

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





## HISTOIRE 'NATURELLE

DES

# **INSECTES**

## LÉPIDOPTÈRES

HÉTÉROCÈRES

I

SPHINGIDES, SÉSIIDES, CASTNIDES

BAR-SUR-SEINE. - IMP. SAILLARD.

## HISTOIRE NATURELLE

DES

# INSECTES

## SPECIES GÉNÉRAL

DE

## LÉPIDOPTÈRES

HETEROCERES

Par MM, BOISDUVAL et GUÉNÉE.

TOME PREMIER

## SPHINGIDES, SESIIDES, CASTNIDES

PAR M. LE D' J.-A. BOISDUVAL

Chevalier de la Légion-d'Honneur, Officier de l'Académie, Membre honoraire des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique, de Russie et de Stettin,

Vice-Président de la Société centrale d'Horticulture de France, Membre honoraire de la Société royale d'Horticulture de Londres, Membre de la Société de Botanique de France, Membre de l'Académie impériale des Naturalistes de Moscou, de l'Académie des Georgophiles de Florence, etc.

OUVRAGE ACCOMPAGNÉ DE PLANCHES

## PARIS

LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET RUR HAUTEPRUILLE, 12 1874

## AU SAVANT

## M. JOHN EDWARD GRAY

DIRECTEUR DE LA PARTIE ZOOLOGIQUE AU BRITISH MUSEUM

# HOMMAGE DE RECONNAISSANCE DE LA PART DE L'AUTEUR

## AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR

Le volume que nous offrons aujourd'hui au public est commencé depuis plus de vingt années et totalement terminé depuis six ans. Inutile de dire que les tristes événements survenus en France n'ont pas peu contribué à retarder sa publication. Malgré l'état encore languissant des affaires, l'éditeur, M. Roret, n'a pas voulu différer davantage l'impression d'un ouvrage annoncé et attendu depuis longtemps. Répondra-t-il à l'attente des Entomologistes? That is the question.

Nous avons fait pour cela tout notre possible. Pendant nombre d'années, nous avons rassemblé dans notre cabinet tous les Sphingudes que nous avons pu nous procurer. D'un autre côté, nous avons obtenu des principaux Musées, les plus obligeantes communications. En Angleterre, M. John Edward Gray, directeur de la partie zoologique du British Museum, nous a permis, avec la meilleure grâce, d'étudier et de décrire tous les Sphingides de cet établissement hors ligne.

M. le D' Horsfield a mis à notre disposition les collections du Museum de la Compagnie des Indes, et nous a permis, en outre, de prendre des notes sur les beaux et nombreux dessins de chenilles peintes par lui-même, pendant un long séjour à Java.

M. W.-W. Saunders nous a accueilli avec la même faveur, et nous a autorisé à décrire tout ce qu'il y avait d'intéressant dans sa riche reliection.

M. Preud'homme de Borre nous a envoyé, sans la moindre exception, la nombreuse série de Sphinx que possède le Musée royal de B-laque.

M. Hapfier nous a fait aussi de précieuses communications, principalement sur les Castnides du Musée impérial de Berlin, l'un des parantes de l'Europe en entomologie.

En Autriche, M. G. Felder nous a fait connaître, avec l'obligeance in le caractérise, les rares Sphingides et Castnides de sa nombreuse sollection.

Enfin, le Musée national de France a également mis à notre discrétion les espèces qu'il possède.

D'autre part, feu noire savant et à jamais regrettable collaborateur, Lin Loconte et l'habile artiste John Abbot, nous ont envoyé dans le sumps, la plupart des Sphingides des Etats-Unis d'Amérique, avec les cessus des chenilles exécutés par Abbot lui-même.

Beske nous a fourni beaucoup d'espèces du Brésil, avec quelques chemilles dans de l'alcool.

Plus récemment Lorquin qui, dans ses divers voyages, s'était, sur notre recommandation, occupé particulièrement de cette famille, nous a envoyé toutes les nouveautés recueillies ou élevées par lui en Californie, en Chine, aux îles Philippines, aux Moluques et dans l'archipel d'Arrow. Malheureusement, cet ami plein de zèle et de dévouement était, en botanique, d'une ignorance complète, de sorte qu'il nous a été presque toujours impossible de reconnaître sur des débris informes, les plantes qui avaient servi de nourriture aux chenilles.

Le capitaine Shervill, l'un des officiers distingués de l'armée anglaise dans l'Inde, nous a confié, avec une grande obligeance, un album dans lequel il a peint, à Darjeeling, avec un talent d'artiste, les chenilles de plusieurs Sphingides propres au Bengale; il nous a offert, en outre, plusieurs espèces élevées par lui dans ses moments de loisir.

Nous ne devons pas omettre non plus feu le général Brunet, qui nous a procuré de précieux renseignements sur les espèces de la Martinique, ni notre excellent ami Hornebeck, qui nous a généreusement donné celles qu'il avait prises ou élevées à l'île Saint-Thomas. Nous devons encore des obligations à feu Goudot, qui nous a cédé les espèces qu'il avait trouvées à Madagascar; au Dr Coquerel, qui nous a offert celles qu'il avait recueillies à Nosi-Bé; à feu R. Marchal, qui nous a offert également les espèces de Maurice et de Bourbon; à Dumolin, qui nous a fourni quelques documents sur deux ou trois espèces de la Sénégambie; enfin, à Adulphe Delegorgue, le célèbre chasseur d'éléphants, d'hippopotames et de rhinocércs, qui a enrichi notre collection de tous les Sphingides pris par lui aux environs de Natal, dans le pays des Amazoulous et de Masilicatsy.

Malgré tous ces matériaux, nous ne nous dissimulous pas qu'il restera encore bien des lacunes à combler. Nous n'avons certainement pas vu tout ce qui peut exister dans des collections particulières. Il n'y a pas, a dit Lacordaire « de petite collection qui ne renferme

quelque espèce intéressante. »

Notre species, ainsi que nous l'avons dit plus haut, étant achevé depuis longtemps, nous n'avons presque rien changé à notre manuscrit. Nous avons laissé subsister les noms tels que nous les avions donnés en 1853 aux Sphingides de la collection du British Museum, où chaque espèce porte encore aujourd'hui une étiquette écrite de notre main. Deux savants, MM. Walker et Moore ont, dans leurs écrits, respecté et adopté ces mêmes noms. Il y a sans donte plusieurs espèces qui ont été décrites depuis dans des travaux que nous n'avons pas été à même de nous procurer, ou dont nous n'avons pu consulter que des fragments détachés.

Les Américains du nord, qui élargissent tous les jours le corset

des Etats-Unis, et qui regardent maintenant le Mexique et les Antilles comme annexés scientifiquement à leur immense territoire, ont, paralt-il, publié beaucoup de choses sur les Lépidoptères. Malheureusement, il n'y a pas encore, que nous sachions, un seul ouvrage consacré à une faune locale, ou à la monographie d'une famille, mais des descriptions d'espèces isolées et éparpillées dans divers recueils. Nous devons en excepter, toutefois, une excellente monographie des Sphinx de l'île de Cuba, par le savant M. Grote.

Les Entomologistes de l'Union américaine, animés du feu sacré de la science, travaillent avec zèle : s'ils continuent de la sorte, avec les matériaux qui abondent chez eux, ils pourront, dans un avenir rapproché, rivaliser avec les Entomologistes du continent Européen. Il v a aujourd'hui en Amérique plusieurs jeunes sociétés savantes, où ion s'occupe activement de toutes les branches des sciences naturelles. La société de Buffalo, par exemple, et surtout la société Eutomologique de Philadelphie: dans cette dernière on s'est partagé la besogue, chacun selon ses goûts ou son aptitude. M. John Leconte primes inter pares, fils de notre savant collaborateur, est à la tête des Cole opti ristes; M. E. T. Cresson s'occupe spécialement des Hyméniptères; M. Scudder, des Orthoptères et des Lépidoptères de la Nouvelle-Ecosse; le baron Osten Sacken, des Diptères; M. Reskirt Tryon, des Lépidoptères diurnes; M. Grote se voue en partie à l'étude des Bétérocères, qu'il poursuit avec zèle; M. Blackenridge Clemens · appiique particulièrement à l'histoire des Sphingides américains; > en passons et des plus capables; enfin, M. W. H. Edwards de burg public en ce moment une magnifique lconographie descr. ptive des Rhopalocères, ouvrage hors ligne.

Il est regrettable que parmi cet essaim d'Entomologistes, il n'y en ait pas un qui se livre exclusivement à l'étude et à l'éducation des chemiles, base de toute bonne classification, comme le faisait Abbot aux environs de Savanah. Jamais cet observateur patient ne représentait un insecte parfait, qu'après l'avoir peint sous ses diverses phases evo atives. Cependant, M. Lintner, d'Albany, semble entrer un peu dans cette voie.

La triste maladie dont nous sommes atteints depuis plusieurs ances, la Génésomanie, a traversé l'Océan, et fait en ce moment des process si rapides chez nos collègues américains, que si l'épidémie con rencontre pas un obstacle, il y aura bientôt autant de genres que despeces. C'est un véritable déluge.

Nons ne saurions approuver davantage les noms empruntés aux Costus de Hubner, et appliqués par certains Entomologistes à leurs par de la genres nouveaux. Hubner, le plus consciencieux de nos la la la jamais vu en nature la sixième partie des Lépisoptères qu'il a essayé de grouper d'après des images. Il ne donne,

d'ailleurs, aucun caractère positif à ses Coitus, où les espèces sont souvent associées au hasard. Nous en pourrions même citer plus d'un, où une variété n'est pas placée dans le même groupe que l'espèce type. Que dirait-on d'un hotaniste qui donnerait pour caractères de genres, la couleur des fleurs, la marbrure ou la découpure des feuilles? C'est par ces diverses raisons, qu'à l'exemple d'Ochsenheimer, de Latreille, de Godart, de Treitschke, de Duponchel, de Guénée, etc., nous rejetons ces sortes de genres et les considérons comme non avenus.

On remarquera que dans beaucoup de cas, nous nous sommes abstenu, pour les espèces les plus communes, de citer toute la série des auteurs qui en ont parlé. Ce luxe de synonymie aurait allongé inutilement le texte de notre volume et dépassé la limite qui nous est assignée. On verra aussi que nous avons modifié le genre Macrosila, que nous avions proposé pour un groupe de Sphingides à taches latérales jaunes, qui ne diffèrent en rien des Sphinx proprement dits. La seule espèce que nous ayons conservée dans ce genre est le Tetrio de Linné. Nous avons aussi supprimé le sous-genre Calliomma créé par nous pour le Sph. Licastus de Cramer qui, malgré sa tache argentée, n'offre aucun caractère suffisant pour motiver sa séparation des Eucheryx.

Nous pourrions arrêter ici notre travail, mais comme les anciens auteurs ont donné le nom de Sphinx aux Sésies, Thyris et groupes voisins, et que les Entomologistes modernes les placent toujours à côté des Macroglosses, nous n'avons voulu rien innover à une classification admise jusqu'à présent. C'est pour cette raison que nous avons suivi leur exemple. Nous avons même été plus loin, en ajoutant à la suite de ces Pseudo-Sphinx, la famille des Castnides appelées Hesperies-Sphinx par l'illustre Latreille, quoiqu'elles n'aient pas plus de rapports avec les Hespéries qu'avec les Sphinx. Ce sont des insectes d'une création à part, qui sous leurs premiers états, ont à la fois les habitudes des Sésiides et des Zeuzérides, mais auxquels il est difficile d'assigner une place. Nous n'avions pas à nous occuper des Agaristides, Aganaldes, Zygénides, Glaucopides, etc., etc., qui par leurs chenilles velues appartiennent à l'immense série des Trichophorides et conduisent presque insensiblement aux Lithosides, Chélonides, etc.

Nous terminerons en priant les personnes qui ont bien voulu nous venir en aide, de recevoir ici un témoignage public de notre reconnaissance.

Paris, mars 1874.

Dr J.-A. BOISDUVAL.

## HISTOIRE NATURELLE

## INSECTES LÉPIDOPTÈRES

## FAMILLE DES SPHINGIDES

Généralement, dans les classifications zoologiques, on commence la série par les êtres les plus complets et les plus fortement constitués. Si l'on suivait la même marche pour les Lépidoptères, on devrait mettre en tête les Sphingides, dont l'organisation robuste l'emperte sur tous les insectes du même ordre; mais comme ce n'est pas ici le lieu de faire une classification nouvelle, nous suivrons dans cet ouvrage les errements de nos devanciers, en retranchant de la famille des Sphingides, les Zygénides, qui n'ont aucun rapport avec les Lépidoptères dont il va être question.

La nombreuse famille des Sphingides, répandue sur tout le globe, moins les régions polaires, se composait, au temps de Linné, de deux groupes bien distants: Sphinges legitima et Sphinges adscita. Fabritus, qui vint ensuite, en retrancha avec raison les a la line, et laissa le nom de Sphina aux legitima, dont il ne détacha que les espèces dont l'abdomen se

Lépidoptères. Tome i.

termine par une brosse, pour en former le genre Sesia, qu'il ne faut pas confondre avec les véritables Sesia de Laspeyres et des auteurs modernes. Latreille vint à son tour : il conserva le grand Sphina en y réunissant de nouveau les espèces à brosse anale; mais il créa le genre Smerinthus, déjà indiqué par Fabricius, sous le nom de Laothoe. Depuis lors, chaque auteur a essayé de faire des genres nouveaux, dont les caractères très-oscillants ne sont pas toujours bien saisissables. Nous n'osons nous flatter d'avoir mieux réussi : beaucoup de nos soi-disant genres ne sont, à proprement parler, que des divisions dans lesquelles nous avons tâché de grouper les espèces aussi naturellement qu'il nous l'a été possible.

## CARACTÈRES DES SPHINGIDES.

Chenilles: glabres, cylindriques, allongées, légèrement renflées postérieurement, munies généralement d'une corne sur l'avant-dernier segment, ou quelquefois d'un petit écusson lenticulaire qui en tient lieu.

Chrysalides: coniques, lisses, pourvues d'une pointe anale plus ou moins prononcée et plus ou moins rugueuse.

Les chenilles des Sphingides vivent solitairement, tantôt sur les arbres ou les arbustes, et tantôt sur les plantes basses.

Insecte parfait: Antennes linéaires, prismatiques, terminées à l'extrémité par une petite pointe velue, en crochet plus ou moins prononcé, plus fortes chez les mâles où elles sont scabres en dessous, ou même

quelquefois un peu dentées; plus simples chez les femelles. Palpes larges, contigus, appliqués exactement sur le front, et couverts de poils écailleux trèsserrés; leur troisième article à peine distinct dans la plupart des genres. Chaperon saillant, recouvert de poils écailleux très-denses. Ailes supérieures étroites, elliptiques, allongées, marquées ordinairement vers leur milieu, sous la côte, d'un stigmate plus ou moins apparent, lorsqu'il n'est pas absorbé par la couleur du fond. Ailes inférieures beaucoup plus courtes que les supérieures, pourvues généralement d'un crin (retinaculum). Corselet très-robuste pour recevoir l'insertion des muscles alaires. Abdomen très-gros, allongé, cylindro-conique, terminé quelquefois par un suitit pinceau de poils ou par une brosse étalée en queue d'oiseau.

Ces insectes, doués d'un vol puissant et soutenu, reuvent se transporter souvent à des distances considérables, et former, par des migrations, des colomes momentanées loin de leur patrie.

Les Sphingides constituaient, avec les Sésides, les Zygénides, les Castniaires, les Agaristides, les Glauco-poles, etc., une partie des soi-disant crépusculaires lans la méthode du célèbre Latreille.

Pour la détermination des espèces, les seuls caraceres distinctifs n'existent pas seulement dans la couleur et le dessin des ailes, comme chez la plupart des impoloptères Rhopalocères. Chez les Sphingides, il en c-t autrement; il faut tenir un grand compte de ceux que peuvent fournir le corselet et l'abdomen.

## TRIBU DES ACHÉRONTIDES

Cette tribu se compose seulement du genre Acheron-tia.

Chenilles: très-grosses, cylindriques, chevronnées sur le dos, marquées latéralement de bandes obliques, et munies sur l'avant-dernier segment d'une espèce de queue plus ou moins grenue.

Insecte parfait. Antennes relativement très-courtes, roides, recourbées à leur extrémité en un petit crochet. Corselet très-robuste, portant sur son milieu l'empreinte plus ou moins nette d'une tête de mort. Palpes un peu écartés, trompe roulée en spirale aussi longue que le corps. Yeux gros et saillants, très-brillants pendant la vie. Abdomen cylindroïde-obtus. Pattes robustes, avec les cuisses épineuses et les jambes terminées par une griffe très-prononcée.

## GENRE ACHERONTIA. Ochsenh. Boisd.

Brachyglossa, Latreille, Boisd. Dup. olim.

Latreille, frappé de la différence qui existe entre l'Atropos et les autres Sphingides, avait proposé d'en faire un
genre propre sous le nom de Brachyglossa, lequel aurait
compris, en outre, les triangularis et australasiæ de la
Nouvelle-Hollande. Nous avons cru qu'il était préférable
d'appliquer le nom d'Acherontia, donné par Ochsenheimer
aux espèces suivantes, et de laisser le nom de Brachyglossa
à celles de l'Australie, dont la trompe est très-courte, comme
dans les Smérinthes.

Les Acherontia sont exclusivement propres aux régions chaudes de l'ancien continent. Quoique lourds en apparence, ils peuvent se transporter à de grandes distances.

## 1. A. ATROPOS.

Sphinx idem, Linn. — Fab. — Esp. — Ochs. — Hubner, — God. etc.
Sphinx à tête de mort, Engr. P. d'Europ.— Geoffr. Hist. des Ins. 41.

Cette espèce est parfaitement connue de toutes les personnes qui s'occupent d'entomologie. Si nous en donnons ici la description, c'est pour établir la comparaison entre elle et les deux espèces suivantes qui en sont très-voisines.

Il a environ 14 centimètres d'envergure. Ses ailes supérieures sont d'un brun plus ou moins intense, avec deux raies blanchâtres, transversales, courtes et ondulées, dont la première, qui est rapprochée de la base, est divisée par une ligne noirâtre, principalement vers la côte; l'autre, qui est placée entre le sommet et le milieu, est double, suivie en dehors d'un espace mélangé de grisâtre et de ferrugineux. Outre cela, l'origine du bord interne offre une petite touffe de poils fauves; le milieu de l'aile est traversé par des lignes noirâtres et marqué, à l'extrémité de la cellule discoldale, d'un point blanc; les nervures de l'extrémité sont ferrugineuses.

Le dessus des ailes inférieures est d'un jaune-d'ocre assez vif, au deux bandes transversales noires, dont l'antérieure plus étroite forme un coude, la seconde est presque terminale et se prolonge sur les nervures.

Le dessous des quatre ailes est jaune d'ocre, avec deux bandes transversales noires.

Le corselet est d'un brun-noir sablé de bleuâtre, avec une grande tache médiane d'un gris plus ou moins blanchâtre, marquée de deux points noirs, ce qui lui donne une certaine ressemblance avec une tête de mort. L'abdomen est d'un jaune foncé, avec une large bande dorsale, longitudinale, d'un bleu pâle, coupée par six anneaux noirs qui font le tour du corps. Les antentes sont brunes avec le bout d'un beau blanc.

La chenille, que l'on trouve en Europe, depuis la mi-juillet jusqu'à la fin d'août, sur la pomme de terre, Solanum tuberomm, la tomate, Solanum lycopersicum, l'alkekenge, Physalis al-cergi, le lyciet, Lycium Europæum, la douce-amère, Solanum fuicamara, le lilas, le jasmin, l'olivier, etc., est d'un beau jaune curou ou d'un jaune-vert, avec sept bandes obliques vertes; son ba est en outre marqué de sept chevrons bleus, piqués de noir.

La corne du onzième segment est très-granuleuse, scabre, relevée à son extrémité en queue de chien. On rencontre quelquefois, mais rarement, une variété entièrement d'un brun noirâtre dont les premiers anneaux sont marbrés de blanc.

La chrysalide est d'un brun-marron clair.

L'insecte parfait paraît vers la fin de septembre ou dans la première quinzaine d'octobre.

Les chrysalides, provenant de chenilles métamorphosées trop tard, se dessèchent pendant l'hiver et n'éclosent jamais.

Ce Sphingide n'est pas indigène de l'Europe comme on le croit généralement : dans les années chaudes il nous est apporté par les vents du sud et du sud-est. C'est alors qu'il s'accouple dans notre climat et nous donne une génération en automne, tandis qu'en Afrique et dans l'Asie, il paraît sans interruption.

Ce migrateur est souvent fort commun dans le midi et le ceutre de l'Europe, et s'avance même quelquefois jusqu'en Angleterre.

Cet Acherontia a joui autrefois d'une certaine célébrité. Dans quelques contrées de la France, on le regardait comme un avant-coureur de la mort, et il inspirait aux gens superstitieux une sorte de terreur, à cause de l'empreinte qu'il porte sur son corselet et du cri qu'il fait entendre lorsqu'il pénètre le soir dans les appartements, ou qu'on le saisit avec les doigts. Plusieurs savants ont cherché la cause de ce bruit sinistre, chacun a émis une théorie différente. Mais cette question n'est pas encore parfaitement tirée au clair.

A l'île de la Réunion, où il est excessivement commun pendant toute l'année, il porte le nom d'Aille. Les gens du peuple et beaucoup de créoles le regardent comme un insecte fort dangereux; ils croient que lorsqu'il entre dans une chambre, il peut aveugler les personnes qui s'y trouvent. Aussi emploient-ils tous les moyens possibles pour le faire sortir. On s'étenne que Bernardin de Saint-Pierre ait pu se faire l'écho d'une pareille fable.

#### 2. A. STYX.

Westwood, Cabin. orient. ent. pl. 42, f. 3. — Moore, Lepid. of the east ind. Comp. p. 266; 614.

Acherontia atropos, var. Walker, Het. Lepid. Brit. mus. pt. VIII, p. 234, 1.

Artel, Boisd. M.

Il a le port de l'Atropos, mais il est beaucoup plus petit, avec

les ailes supérieures beaucoup plus nuancées de ferrugineux; les deux raies blanches transversales sont remplacées par du ferrugineux; le point blanc est remplacé par un point roussatre plus petit; les antennes sont brunâtres, avec la pointe d'un gris roussatre et non d'un beau blanc. L'empreinte de la tête de mort est plus allongée, bien nette, souvent un peu vineuse; la bande dorsale blene est de moitié plus étroite; les anneaux noirs qui la coupent sont moins larges et ne se continuent pas sous le ventre comme chez l'Atropos; les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocra plus pâle, avec les bandes transversales plus étroites.

Les antennes sont plus longues et plus grêles, avec l'extrémité moins blanche.

La chenille, d'après un dessin fait à Darjeeling par le capitaine Shervill, vit sur presque toutes les plantes de la famille des Soimées, mais plus souvent encore sur le lilas. Elle est d'un brun noirâtre, avec les chevrons plus obscurs ainsi que les traits obliques; elle est rayée de blanc sur les premiers anneaux; ses stigmates sont noirs, cerclés de blanc; sa queue est rugueuse, printue et relevée en l'air.

Ce Sphingide est beaucoup plus commun au Bengale que le véritable Atropos. Malgré sa taille plus petite, il fait entendre un cri plus aigu.

Aux environs de Madras, sa chenille dévore dans les jardins les aux-rejines, Solanum melongena, et le lilas, Syringa persica.

### 3. A. SATANAS.

Boisd. Spec. gen. des Lep. pl. 16, fig. 1. — Moore, Lep. of the east .ad. Comp. I, p. 367.

Arherontia lethe, Westwood, Cabin. orient. Ent. pl. 42, f. 2. — Walker, Heter. p. 235, 3.

Subma atropos, var. Cram. Pap. exot. 237, f. A.

Un peu plus grand que l'Atropos. Ses ailes supérieures sont presque semblables, sauf que le point blanc est plus petit, que l'espace qui suit la double ligne blanche est plus blanchâtre, et ene le long du hord terminal il y a une ligne blanchâtre en festal. Les ailes inférieures ont les deux bandes noires transversales le aucoup plus larges, la seconde va jusqu'au bord extérieur et des seulement quelques crénelures jaunes, la première ou celle de milieu est précédée, du côté de la base, d'une grosse tache zoire un peu triangulaire.

La tête de mort du corselet est bien marquée, un peu vineuse, avec les taches imitant les orbites grandes et cerclées de gris blanchâtre.

La bande dorsale bleue de l'abdomen est plus large que dans l'Atropos, les anneaux noirs qui la coupent font le tour du corps. Les antennes sont plus minces et plus longues que dans l'Atropos, avec la pointe blanche; le dessous des ailes est beaucoup plus varié de noir entre les deux bandes transversales.

La chenille, d'après un beau dessin fait dans l'Inde par le capitaine Shervill, qui a eu l'obligeance de nous le communiquer, est verte ou d'un vert un peu jaune, pointillé de brun, avec sept traits obliques jaunes. Elle n'a pas de chevrens sur le dos. Sa queue, peu granuleuse, est presque comme chez notre Sph. ligustri. Les stigmates sont blancs, cerclés de noir. Elle vit sur le tabac, Nicotiana tabacum.

Il se trouve dans l'Inde, à Java, Bornéo et aux îles Philippines. Il est moins commun que le Siyx.

Le Sphinx Lachesis de Fabricius, qui a aussi une tache noire vers la base des ailes inférieures, pourrait bien être le même que notre Satanas. La description qu'il donne conviendrait assez à notre espèce, s'il ne disait pas que, dans son Lachesis, l'abdomen est noir, avec des bandes jaunes, abdomine nigro flavo-jasciato. C'est peut-être une espèce voisine que nous ne connaissons pas.

## TRIBU DES SMÉRINTHIDES

Cette tribu est composée d'un certain nombre de genres dont les chenilles ont les habitudes des autres Sphingides; elles sont de même munies d'une petite queue ou plutôt d'une espèce de corne sur le onzième segment. Mais ce qui les distingue particulièrement, c'est d'avoir le plus ordinairement la tête triangulaire et la peau chagrinée et rugueuse.

Le papillon à l'état parfait semble faire le passage aux Sericaria, aux Endromis, etc., particulièrement les Smérinthes proprement dits, dont les antennes sont grosses, fortement dentées dans les mâles, et dont la trompe,

dans les deux sexes, est généralement trop peu développée pour servir à l'alimentation.

## GENRE BRACHYGLOSSA. Latr. Boiled.

Caquosa, Walker.

Ce genre, dont nous ne connaissons encore que trois espèces, a pour types les Sphinx triangularis et Australasiæ de Donovan.

Les chenilles des Brachyglassa sont très-grosses, presque cylindriques; elles ont la peau chagrinée et la tête triangulaire, comme celles des Smérinthes. Elles vivent sur les arbres et donnent deux générations chaque année.

L'insecte parfait est lourd, paresseux, et offre les caractères suivants: Antennes longues, assez grêles, un peu atténuées vers l'extrémité et recourbées en crochet. Palpes non ascendants, ne s'appliquant pas sur le front, presque dirigés horizontalement, écailleux, avec le second article dilaté et élargi à l'extrémité. Trompe très-courte. Yeux gros et saillants. Pattes peu épineuses. Corps gros, cylindrico-conique, obtus. Ailes larges, les supérieures sinuées à l'extrémité, les inférieures colorées en jaune plus ou moins intense.

Les Brachyglosses sont propres à la Nouvelle-Hollande.

#### 1. B. TRIANGULARIS.

Donov. Epitom. of the Ins. of New. Holl. pl., fig. 2.

Boisd. Voy. de l'Astrolahe, p. 181, 1. — Spec. gener. pl. 16, 2.

Walker, Heterocera, p. 257, 1.

Il a de 12 à 15 centimètres d'envergure. Ses ailes supérieures ent d'un brun soyeux très-clair, lavé d'un peu de blanc, avec parlques poils fauves à leur base et une grande tache trianguitre, d'un brun marron, sur le milieu de la côte; cette grande table ne dépasse guère inférieurement le milieu de l'aile et est entourée d'une éclaircie blanche principalement en dehors; l'antie interne offre aussi un petit espace blanchâtre, le bord interne est liseré de blanc.

Les afles inférieures sont d'un beau jaune fauve à leur hasé, avec la moitié postérieure d'un brun marron, et un espace d'un cendré blanchâtre à l'angle anal.

Le corselet est d'un brun clair; l'abdomen est d'un gris brunâtre avec une petite ligne dorsale brune. Les antennes sont d'un beau blanc.

Le dessous des ailes est grisâtre avec le disque des supérieures lavé de fauve.

La chenille, d'après un dessin fait à la Nouvelle-Hollande par feu Jules Verreaux, est verte, chagrinée avec des gros traits obliques et la tête parfaitement triangulaire. Elle est très-commune sur plusieurs espèces de Protéacées des genres Banksia et Embothrium.

#### 2. B. Australaslæ.

Donov. Epit. of Ins. of New. Holl. pl., fig. 1. Boisd. Voy. de l'Astrolab. p. 181, 2.—Walker, Heterocera, pl. 257, 2.

Il est de la taille du triangularis, mais ses ailes supérieures sont tronquées au sommet; leur base est d'un gris-soyeux trèspâle tirant sur le gris tourterelle; cette partie pâle forme une espèce de tache irrégulière en dehors, se prolongeant en pointe au-dessous de la nervure médiane pour séparer deux taches brunes, l'une en carré oblong sur le bord interne, et l'autre souscostale, beaucoup plus grande, et d'une forme un peu triangulaire; cette dernière tache est marquée d'un point central brun; l'extrémité des ailes est d'un gris soyeux, nuancé d'une teinte un peu plus obscure avec deux raies brunes parallèles, interrompues.

Les ailes inférieures sont d'un rouge-capucine aurore avec l'angle anal d'un gris cendré, surmonté d'une tache noire et suivi, en déhors sur le bord marginal, d'une bande courte de la même couleur.

Le corselet est d'un gris tourterelle avec une raie longitudinale brune. L'abdomen est d'un gris un peu brun avec une petite ligne dorsale très-fine, obsolète, brune.

Le dessous des ailes est grisâtre avec tout le disque des supérieures d'un fauve aurore.

La chenille, selon M. Jules Verreaux qui l'a élevée plusieurs fois, se trouve sur différentes Protéacées du genre Banksia, principalement sur le Banksia serrata. On trouve fréquemment ce Sphingide accouplé.

### 3. B. BANKSLÆ. Boiad.

Il est de la taille du précédent; ses ailes supérieures sont de même tronquées au sommet; elles sont d'un brun rougeâtre avec des raies transversales plus foncées, dont la plus rapprochée de l'extrémité est la mieux marquée; le bord marginal au-dessous de la troncature est bordé d'un peu de brun qui se fond avec la teinte générale.

Les ailes inférieures sont d'un jaune pâle avec une raie longitudiuale de poils d'un fauve vif, située entre le milieu et la gouttière abdominale; il y a en outre quelques poils fauves disséminés sur plusieurs points de la surface; l'angle anal est d'un cendré blanchâtre surmonté d'une petite tache brune allongée; la bordure est brune et se rétrécit insensiblement en remontant vers l'angle externe.

Le corselet est d'un gris foncé avec une raie longitudinale brune; l'abdomen est d'un gris jaunâtre sur ses premiers anneaux et ensuite d'un brun grisâtre avec une petite ligne dorsale très-fine, de couleur brune.

Le dessous des ailes est d'un gris un peu vineux avec une raie brune, commune, dentée en soie, et le disque des supérieures d'un fauve assez vif.

Cette espèce est la plus rare des trois. Sa chenille vit sur le Banksia ericæfolia.

Coll. Bd.

GENRE METAGASTES. Boisd. - Sphinx auctorum.

Caquosa, Walker.

Ce genre a un certain rapport avec les Brachyglosses; mais comme nous ne connaissons pas les chenilles, nous ne sommes pas parfaitement sûr qu'il appartienne véritablement à la tribu des Smérinthides.

Insecte parfait: Antennes assez longues, relativement gréles, recourbées en crochet à leur extrémité. Front nu. Palpes ascendants, légèrement écartés, appliqués sur la tête, avec le second article large, cylindroïde, aplati, couverts de petits poils serrés, écailleux. Trompe large, apla-

tie, de longueur très-moyenne. Yeux grands et saillants. Corps robuste, comme dans notre populi et notre quercus. Ailes larges sans dentelures.

Les deux seules espèces que nous connaissons sont propres aux Indes orientales.

## 1. M. PHALARIS.

Cram. 149, A. — caquosa? phalaris, Walker, Heterocera, p. 258, 3.

Il a le port et la taille du Brachyglossa triangularis. Ses ailes supérieures sont entières avec le bord interne et un espace vers le sommet d'un cendré bleuâtre; outre cela, elles sont marquées d'une espèce de bande oblique, brune, assez large, allant du tiers autérieur de la côte à l'angle interne, et de quatre à cinq raies transversales de la même couleur; celle de ces raies qui est la plus rapprochée de la base est peu indiquée, les quatre autres sont parallèles et placées entre le milieu et l'extrémité.

Les ailes inférieures sont d'un rouge un peù brun avec un espace d'un gris cendré à l'angle anal.

Le corps et le corselet sont d'un brun clair; ce dernier est marqué d'une raie longitudinale noire assez étroite.

Le dessous des ailes est d'un brun rougeatre.

Chez le mâle, qui est un peu plus petit, les lignes brunes sont beaucoup moins bien marquées que chez la femelle figurée par Cramer.

Indes orientales. Coll. Bd.

#### 2. M. NICOBARENSIS.

Schwarz, Beytr. Suppl. à Klem. et Rœs. I, 1.

Il est à peu près de la taille du *B. triangularis*. Ses ailes supérieures sont bien entières, d'un gris roussâtre, lavé d'incarnat, avec le bord interne d'un gris plus ou moins clair; elles ont en outre, à partir du milieu de la côte, une large tache plus claire que le fond, s'étendant obliquement jusqu'à l'extrémité sans dépasser le second rameau de la nervure médiane; cette même tache est traversée par trois raies, très-obsolètes, un peu obscures, et est marquée au sommet d'un espace brunâtre.

Les ailes inférieures sont d'un roux ferrugineux, avec tout leur bord costal beaucoup plus pâle et presque blanchâtre. Le corselet est de la couleur des premières ailes; l'abdomen est d'un gris roussatre. Les antennes sont d'un brun clair.

Le dessous des ailes est d'un jaunâtre pâle, avec le disque des supérieures un peu ferrugineux.

La femelle est plus grande que le mâle, d'une couleur plus blanchâtre, non lavée d'incarnat; ses ailes supérieures sont traversées par six raies plus obscures que le fond, un peu ondulées, dont trois entre la base et le milieu, et les trois autres dans la grande tache oblique.

Schwarz a figuré un mâle que son ami Esper avait reçu de l'île de Nicobar. Nous possédons un mâle et une femelle, mais nousignorons dans quelle partie de l'Inde ils ont été trouvés.

Rare.

## GENRE CALYMNIA. Boisd. Walker, Moore.

Ce genre est établi sur un très-beau Sphingide javanais, figuré par Cramer sous le nom de Panopus.

La chenille, qui, selon Horssield, vit sur le Mangifera indica, est chagrinée, un peu rugueuse, avec la tête triangulaire et sept bandes latérales obliques.

Insecte parfait: Antennes assez longues, grêles, recourbées en crochet. Front presque nu. Palpes ascendants, appliqués fortement sur la tête, couverts de poils serrés, courts et écailleux, avec le second article aplati et dilaté. Trompe peu allongée. Yeux de grandeur ordinaire. Corps très-robuste, avec l'abdomen très-gros, raccourci, cylindroide-pointu. Ailes larges.

#### 1. C. PANOPUS.

Cram. Pap. exot. pl. 224, A, B. — Smerinthus? panopus, Westwood, Cabin. orient. Ent. p. 13, pl. 16, fig. 2. — Walker, Hist. lep. Brit. mus. het. pl. VIII, p. 124. — Moore, Catal. of Lep. in the mus. of east ind. Comp. I, p. 216. — La chenille, pl. VIII, fig. 6, 6a.

Ce grand Sphingide, dont Cramer et surtout M. Westwood ont donné une très-bonne figure, a environ 15 centimètres d'envergure. Ses ailes supérieures entières ont le sommet un peu échancré; elles sont d'un gris luisant avec une grande tache basilaire d'une brun olivâtre, et une bande transversale, droite, de la même couleur, située sur le tiers postérieur; entre la tache basilaire et cette bande, il y a quelques ondes obscures, et à l'extrémité de la cellule discoïdale une tache un peu réniforme d'un brun olive; le bord terminal est bordé par une bande brune élargie dans son milieu, précédée, en dedans, de quelques lignes obsolètes et d'un petit sablé de couleur brune; outre cela, on voit sur l'angle interne une belle tache oculaire, noire, sans pupille, liserée en dedans par un croissant blanc.

Les ailes inférieures sont roses à la base, noires à l'extrémité, traversées par plusieurs bandes obscures, dont celle du milieu est plus large et lavée de rouge-brun.

Le corselet est entièrement d'un brun olive, bordé de blanc rosatre à son point de jonction avec l'abdomen. Celui-ci est d'un gris un peu bleuâtre avec l'extrémité dorsale brune.

Les antennes sont blanches.

Le dessous des ailes est mélangé de brun et de jaune d'ocre.

La chenille, dont nous avons vu un très-beau dessin chez M. Horsfield au Museum de la Compagnie des Indes, est verte, très-rugueuse, pointillée de blanc avec sept bandes obliques blanchâtres, s'étendant de la base des pattes jusqu'à une raie latérale de la même couleur; la tête est fortement triangulaire et la queue très-longue; les stigmates sont blancs cerclés de noirâtre. Elle vit sur le manguier (mangifera indica).

La chrysalide est d'un brun foncé.

Cette grande et belle espèce se trouve à Java, à Bornéo, à Célèbes, à Ceylan et dans le nord de l'Inde.

#### GENRE EUCLEA. Boisd.

Smerinthus, Boisd. olim. - Felder, Walker.

Nous avons fait figurer l'espèce unique, sur laquelle nous établissons ce nouveau genre, sur une planche des Familles naturelles de Latreille, comme un *Smerinthus*; mais l'ayant étudiée depuis avec soin, nous nous sommes aperçu que, par la conformation singulière de ses palpes, elle devait constituer un genre à part.

Sa chenille, selon M. Dumolin, qui en a élevé deux

exemplaires, est verte et rugueuse, avec des bandes latérales obliques.

Insecte parfait. Front couvert de poils très-serrés. Palpes borizontaux, nullement ascendants, de longueur moyenne, velus et écailleux, avec le dernier article se terminant par une petite pointe nue, bien distincte. Trompe courts. Antennes assez longues, un peu grêles, finissant en crochet. Yeux grands. Corps assez robuste, avec l'abdomen cylindrolde-obtus. Ailes dentelées, assez larges.

#### 1. E. DUMOLINII. Boisd.

Boisd. in Latr. Fam. nat. — Felder, Reise der freg. Novara Band. II, abth. 2, tab. LXXXII, fig. 2. — Smerinthus Dumolinii, Walker, Heteroc. p. 250, 12.

Ce magnifique Sphingide, dont nous avons donné une bonne figure sur les planches qui accompagnent le second volume des Familles naturelles de Latreille, a environ 11 centimètres d'envergure. Ses ailes supérieures, régulièrement dentelées, sont d'un gris brillant; leur milieu est marqué d'une large tache triangulaire, transversale, d'un brun brillant, expirant avant d'arriver au bord interne; cette tache est sinuée et denticulée des deux côtés et un peu liserée de blanc; elle est en outre marquée d'un gros paint blanc arrondi, précédé en dehors d'une tache trifide de la même couleur; entre la base et la tache brune dont il s'agit, il y a deux raies blanchâtres, et en dehors de cette même tache, il y a aussi deux autres raies blanchâtres; sur l'angle apical existe une tache brune, et au-dessous, sur le bord terminal, une tache cunéiforme plus grande, de la même couleur.

Les ailes inférieures sont d'un gris un peu brun.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, avec une large tache médiane brune, et une bande transversale de la même couleur à son point de jonction avec l'abdomen; celui-ci est d'un grus foncé. Les antennes sont blanches.

Le dessous des quatre ailes est d'un gris blanchâtre, aves une tache brane assez grande sur leur bord costal.

Cette belle espèce a été élevée à Galam, par feu Dumolin, qui a trouvé la chenille sur le baobab, Adansonia digitata. Elle est, sous a-t-il dit, verte, très-rugueuse, avec sept bandes obliques

d'un blanc jaunâtre; la tête forme un triangle bordé de jaune; elle a, sur le onzième anneau, une corne arquée (Dumolin).

Deux individus lui sont éclos, l'un fait partie de notre collection, et l'autre a été acquis par feu Robyns, de Bruxelles.

Le British Museum possède un exemplaire pris à Natal.

## GENRE NYCERYX. Boisd. - Ambulyx. Felder.

Ce genre, que nous avons établi sur un Sphingide de la Colombie, semble être une contrefaçon de certaines espèces d'Ambulyx de la même contrée, auxquels il ressemble beaucoup, au premier coup-d'œil, par les ailes inférieures; mais lorsqu'on l'examine en détail, on voit que sa véritable place est dans la tribu des Smérinthides.

Chenille: Inconnue.

Insecte parfait. Tête retirée sous le corselet, comme dans nos Smérinthes. Antennes des mâles assez fortes, dentelées. Palpes très-velus, à articles confondus. Trompe épaisse et très-courte. Yeux assez gros. Corselet gros, très-velu. Abdomen du mâle cylindroïde obtus, offrant, de chaque côté, près de l'extrémité anale, une petite dilatation très-visible. Abdomen de la femelle conique. Ailes supérieures pointues au sommet. Ailes inférieures dépourvues de crin.

#### 1. N. HYPOSTICTA.

Felder, Novara, exp. Zool. theil. Bnd. 12, abth. 2, tab. 77, f. 2. — Nyceryx Vega, Boisd. M.

Il est d'un quart plus grand que le S. occilatus. Ses ailes supérieures sont aiguës au sommet, avec le bord terminal ondulé et presque anguleux; leurs deux tiers antérieurs sont d'un gris violâtre luisant, traversés par six bandes brunes, parallèles, dont les trois postérieures n'atteignent pas la côte; l'autre partie est brung avec quelques raies transverses plus obscures et quatre points blancs transparents, dont les trois supérieurs sont alignés longitudinalement.

Les ailes inférieures sont d'un ross un peu briqueté, traversées par quatre bandes parallèles noires aînsi que les nervures; outre cela, on voit entre la première bande qui est très-courte, et la seconde une lunule également noire.

Le corselet est d'un gris violâtre foncé et porte une petite crête médiane, l'abdomen est un peu plus obscur et est fascié latéralement de quatre bandes rougeâtres.

Le dessous des ailes supérieures est brun, marqué dans ses deux tiers antérieurs d'une quinzaine de taches jaunes. Le ventre est ferrugineux ainsi que les ailes inférieures; ces dernières sont traversées par des bandes, un peu maculaires, plus claires que le fond.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a au-dessus de l'angle anal deux points blancs transparents, superposés et alignés transversalement.

Colombie. Rare.

## GENRE SMERINTHUS Lat. Ochsenh. Boisd. Dup. Walk., etc.

Ce genre, le plus nombreux de la tribu, habite les deux continents; mais il est plus répandu dans les régions tempérées que sous les zônes intertropicales.

Les chenilles des Smérinthes vivent toutes sur les arbres, principalement sur ceux de la famille des Salicinées. Elles ont la peau chagrinée, rugueuse, la tête triangulaire, et l'avant-dernier segment pourvu d'une corne; outre cela, elles sont un peu amincies antérieurement et ornées de bandes latérales obliques. La métamorphose a lieu dans la terre. Les chrysalides sont cylindrico-coniques, avec une pointe anale simple.

lasecte parfait: Tête retirée sous le corselet. Palpes trèscourts, velus, écailleux, ne dépassant pas les yeux. Trompe courte. Antennes linéaires, un peu flexueuses, plus fortes et dentées chez les mâles. Ailes inférieures généralement dépourvues de crin (retinaculum). La forme des ailes supérieures varie passablement chez les Smérinthes: elles sont dentées, sinueuses, ou quelquefois entières.

Ces Lépidoptères forment véritablement un trait d'union entre les Sphinx et les Bombycites. Comme ces derniers,

on les trouve souvent accouplés en pleine liberté, ou même lorsqu'on les élève en captivité.

t

## 1. S. BASALIS.

Walker, Heterocera, XXXV, Suppl. p. 1858.

Il a de 42 à 48 lignes anglaises, environ 10 centimètres. Le mâle et la femelle sont d'un gris-cendré blanchâtre. Les antennes sont fauves. Les ailes inférieures ont à leur base une large tache rose.

La femelle a les ailes supérieures saupoudrées de brun pâle, et offre les caractères suivants : un stigmate noir à l'extrémité de la cellule discoïdale; une ligne brune, transverse, près de la base; une autre ligne brune qui traverse la base de la cellule discoïdale et qui se continue le long de la quatrième nervure inférieure; une autre ligne bruné le long de la seconde nervure inférieure; deux autres lignes obliques, brunes, allant de la côte au bord extérieur, entre lesquelles il y a un zigzag très-peu lissible.

Les ailes inférieures sont moins saupoudrées des mêmes atomes que les supérieures, avec la tache basilaire plus foncée.

Rivière de Zambèse. — M. Walker a décrit ce beau smérinthe sur un mâle et une femelle appartenant à sa propre collection.

#### 2. S. Quercus.

Smerinthus quercus, God. Dup. Boisd.

Sphinz quercus, Ochs. — Esp. — Wien. vez. — Fab. — Hubner, etc. La chenille, Hubn. Larv. Sph. III, D, — B, fig. 1, a, b. Le Sphinz du Chêne, Eng. pap. d'Europe, t. III, pl. 120, f. 165.

Ailes supérieures dentées irrégulièrement, d'une couleur noisette, marquées de trois lignes transversales dont la plus rapprochée de la base est ombrée de brun en dedans, la seconde et la dernière située à l'extrémité sont, au contraire, ombrées de brun en dehors. Outre cela, l'angle interne offre un trait marginal brun surmonté d'un gros point noir. Ailes inférieures d'un roux clair, offrant vers l'angle anal un espace irrégulier d'un blanc jaunâtre, suivi d'une petite tache brune. Corps de la couleur des ailes. Chemille verte ou quelquesois d'un vert jaunâtre, avec sept bandes obliques jaunâtres. Bord de la tête liseré de jaune orange. Stigmate et pattes écailleuses d'un jaune d'oore. Queue d'un vert bleuâtre pâle avec un chevron postérieur d'un blanc jaunâtre. Chrysalide d'un brun cuivreux avec la pointe anale bien pro-aoncée. La chemille vit sur les quercus robur, Austriaca, ilex, etc. Le papillon éclot en juillet après trois semaines de métamorphose. La chemille reparaît en septembre et les chrysalides provenant de cette génération éclosent en mai.

Le Smérinthe du Chêne passait autrefois pour un insecte rare. Anjourd'hui, on le reçoit assez communément de la Hongrie et le l'Autriche. On le trouve aussi dans les parties méridionales de la France.

## 3. S. GASCHKEVITSCHII.

Bremer, Beitr. zur Schmett. Fauna des nördl. China's, p. 13, nº 58. Minstriés, Cat. de la Coll. ent. de l'Acad. t. XIII, f. 4.

La le port et presque la taille de notre quercus. Ses ailes sont dentées très-régulièrement avec la frange blanchâtre dans les thancrures. Les ailes supérieures sont d'un gris cendré avec trois lendes transversales, sinuées, d'un gris brun, dont une un peu svant le milieu, précédée du côté de la base d'une petite ligne irégulière, l'autre plus large, précédée en dehors sur le bord interne d'un gros point noir; la dernière couvre l'extrémité et est à peine séparée d'une petite ligne ondulée d'une couleur plus fencée.

Alles inférieures d'un roux un peu briqueté, offrant vers l'angle anni, une petite bande noire s'appuyant en arrière sur un espace cendré et précédée en avant de deux taches blanches. Dessous des ailes avec l'extrémité brunâtre; celui des supérieures lavé de rougeatre sur le disque; celui des inférieures grisâtre. Téte et cerselet de la couleur des ailes de devant. Abdomen d'un gris plus obscur.

Il a été élevé de chenille aux environs de Pékin par M. Gaschkevissch.

## 4. S. SPERCEIUS.

Ministriés, Raum. corp. animal Mus. Acad. petropolit. pars II, pl. 13, L L

Ness avons confondu à tort ce smérinthe avec notre Dryss:

en examinant avec plus d'attention la figure donnée par Ménétriés, nous sommes convaincu aujourd'hui que son Sperchius forme une espèce parfaitement caractérisée.

Il a le port et la taille du *Dryas*, mais ses ailes supérieures sont dentées régulièrement comme dans le *populi* et n'ont nullement le sommet arrondi et marqué d'une tache semi-lunaire brune; elles sont d'un brun clair avec des raies transversales géminées, presque comme dans notre *quercus*. Vers l'extrémité du bord interne, il y a comme chez les espèces voisines une petite tache noire.

Les ailes inférieures sont d'un brun roussatre avec les nervures plus claires; elles offrent, vers l'angle anal, deux taches noires comme dans *Dryas*, surmontées d'une éclaircie d'une teinte ochracée. Corps de la couleur des ailes avec une ligne dorsale noire s'étendant depuis la tête jusqu'à l'extremité anale. Antennes brunes.

Décrit sur la figure donnée par Ménétriés d'après un exemplaire unique rapporté du Japon par M. Gaschkevitsch, pour le musée de Saint-Pétersbourg.

## 5. S. DRYAS. Boisd.

Walker, Hist. Lepidopt. Brit. mus. Het. pt. VIII. Moore, Cat. of Lep. of the east ind, Comp. I, p. 264, 608.

Nous avons décrit en 1853, sous le nom de Dryas, ce smérinthe sur des exemplaires appartenant au British Museum; par suite d'un lapsus calami, quelques auteurs ont écrit Dyras.

Il a le port et la taille des plus grands individus de quercus avec les mêmes dentelures. Les ailes supérieures sont ordinairement d'un brun-clair tirant sur le violâtre, marquées de lignes transversales d'un brun foncé, dont une près de la base; les deux suivantes, à peu près parallèles, sont précédées en dehors de deux lignes réunies en V qui en renferment une troisième très-courte; les deux dernières sont moins accusées et convexes en dedans. Outre cela, on voit, au sommet, une large tache semi-lunaire d'un brun foncé et vers le bord interne une petite tache de la même couleur.

Les ailes inférieures sont d'un roux châtain et offrent vers l'angle anal deux taches brunes, précédées d'un petit espace d'un blanc sale. Le corps participe de la couleur des ailes avec une raie dorsale noire qui s'étend depuis la tête jusqu'à l'extrémité anale. Les antennes sont brunes. Le dessous des ailes est couleur noisette avec la tache semi-lunaire des premières d'un roux châtain.

Il a été élevé de chenille à Java par le D' Horsfield. Il habite sussi le Bengale et la Chine. Deux des exemplaires que nous possédons viennent de Sylhet.

British Museum, Coll. Bd.

## 6. S. ECHEPHRON. Boisd.

Pius petit que notre quercus, avec les ailes supérieures beaucop plus étroites, pointues au sommet, et dentées régulièrement somme dans le populi. Elles sont, en dessus, d'un gris roussatre foncé, avec le milieu du bord interne et l'extrémité largement d'un brun violatre; elles sont en outre traversées par des raies géminées, parallèles, brunes, à intervalles ombrés, et marquées d'une petite tache noire située, comme dans les espèces voisines, près du bord marginal.

Les ailes inférieures sont d'un roux-testacé clair, avec l'extrémité rembrunie et l'angle anal marqué de deux points noirs.

Corps de la couleur des ailes supérieures. Antennes d'un brunroux.

Dessous des ailes d'un brun violâtre, avec le disque un peu rougeâtre.

La femelle est plus grande que le mâle, ses ailes supérieures sent plus larges, avec les raies ou bandes transversales plus serusées. Ses ailes inférieures sont d'un roux plus clair.

Collect. Bd. — Décrit sur un mâle et une femelle rapportés à Japon par un officier de marine qui les avait pris accouplés.

## 7. S. AMBOINICUS.

Pelder, Novara, exp. Zoolog. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 78, f. 1.

Nous n'avons jamais vu cette espèce qui n'existe, à notre conmissance, que dans la collection de M. Felder, à Vienne en Autiche. Elle a le port de notre Dryas; mais elle est plus grande, et ses ailes supérieures sont plutôt sinuées que dentées. Le fond de leur couleur est d'un gris roussâtre, avec sept raies transverteles brunes, dont les deux du milieu se réunissent en bas, en me sorte de V, et n'arrivent pas tout à fait jusqu'au bord interse, comme la suivante qui est un peu oblique. Outre cela, l'extrémité terminale est largement brune, avec une éclaircie pâle au sommet; l'angle anal est marqué de deux taches noires situées sur un espace plus obscur que le fond de l'aile, limité par une ligne tortueuse.

Les ailes inférieures, bien entières, sont largement jaunâtres à leur base, rembrunies à l'extrémité, avec une large liture anale, transversale, noirâtre.

Décrit sur la figure donnée par M. Felder, dans son ouvrage sur l'expédition de la frégate la Novara.

Il a été rapporté de l'île d'Amboine.

#### 8. S. MEANDER. Boisd.

Un peu plus petit que notre quercus. Ailes supérieures sinuées à l'extrémité, mais non dentées; leur dessus est d'un gris-rous-sâtre pâle, avec des lignes transversales brunez, dont les intervalles sont d'une couleur plus obscure que le fond; les deux dernières lignes ou raies sont convexes en dedans, et la plus extérieure plus large, d'un gris blanchâtre, est suivie d'un espace presque semi-lunaire plus obscur que la teinte générale. Outre cela, il y a près du bord interne, vers l'angle anal, un petit œil noir entouré de grisâtre et cerclé légèrement de brun. Ailes inférieures d'un jaune orange, avec l'extrémité d'un roux ferrugineux, et un grand œil anal noir, appuyé en arrière sur un espace grisâtre, et lié à une petite liture de sa couleur. Corps de la couleur des ailes supérieures, avec une petite ligne longitudinale noire s'étendant depuis la tête jusqu'à l'extrémité.

Dessous des ailes d'un brun-ferrugineux clair, avec le disque des supérieures d'un jaune orangé. Antennes brunes.

Ce beau smérinthe, dont nous ne connaissons qu'un individu unique appartenant à notre collection, a été trouvé à Madagascar sur le tronc d'un manguier (Mangifers indica) par feu Goudot; il fait le passage aux espèces de la division de l'ocellatus.

++

## 9. S. POPULICOLA. Boisd

S. princeps? Walker, Heterocera, p. 257, 21. — S. modesta, Harris. Am. Journ. sc. XXXV, 192.

Ce grand et beau smérinthe, dont nous n'avons jamais vu

d'autres exemplaires que les deux individus de notre collection, a tout à fait le port de notre populi, mais il est de moitié plus grand. Ses ailes supérieures très-régulièrement dentées sont d'un gris-hrun, avec des bandes plus obscures, presque brunes, dont celle du milieu est très-large, un peu sinuée sur les côtés, peu rétrésie inférieurement, et marquée, à l'extrémité de la cellule discoidale, d'un petit trait transversal blanc.

Les ailes inférieures sont d'un rouge-obsour tirant sur le pourpre, principalement vers la base; le reste de leur surface est un peu plus clair, avec le bord marginal grisâtre. Outre cela, il y a à leur angle anal une grande tache d'un noir bleuâtre, plus foncée antérieurement, précédée d'une raie transversale grisâtre, obsolète. Le corps est de la couleur des ailes supérieures.

Le dessous des ailes est d'un gris couleur de terre d'ombre, svec le disque des supérieures d'un rouge violâtre. Les antennes sont rousses.

Nous avons reçu ce smérinthe du Canada, où peut-être il n'est pas beaucoup plus rare que notre *populi* ne l'est en Europe.

M. Lorquin en a vu un individu pris en Californie, et il en a lui-même trouvé une chenille sur un peuplier, mais cette dernière n'est pas arrivée à bien.

Il est très-probable que le Smerinthus princeps Walker, dont cet auteur ne connaît pas la patrie, est une simple variété de notre populicola. Comme Fabricius a déjà donné le nom de modeste à un autre Sphingide, nous n'avons pas cru devoir adopter le nom proposé par Harris pour l'espèce que nous venons de décrire.

#### 10. S. Populi.

Liané, — Ochs. — Hubn. — God. etc. — Sphinx du peuplier, Engr. psp. d'Europe.

Ce smérinthe est très-commun et parfaitement connu de tous les entomologistes. Il varie pour la couleur qui est tantôt d'un brun grisâtre ou d'un gris un peu roussâtre, tantôt d'un gris lilas ou d'un gris-blanc, avec des bandes plus foncées, dont celle qui occupe le milieu des ailes supérieures est marquée, sur l'extrémité de la cellule discoïdale, d'un point blanchâtre.

Les ailes inférieures ont, vers la base, un large espace d'un roux ferrugineux.

Les semelles sont ordinairement plus pâles que les mâles.

La chenille varie aussi : tantôt elle est d'un vert pâle, et tantôt d'un vert blanchâtre, à peau chagrinée comme les espèces congénères, avec sept raies latérales obliques; ses stigmates sont blancs, cerclés de fauve; la corne est jaunâtre, avec la base un peu bleuâtre; la tête est bordée de jaune. Dans quelques variétés, il y a sur le corps plusieurs rangées longitudinales de taches d'un rouge ferrugineux.

Cette chenille vit indistinctement sur les *Populus nigra*, fastigiata, tremula, alba, etc. Celles que l'on trouve sur le peuplier blanc, par une sage prévoyance de la nature, prennent la couleur des feuilles de cet arbre.

Le smérinthe du peuplier se trouve dans toute l'Europe. On le rencontre même en Baskirie et dans le pays des Kirghis.

Nous possédons dans notre collection un magnifique individu hermaphrodite qui nous a été donné dans le temps par M. Martin-Pacard, de Chalon-sur-Saône.

Les Allemands ont fait accoupler en captivité le S. populi avec l'occilatus, et ont obtenu un hybride qui tient de l'un et de l'autre.

## 11. S. TREMULÆ.

Fischer, Oryctog. du gouvernem. de Mosc. tab. X, fig. 1, 2, 2 b. Treitschke, Schm. von europ. X, p. 140. God. — Dup. Lep. de France, Suppl. pl. II, f. 2, p. 29. Ménétr. Enum. corp. animal. Mus. acad. petropol. p. II, p. 138.

Ce smérinthe n'existe dans aucune de nos collections françaises. Le très-petit nombre d'exemplaires que l'on connaît pourrait faire supposer que cette rareté n'est peut-être qu'une modification locale de notre populi. Nous ne l'avons jamais vu en nature. Notre description est faite d'après un dessin exécuté au musée de Vienne, sur un exemplaire femelle, sous les yeux de feu notre collègue Alexandre Lefebvre, et d'après les figures qu'en a donné Fischer, dans son Oryctographie.

Il est beaucoup plus petit que le populi; l'extrémité de ses ailes supérieures est plutôt ondulée que dentée; la bande de leur milieu est étranglée avant d'arriver au bord interne; le stigmate que l'on voit dans le haut de cette même bande n'est pas un point allongé comme chez le populi, mais un trait étroit, allongé de haut en bas. Toutes ces différences sont bien minimes; mais le caractère le plus notable est l'absence complète de la tache

d'un brun marron qui existe toujours sur les ailes inférieures dans le populi.

La chenille, selon M. Fischer, ressemble beaucoup à celle du populs. Elle est verte, chagrinée, et offre de même des traits latéraux obliques. Elle vit exclusivement sur le tremble (*Populus transla*). La description qu'en a donné Treitschke est absurde. Selon son correspondant, elle aurait la peau lisse et non chagrinée, avec la tête arrondie et non cordiforme, les traits obliques seraient remplacés par des rudiments de lignes bleuâtres, et la queue serait d'une longueur insolite.

Ce smérinthe a été découvert aux environs de Moscou par Zetter. M. Bremer en a élevé un individu dont il a trouvé la thenille près de Jambourg, dans le gouvernement de Saint-Pétersbeurg. Cet exemplaire fait partie du musée de l'Académie. Il y en avait deux à Vienne, l'un appartenant au musée impérial, et l'autre à la collection de Treitschke. Nous ignorons où sont passés ceux qui ont été figurés dans l'ouvrage de Fischer.

## ##

#### 42. S. DENTATUS.

Cramer, Pap. exot. pl. 125, f. 6. — Walker, Hist. lep. Brit. mus. het. pl. VIII. — Moore, Cat. of the Lep. ins. in. th. Mus. of east ind. Comp. l. p. 264.

Sphinx Timesius, Stoll. Suppl. a Cram. pl. 40, f. 1. — Sph. dentata, Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 361, 19.

Il est de la taille de notre populi; ses ailes sont à peu près dentées de la même façon, mais elles sont notablement plus étroites; les supérieures, dont l'extrémité apicale se prolonge en pointe, sont d'un gris-cendré plus ou moins clair, avec trois lignes transversales brunes, dont les intervalles sont souvent remplis par une teinte brunâtre plus ou moins foncée; entre les deux premières lignes, il y a un trait transversal plus ou moins indiqué, se réunissant quelquefois à la seconde ligne vers son tiers inférieur; entre la seconde et la troisième, il y a aussi quelquefois, principalement chez les femelles, une quatrième ligne; le bord terminal, vers le sommet, est largement brun. La frange est blanche dans les dentelures.

Les ailes inférieures sont brunes ou d'un brun grisâtre, avec la base plus claire et la trace d'une raie transversale d'un gris Manchâtre. Le corps est de la couleur des ailes.

Le dessous des quatre ailes est d'un gris mélangé de blanchâtre, et offre, un peu avant le bord terminal, une raie commune brunâtre liserée de blanchâtre.

La chenille, que nous ne connaissons que par un très-beau dessin fait dans l'Inde par le capitaine Shervill, vit au Bengale sur un arbre portant dans le pays le nom de *Lussorah trie*. Elle est extrêmement rugueuse, d'un vert clair, avec des raies obliques jaunâtres, très-obsolètes; elle a sur le dos deux raies longitudinales d'un jaune-verdâtre pâle; la corne est de cette dernière couleur.

Ce smérinthe se trouve au Bengale. Selon M. Shervill, il n'est pas rare dans certains districts.

Collect. Bd.

## 13. S. GRAYI. Boisd.

Walker, Heterocera, p. 249, 11.

Il a le port du dentatus, mais il est plus petit et d'un gris cendré plus blanchâtre. Ses ailes supérieures sont dentées, avec un point central blanc; elles ont en outre, près de la base, un point brun, et sont traversées par trois raies de la même couleur, dont la plus rapprochée du bord terminal est fortement dentée en scie; le sommet est marqué d'une tache semi-lunaire de couleur également brune.

Les ailes inférieures sont traversées par une bande médiane, assez obsolète, plus obscure que le fond, devenant un peu noire vers l'angle anal.

Le corselet et l'abdomen sont d'un gris cendré.

Nous avons décrit ce smérinthe au British museum sur un individu unique rapporté de Port-Natal par M. Guienzius.

Nous avons dédié cette nouvelle espèce à M. Edward Gray, comme un faible témoignage de notre reconnaissance, pour l'obligeance parfaite qu'il a mise à nous communiquer, lors de notre dernier voyage en Angleterre, tous les Lépidoptères du riche établissement qu'il dirige avec autant de zèle que de talent.

## ###

#### 44. S. JUGLANDIS.

Smith-Abbot, Lep. ins. of Georgia, I, pl. 29. — Hubn. Saml. exot. Schmett. — Walker, Heterocera, p. 247, 9.

Il est d'un tiers plus petit que notre populi, avec les ailes moins profondément dentées; les supérieures sont d'un gris plus ou moins foncé, traversées par quatre lignes brunes, savoir : une un peu arquée, asses obsolète, vers la base, une seconde avant le milieu, suivie sur l'extrémité de la cellule discoïdale, d'un arc de sa couleur, la troisième et la quatrième assez rapprochées l'une de l'autre. Outre cela, l'extrémité est brune, avec une éclaircie près du sommet. Dans les mâles, les lignes transversales sont beaucoup plus épaisses, ombrées de brun.

Les ailes inférieures sont d'un brun-gris, avec deux raies transversales obsolètes, plus obscures.

Le corselet et le corps participent de la couleur des ailes.

Le dessous des ailes est d'un brun rougeâtre, avec deux petites lignes transversales brunes.

La chenille, d'après des dessins d'Abbot que nous avons sous les yeux, varie pour la couleur : tantôt elle est d'un vert un peu jaunâtre, et tantôt presque fauve. Elle est atténuée antérieurement comme celle de notre titiæ, et ses côtés sont marqués de sept bandes obliques jaunes; la corne est assez développée et un peu arquée. Cette chenille vit sur une espèce de noyer (Juglans alba).

La chrysalide a une forme singulière; la pointe anale est trèscourte, et l'avant-dernier segment présente deux petites dilatations en forme d'oreillettes; elle est en outre d'un noir mat.

Nous en avons reçu plusieurs d'Abbot, mais une seule nous a produit un insecte parfait, en mai, les autres se sont desséchées.

Nous croyons que ce smérinthe n'est pas très-rare en Géorgie. Collect. Bd.

++++

## 15. S. ADANSONLE. Boisd.

Il est de la taille du Juglandis et il a à peu près le port de notre populi. Ses ailes sont sans dentelures; les supérieures, dont le sommet est un peu aigu et comme falqué, sont d'un cendré brunâtre, avec des raies ou bandes transversales olivâtres.

Les ailes inférieures sont brunâtres, avec deux raies parallèles, transversales, plus obscures que le fond.

Le corselet et l'abdomen sont d'un cendré brunâtre.

Le dessous des ailes est d'un brun clair, avec deux bandes transversales d'une teinte plus foncée.

Nous avons décrit, il y a une vingtaine d'années, ce smérinthe sur un individu unique que le baron Feisthamel avait reçu de l'intérieur du Sénégal. Son correspondant lui disait qu'il l'avait trouvé sur le tronc d'un baobab; mais cela ne prouve pas qu'il ait réellement vécu sur cet arbre.

Cette espèce intéressante a été vendue comme toute la collection de Feisthamel; nous ignorons dans quelles mains elle a passé, attendu que la vente s'est faite boîte par boîte.

## 16. S. AILANTI. Boisd.

Il a le port de notre populi; mais ses ailes sont légèrement sinuées sans l'apparence de la moindre dentelure. Les supérieures sont d'un gris cendré un peu luisant, avec des bandes brunes; celle de ces bandes qui est placée un peu avant le milieu est légèrement dentée en dehors, très-dilatée en dedans dans sa moitié supérieure, où elle forme une espèce de V irrégulier éclairci dans son centre; celle qui la suit paraît composée de deux petites lignes dentées en scie, lesquelles constituent sur le bord marginal, vers l'angle interne, une large tache brune marquée d'une espèce d'œil oblique de couleur blanchâtre; outre cela, le bord terminal est rembruni et précédé de deux petites lignes parallèles dentées en scie.

Les ailes inférieures sont d'un gris roussâtre, avec une bordure un peu obsolète d'un brun ferrugineux; leur angle anal offre un très-petit espace blanchâtre s'appuyant en arrière sur un peu de noir, et précédé sur la gouttière abdominale d'un peu de brun roussâtre.

Le corps participe de la couleur des ailes. Les antennes sont rousses avec le rachis blanc.

Le dessous des ailes est d'une teinte un peu ferrugineuse, avec des raies transversales brunes ; celui des supérieures présente sur le milieu de la bordure un petit espace blanc. Décrit sur un individu mâle unique dans notre collection. Ce bei exemplaire d'une pureté remarquable a été obtenu par M. Lorquin d'une chrysalide déterrée par lui à Hong-Kong, au pied d'un Ailantus glandulosa, vulgairement vernis du Japon, ce qui nous fait supposer que la chenille de ce joli smérinthe doit vivre sur cet arbre.

## <del>111111</del>

## 17. S. OCULATA. Boisd.

Il est de la taille de notre tiliæ, avec les ailes entières, un peu pointues au sommet. Les supérieures sont grises, avec quelques lignes transversales brunes très-peu indiquées; la base offre une tache d'un gris blanchâtre, séparée de la teinte générale par une ligne très-anguleuse; outre cela, il y a sur le bord interne, en tirant vers l'angle anal, une tache oculaire jaunâtre, pupillée dans sa partie inférieure d'un peu de roussâtre.

Les ailes inférieures sont grisatres, avec un petit espace d'un blanc cendré à l'angle anal, suivi d'un peu de brun sur le bord marginal.

Le corselet et l'abdomen sont de la couleur des ailes.

Le dessous des ailes est d'un brun rougeâtre, avec plusieurs petites lignes transversales brunes; celui de l'abdomen est d'un rouge brique, ainsi que la partie antérieure de la poitrine.

Décrit sur un individu mâle que nous avons reçu du Mexique, en asses mauvais état. Au reste, on reconnaîtra facilement cette aspèce à la tache oculaire jaunâtre de ses ailes supérieures.

Collect. Bd.

## <del>1111111</del>

#### 18. S. PSEUDAMBULYX.

Ce smérinthe a le port de l'Ambulyx Ganascus, dont il paraît être une contresaçon. Ses ailes supérieures sont sinuées, un peu anguleuses, avec le sommet échancré; elles sont d'un gris cendré, avec des raies et taches d'un brun olivâtre, savoir : un petit point près de la base, puis une bande olive, élargie inférieurement et interrompue par la nervure médiane; vient ensuite une ligne transversale très-peu marquée, suivie sur la cellule discoldale d'un arc brun, puis ensin d'autres lignes parallèles se terminant au bord interne dans une bande longitudinale très-courte

d'un brun olivâtre; outre cela, le bord terminal est un peu rembruni, et l'avant-dernière ligne est marquée dans sa partie inférieure d'un gros point olivâtre.

Les ailes inférieures sont roses, avec deux bandes transversales noires, dont une au milieu et l'autre un peu avant le bord marginal; entre ces deux bandes parallèles, les nervures sont noirêtres, et la première bande est en outre précédée d'un petit stigmate de sa couleur; leurs dentelures sont liserées de blanc.

Le corselet est d'un brun olive, avec une tache médiane triangulaire d'un gris cendré; la tête est d'un brun olive avec les antennes blanchâtres. L'abdomen est gris, avec la partie dorsak plus foncée.

Le dessous des ailes est d'un gris pâle presque blanchâtre, avec quelques raies obsolètes plus foncées; le disque des supérieures est d'un rose un peu vineux, avec une bande longitudinale noire interrompue.

Décrit sur un exemplaire femelle qui nous a été donné par feu Becker comme venant du Mexique.

Collect. Bd.

## <del>1111111</del>

## 19. S. COMPLACENS.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 40.

Il a au moins 10 centimètres, et il est d'une couleur cendrée brunâtre en dessus et rose en dessous; les antennes sont dentées, d'un jaune testacé pâle.

Le corselet est marqué d'une raie noire. La base de l'abdomen est d'un brun-noir.

Les ailes supérieures sont dentées et traversées par sept lignes noirâtres, savoir : la première un peu ondulée, la seconde très-ondulée, la troisième et la quatrième un peu denticulées, la cinquième dentelée et presque double, la sixième flexueuse inférieurement, et la septième un peu ondulée; outre cela, il y a près du bord interne une raie et une tache noires, et vers ce même bord une bande longitudinale d'un cendré noirâtre.

Les ailes inférieures sont roses à la base, avec une large liture noire à l'angle anal.

Trouvé en Chine, aux environs d'Amoy. - British museum.

## 20. S. OCELLATUS.

Linné, — Fabr. — Ochsenh. — God. — etc.
Sphina selicis, Hubn. Eur. Schm. Sphing. 73.
Le Sphina demi-paon. Engram. pap. d'Europ. — Geoffroy. Hist. des
las. t. II, p. 79.

Il a de 6 à 6 centimètres et demi d'envergure. Il varie pour le send de la couleur des ailes supérieures, qui sont tantôt d'un gris tengestre et tantôt d'un gris violatre, avec des ondes plus obscumet trois espaces bruns irréguliers, dont deux sur le milieu de la surface et le troisième couvrant une partie du bord terminal : le premier est précédé, du côté de la base, par une raie brunâtre. simée, plus ou moins prononcée; il offre une éclaircie en remontatvers la côte, où il est marqué d'un stigmate grisatre ; le second, mi forme une tache oblongue sur le milieu du bord interne, est sparé du précédent par une ligne oblique de la couleur du fond; min la portion terminale est divisée par des raies irrégulières Fishtres plus ou moins nettes. Outre cela, il existe sur l'angle laterne une tache noire et une autre tache plus petite au milieu da tiers postérieur de ces mêmes ailes, qui ne sont nullement dentées, mais qui offrent seulement une échancrure vers leur agie anal.

Les ailes inférieures sont d'un rouge-rose plus ou moins vif, avec l'extrémité lavée de brun; elles sont marquées d'un grand eil bleu, arrondi, à prunelle noire assez grande; près de cet œil est un cercle noir, lié à l'angle anal par une liture également aoire. Le corselet est de la couleur des premières ailes, marqué dans son milieu d'une large tache brune un peu en forme de T. L'abdomen est d'un gris brunâtre.

Le dessous des ailes supérieures est d'un rouge-violet sur le disque, et ensuite brun jusqu'au bout, avec des raies transverses blanchâtres. Le dessous des secondes ailes est d'un brun fisarron, traversé par deux lignes parallèles, dentées de couleur blanche.

La chenille est tantôt verte sur le dos avec les côtés et le ventre un peu bleuâtres, et tantôt entièrement d'un blanc verdâtre glauque. Elle a sur les côtés sept traits obliques blancs. La queue est bleue à sa base, avec l'extrémité verte ou blanchâtre. On trouve quelquesois, mais rarement, des individus qui sont marqués, sur les côtés, de deux rangs de gres points d'un rouge serrugineux. Dans tous les cas, la tête est liserée de jaune, et les stigmates sont blancs cerclés d'orangé. Cette chenille a l'habitude, lorsqu'elle attaque un rameau, de dévorer les feuilles jusqu'à l'extrémité.

La chrysalide est légèrement chagrinée d'un brun-roux foncé, avec la pointe anale un peu obtuse.

Cette espèce éclôt en juin lorsque les chrysalides ont passé l'hiver. Dans les années chaudes et dans le midi, il y a une seconde éclosion à la fin d'août, et l'on retrouve des chenilles en septembre.

Ce smérinthe est commun dans une grande partie de l'Europe. On trouve sa chenille sur l'osier, le saule ordinaire, le saule pleureur, le pommier, l'amandier et même sur l'aubépine.

M. Lucas nous a communiqué un exemplaire un peu plus grand que les individus ordinaires, pris par lui en Algérie, qui ne diffère de notre occilatus que par un plus grand développement.

## 21. S. ARGUS.

Ménétriés, Enum. corp. animal. academ. petrop. p. 11, pl. 13, f. 3.

Nous ne connaissons pas ce smérinthe, dont Ménétriés a donné une figure qui doit être très-exacte. Il a la plus grande ressemblance avec notre occilatus, dont il peut bien n'être qu'une variété un peu plus grande. Ce que nous en dirons est extrait de l'ouvrage précité.

« Les ailes supérieures présentent un dessin plus simple que chez l'ocellatus, l'espace brun qui occupe le milieu de la surface de ces ailes est traversé par un trait longitudinal oblique bien prononcé d'un gris-rosé clair. Ce trait part du tiers basal de l'aile, interrompt largement la ligne noire qui limite en dedans l'espace brun du milieu de l'aile, et vient atteindre la petite tache noire du bord interne de l'aile. L'espace brun du milieu est en outre traversé extérieurement par une large ligne noire, bien indiquée, bien droite, qui part du bord antérieur de l'aile et arrive jusqu'an bord interne, après avoir été un peu interrompue par le trait longitudinal rosé. En dehors de cette ligne noire, on remarque deux ou trois lignes parallèles fortement dentées, et non flexueuses comme chez l'ocellatus. La petite tache noire de l'angle interne est bien marquée, mais celle qui se trouve vers le milieu du bord extérieur est assez peu indiquée. Les ailes inférieures sont lavées

de rese à la bese et d'un rouge-vineux brillant autour de la partie supérieure de la tache oculaire. Cette teinte est brusquement intercompue un peu au-dessus de l'œil et laisse tout le bord antimeur d'un gris blanchâtre. La tache ocellée est très-grande, surout ches la femelle; elle est entourée d'un cercle d'un noir présond, très-large; l'iris est d'un bleu grisâtre, avec une grosse pupille ronde d'un noir grisâtre. Le dessous des ailes diffère de sail de l'ocellatus, en ce que les lignes transversales sont moins tranchées. Le corselet participe de la couleur des ailes supérieures somme ches l'ocellatus, mais la tache brune en forme de T est plus étroite.

Décrit d'après un mâle rapporté des bords de l'Amour par Il. Schrenck, et deux femelles prises par M. Maack vers l'emleushure de l'Oussouri. » (Ménétriés.)

Nous lui trouvons de grands rapports avec notre occilatus, dont i s'est peut-être qu'une grande variété analogue à celle que L. Lacas a mentionnée dans les Annales de la Société entomologue de France, 1856. Bulletin, p. XCII.

#### 22. S. PLANUS.

Walker, Heterocera, p. 254, 18.

Nons ne connaissons pas cette espèce qui a quelque analogie see l'argus de Ménétriés.

Selon M. Walker, il a le port de l'occilatus. Ses ailes supérieules sont d'une teinte fauve, traversées par une très-large bande fun brun pâle, renfermant une tache discoldale blanche et dil'étée par une ligne d'un brun plus foncé. On voit en outre, vers l'extrémité, deux lignes transversales ondulées d'un brun foncé, et vers le hord terminal une raie irrégulière dilatée d'un brun

Les ailes inférieures sont roses en avant de l'æil anal; celui-ci en grand, noir, entouré de bleu, avec un cercle d'un noir profond. Il a été rapporté du nord de la Chine par M. Cuming, et fait partie du British museum.

#### 23. S. OPHTALMICUS.

Boied. Lepid. de la Calif. part. II, p. 67, 72.

la le port et la taille de notre occilaius. Ses ailes supérieures,

Lipidoptères. Tome I.

qui offrent seulement deux sinus, sont d'un gris-cendré clair, quelquesois lavé d'un peu de rose; elles sont marquées sur leur milieu d'une large bande transversale brune, offrant sur son côté interne un angle aigu très-prononcé, coupée presque droite sur son côté interne, très-éclaircie dans toute sa partie supérieure, avec la nervure médiane et un trait à l'extrémité de la cellule discoidale d'un gris cendré. L'extrémité de l'aile est rembrunie, et on y distingue à peine, deux raies brunâtres obsolètes, fondues dans la teinte brune. On voit en outre deux petites taches noires situées comme dans l'ocellatus, mais bien moins distinctes.

Les ailes inférieures sont roses, avec l'extrémité lavée de roussâtre; elles sont marquées d'un œil bleu à pupille noire asses petite, et entouré d'un cercle d'un noir profond qui envoie un petit prolongement vers l'angle anal. Les antennes sont d'un gris pâle.

Le corselet offre au milieu une tache brune s'élargissant en arrière; les ptérigodes sont d'un gris cendré, bordées de blanchâtre dans la partie qui limite la tache brune; le corps est d'un gris roussatre.

Le dessous des ailes supérieures est d'un rouge-violet avec un stigmate blanc, en croissant, sur l'extrémité de la cellule discoldale; leur extrémité est d'un brun-tanné clair, avec deux lignes transversales plus obscures. Le dessous des secondes ailes est d'un brun-tanné très-clair, avec deux raies transversales, obsolètes, parallèles, brunâtres; elles offrent en outre un petit croissant blanc à l'extrémité de la cellule discoldale et un espace marron près de l'angle anal.

La chenille, selon M. Lorquin qui l'a élevée souvent en Californie, se trouve sur un saule très-commun, à feuilles épaisses d'un beau vert en dessus et blanches en dessous; elle a tout à fait le port de la chenille de notre occillatus, mais elle est plus ramassée; sa couleur varie du vert au blanc verdâtre, ses côtes sont marquées de sept traits obliques blanchâtres, partant de chaque côté d'une raie longitudinale; la corne du onzième anneau est verdâtre. Cette chenille n'a pas l'habitude, comme sa congénère de l'Europe, de dépouiller les branches jusqu'à l'extrémité, mais elle les ronge par en bas, ce qui rend sa recherche plus difficile.

La chrysalide est noire et très-rugueuse.

L'insecte parfait paraît à deux époques; les chenilles, qui se métamorphosent à la fin de l'été, donnent leur papillon en mai de l'année suivante, tandis que celles que l'on rencontre à la fin de juin le produisent à la fin de juillet ou au commencement d'août.

Décrit sur une demi-douzaine d'exemplaires provenant de M. Lorquin.

M. Lorquin nous a écrit en outre qu'il a trouvé en Sonora, en 1866, une chenille à peu près semblable, sur un saule à feuilles d'un vert pâle en dessus et en dessous. Malheurensement il n'a pas pu en faire l'éducation. Cette dernière était peut-être celle de la miliesti, espèce très-voisine qui habite le Mexique.

## 24. S. SALICETI. Boisd.

Cette espèce est voisine de l'ophthalmicus. Elle en diffère par les caractères suivants : ses ailes supérieures sont sensiblement plus étroites, dentées à l'extrémité, presque comme dans l'excecutus et non sinuées; l'angle formé par le sinus, du côté interme de la bande brune, est plus obtus; le stigmate placé à l'extrémité de la cellule discoldale est plus court et moins marqué; l'œil des tiles inférieures est plus petit; la pupille est plus grosse et la partée bieue forme un petit anneau un peu interrompu, le cercle noir qui l'entoure est beaucoup plus mince; en dessous, le disque des premières ailes est d'un rouge vineux, complétement dépourvu d'erc biene à l'extrémité de la cellule discoldale.

Décrit sur deux individus très-purs que nous avons reçus du lexique.

Cullect. Bd.

#### 25 S. CERISYI.

Kirby, Fauna boreali-americana, pl. IV, fig. 4.

Nous ne connaissons pas ce smérinthe, dont nous donnons la description d'après Kirby. Il a le port et la taille du geminatus de sey et de notre ophthalmicus. Ses ailes supérieures sont grossidment dentées, de couleur brune avec les nervures blanches; elles et, un peu avant le milieu, une raie transverse, blanche, courbe, et peu sinuée, et avant l'extrémité, une bande transverse également blanche, suivie, vers le bord terminal, de deux raies ondures d'un brun un peu violâtre.

Les ailes inférieures sont roses, principalement dans leur moid'antérieure, plus pales et d'un rose un peu grisatre dans l'autre mité. Elles offrent en outre à l'angle anal une tache arrondie, mire, marquée d'un cercle bleu pupillé de noir. Le corselet est d'un gris blanchâtre, avec une large tache brune qui occupe presque tout le milieu.

L'abdomen est brun, avec quelques taches latérales blanchâtres.

Kirby dit qu'il a été pris au nord des Etats-Unis, sans désignation de localité.

Ce célèbre auteur a dédié cette espèce à Cerisy, ingénieur de la marine à Toulon, qui avait dans le temps rassemblé de nombreux matériaux pour une monographie des Sphinx, que des circonstances en dehors de sa volonté l'ont empêché de terminer.

#### 26. S. JAMAICENSIS.

Drury, Ins. II, pl. XXV, f. 2-3. — S. geminatus, Walker, Heterocera, p. 246, 7.

Il est, comme l'ophthalmicus, notablement plus petit que notre occilitus. Sea ailes supérieures offrent à l'extrémité deux sinus, dont un grand vers le milieu et un beaucoup plus petit près l'angle interne; outre cela, le sommet a une petite échancrure. Le fond de la couleur de ces mêmes ailes est d'un gris-clair lavé de rose, avec une large bande médiane brune, offrant sur son côté interne un sinus en angle aigu comme dans l'ophthalmicus. Cette bande est un peu éclaircie dans le haut où elle est marquée d'un stigmate brun; vers le bord extérieur, il y a deux raies obscures brunâtres, et sur la grande échancrure une belle tache semi-lunaire d'un brun foncé, et une petite lunule de la même couleur sur la petite échancrure du sommet.

Les ailes inférieures sont d'un gris-rosé très-clair, avec le milieu rouge; elles sont marquées, comme dans les espèces voisines, d'un œil bleu cerclé de noir, à la différence que la partie bleue remplit entièrement l'anneau et qu'il est dépourvu de pupille.

Ce corselet est de la couleur des ailes supérieures, avec une tadés médiane brune échancrée en arrière. Le corps est d'un gris brunatre.

Le desse des ailes supérieures a le disque d'un rouge vineux, sans stigmate blanc; leur extrémité est brune, avec des raies parallèles blanchâtres qui se continuent sur les ailes inférieures dont le fond est brun et le bord antérieur marqué d'un petit arc hlanc:

Nous n'avons jamais vu ce smérinthe, nous ne savons même pas s'il existe dans quelque collection. La description que nous en donnons est faite d'après Drury, qui le dit de la Jamaique.

## 27. S. PAVONINUS. Boisd.

Sphinz pavonina, Hubn.-Geyer, Züt. 335-836.

Il a le port de l'excecatus, mais ses ailes supérieures sont sensiblement moins dentées, et offrent, vers le milieu de leur bordure, une petite échancrure plus profonde que l'intervalle existant entre chaque dent. Leur dessus est mélangé de gris jaunâtre, avec quatre raies transversales d'un brun-noir; elles ont en outre, près du bout, une raie jaunâtre obsolète, et à l'angle apical deux petites lunules allongées placées comme dans l'excecatus.

Les ailes inférieures sont d'un rose foncé sur le disque, beaucoup plus pâles à l'extrémité, et rembrunies sur leur angle externe; elles sont marquées d'un œil bleu sans pupille, entouré d'un cercle poir.

Le corselet participe de la couleur des premières ailes; il est marqué sur son milieu d'une raie noire qui se continue tout le long de l'abdomen.

Le dessous des ailes supérieures a le disque lavé de rose, et l'extrémité marquée de deux rangées de points noirâtres, lunulés; celui des inférieures est traversé par une bande médiane blanchâtre, bordée de noir, et sufivie de points allongés de la même couleur. La femelle a le cercle de l'œil plus large que le mâle.

La chenille, d'après un dessin d'Abbot, est d'un vert un peu jaunâtre, pointillée de ferrugineux; elle a en outre sur le dos une rangée de points ferrugineux et une raie en feston de la même couleur au-dessus des stigmates; ceux-ci sont blancs, cerdes de ferrugineux; la corne est de longueur moyenne, d'un vert jaunâtre, avec l'extrémité bleuâtre. Elle vit sur plusieurs espèces de prussus. La chrysalide est d'un brun-noir.

Ce smérinthe nous est éclos à la fin de mai, de chrysalides envoyées de New-York par feu John Leconte, en même temps que le dessin de la chenille.

Il se trouve en Georgie et en Pensylvanie.

## 28. S. EXCECATUS.

Sphina excacata, Smith-Abbot, Lepid. of Georg. vol. I, tab. 25.—Harris, Am. Journ. sc. XXXVI, 290, 1.—Walker, Heterocera, p. 247, 8.

Il est généralement un peu moins grand que notre occilatus; ses ailes sont dentées comme dans notre populi. Les supérieures sont d'un gris roussâtre avec des bandes et des ondes brunes, dont la plus prononcée s'étend obliquement du milieu de la côte à l'angle interne, où elle est précédée de deux petites taches noires; le stigmate, placé à l'extrémité de la cellule discoïdale, est petit et très-noir; le bout des ailes est brun, et dans les deux premières échancrures apicales il y a une lunule allongée d'un brun plus foncé.

Les ailes inférieures sont roses sur le disque, beaucoup plus pâles à l'extrémité, rembrunies sur leur angle externe; elles sont marquées d'un œil bleu sans pupille, entouré d'un cercle noir assez large.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, marqué sur son milieu d'une tache brune très-étroite. L'abdomen est d'un gris brunâtre, avec une ligne dorsale noire.

Le dessous des ailes est traversé, un peu avant l'extrémité, par une bande fauve dentée. Leur disque est lavé de rose.

La chenille, dont nous possédons plusieurs dessins faits par Abbot, varie passablement : tantôt elle est d'un beau vert, et tantôt d'un vert jaunatre avec sept traits obliques jaunes. Le plus ordinairement elle offre, sur les côtés, une ou deux rangées de gros points ferrugineux, la tête est bordée de jaune; la corne est également jaune et assez petite; les stigmates sont blancs cerclés de noir. La chrysalide est chagrinée d'un brun marron.

Le papillon éclôt deux fois par an, en mai pour la première époque, et à la fin de juillet pour la seconde.

La chenille n'est pas très-rare; on la trouve, dans plusieurs parties de l'Amérique du Nord, sur différentes espèces de rosiers sauvages et sur plusieurs autres arbrisseaux de la même famille.

Nous avons obtenu un certain nombre d'insectes parfaits de chrysalides que nous avait envoyées notre savant et zélé collaborateur feu John Leconte.

Coll. Bd.

## 29. S. GEMINATUS. Say:

Sm. geminata, Harris, Am. Journ. sc. XXXVI, 291, 4. — Walker, Beterocera, p. 246, 7.

Il a le port de notre occilatus, mais il est peut-être un peu plus petit. Ses ailes supérieures, simplement sinuées, sont d'un gris-cendré plus ou moins rosé, avec des bandes brunes dont les deux du milieu réunies au-dessous de la nervure médiane, forment une espèce de V marqué dans son centre, qui est de la couleur du fond, d'une petite tache blanche; au-dessous de ces deux nies confluentes, il y a sur le bord marginal deux autres rales martes divergentes, liées aux deux précédentes par un gros trait incitudinal de la même couleur; l'extrémité des ailes offre pluseurs raies brunâtres, obsolètes, plus ou moins distinctes, et sur langle apical une petite lunule brune bien marquée, liserée de linc en dedans.

Les ailes inférieures ont le disque rose, avec les contours d'un codré rose; l'œil est oblong de bas en haut, bleu, cerclé de coir, coupé en deux parties par un trait transversal du même . ir.

Le corselet participe de la couleur des ailes supérieures; et est zaqué au milieu d'une tache brune. L'abdomen est d'un gris ècur.

Le dessous des ailes supérieures a le disque rose et l'extrémité rue, avec la lumule apicale comme sur la face supérieure; celui le inférieures est brun, traversé au-delà du milieu par une lande blanchâtre; il est en outre marqué d'un arc blanc au bout de la cellule discolidale.

Chez les femelles, les bandes qui forment un V, ont le centre rabruni, et non de la couleur du fond.

La chenille vit sur les drupacées et sur les saules; elle est d'un rent très-glauque, pointillée de vert et de blanc avec sept bandes biques blanches et une raie latérale de la même couleur, s'évidant sur les trois premiers anneaux et assez rapprochée du la; la corne est assez forte, d'un vert glauque, hordée de blanc par la dernière bande oblique qui remonte presque jusqu'à la pointe; les stigmates sont blancs cerclés d'orangé. La chrysalide est d'un brun-marron clair.

Nons avuns obtenu trois insectes complets, en mai, de chrysa-

lides que nous avait envoyées feu John Leconte, en même temps que le dessin de la chenille.

Coll. Bd.

#### 30. S. COECUS.

· Ménétriés, Knum. corpor. animal. academ. petrop. part. II. pl. 13, f. 2.

Il a le port de notre occilatus et surtout du geminatus. Ses ailes supérieures sinuées sont d'un gris-cendré plus ou moins rosé avec des bandes et des ondes brunes presque comme dans l'occilatus; l'angle du sommet offre de part et d'autre dans une petite échancrure une lunule brune, allongée comme dans le geminatus, entourée d'un peu de blanc lilas; au-dessous de cette lunule, sur le bord terminal, on voit quatre autres petites lunules alignées de couleur plus pâle.

Les ailes inférieures sont roses avec les contours plus pâles; elles sont marquées d'un œil transversal, allongé, noir, coupé par deux traits bleus qui le divisent dans le sens de sa longueur et qui lui font des espèces de paupières.

Le dessons des ailes est à peu près comme dans notre ocsilatus.

Le corselet est d'un gris cendré avec une grande tache brune évasée dans sa partie supérieure. Le corps est d'un gris brunâtre.

Nous ne connaissons pas cette espèce en nature. Notre description est faite d'après une excellente figure qu'en a donné Ménétriés. Cet auteur dit dans sa description que le Musée de l'Académie de Saint-Pétersbourg en possède trois exemplaires parfaitement semblables, l'un de la Daourie et les deux autres des bords de l'Amour.

## 31. S. ASTYLUS.

Drury, Ins. II, pl. 26, fig. 2. — Walker, Heterocera, 245, 6. — Smerinthus integerrima, Harris, Am. Journ. scient. XXXVI, p. 290, 2. — Variété Smerinthus Io, Boisd. in Guerin, R. anim. pl. 84, f. 2.

Il a le port des espèces précédentes, mais il s'en éloigne beaucoup par le dessin. Ses ailes supérieures entières, pointues au sommet, sont d'un brun ochracé pâle, avec une ligne brune, droite, oblique, commençant avant le milieu de la côte effinissant vers l'angle interne; l'extrémité de ces mêmes ailes offre quelques petites lignes noirâtres très-peu distinctes, suivies avant le bord terminal, d'une raie transversale blanche, bien indiquée, précédée vers le sommet de deux ou trois petits arcs de la même couleur, séparés de la bande en question par un petit espace fauve; on voit aussi sur l'angle interne une tache fauve.

Les ailes inférieures sont fauves avec le bord antérieur plus chacur; elles sont marquées d'un œil bleu sans pupille fortement cerclé de noir.

Le correlet est de la couleur des premières ailes avec une tache longitudinale plus obscure sur le milieu. L'abdomen est d'un less ochracé avec une petite raie dorsale brune.

Le dessous des ailes supérieures a le disque fauve avec l'extrémité brune et la même bande blanche que sur la face opposée; celui des inférieures est brun à sa base et à l'extrémité avec une écuble rais médiane blanche suivie d'une bande fauve.

La semelle est semblable au mâle.

La chenille, d'après un dessin grossier de M. John Leconte, est d'un vert tendre avec une rangée de points fauves sur les dermers anneaux et sept bandes obliques jaunes; les stigmates sont blancs cerolés de roux; la corne n'est qu'esquissée; elle vit sur les rosacées.

Décrit sur plusieurs individus mâles et femelles que nous gvons reçus de John Leconte comme provenant des environs de New-York.

L'individu que nous avons prêté à M. Guérin sous le nom d'Io, peur son Iconographie du Règne animal, est une variété dont les alles inférieures sont d'un fauve un peu rongeâtre.

#### 32. S. Myops.

Smith-Abbot, Lepidopt. ins. of Georgia, vol. I, tab. 26. — Walker, Beter. p. 245, 5. — Harris, Amer. Journ. sc. XXVI, p. 291, 3 — Variété Sm. reseccerum, Boisd.

Il est plus petit que notre occilats dont il a le port, mais il est plus voisin de l'astalus que d'aucune autre espèce. Ses ailes repérieures ont le bord un peu anguleux avec la pointe apicale peu échancrée; elles varient pour la couleur qui est un mélarge plus ou moins confus de grisatre avec des bandes et des rades brunes; près de l'extrémité, on aperçoit dans toutes les

variétés une raie blanchâtre, ou d'un blanc lilas, interrompue, plus ou moins blen écrite; dans la petite échancrure du sommet, il y a une lunule brune, liserée en dedans d'un arc d'un blanc lilas, séparée de quelques traits blanchâtres par une tache fauve; l'angle interne est aussi marqué d'une petite tache fauve.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocre, tirant un peu sur le fauve dans certaines variétés, avec le bord antérieur et le bord externe très-rembrunis; l'œil est bleu, petit, sans pupille, entouré d'un cercle noir, assez épais.

Le dessous des ailes est d'un jaune d'ocre, avec l'extrémité brune et des raies blanches vers le bord terminal des premières et sur le milieu des secondes.

Le corselet participe de la couleur des ailes supérieures. L'abdomen est roussâtre avec une petite raie dorsale brune.

La chenille, qui vit sur une infinité de Rosacées, varie passablement, à en juger par plusieurs dessins d'Abbot que nous avons sous les yeux. Tantôt elle est d'un vert glauque, tantôt d'un vert jaunâtre et quelquefois d'un vert bleuâtre, avec des bandes obliques jaunes, dont le nombre varie de cinq à sept; généralement, il y a sur les côtés deux rangs de gros points ferrugineux dont ceux de la rangée inférieure entourent les stigmates, qui sont blancs; la corne est d'une longueur moyenne, verte, bordée de blanc. Dans la variété appelée Rosacearum par feu John Leconte, la chenille est verte sans aucune trace de points ferrugineux.

La chrysalide est luisante, d'un brun-marron, très-légèrement chagrinée. L'insecte parfait des deux variétés nous est éclos en mai 1832 de chrysalides que nous avions reçues de John Leconte en même temps que les dessins des chenilles.

Décrit sur une dizaine d'exemplaires. - Coll. Bd.

\_ \_

Nous avons aussi reçu de notre collaborateur, sous les noms de Cerasi, Sorbi et Tiliastri, le dessin de trois chenilles de smérinthes avec leurs chrysalides vivantes, malheureusement ces dernières se sont desséchées. Les deux premières n'étaient peut-être que des variétés de Myops. Quant à la troisième, elle est tellement différente des espèces du groupe d'occilates qu'elle appartient peut-être à une espèce Géorgienne encome inconnue en Europe.

#### <del>11111111</del>

#### 33. S. TATARINOVII.

Bremer, Etud. Entom. de Motschulsky, p. 62. — Idem, Beitr. zur Schmett. Fauna des Nordl. China's, p. 13, n° 57.

Variété, smerinthus Eversmannii, Popoff, Eversm. Bullet. de la Soc. des nat. de Mosc. II part. pl. I, f. 5, p. 482.

Ce beau smérinthe, rare dans nos collections françaises, varie beaucoup pour le fond de la couleur des ailes supérieures, qui tantôt est d'un vert olivâtre, et tantôt d'un gris rosé plus ou moins intense. Il est un peu plus grand que notre occilatus. Le dessus de ses ailes supérieures dans le type est d'un gris-vert marqué sur le milieu d'une grande tache deltoïde, un peu irrigulière, d'un vert olive, et sur le bord interne d'une petito tache quadrangulaire de la même couleur. L'extrémité de l'aile offre en outre deux taches de la même teinte, dont l'une triangulaire placée sur la pointe apicale et l'autre sinuée sur le bord marginal, se terminant, tout à fait en bas, par un gros point noir.

Ailes inférieures d'un rouge-rose un peu plus pâle sur le disque avec une liture anale noire.

Corselet de la couleur des ailes supérieures ayant sur le milieu une grande tache d'un brun olive qui s'étend jusque sur la tête et une bande transversale de la même couleur à son point d'insertion avec l'abdomen. Ce dernier est d'un vert olivâtre avec les incisions d'un gris blanchâtre.

Dessous des ailes lavé d'un peu de verdâtre avec une tache blanche en triangle allongé vers le sommet des supérieures.

La variété Eversmannii ne différe que parce que le fond de la couleur est d'un gris un peu rosé avec le dessin d'un brun châtain au lieu d'être d'un vert olive.

Nous rencontrons dans notre Tiliæ des variations analogues.

il a été élevé de chenille aux environs de Pékin par M. Tatarinoff, médecin de la mission russe, et aux environs de Kiachta par M. Popoff, qui lui a donné le nom d'Eversmannii.

Nous ne savons rien des premiers états de ce smérinthe.

Collect. Bd. - Mus. N.

#### 34. S. TILLE.

Sphinx tillæ, Linn. — Fab. — Hubn. — Ochsenh. etc. Le Sphinx du tilleul, Geoffr. — Engr. — God. etc.

Ce smérinthe est bien connu de tous les entomologistes, et nous pourrions parfaitement nous dispenser d'en donner ici la description. Il varie beaucoup pour la couleur du fond des ailes supérieures, qui est tantôt d'un gris blanchâtre ou d'un gris rosâtre, tantôt chamois ou d'un fauve un peu rosé, ou même d'un rouge briqueté. Dans toutes les variétés, l'extrémité est olivâtre, liserée de ferrugineux; il y a sur le milieu deux taches d'un vertolive foncé ou bien d'un brun roux; ces deux taches, dont la supérieure est la plus grande, sont placées l'une au-dessus de l'autre; dans quelques variétés, elles sont réunies; outre cela, il y a toujours vers le sommet une tache en forme de doloire.

Le dessus des ailes inférieures est d'un brun-roux plus ou moins clair, avec une bande transversale noirâtre.

Le corselet est de la couleur du fond des premières ailes avec une raie dorsale, et les ptérygodes olives ou brunes, selon les variétés.

Nous possédons des variétés chez lesquelles les deux taches du milieu ont disparu, et sont remplacées par un gros point olivâtre placé à l'extrémité de la cellule discoïdale.

La chenille vit sur le tilleul, mais principalement sur l'orme (ulmus campestris) et quelquefois sur le catalpa. Elle est atténuée antérieurement, d'un vert plus ou moins clair, marquée sur chaque côté de sept traits obliques blanchâtres, liserée antérieurement de vert foncé ou de rougeâtre; la corne est bleuâtre avec la pointe verdâtre. Lorsque cette chenille est pour se métamorphoser, elle change de couleur et devient d'une teinte un peu vineuse.

La chrysalide est matte, d'un brun-noir.

L'insecte parfait éclôt depuis la fin de mai jusqu'à la fin de juin; il est commun dans toute l'Europe, principalement dans les parties tempérées.

Nous avons reçu dans le temps, de feu John Leconte, un individu comme ayant été trouvé dans le nord des Etats-Unis, mais nous pensons que c'est une erreur d'habitat, et que le smérinthe en question aura été envoyé d'Europe à quelque amateur de l'A-

mérique septentrionale. Dans la famille des Sphingides, nous ne connaissons que le D. Galii qui habite le nord des deux continents.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

#### 35. S. MAACKII.

Bremer, Neue Lep. aus-ost. Siber. und. d. Amour-Lande, Gesam. von Radde und Maack, p. 557, 25.

Nous n'avons jamais vu ce Smérinthe qui, comme le dit fort bien M. Bremer, paraît être assez voisin de l'Indicus que nous avons décrit au British Museum.

Ses ailes sont dentées et échancrées de la même façon; les supérieures sont d'un gris olivâtre, avec des raies et des bandes transverses plus obscures; elles ont en outre, vers l'angle interne, une tache brune bilobée, et près du bord postérieur un embre d'un brun olivâtre.

Les ailes inférieures sont d'une couleur ochracée, avec le bord interne grisatre et une petite bande brune vers l'angle anal.

Le corselet est d'un blanc olivâtre, avec une raie dorsale d'un vert olive, s'élargissant en arrière; les palpes et la poitrine sont de couleur jaunâtre; l'abdomen est d'un gris olivâtre avec des anneaux d'une teinte plus claire.

Le dessous des ailes est d'un jaune ochracé; celui des supéneures avec deux bandes blanchâtres liserées de brun; celui des inférieures avec trois raies brunes.

Cette rare espèce a été trouvée en juin sur les bords de l'Ussuri par M. Maack, et parfaitement bien décrite par le savant M. Bremer.

## 36. S. Indicus. Boisd.

Il est de la taille des petits individus de notre Tiliæ. Ses ailes sup-rieures sont dentées, d'un brun-tanné plus ou moins clair trec des bandes mal définies, un peu obsolètes, d'une teinte olivitre; elles ont en outre, à l'extrémité, une tache semi-lunaire également olivaire.

Les ailes inférieures sont d'une teinte roussatre pale, avec un trait brun vers l'angle anal.

Le corselet et le corps participent de la couleur des ailes. Décrit au British Museum.

Himalaya.

#### 37. S. PUDORINUS. Boisd.

Ce petit smérinthe est à peu près de la taille du précédent, mais ses ailes sont très-faiblement dentées; les supérieures sont d'un gris-tanné très-clair, traversées par des bandes brunâtres.

Les ailes inférieures sont rougeâtres, sans raie transversale, avec l'angle anal d'un gris cendré.

Le corselet et l'abdomen sont de la couleur des ailes.

Décrit au British Museum.

Inde centrale.

## 38. S. Pusillus.

Felder, Novara, Exp. Zoolog. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 82, fig. 1.

Il est très-petit; il n'a que 4 centimètres 1/4 d'envergure. Ses quatre ailes sont dentelées, avec les échancrures liserées de blanc; les supérieures sont d'un gris cendré, marquées entre la base et le milieu de trois petites raies transverses brunes, un peu ondu-lées, légèrement liserées de blanchâtre, suivies d'un petit arc de même couleur; au-delà de celui-ci, il y a une bande transversale brune assez régulière, suivie en dehors d'une raie sinueuse de la même teinte, se prolongeant un peu sur les nervures; outre cela, la tranche du bord terminal est brune.

Les ailes inférieures sont d'un roux-cannelle vif, avec l'angle anal brun, coupé par une petite ligne blanchâtre.

Le corselet est varié comme les ailes supérieures.

L'abdomen est gris avec les articulations blanchâtres et trois rangées de taches brunes, dont une dorsale et deux latérales.

Décrit sur la figure donnée par M. Felder.

Il a été rapporté de?

# GENRE EURYPTERYX. Folder.

Le Sphingide qui a servi à M. Felder pour établir ce genre est tellement différent de toutes les espèces connues, qu'il nous est impossible, malgré la belle figure que nous avons sous les yeux, de dire à quelle tribu il appartient. C'est peut-être même à tort que nous le plaçons provisoirement avec les Smérinthides. Il a les yeux saillants, les antennes assez fortes, le corps long et grêle terminé par une brosse comme chez les Macroglosses. Les ailes sont entières, très-larges; les supérieures, un peu pointues au sommet, ont l'angle interne fortement arqué.

Nous ne pouvons rien dire des palpes ni de la trompe que nous ne pouvons voir. M. Felder, lorsqu'il publiera le texte des planches qu'il a eu la bonté de nous envoyer, ne manquera pas de compléter les caractères que nous n'avons fait qu'ébaucher.

## E. MOLUCCA.

Felder, Novara, Exp. Zoolog. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 76, fig. 1.

Il a environ 8 centimètres d'envergure. Ses ailes sont trèslarges; les supérieures un peu aigués au sommet et fortement arquées à l'angle interne, sont d'une teinte violette depuis la base jusqu'an milieu, puis ensuite d'un brun marron; sur cette partie foncée, il y a sur la côte vers le tiers postérieur, deux taches blanches, superposées, très-rapprochées, un peu quadrangulaires, séparées par une simple nervure; sur le bord terminal, il y a, en outre, une longue lunule d'un brun-noir, limitée en dedans par une teinte d'un blanc bleuâtre.

Les ailes inférieures sont d'un brun marron avec la base largement d'un gris verdâtre.

Le prothorax et le corselet sont d'un brun marron. Le corps est mince, allongé, cylindrique, d'un gris verdâtre sur le dos avec les côtés blancs; la brosse ansle est d'un brun marron.

Cette rare espèce a été prise à Ternate et fait partie de la coliection de M. Felder.

# GENRE BASIANA. Walker.

Ce genre a été établi par M. Walker sur un Sphingide que nous avons décrit au British museum sous le nom de *Deucalion*, et que nous avions rapproché provisoirement des Smérinthides avec lesquels il a plus d'affinité qu'avec aucune autre tribu.

M. Walker lui adjoint, dans son supplément, d'autres

espèces que nous ne connaissons pas. En conséquence, nous ne pouvons pas affirmer qu'elles appartiennent véritablement au même sous-genre que le *Deucation*, qui offre les caractères suivants :

Corps épais avec la tête courte non saillante. Trompe assez courte, mais distincte. Palpes courts, bien développés, appliqués fortement sur le front. Antennes du mâle dentelées en scie et pubescentes. Antennes de la femelle un peu sétacées, un peu plus longues que le corselet. Pattes robustes, avec les jambes postérieures munies de quatre éperons de longueur moyenne. Ailes longues, assez larges; les supérieures à peine convexes le long de la côte, un peu pointues au sommet; les inférieures arrondies avec le bord extérieur entier.

#### 1. B. DEUCALION. Boisd.

Walker, Heterocera, p. 236, 1. - Smerinthus? Deucalion, Boisd. M.

Il est de la taille d'un Ch. Equestris. Ses ailes supérieures sont d'un brun-tanné clair, avec six raies transverses, parallèles, brunes, ondulées; on n'y voit point de stigmate.

Les ailes inférieures sont d'un brun-tanné assez foncé, marquées à leur base d'une grande tache noire.

Le corselet et l'abdomen participent de la couleur des ailes. Ce dernier a les côtés un peu testacés.

Le dessous des ailes est beaucoup plus pâle que la face opposée, traversé par deux raies brunâtres peu marquées; on voit, en outre, à la base des supérieures une bandelette noire un peu velue.

Himalaya. — Décrit au British Museum sur un exemplaire unique.

## 2. B. CERVINA.

Walker, Heterocera, p. 237, 2. — Moore, Cat. of Lepid. of ind. Compan. p. 265, 641.

Nons ne connaissons pas ce grand Sphingide qui, cependant, ne paraît pas être aussi rare que le précédent, puisque le British Museum en possède trois exemplaires et le Muséum de la compagnie des Indes un pareil nombre.

I est d'un cinquième plus grand que le Ch. equestris.

I est d'un brun tanné pâle. La tête est marquée d'une bande l'un gris brunâtre.

Les ailes supérieures sont traversées par quelques lignes ontakées un peu plus obscures que le fond; leur disque et une table apicale sont d'une teinte brunâtre.

les ailes inférieures sont roussatres, avec la base et l'angle uni testacés.

Nord des Indes. - British Museum. Walker.

## 3. B. SUBMARGINALIS:

Walker, Heterocera, XXXI, p. 37.

Il est notablement plus petit que Deucalion, et sa couleur est du fauve un peu grisatre.

les ailes supérieures falquées au sommet et marquées vers leur base d'un petit anneau noir mal écrit, sont traversées par leur lignes noirâtres, diffuses, denticulées et ont en outre des points marginaux noirs.

les ailes inférieures sont ochracées vers le sommet de leur

Il se trouve à Sierra Leone. - British Museum.

Selon M. Walker, cette espèce est bien distincte du Postica Par ses ailes inférieures.

#### 4. B. CANESCENS.

Walker, Heterocera, XXXI, p. 38.

Il est aussi grand que le Deucalion et sa couleur est d'un brun ochracé. La tête est d'un gris ochracé, marquée d'une large lande brune. Les palpes sont roux avec le sommet cendré. L'abdomen offre vers l'extrémité deux taches brunes allongées.

Les ailes supérieures falquées sont traversées par cinq lignes anguleuses, noirâtres, ailes que les raies basilaires; outre cela, elles ont une bande cendrée marquée d'un point noir, une tache cotale brune et un espace apical brun, sablé de jaunâtre et, en plus, vers le bord extérieur une large tache ferrugineuse.

Les alles inférieures ont quelques litures d'un testacé pâle

Lipidoptères. Tome I.

Cette grande espèce, que nous n'avons jamais vue, a été rapportée du Camboge et fait partie de la collection de M. Sannders.

## 5. B. SEMIFERVENS.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 38.

Il est plus petit que le précédent et sa couleur est d'un brun fauve. La tête est d'un gris ochracé, marquée d'une large bande brune. Les palpes sont roux avec le sommet gris. L'abdomen offre vers son extrémité deux taches brunes allongées.

Les ailes supérieures un peu falquées sont traversées par trois bandes obliques, irrégulières, plus obscures, bordées par du gris purpurescent; la seconde bande renferme une tache noire; la seconde et la troisième sont réunies près de la côte; cette dernière est marginale, précédée près de la côte, d'une tache brune bordée de gris et de deux petits anneaux connexes également gris.

Les ailes inférieures sont marquées de trois raies obscures, très-obsolètes.

Décrit sur un exemplaire unique pris à Ternate et appartenant à la riche collection de M. Saunders.

## 6. B. Postica.

Walker, Heterocera, p. 237, 2.

Cette espèce est plus petite que les précédentes et d'une couleur testacée. Les antennes sont d'un brun tanné. La tête et le corselet sont marqués d'une raie noirâtre. L'abdomen est en grande partie d'un roux fauve avec une tache noirâtre à sa base. Les pattes sont ferrugineuses.

Les ailes supérieures ont une tache noire à la base.

Les ailes inférieures sont jaunes, avec un espace basilaire, et une bandelette étroite, un peu ondulée, extérieure, de couleur noire.

Décrit sur un exemplaire recueilli à Natal. — British Museum. Ce Sphingide est-il bien à sa place à côté de notre Deucation?

#### 7. B. BILINEATA.

Walker, Heterocera, XXXV, 1857.

Il est au moins aussi grand que le Deucalion. Sa couleur est

ressitre en dessus et ochracée en dessous. La tête est brune attérisurement.

Les ailes supérieures falquées sont marquées de lignes transvenes, indéterminées, d'une teinte plus obscure, et de deux autres lignes extérieures obliques, en zigzag, plus pâles que le fond de l'aile; elles ont, en outre, sur le milieu de la côte, une large tache triangulaire de couleur pâle.

Les ailes inférieures sont d'un brun-roussatre avec la base noititre et le bord extérieur roux.

Le dessous des ailes offre deux lignes ondulées, obliques, obsolètes, obscures; celui des supérieures a, près de la base, une raie noire et une espèce de tache velue qui longe la cole dans a partie voisine du sommet; cette même tache est bordée en arrière par une ligne oblique brune.

Darjeeling. - British Museum.

# GENRE DAPHNUSA. Walker.

M. Walker a établi ce genre sur des Sphingides que nous se connaissons pas, mais qui, d'après les caractères exposés par ce savant entomologue, nous paraissent être à leur wintable place dans la tribu des Smérinthides, à côté des Basiana.

Chenilles: Inconnues.

lasecte parfait: Corps robuste. Trompe rudimentaire. Palpes courts, robustes et recourbés sur la tête. Abdomen chang-lancéolé, plus du double de la longueur du corselet. Pattes robustes, assez courtes, avec les jambes postérieures sans éperons. Ailes de largeur moyenne, peu allongées; les supérieures à peu près droites le long de la côte, à peine pointues au sommet, avec le bord terminal presque droit. Les ailes inférieures arrondies avec le bord extérieur entier. — Walker.

# 1. D. OCELLARIS.

Walker, Heterocera, p. 238, 1.

li a 34 lignes anglaises et sa couleur est d'un gris cendré en dessus et roussàtre en dessous. Le corselet est marqué antérieurement d'une bande fauve. L'abdomen offre des bandes brunes interrompues, avec des taches intermédiaires plus obscures.

Les ailes supérieures ont quelques lignes transverses, ondulées, brunes, avec une bande d'un brun foncé près de la base; elles ont, en outre, à l'angle interne une large tache jaune accompagnée d'une raie testacée.

 Les ailes inférieures sont d'un cendré brunâtre, traverrées par deux bandes obsolètes, obscures, avec les nervures roussatres.

Bornéo. — British Museum.

# 2. D. COLLIGATA.

## Walker, Heterocera, p. 238, 2.

Il est de la même taille que l'espèce précédente et d'un fauve roux. Le corselet, plus pâle dans sa partie postérieure, est marqué de chaque côté d'une tache brune.

Los ailes supérieures, en partie d'un gris cendré, sont blanchâtres le long de la côte, avec une bandelette discoïdale brune et une bande transverse, oblique, arquée, blanche; outre cela, elles ont une tache apicale blanche et un stigmate argenté.

Les ailes inférieures sont brunâtres, plus pâles vers l'angle anal où elles sont marquées d'une raie d'un brun obseur; leur bord marginal est d'un fauve roussâtre.

Nord de la Chine. — British Museum.

Décrit sur un exemplaire unique.

## GENRE CYPA. Walker.

Nous ne connaissons ce genre que par les caractères que lui assigne M. Walker. D'après cet auteur, il a les plus grands rapports avec les smérinthes.

Insecte parfuit: Corps épais, très-velu. Trompe presque nulle. Antennes épaisses. Abdomen en cône allongé, n'étant pas moitié plus long que le corselet. Pattes courtes, robustes, avec les jambes postérieures armées de deux éperons très-courts. Ailes supérieures pointues, un peu falquées, avec le bord extérieur un peu endulé et un peu échancré au sommet.

#### C. FERRUGINEA.

## Walter, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 42.

Il a 7 centimètres et sa couleur est ferrugineuse. Les antennes sont blanchâtres en dessus. Le dessous de l'abdomen et la partie postérieure de la poitrine sont d'un rose cendré. Les jambes et les tarses sont d'un brun noirâtre en dessus.

Les ailes supérieures ont un stigmate noir, suivi en dehors de deux lignes obliques, obscures, obsolètes.

Décrit sur une femelle unique rapportée de Ceylan. — British museum.

## GENRE CERATOMIA. Harris.

Chenille très-fortement chagrinée, pourvue d'une queue rugueuse de médiocre longueur, peu arquée; une paire d'épines courtes, obtuses, raboteuses sur le second et le troisième anneau. Chrysalide comme dans les smérinthes.

Insecte parfait: Palpes courts à peu près horizontaux, non accendants, très-fortement ciliés, ne dépassant pas le front. Trompe roulée, assez courte. Front proéminent en avant. Antennes dentées dans les mâles, plus grêles et faiblement denticulées chez les femelles, terminées dans l'un et l'autre sexe par une petite pointe. Corselet ordinaire. Ailes entières, à frange entrecoupée. Corps rayé longitudinalement de noir.

Le seul Sphingide appartenant à ce genre a le port du Sphinz ligustri et autres espèces voisines.

#### C. AMYNTOR.

Bubn. Exot. Saml. — Ceratomia quadricornis, Harris, Descr. Cas.
p. 13. — Walker, Heterocera, p. 258, 1.
Sphiax ulmi, Leconte.

li a le port et la taille de notre S. ligustri. Ses ailes ont la frange entrecoupée de blanc jaunâtre. Les supérieures sont brunes, avec la base et presque toute la côte assez largement d'un blanc-gris; le stigmate est blanc, grand et placé à l'extrémité antérieure du brun, sur un fond noisette; outre cele, il y a, an

sommet, des raies longitudinales noires et, avant le bord terminal, une double ligne blanchâtre, courbe, sinuée, divisée dans le sens de sa longueur par une ligne noirâtre; la bordure est d'un brun-marron clair.

Les ailes inférieures sont d'un blanc-jaunâtre sale, avec la bordure noire chez la femelle; chez le mâle, la bordure est de la couleur du fond avec une bande anté-marginale noirâtre; dans l'un et l'autre sexe, on voit la trace d'une bande transverse obscure.

Le corselet est brun, avec les côtés blancs, ainsi que la tête et le collier.

L'abdomen est d'un gris roussâtre, avec une ligne dorsale noire et une raie latérale de la même couleur un peu dilatée transversalement dans toutes les incisions.

Le dessous des ailes est brun, beaucoup plus clair sur les inférieures, avec deux raies noirâtres fortement dentées en scie.

La chenille est d'un vert pâle, très-fortement chagrinée, avec six traits obliques blancs, dont le premier et le dernier sont plus longs que les autres; la corne est rugueuse, d'un vert blanchâtre, de longueur moyenne, peu arquée; lès stigmates sont blancs cerclés de noir; mais ce qui distingue cette chenille de toutes les autres, c'est qu'elle porte quatre cornes courtes, obtuses, très-raboteuses, disposées sur le second et le troisième anneau.

La chrysalide est d'un brun clair.

Trois individus sont éclos chez nous, à Paris, à la fin de mai.

# TRIBU DES LEUCOPHLÉBIDES.

Cette tribu, assez aberrante dans la grande famille des Sphingides, est établie sur des Lépidoptères très-intéressants qui semblent, au premier coup-d'œil, se rapprocher un tant soit peu des Notontides.

La chenille du Luxeri, qui a été élevée et peinte dans l'Inde par M. Frith, est verte, un peu chagrinée, avec deux raies latérales d'un blanc verdâtre, dont l'inférieure, moins indiquée, porte les stigmates; elle est munie, sur le onzième anneau, d'une petite corne droite médiocrement longue.

Cette chenille ne vit pas sur les arbres, C'est, à netre comaissance, la seule dans la famille qui se nourrisse de graminées. M. Frith l'a trouvée sur le Saccharum cylindricum, plante assez commune dans une grande partie de l'Asie, de l'Europe et même de l'Amérique.

Insecte parfait: Antennes des mâles assez longues, doublement dentées, recourbées en crochet à l'extrémité, plus simples et plus courtes chez les femelles. Palpes ascendants, couverts de poils courts, écailleux, appliqués sur le front, dépassant un peu les yeux. Ceux-ci assez grands, arrondis. Trompe très-courte. Ailes elliptiques, lancéolées, parfaitement entières. Abdomen mince, allongé, pointu à l'extrémité comme chez la plupart des Chærocampa.

On voit, d'après les caractères ci-dessus, que l'insecte dont il s'agit se rapproche beaucoup plus des Smérinthides' que de tout autre groupe, ainsi que l'illustre M. Westwood, qui n'avait aucun renseignement sur la chenille, l'avait déjà soupçonné dans son « Oriental Cabinet. » Nous trouvons que M. Moore l'a bien mis à sa place; mais nous ne pouvons partager l'opinion du savant M. Walker, qui en fait une Noctuélide dans le groupe des Leucanides.

# GENRE LEUCOPHLEBIA. Westwood.

Mêmes caractères que ceux de la tribu.

#### 1. L. LUXERI. Boisd.

Lineata, Westwood, Cabin. orient. Ent. pl. 22.—Walker, List. Lepid. Brit. mus. Heter. pt. IX, 136. — Moore, Cat. of Lepid. of east india Comp. I, pl. 263, 610. — La chenille, pl. VIII.

Rasphele Luxeri, Bd. M.

Ce joli Sphingide, que nous avons reçu de Java il y a une tren-

taine d'années, et que nous avions dédié à feu M. de Luxer, président du tribunal de Nancy, a environ 7 centimètres d'envergure; son corps est plus grêle que dans aucune autre espèce de la même famille; ses ailes sont bien entières; les supérieures sont d'un rose tendre, avec deux bandelettes longitudiuales d'un jaune doré, dent l'antérieure, située un peu au-dessous de la côte, est longuement cunéiforme et s'étend, en se rétrécissant, du bord marginal jusqu'à la base; la seconde, beaucoup plus étroite, moins bien marquée, est placée entre le milieu et le bord interne; entre ces deux bandes, les nervures sont un peu lavées de blanc.

Les ailes inférieures sont entièrement d'un jaune-d'ocre fauve. Le corselet est d'une teinte rosée avec le milieu d'un jaune roussâtre; l'abdomen est d'un roux tirant sur le brun:

Le dessous des ailes est un peu jaunâtre, avec le disque des supérieures largement d'un fauve ochracé. Le dessous de l'abdomen est rose, avec la poitrine et la tête de couleur brune.

La chenille, d'après un dessin de M. Frith, reproduit par M. Moore, est verte, chagrinée, avec deux raies latérales plus obscures; les stigmates sont blancs cerclés de noir. La queue est droite, peu allongée.

Elle vit sur le Saccharum cylindricum.

ll est assez rare. On le reçoit de temps en temps de Java et de l'Inde centrale. M. Westwood en a donné une très-bonne figure.

Collect. Bd.

C'est avec regret que nous avons changé le nom donné à cette espèce par M. Westwood. Nous ne l'avons fait que parce qu'il y a déjà un Sphingide qui porte le nom de lineats.

## 2. L. EMITTENS.

Walker, Heterocera, XXXV, Suppl. p. 1838.

Quelque hétéromorphe que soit un insecte, rarement, et peutêtre jamais, la nature n'a fait une espèce seule. Tôt ou tard, on est tout étonné de voir que l'on en découvre une seconde et quelquesois une troisième. C'est ce qui est arrivé pour le genre Leucophlebia, dont pendant longtemps on n'a connu que le Luxeri (lineata Westwood).

L'espèce dont il s'agit est de la même taille et elle a le même

pert. Sa esculeur est d'un brun obseur. L'abdomen est d'un fauve rest.

Les alles supérieures ont une large bandelette longitudinale blanche, donnant naissance à quatre rayons de sa couleur, longent les nervures.

Les ailes inférieures sont d'un jaune-d'ocre un peu obscur, see une ligne marginale brune qui s'élargit un peu vers l'angle mal.

Décrit sur un exemplaire femelle rapporté de l'Hindostan. —

## 3. L.? BEUGLINI.

Smerinthus Bouglini, Feld. Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 76, fig. 2.

M. Felder fait de ce Lépidoptère un véritable Smérinthe. Nous coyens qu'il est mieux à sa place dans le genre Leucophlebia, quelque ses ailes supérieures soient moins arrondies au sommet et qu'il soit d'une stature plus grêle.

Il a environ 6 centimètres d'envergure. Ses ailes sont bien entières; les supérieures sont blanchâtres lavées de rose, avec une bordure grisâtre, assez large, précédée d'une petite ligne de sa souleur; leur sommet est marqué d'une lunule rousse bordée en dedans par un croissant blanc; outre cela, il y a, sur la partie d'un blanc rosé, une baude brune bien marquée, partant de la obte et se contournant pour retourner à la côte en formant une espèce de V très-ouvert.

Les ailes inférieures sont d'un violet-lilas clair, avec une tache centrale noirâtre et une bordure grisâtre.

Le cerselet est minee, d'un blanchâtre lavé de rose, avec une raie dorsale brune.

L'abdomen est très-grêle, effilé et d'un blanc rosé.

Cette jolie petite espèce a été envoyée d'Abyssinie à M. Felder. Il est très-probable que si nous avions pu examiner ce Sphingide sur la nature, nous en aurions fait un sous-genre à part près des Leucophlebia.

# TRIBU DES EURYGLOTTIDES.

Cette tribu, l'une des plus nombreuses de la famille des Sphingides, est presque entièrement composée du grand genre Sphinx des anciens auteurs.

Les chenilles ont la tête arrondie; leur peau est lisse, jamais chagrinée. Elles sont généralement pourvues d'une corne sur le onzième segment, et le plus souvent ornées de taches latérales obliques.

Les Euryglottides sont remarquables par la longueur de leur trompe qui dépasse souvent de beaucoup celle de leur corps, et aussi par leur forte organisation. Ils sont doués d'un vol puissant à l'aide duquel ils peuvent se transporter à des distances considérables. Ils ne se montrent que le soir vers le coucher du soleil.

GENRE MEGANOTON. Boisd. - Macrosila. Boisd, olim.

Walker. - Moore.

La chenille nous est inconnue, quoique celle du Discistriga ait été élevée plusieurs fois aux îles Philippines par M. Lorquin sur une plante grimpante qu'il ne connaît pas. La chrysalide qu'il nous a envoyée, s'il ne s'est pas trompé, ressemble plutôt à la chrysalide d'un Deilephila qu'à celle d'un Sphinx.

Insecte parfait: Antennes longues, assez minces, terminées par un crochet grêle très-prononcé. Palpes avancés, obtus, couverts de poils très-serrés, à articles indistincts. Trompe un peu plus longue que le corps. Yeux gros et saillants. Corselet robuste. Abdomen allongé, de grosseur moyenne, très-conique. Ailes bien développées, un peu dentées, de couleur sombre. Pattes assez grêles.

Ce genre est très-voisin des Sphinx proprement dits. Les

deux espèces que nous connaissons habitent les Indes orien-

## 1. M. NYCTIPHANES. Boisd.

Walker, List. Lepid. Brit. mus. het. pt. VIII, p. 209. — Moore, Cat. of Lep. of east ind. Comp. p. 208, 618. — Ménétr. Enum. corp. anim. Mus. petr. p. 89, 1469.

Il est un peu plus grand que le convolvuli. Ses ailes sont dentales avec les échancrures blanchâtres; le fond de la couleur des supérieures est brun avec des nuances plus claires; elles sont traversées par des lignes noirâtres et par des lignes grisâtres, estulées; le stigmate est petit, blanc, cerclé de noir, précédé en dedans d'un point également noir; avant le sommet, vers le tiers supérieur, on voit, entre deux lignes noires, une raie blanchâtre preque droite qui ne dépasse guère le niveau de la principale nervure; cette raie blanche est suivie de deux ou trois tâches soirâtres; tout près de la frange, existe, en outre, une raie maculaire, formée de petites taches noires inégales, dont la seconde, à partir de la pointe apicale, est un peu cordiforme, bordée de blanchâtre en dedans.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande maculaire d'un blanc sale, formée de quatre à cinq taches.

Le corselet est brun, bordé de noir en arrière et sur les épau-

L'abdomen est d'un gris un peu jaunâtre avec les trois premiers anneaux d'un noir profond et les incisions blanches.

Le dessous des ailes est d'un blanc jaunâtre jusqu'au-delà du milieu, ensuite brun jusqu'à la frange; celui des inférieures a une bande transverse brune, appuyée sur une bande blanchâtre dantée en scie.

Il habite le nord des Indes; nous ne le croyons pas très-rare.

Coll. Bd.

#### 2. M. DISCISTRIGA.

Walker, List. Lep. Brit. mus. het. pt. VIII, p. 209. — Moore, Cat. of Lepid. of ind. Compan. p. 268, 618. — Macrosila Darius, Boisd. M. Ménétriés, Enum. corp. animal. Mus. petropol. p. 89, 1470.

Il est de la taille d'un grand exemplaire de convolvuli; ses ailes ont la frange entrecoupée de blanc; les supérieures sont d'un gris sombre avec un assez grand espace brun, au-dessous du milieu de la côte; cet espace porte un petit stigmate hlane, et est limité en dehors par une double raie noire, dentée, commeaçant à la côte et descendant perpendiculairement jusqu'au milieu de l'aile pour se replier presque en angle aigu au-dessous de la nervure médiane; ce même espace est coupé par un gros trait noir longitudinal; il y a, en outre, des raies transversales un peu effacées, principalement vers la base; le sommet offre une grande tache noirâtre, un peu longitudinale, bordée de noir; au-dessous de cette grande tache, existo près du bord terminal une espèce de bande maculaire brune, et sur l'extrémité des nervures une série de taches brunes, plus ou moins nettes.

Les ailes inférieures sont d'un noir profond avec un espace d'un gris-blanchâtre sale vers l'angle anal.

Le corselet est brun, bordé de noir latéralement et en arrière. L'abdomen est grisâtre avec une ligne dorsale noire bien marquée, et une raie latérale de la même couleur.

Le dessous des ailes est d'un gris brunâtre.

Ce Sphinx n'habite pas seulement le nord des indes; M. Lorquin a trouvé et élevé la chenille dans l'île Luçon.

Coll. Bd.

# GENRE MACROSILA. Boisd. — Sphinx auctorum.

Nous ne connaissons qu'une seule espèce appartenant véritablement à ce genre tel que nous l'avons réduit : c'est le Sphinx Hasdrubal de la plupart des auteurs.

Chenille allongée, cylindrique, un peu rugueuse, noire, annelée de jaune, munie d'une corne très-longue et tout à fait filiforme.

Insecte parfait: Antennes longues, un peu recourbées à l'extrémité, légèrement dentées chez les mâles, plus grêles et plus simples chez les femelles. Palpes à articles indistincts, appliqués sur le front, recouverts de poils serrés écailleux. Trompe à peu près de la longueur du corps. Yeux de grandeur moyenne. Corps très-robuste, avéc l'abdomen gros, conique, un peu obtus. Ailes larges, bien développées, variées de gris et de noirâtre.

## M. TETRIO.

limé, Mantissa, I, 538. — Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 366-32. — Sphiaz Asirabal, Cram. 246, F, etc. — Poey, Centurie de l'île de Cuba.

Le mâle a de 11 à 12 centimètres et la femelle de 14 à 15 d'envegure. Ses ailes supérieures, un peu dentées, sont d'un gris blanchêtre, variées de brun; elles ont toujours à la base une ache costale brune qui s'arrête à la ligne médiane; il y a toujous aussi sur le milieu de la côte un trait transversal noirêtre, qui, dans le mâle, vient se réunir en angle aigu à une espèce de bande noirêtre mal définie.

Les ailes inférieures sont d'un brun-noir avec un espace cendré vers l'angle anal divisé par deux traits noirêtres.

Le corselet est brun mélangé de gris.

L'abdomen est d'un gris plus ou moins foncé, avec des bandes noires interrompues sur le dos. Les antennes sont longues, assez grêles, de couleur blanchâtre.

Le dessous des ailes est d'un gris foncé, avec deux raies communes noires un peu dentées en scie. Le dessous de l'abdomen est d'un gris blanchâtre avec quatre points noirs.

Ce Sphingide est l'une des espèces les plus communes. La femelle est généralement d'un tiers plus grande que le mâle. Il est beaucoup plus connu sous le nom d'Hasdrubal que sous celui de Tetrio, oublié depuis longtemps.

La chenille est assez bieu représentée par M. Poey, dans sa Centrie de l'île de Cuba. Nous en possédons également un très-beau dessin, fait sur nature aux Antilles par feu notre ami le général Brunet. Voici sa description exacte d'après cet observateur. « Cette chenille, remarquable entre toutes, vit sur le jasmin du Para (Plamieria rubra). Lorsqu'elle est parvenue à toute sa grandeur, elle ést longue de 12 à 13 centimètres. Elle est un peu rugueuse, d'un noir mat. Tous ses anneaux, excepté le premier et le derzier, offrent une bande transversale d'un jaune sitron. Sur les deuxième, troisième et onzième anneaux, cette bande jaune est interrompue sur le dos. Les pattes, la partie dorsale du premier apneau, une tache semi-lunaire sur le onzième, et tout le deraier segment sont rouges tiquetés de noir. Sur le milieu de la tache du onzième anneau s'élève une espèce de queue noire trèspatte, filiforme, longue de près de 3 centimètres. Cette queue

est très-mobile et se casse souvent. La tête est d'un rouge de corail. Les stigmates sont noirs.

Cette chenille, pour peu qu'on l'inquiète, agite vivement toute la partie antérieure de son corps, en relevant et abaissant alternativement sa queue comme si elle voulait se défendre, ce qui ne l'empêche pas d'être très-sujette à être piquée par les ichneumons. » (Brunet.)

Cette chenille vit probablement sur d'autres espèces de plumieria et peut-être même sur d'autres apocynées.

Nota. Fabricius rapporte au Sph. Tetrio de Linnée, un grand Sphingide à abdomen marqué latéralement de taches orangées, figuré par M<sup>110</sup> de Mérian sur la pl. V. La chenille, quoique représentée d'une manière très-grossière sur le Jatropha manihot, nous paraît en effet appartenir à l'espèce en question; mais il n'en est pas de même de l'insecte parfait, qui nous paraît être une femelle de l'Amphonyx jatrophæ.

# GENRE AMPHONYX. Poey. — Macrosila. Walker. — Sphinx auctorum.

Chenilles très-fortes, allongées, pourvues d'une queue arquée.

Insecte parfait: Antennes longues, terminées par un petit crochet. Palpes un peu écartés, fortement recouverts de poils écailleux, avec le dernier article saillant, formant une pointe aciculaire, piquante. Trompe plus longue que le corps. Yeux gros. Corselet robuste. Abdomen conique, marqué de taches latérales jaunatres. Alles bien développées.

Sauf une espèce qui a été trouvée sur la côte d'Afrique, les Amphonyx sont propres aux contrées intertropicales de l'Amérique.

# 1. A. CLUENTIUS.

Cram. 24, F, et 126, A.

Il a de 16 à 20 centimètres d'envergure. C'est le plus grand Sphingide que nous connaissions. Ses ailes supérieures sont d'un brun noirâtre, avec des bandes transversales irrégulières, un peu maculaires, d'une couleur plus obscure que la teinte générale. Entre le hord interne et la nervure médiane, il y a une espèce de bande roussâtre, longitudinale, marquée de quelques gros points noirs. A partir de la cellule discoïdale jusqu'à l'extrémité, il y a aussi une bande longitudinale roussâtre.

Les ailes inférieures sont noires, avec deux taches orangées à peu près rondes, dont une, beaucoup plus grande, située vers la base, et l'autre, plus petite, placée plus bas, dans le voisinage de la gouttère abdominale; outre cela, ces mêmes ailes ont, vers le milieu, au-dessous des deux taches orangées, une bande transversale d'un jaune plus pâle, coupée en taches cunéiformes par les nervures; la gouttière abdominale est jaune ainsi que les échancrures.

Le carselet et la tête sont mélangés de noir et de brun; les antennes sont blanchâtres, longues et grêles. L'abdomen est brun eu d'un brun légèrement grisatre; il offre de chaque côté une rangée de cinq grosses taches jaunes arrondies; en dessous, il est d'un blanc jaunâtre.

La chenille, que nous ne connaissons pas, doit être fort grosse; nous supposons qu'elle doit vivre sur quelque espèce de Jatropha.

Le Ciuentius se trouve à Cayenne et dans quelques-unes des grandes Antilles.

Il est assez répandu dans les collections.

Coll. Bd.

## 2. A. BEELZEBUTH. Boisd.

Il est un peu plus grand que le Duponchelii. Ses ailes supérieures sont brunes avec des traits longitudinaux noirs, dont le plus accentué se trouve au-dessous de la nervure médiane; le stirmate est blanc, surmonté d'un point de la même couleur; outre cela, il y a, vers la base, l'angle interne, aux environs én sommet et en dehors du stigmate, un espace d'un vert d'herbe.

Les ailes inférieures sont noires, avec une tache orangée à la faise et une baude transversale, médiane du même jaune, diviée en cinq taches oblongues par des nervures noires; cette binde s'arrête vers le milieu de l'alle et est loin d'atteindre le bord abdominal; la gouttière abdominale est bordée de jaune et les échancrures sont liserées de blanchâtre.

Le corselet est brun avec une raie noire sur les épaulettes. L'abdomen est d'un brun un peu roussâtre, marqué de chaque côté d'une tache blanche basilaire et de trois taches orangées encadrées de noir.

Le dessous des ailes est brun; celui des inférieures offre à peu près le même dessin qu'en dessus, mais celui des supérieures est rayonné de jaune à la base. Le ventre est d'un blanc un peu jaunâtre avec trois grosses taches noires; les palpes sont d'un blanc jaunâtre.

Brésil. — Décrit sur un très-bel individu mâle unique que nous devons à la munificence de M. Emile Deyrolle.

## 3. A. JATROPHÆ.

Sphinæ idem, Fab. Ent. Syst. III, p. 1, pag. 162, 22. Sphinæ Medor, Cram. 394, A. Sphinæ Antœus, Drury, Ins. II, pl. 25, f. 1. Variété Sphinæ Hydaspes, Cr. 118, A.

Un peu moins grand que le Cluentius, il a de 12 à 15 centimètres d'envergure. Le fond des ailes supérieures est d'un brunclair tirant sur le roussatre, avec des lignes noires, transvarsales, doubles, ondulées, un peu irrégulières; vers la cellule discoldale, il y a un point blanchâtre réniforme.

Les ailes inférieures ont la base largement d'un jaune orangé; leur milieu est marqué d'une grande tache transparente, divisée par des nervures noirâtres; l'extrémité est bordée de noir. Les échangrures de toutes les ailes sont blanchâtres.

Le corselet et la tête sont bruns avec les ptérigodes bordées de noir. L'abdomen est également brun, marqué sur chaque côté de trois grosses taches jaunes arrondies, bordées du côté du dos par une raie noire un peu ondulée qui se prolonge jusqu'à l'extrémité anale. Les antennes sont très-longues et de couleur brune.

Le dessous de l'abdomen est d'un blanc jaunâtre, ainsi que les palpes et le milieu de la poitrine.

Le dessous des ailes inférieures est à peu près semblable au dessus; celui des supérieures est brun avec une bande médiane, longitudinale, orangée.

Cramer figure, pl. 118, sous le nom d'Hydaspes, une variété que nous n'avons jamais vue. Elle diffère du type ordinaire, en ce que les trois taches latérales jaunes sont suivies de trois taches blanches de même grandeur et de même forme.

On rencontre quelquefois des individus dont la base et l'ex-

trimité des ailes supérieures sont plus ou moins panachés de blane, aussi bien chez les mâles que chez les femeiles.

La chenille, dont Merian a donné une figure assez grossière, vit sur les Jatropha. Elle est d'un vert clair avec sept bandes chiques noirâtres; la corne du onzième anneau est arquée et rabeteuse. La chrysalide est d'un brun marron avec la gaine de la trompe détachée en forme d'anse.

Ce Sphingide habite une grande partie de l'Amérique méridionale et les Antilles.

Coll. Bd.

#### 4. A. GODARTII. Boisd.

Il est de la taille des individus moyens de jatrophæ; et il est intermédiaire entre cette espèce et le Duponchelii.

Ses ailes supérieures sont d'un gris obscur, saupoudrées d'atomes verdâtres bien indiqués; elles sont marquées d'un stigmate très-blanc et de raics obliques noirâtres, partant de la côte, me dépassant guère la nervure médiane; elles offrent, en outre, avant le bord terminal, une raie transversale noirâtre, sinuée, doublée en dedans d'une raie blanchâtre, un peu obsolète, de même forme, et au sommet, un trait noir irrégulier, bifide du côté de la frange.

Les ailes inférieures sont noires avec une tache basilaire jaune, et un espace diaphane, comme chez les espèces du même groupe. La tête et le corselet sont fortement saupoudrés de verdâtre comme les ailes supérieures : sur chaque épaulette, il y a une raie noire. L'abdomen est lavé de verdâtre en dessus avec trois taches latérales orangées, encadrées de noir. Le dessous du corps est blanc comme dans le Duponchelii.

Il se trouve à Minas Geraes, au Brésil.

Nous avons dédié cette espèce à feu Godart, le savant auteur de l'article Papillon dans l'Encyclopédie et de l'Histoire des Papillons de France continuée par Duponchel.

#### 5. A. Duponchelii.

Poey, Centurie de l'île de Cuba.

Il est à peine de la taille d'un exemplaire moyen de notre consoiruli. Ses ailes sont un peu dentelées et liserées de blanchâtre dans les échancrures. Les supérieures sont d'un gris brunâtre

Lépidoptères. Tome I.

fortement lavées de vert; elles sont traversées par des raies noirâtres, ondulées; elles ont en outre un petit stigmate blanc, ponctiforme, surmonté vers la côte d'un point semblable.

Les ailes inférieures sont noires avec une tache basilaire bifide, d'un jaune orangé, puis ensuite elles offrent une tache transparente, transversale, coupée en cinq par des nervures de la couleur du fond.

Le corselet, la tête et le dessus de l'abdomen sont fortement lavés de vert. Ce dernier est marqué de chaque côté de trois taches d'un jaune orangé encadrées de noir. Le dessous de l'abdomen, la poitrine et les palpes sont blancs.

Il se trouve dans l'île de Cuba.

Coll. Bd.

#### 6. A. MORGANII. Boisd.

Walker, Heterocera, p. 206, 12.

Il est au moins de la taille du jatrophæ. Ses ailes sont dentelées avec les échancrures liserées de blanchâtre. Les supérieures sont d'un gris jaunâtre, lavées d'un peu de verdâtre, principalement dans leur tiers basilaire; elles sont marquées, au-delà du milieu, d'une raie transversale double, noire, ondulée, coupée par des traits longitudinaux de la même couleur, et d'un point discoïdal blanchâtre; elles ont en outre, sur la côte, deux raies courtes, réunies inférieurement, et vers le bout, des traits irréguliers également noirs.

Les ailes inférieures sont noires, avec une tache basilaire bifide d'un jaune orangé, puis elles offrent ensuite une tache transversale, transparente, coupée en quatre par des nervures noires; le hord marginal est un peu roussâtre.

Le corselet est de la couleur des premières ailes, lavé d'un peu de vert, avec les ptérigodes bordées de noir sur leur côté inférieur. L'abdomen est d'un gris-roux, marqué de chaque côté de cinq taches jaunes arrondies encadrées de noir. La tête est de la couleur du corselet avec les antennes longues et grêles. Le dessous de l'abdomen est blanc, ainsi que la poitrine et les palpes.

Le dessous des quatre ailes est rayonné de jaune orangé à la base.

Décrit sur un très-bel individu femelle élevé de chenilles à Sierra Leone, que nous devons à l'obligeance de feu notre ami Edward Doubleday. Nous possédons aussi les débris d'un mâle que Feisthamel avait sep de la Cazamance.

Nous avons dédié ce bel Amphonix au Rév. D. F. Morgan, qui ca a fait la découverte à Sierra Leone.

#### 7. A. WALKERI, Boisd.

Il est de la taille du *Cluentius*. Ses ailes supérieures sont d'un gris verdâtre pâle avec des raies sinueuses, irrégulières, noirâtres, dont les deux principales se courbent pour se diriger longitudinalement du côté du bord extérieur.

Les ailes inférieures sont noires, avec une tache un peu triangulaire, d'un jaune d'ocre, placée près de la base, et suivie sur le milieu de l'aile d'une raie tranverse obsolète d'un jaune ochracé, surmontée vers l'angle anal d'une tache jaune; la gouttière abdominale est d'un jaune d'ocre; outre cela, on voit sur le bord marginal, du côté de l'angle interne, deux ou trois taches formées d'atomes grisatrés.

Le corselet est de la couleur des ailes, encadré de noir sur les côtés et en arrière.

L'abdomen est heunatre en dessus avec quatre raies dorsales d'un jaune d'ocre interrompues aux articulations; il offre en cutre, de chaque côté, une bande maculaire d'un jaune d'ocre formée de taches oblongues. Le ventre et la poitrine sont jau-

Le dessous des ailes est brun; celui des supérieures est marqué près de la base d'une bandelette ochracée; celui des inférieures est rayonné de la même couleur avec la bande transversale plus promocée que sur la face opposée.

Décrit sur un très-bel individu mâle pris sur les bords de l'Oyapeck, dans la Guyane française.

Nous avons dédié cette nouvelle espèce à M. Francis Walker, auteur de nombreux travaux entomologiques.

Nota. Cet Amphonyx est le seul, jusqu'à présent, qui ait des tactes latérales oblongues, disposées en forme de bande interrempue, au lieu d'avoir des taches jaunes arrondies.

GENRE EURYGLOTTIS. Boisd. — Macrosila. Herrich-Schæff. — Walker, — Boisd. olim.

Chenille: Inconnue.

Insecte parfait: Antennes longues, terminées en crochet. Trompe plus longue que le corps. Palpes rapprochés, hérissés de poils raides, très-saillants. Yeux de grandeur moyenne. Corselet robuste, hérissé de poils roides formant une sorte de crinière. Abdomen cylindrico-conique, marqué de taches latérales jaunes ou blanches. Pattes terminées par une griffe assez prononcée.

Le seul Sphingide appartenant à ce genre habite la Nouvelle-Grenade.

E. APER. Boisd.

Boisd. in Herrich-Schæffer, 477. — M. Aper, Walker, Heterocera, p. 304, 10.

Il est de près d'un tiers plus grand que le rustica. Ses ailes sont dentelées avec les échancrures blanches; les supérieures sont d'un brun-noir, très-faiblement sablé d'un peu de jaunâtre; elles ont un stigmate blanc assez grand, bien marqué, encadré de noir, et quelques raies noires transversales, peu visibles, fondues avec la teinte générale; elles ont en outre vers la base une ligne blanchâtre obsolète, et au-delà du milieu, une double raie transversale, arquée, de la même couleur. Dans la plupart de individus, il existe entre la ligne blanchâtre de la base et la raie double dont il vient d'être question, un long trait oblique gri sâtre; sur le bord terminal, on voit une belle raie fulgurale blanche, formée par une suite de V, dont la pointe est tourné en dehors, et tout à fait au sommet, une raie oblique, un pe tortueuse du même blanc.

Les ailes inférieures sont noires avec la base, la gouttière al dominale et une bande transversale d'un blanc grisâtre, décuirente vers l'angle anal.

Le corselet et la tête sont brunatres, hérissés de poils raid et mélangés de quelques poils fauves. Les antennes sont brun et les palpes roux.

L'abdomen est noir avec cinq taches d'un jaune orange :

ées est marqué dans les incisions de deux points blancs disposés par paires. Le dessous du corps est brun avec la base garnie de polis roussâtres et une série latérale de taches blanches.

Le dessous des ailes est noirâtre avec des bandes transversales plus obscures.

Ce beau Sphinx a été élevé de chenille aux environs de Bogota, par Lebas, sur une plante dont il ne nous a pas fait connaître le nom.

lest toujours rare dans les collections. Coll. Bd.

Nous possédons un individu mâle chez lequel les taches sangus sont remplacées par des taches blanches.

Nous avons prêté ce Sphinx à M. Herrich-Schæsser pour son bel ouvrage sur les papillous exotiques; la figure qu'il en a dousée ne laisse rien à désirer. Il est regrettable qu'une aussi bele iconographie soit encore si peu connue des entomologistes.

# GENRE SPHINX. - Sphinx auctorum.

Chevilles: Cylindroïdes, peu atténuées antérieurement, de couleur verte ou quelquesois brunâtre, à tête arrondie, marquées ordinairement de bandes latérales obliques, et munies généralement d'une corne sur le onzième segment, carant quelquesois en outre, mais très-rarement, une petite crète épineuse sur les premiers anneaux.

Chrysalide: Cylindrico-conique, de couleur obscure, terminée par une pointe plus ou moins rugueuse.

lascite parfait: Antennes fortes dans les mâles, plus faibles chez les femelles, terminées par un crochet assez petit. Palpes velus, écailleux, appliqués sur le front. Trompe au moins aussi longue que le corps. Yeux gros. Corselet trèsrobuste. Abdomen conique, presque toujours fascié transversalement ou marqué de taches latérales jaunes.

Les Sphinx proprement dits sont répandus sur les deux continents. Leurs chenilles vivent sur les arbres ou sur les plantes basses.

#### PREMIER GROUPE.

Abdomen marqué de taches latérales jaunes.

#### 1. S. CAROLINA.

Linné, — Fabricius, — Drury, Ins. I, pl. 25, fig. 1. — Smithabot, Lepidopterous ins. of Georgia, I, pl. XXXIII, etc.

Ce Sphinx américain est très-commun, il s'étend du midi des Etats-Unis jusqu'au Brésil; mais il existe un certain nombre d'espèces voisines avec lesquelles il est facile de le confondre au premier coup-d'œil.

Le Sphinx Carolina a le port et la taille de notre convolvali; ses ailes sont très-légèrement dentelées avec les échancrures blanches; le fond des supérieures est d'un brun plus ou moins clair, quelquefois varié de roussâtre; elles ont un petit point discoïdal grisâtre, cerclé de noir; elles sont traversées par des lignes doubles, ondulées, noirâtres, séparées l'une de l'autre par un peu de blanchâtre; celle de ces lignes qui est la plus rapprochée de l'extrémité est en feston, toujours assez bien indiquée, et elle s'anastomose vers le sommet avec un trait tortueux de la même couleur qui part de la pointe apicale.

Les ailes inférieures sont d'un blanc grisâtre dans leur tiers antérieur avec une bande noire un peu arquée; elles ont ensuite une bande médiane noire divisée longitudinalement par une petite raie obsolète grisâtre; puis vient une bande étroite blanchâtre; l'extrémité est assez largement noirâtre, souvent un peu saupoudrée de gris.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures avec une tache latérale blanchâtre qui s'étale à la base de ces mêmes ailes.

L'abdomen est d'un gris brunatre avec six taches latérales, arrondies, d'un jaune orangé, encadrées de noir, dont la dernière est beaucoup plus petite que les autres; la première de ces taches est précédée, comme dans les espèces du même groupe, d'une touffe de poils qui forment une tache d'un noir profond; outre cela, il y a sur le dos, dans les articulations, deux points blancs et un trait de la même couleur dans les incisions latérales.

Le dessous des ailes est grisâtre, plus ou moins blanchâtre sur les inférieures, avec deux raies noires, communes, parallèles, dentées en scie.

La chenille, qui est une véritable calamité dans les plantations de tabac, vit non-seulement sur cette plante, mais encore sur toutes les espèces de Capsicum. D'après les dessins que nous avons reçus d'Abbot, elle est d'un beau vert avec sept bandes obliques blanthes, bordées en dessus d'une série de petits points d'un vertmir; la corne du onzième anneau est rose ou un peu violette; le sigmates sont noirs cerclés de blanc. La chrysalide est d'un lem marron avec la gaine de la trompe détachée en forme fanse.

L'insecte parfait paraît presque sans interruption pendant toste l'année dans les régions équinoxiales.

Il habite aussi les Antilles. Nous ne l'avons jamais reçu de la Guyane.

La figure donnée par Drury est grossière et assez mauvaise; il n'a pas indiqué la sixième petite tache jaune de l'extrémité de l'abdomen.

Nous croyons que c'est à tort qu'on a rapporté au Carolina le Sphinx figuré grossièrement par mademoiselle de Merian, pl. 57 de son ouvrage sur les insectes de Surinam.

Hubuer place ce Sphinx dans son genre Manduca.

## 2. S. LYCOPERSICI. Boisd.

Ce Sphinx pourrait bien être une modification très-accentuée du Carolina auquel il ressemble par l'abdomen; mais par ses ales supérieures, il est très-différent de cette espèce; elles sont d'un gris noirâtre, plus panachées et plus marbrées de blanchâtre que dans le mâle de notre convolvuli. Elles ont sur un espace d'un gris blanchâtre, un stigmate bien marqué d'un blanc pur, et près du bord terminal, une raie sinueuse blanchâtre que l'on au voit pas dans le Carolina.

Les ailes inférieures sont d'un gris blanchâtre, traversées par deux bandes noires qui se réunissent à l'angle anal; la seconde de ces bandes est plus étroite que dans le Carolina, jamais divisée par une raie blanchâtre; l'extrémité marginale est grisâtre, bordée en avant par une raie étroite, ondulée, noirâtre, et divisée dans son milieu par une raie obsolète de la même couleur.

Le corselet est de la couleur des premières ailes, avec une tache médiane blanchâtre en V renversé. L'abdomen est marqué à sa bas- de deux grosses taches noires, comme chez les espèces du même groupe. Pour le reste, il ressemble à peu près à celui du Carolina.

Le dessous des ailes est d'un gris blanchâtre, traversé sur les supérieures par trois raies noires, parallèles, bien marquées et dentées en scie; la bande qui traverse les inférieures est à peu près comme dans les espèces voisines.

La chenille, selon M. Lorquin, vit en Californie, sur la tomate, Lycopersicum esculentum, les Capsicum et sur la pomme de terre. Elle est verte avec sept bandes obliques d'un vert noirâtre et une corne arquée noirâtre.

Décrit sur 20 individus des deux sexes élevés de la chenille.

# 3. S. Paphus.

Cram. 216, B. - Walker, Heterocera, 221, 15.

Il a le port et la taille du Carolina. Le fond de ses ailes supérieures est beaucoup plus noirâtre, avec les raies transversales plus pâles, d'un gris un peu bleuâtre; le point discoïdal est d'un gris bleuâtre un peu cerclé de noir. Les deux raies les plus rapprochées de l'extrémité sont formées de croissants dont la convexité pour la pénultième est tournée en dedans, et en dehors pour la dernière.

Les ailes inférieures sont à peu près comme dans le Carolina, sauf que sur la partie blanchâtre de la base, elles ont deux bandes noires au lieu d'une seule.

Le corselet est d'un brun obscur.

L'abdomen est obscur avec une rangée latérale de six taches égales, d'un jaune orangé, séparées, dans les incisions, par du noir bleuâtre; sur le milieu du dos il y a en outre, dans chaque articulation, deux points d'un cendré bleuâtre.

Le dessous des ailes est d'un blanc sale, avec une double raie noirêtre, commune, dentée en scie.

Il se trouve à la Guyane. Nous en avons reçu un exemplaire de Cayenne, élevé de chenille par M. Année, sur le piment, Capsicum annuum.

Beaucoup moins répandu que la Carolina. — Coll. Bd.

## 4. S. CESTRI. Boisd.

Sphinx idem, Blanchard in Gay, Historia fisica de Chili, Zool.

Il est plus petit que le Carolina. Ses ailes n'offrent pas la moindre dentelure. Les supérieures sont d'un gris-roussâtre pâle.

es platôt d'un gris terreux avec un stigmate blanc cerclé de brun; sites sont traversées par des raies noirâtres, ondulées, géminées, les unes vers la base et les autres au-delà du stigmate; avant le bed terminal, il y a une ligne noirâtre en feston qui s'anastomes avec un trait apical tortueux de la même couleur.

les ailes inférieures sont noirâtres, avec deux bandes transversiles d'un blanc un peu sale et une petite tache basilaire de la même couleur.

Le corsolet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est aussi à peu près de la même couleur, marqué, sur chaque côté, de cinq taches d'un orangé pâle, dont la dersière est très-petite. Le dos n'offre pas de points blanchâtres géminés.

Le dessous des ailes est d'un gris uniforme, ainsi que le veutre; les inférieures sont traversées par deux bandes d'un blanc un peu sale, dont l'antérieure est beaucoup moins marquée.

M. Isabelle, du Hâvre, a élevé la chenille au Paraguay sur une salanée appelée Gestrum parqui.

Co même Sphinx habite aussi le Chili.

Coll. Bd.

Nous avons prêté cette espèce, en 1851, à M. Emile Blanchard, pour compléter l'ouvrage qu'il a publié avec M. Gay sur les insectes du Chili.

## 5. S. PETUNIÆ. Boisd.

Il a le port et la taille du Carolina, avec les ailes dentelées, bordées de blanc dans les échancrures. Les supérieures sont d'un gris brunâtre, avec un stigmate blanc bien indiqué, cerclé de soir, émettant un petit trait oblique noirâtre dirigé vers la côte; elles sont traversées par des raies d'un brun noirâtre, ondulées et géminées; mais ce qui caractérise surtout cette espèce, c'est que les deux raies doubles placées en dehors du stigmate, au lieu d'être arquées comme dans la plupart des espèces voisines, descendent obliquement du hord costal pour former une sorte d'angle aigu, avant d'atteindre le bord interne; avant l'extrémité, il y a deux lignes ondulées renfermant dans leurs intervalles quelques traits blanchâtres un peu sagittés.

Les ailes inférieures sont noires avec deux bandes blanches,

dont une vers la base et l'autre au-delà du milieu; l'extrémité est un peu sablée de jaunâtre.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est d'un gris roussatre en dessus, marqué de chaque côté de cinq taches orangées encadrées de noir; le dos n'offre pas de points géminés.

Le dessous des ailes est grisâtre avec deux raies noirâtres, géminées, dentées en seie.

Beske a élevé très-communément cette espèce au Brésil sur le tabac et sur les piments, *Capsicum*, qu'elle dévore dans les cultures. C'est, d'après cet observateur, un fléau pour les jardins.

Nous avons requ de Buenos-Ayres des exemplaires un peu plus petits, mais dont les caractères sont les mêmes.

Coll. Bd.

#### 6. S. Lucrtius.

Cram. 301, B. — Walker, Heterocera, p. 221, 14.

Il a le port et la taille de notre convolvuli. Ses ailes ont la frange noire, entrecoupée de blanc; les supérieures sont d'un brun-noir avec le bord interne largement lavé de roussâtre; le stigmate est blanc, et le milieu de l'aile où il est placé, offre un espace un peu luisant, d'une teinte plus foncée que le reste de la surface; elles sont traversées par des lignes noires, doubles, ondulées, dont les deux qui limitent en dehors, l'espace en question, sont dentées en scie; outre cela, il y a, avant le bord terminal, une ligne noire en zigzag qui vient envelopper vers l'angle anal une éclaircie d'un blanc grisâtre.

Les ailes inférieures sont noires, avec trois taches basilaires et une bande transversale blanche.

Le corselet est brun avec les côtés gris. La tête est également grise avec les antennes brunes.

L'abdomen est brun mélangé de quelques poils jaunâtres, avec six taches latérales d'un jaune orangé, encadrées de noir en dessous et dans les incisions; on voit aussi sur le dos la trace d'une petite ligne longitudinale noirâtre; la première tache orangée est précédée d'une tache blanche à la base du corselet.

Le dessous des ailes est d'un gris obseur, avec une double raie noirâtre dentée en soie.

La chenille que Beske trouvait assez communément sur les piments, Capsicum, est verte, avec sept bandes obliques, blanches, tont la première est peu indiquée; sa corne est arquée de couleur rougeatre; les stigmates sont noirs cerclés de jaune.

La chrysalide est d'un brun marron, avec la gaine de la trompe tétachée en forme d'anse.

Bresil, Cayenne. — Coll. Bd.

Nous sommes presque certains que la chenille dont Mérian a écuné une figure grossière, pl. 57, et qu'elle représente sur une branche de Capsicum, appartient à cette espèce, et non au Carolina, comme l'ont cru certains auteurs.

# 7. S. NICOTIANÆ. Boisd.

Il est de la taille des plus grands individus de l'A. jatrophæ. Ses alles sont un peu dentelées, avec les échancrures blanchâtres. Les supérieures sont d'un brun-clair un peu grisâtre, varié de blanchâtre, avec la base et le stigmate blancs; elles sont travenées par des lignes doubles, noirâtres, ondulées, ou dentées en scie, dont les deux qui précèdent le stigmate se dilatent vers la côte, pour former une sorte de nodus; les deux qui suivent ce même stigmate sont dentées en scie, et le côté externe de la dernière s'appuie sur quelques traits sagittés blancs, plus ou moins accusés; avant le bord terminal, il y a une ligne noire en feston, s'anastomosant avec le trait tortueux du sommet; avant la frange, on voit en outre une ligne blanche ondulée.

Les ailes inférieures sont noires avec une tache basilaire et trois bandes transversales d'un blanc sale, dont la postérieure est très-obsolète.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est d'un brun roussâtre, avec six taches latérales d'un jaune orangé, encadrées de noir. Il y a sur le dos une petite ligne longitudinale noire.

Le dessous des ailes est grisâtre avec trois bandes communes, soirâtres. Nous avons acquis ce Sphinx de feu Becker qui nous a dit l'avoir reçu de la Colombie.

Call, Bd.

C'est par analogie que nous lui avons donné le nom de Nicotiener, car nous ne savons pas sur quelle plante vit sa chenille.

#### 8. S. QUINQUEMACULATA.

Haworth, L. B. 59. — Stephens, H. I. 119. — Sphinx Carolina, Don. B. I. XI, t. 361. — Sphinx Celeus, Hubn. Exot. Saml. — Great tobacco Sphinx, Abbot in litteris.

Il est un peu plus grand que le Carolina; ses ailes ont la frange entrecoupée de gris et de blanchâtre; les supérieures sont d'un gris cendré avec des traits longitudinaux et une ombre transversale de couleur brune; il y a vers le bord terminal une ligne noire bien marquée, un peu sinueuse, précédée d'une autre petite ligne interrompue de la même couleur, et suivie près de la frange, d'une raie blanchâtre; sur le bord interne, on voit, en outre, le commencement de raies brunes, transversales, rapprochées, mais qui ne remontent pas plus haut que le tiers de l'aile.

Les ailes inférieures sont d'un blanc sale avec l'extrémité grise; elles ont cinq bandes noires, savoir : deux très-courtes vers la base, deux au milieu fortement dentées en scie et la cinquième qui est plus large et régulière, entre le milieu et l'extrémité.

Le corselet est gris avec deux lignes noires transversales sur le collier; les ptérigodes sont également bordées de noir des deux côtés.

L'abdomen est grisâtre sur le dos avec une ligne dorsale brune; les côtés sont marqués de cinq taches d'un jaune orangé, cerclées de noir profond; au point de son insertion avec le corselet, il y a deux taches très-noires, suivies de touffes de poils blancs qui cachent un peu la première tache orangée; on voit encore audessous de la rangée des taches orangées, dans les incisions une série de taches blanches.

Le dessous des quatre ailes est gris avec deux bandes noires, communes, dentées en scie.

La chenille, d'après un beau dessin d'Abbot que nous a envoyé notre regretté collaborateur M. John Leconte, est verte avec une bande blanche longitudinale le long des pattes et sopt traits obliques de la même couleur, Lordés de vert foncé; son premier anneau est marqué d'une tache transversale roussâtre; la corne de l'extrémité est droite, un peu violâtre, non arquée comme chez le Carolina; les stigmates sont noirs, cerclés de jaune.

La chrysalide a la gaine de la trompe détachée comme dans les espèces du même groupe. SPHINX. 77

Il habite plusieurs contrées des Etats-Unis, mais il ne se trouve pas ailleurs.

Coll. Bd.

Ce Sphinx a été compris par Haworth et Stephens, dans leur Catalogue, comme se trouvant en Angleterre. Ces deux auteurs ent été trompés sur son origine, aussi bien que sur celle du Cinquists; car il est bien positif que ces deux Sphinx n'ont jamais vécu sur l'ancien continent.

Hubner, dont les soi-disant genres ne sont pas nés viables, place cette espèce dans le genre Phlegetonius!!!

## 9. S. AFFLICTA.

Grote, Proced. of Ent. sociel. of Philad. vol. V, no 1, p. 71.

Il est de la taille du Lucetius, dont il a le port; ses ailes sont faiblement dentelées; les supérieures sont d'un gris jaunâtre légèrement lavé de verdâtre; elles sont traversées par des lignes noires, parallèles, régulièrement dentées en scie; le stigmate est blanc, faiblement cerclé de noir.

Les ailes inférieures sont noires, traversées par deux bandes blanchâtres, sinuées, dont l'antérieure est un peu interrompue dans son milieu; leur extrémité est d'un gris jaunâtre de la même teinte que les ailes supérieures.

Le corselet est de la couleur des premières ailes, marqué en arrière de deux taches noires comme dans les espèces du même groupe.

L'abdomen est jaune sur le dos avec les incisions entrecoupies de blanc; les côtés sont marqués de cinq taches jaunes entadrées de noir.

Le dessous des ailes est d'un gris brunâtre, beaucoup plus clair sur les ailes inférieures, traversé par trois bandes noirâtres. Le ventre est un peu bianchâtre.

Il se trouve à Cuba et à Haîti.

Il est probable que l'individu qui a servi à M. Grote pour sa description, était un peu décoloré, sans cela, il ne l'aurait pas considéré comme pouvant être une variété du *Pamphilius* de Cramer.

## 10. S. TABACI. Boisd.

Il est de la taille du Lucetius de Cramer. Ses ailes sont d'un joli gris cendré avec la frange entrecoupée de blanc; les supérieures ont un stigmate blanc cerclé de noir, et sont traversées par des lignes noires, géminées, dentées un peu en scie; avant l'extrémité, il y a une autre ligne noire en zigzag, un peu interrompue avant d'arriver au sommet.

Les ailes inférieures sont d'un blanc sale avec l'extrémité cendrée; elles sont traversées par quatre bandes noires dont deux vers la base, une plus large vers le milieu et la quatrième entre celle-ci et le bord terminal.

Le corselet est d'un gris cendré, un peu hérissé.

L'abdomen est grisatre sur le dos avec deux taches noires à son point d'insertion au corselet et une rangée latérale de six taches d'un jaune orangé encadrées de noir; la première de ces taches est un peu cachée par des poils blancs.

Le dessous des ailes est d'un gris blanchâtre, principalement sur les inférieures qui sont traversées par une bande noire fortement dentée en scie.

Chili, Paraguay. — Coll. Bd.

Nous ne savons pas si c'est cette espèce ou bien le nicotianæ qui, au Paraguay, dévore les plantations de tabac.

## 11. S. HANNIBAL.

Cram. 216, A. — Walker, Heterocera, p. 220, 13.

Il est à peu près de la taille de notre ligustri. Ses ailes supérieures sont d'un gris-jaunâtre pâle, avec un petit point discoïdal blanc, cerclé de noir; entre ce point et la base, il y a trois petites raies noires, transversales, sinuées, surtout inférieurement, et très-rapprochées les unes des autres; sur le tiers postérieur, il y a une large bande brune, qui se réunit par en bas, à une bande longitudinale de la même couleur, mais qui ne touche pas le bord interne; cette même bande est limitée en haut et en dehors par une double ligne noirâtre, sinuée, arrivant jusqu'au bord interne; le sommet de l'aile offre une ligne noire tortueuse, et le bord marginal une bande presque régulière d'un blanc grisatre.

Les ailes inférieures sont noires avec trois taches basilaires et une bande longitudinale d'un blanc grisâtre.

Le corselet est brun avec la tête et une partie des ptérigodes de la couleur du fond des premières ailes, bordées inférieurement de grisâtre pâle. Les antennes sont d'un brun clair.

L'abdomen est d'un gris brunâtre sur le dos avec une petite interdes d'un jaune orangé encadrées de noir, dont la première es précédée à la base du corselet, d'une tache très-noire et d'une petite touffe de poils blancs.

Le dessous des ailes est d'un gris brunâtre avec une double nie noirâtre dentée en scie.

Brésil, Cayenne. — Coll. Bd.

Fou Année a élevé à Cayenne ce Sphinx, sur des piments saurages, Capsicuss.

#### 12. S. HAMILGAR. Boisd.

Aussi grand que l'Amphonyx jatrophæ. Ce Sphinx n'est peutire qu'une grande variété locale du Sphinx Hannibal. Il a le zeme port, mais le fond de ses ailes est brun avec le bord interce un peu roussâtre, et la bordure blanche; le point blanc disoidal est semblable; le dessin, quoique plus confus, est à peu près comme chez Hannibal, sauf qu'il n'y a pas, vers le sommet, cette éslaircie pâle, si tranchée dans le premier.

Les ailes inférieures offrent les mêmes taches et la même tande transversale.

Le corselet est brun avec la tête et une partie des ptérigodes : une teinte roussâtre. Les antennes sont blanchâtres.

L'abdomen est d'un gris roussâtre sur le dos, avec une petite une longitudinale noire, et deux points blancs géminés dans les unisions; il est marqué comme chez Hannibal, de six taches can jaune orangé encadrées de noir.

Le dessous des ailes n'offre aucun caractère particulier.

Ce Sphinx a été élevé de chenille par Beske, à la colonie de la Novelle-Fribourg, au Brésil. Il nous a également envoyé Hansial typique.

Coll. Bd.

#### 13. S. PELLENIA.

Boisd. in Herrich-Schæffer, 103.

Il est de la taille d'un grand Carolina, et se rapproche beaucoup pour le dessin d'Hannibal, d'Hamilcar et de Capsici. Ses ailes supérieures sont grisâtres, avec un point blanc, un peu transversal, fortement encadré de noir, constituant le stigmate; entre ce point et la base, il y a deux raies noires, ondulées, doubles, bien marquées vers le bord interne; sur le tiers postérieur de l'aile il y a un large espace transversal brun, sinué en dedans, trèsdroit en dehors dans sa moitié supérieure, puis se dilatant vers l'angle interne en s'avançant presque jusqu'à l'extrémité; le sommet, dont le fond est d'un gris pâle, est strié longitudinalement de noir; il y a en outre, le long du bord terminal, une ligne blanche très-sinueuse qui limite une tache blanchâtre oblongue, située sur l'angle anal.

Les ailes inférieures sont noirâtres avec trois taches basilaires et une bande transversale d'un gris blanchâtre.

Le corselet est brun avec les ptérigodes bordées de blanchâtre inférieurement.

L'abdomen est d'un brun clair sur le dos, avec une ligne dorsale noire; il est marqué de six taches latérales jaunes encadrées de noir, dont la première est précédée vers la base d'une tache très-noire.

Le dessous des ailes est d'un brun grisâtre, avec une double raie noirâtre.

Colombie. — Coll. Bd.

## 14. S. CAPSICI. Boisd.

Il est de la taille du Macrosila Tetrio femelle, et très-voisin du Pellenia. Ses ailes ont la frange entrecoupée de blanc jaunâtre, principalement en dessous; les supérieures sont marquées d'un stigmate assez grand, d'un blanc légèrement roussâtre, cerclé de noir; le fond de la couleur est brun vers le centre, varié de gris roussâtre, dans leur tiers basilaire et vers l'extrémité; elles sont traversées par des raies noires, sinuées, doubles pour la plupart, dont celle qui est en dehors du stigmate est simple, plus large que les autres et très-prononcée; vers l'extrémité il y a une ligne

noire tortueuse, suivie près de la frange de quelques petres aircs

Les ailes inférieures sont noires avec deux bandes transvernies blanchâtres, l'une près de la base et l'autre au-delà du mi-

La tête et le corselet sont bruns, avec les ptérigodes largement tordées de blanchâtre du côté de la base de l'aile.

L'abdomen est noirêtre sur le dos, avec une petite ligne longitudinale noire, et deux points blancs géminés dans les incisions; il est, en outre, marqué sur un fond noir de six taches d'un jaune trange, dont la première est précédée d'une tache très-noire; les incisions latérales sont d'un beau blanc, ainsi que le ventre et la poitrine.

Le dessous des ailes est d'un gris brunâtre sur les supérieures, d'un blane grisâtre sur les inférieures, avec une bande plus obserure, dentée en scie.

Ce bean Sphinz, dent nous possédons deux exemplaires, a étéevé de chenilles par Lebas, aux environs de Bogota, sur le pours long, probablement un Capsicum.

#### 15. S. LEPEBYREI.

Guéria, Magaz. de Zool. — Macrosila Meisa, Walker, Heterocera, f. 305, 11.

Il est à peine de la taille de notre convolvuli. Ses ailes supéreures sout d'un cendré blanchâtre, avec une bande oblique rane, allant du miliou de la côte au tiers inférieur du bord tormal. Cette bande est marquée d'un petit stigmate blanc, et roit perpendiculairement une raie courte, double, de la même aleur qui part de la côte; entre la bande oblique et la base c voit la trace de raies poirâtres doubles; l'angle interne, plus anchâtre que la teinte générale, offre dans sou centre une petite tache noirâtre; au sommet, il y a en outre une petite ligne are tortueuse.

Les ailes inférieures sont noires, avec un espace cendré vers lesgle anal:

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, avec les ; rigodes bordées de noir dans leur partie inférieure.

L'abdomen est gris, avec trois taches latérales d'un jaune d'oure relées de noir.

Le desspus des alles est d'un brun reussatre, avec des bandes transversales un peu plus obscures.

Un regoit ce Sphinz, de temps en temps, du Brésil. Beske l'élevait de chenilles aux environs de la colonie de la Nouvelle-Fribourg. L'exemplaire qui a servi à M. Guérin, pour sa description, vanait de la Rollvie.

Coll. Bd.

# 16. S. OCHUS.

Klug, Neue Schmett. pl. III, fig. 2. — Boisd. Consid. sur les Lép. du Guatemal. p. 74.

Cotte espèce est la plus facile à distinguer de toutes celles qui cut des taches latérales jaunes. Ses ailes ont la frange entrecoupée de noir et de jaunêtre; les supérisures, d'une coulour noisette, effreut, sur le milieu de la côte, une large tache d'un noir husant, laquelle se prolonge, en se rétrécissant fortement, jusqu'à la base où elle se dilate pour arriver presque jusqu'au bord interne; vers le sommet, il y a aussi sur la côte une tache asses grande, égulement d'un noir luisant; il y a encare, vers le bord terminal, deux ou trois petites taches noires.

Les arles inférieures sont noires, avec des handes d'un blanc reussdire.

Le avreille est roux, avec la tête moire.

Labdomen est greatre sur le dos, avec deux points hancs dans chaque meneron; chaquen des crites est en cuive marqué de quatre thobse d'un paure orange encadrese de mair.

Le descous des mies est d'un gru branders, plus blanchâtre sur des monganes poss deux bandes brances.

Social ette, itt stofe-frei austimbritta dan ange man solie ge Mezi-

M. in C Over a succe vega vette espèce de Manthums, mais dans un con colombiquement de la colombique de la c

# C. S. Bustica.

. There is  $\Psi(t,k)=SU(m)$  ,  $SU(t)\geq -2mt$  . Set  $SU(t)\geq 300$  ,  $SU(t)\geq 1$ 

Annual manual milenature after a marger of the total

I see I'm has not present the extre assessment. See also not being surrectionally in black of the consequences, then



#### SPHINX.

M'un brun noir et tantôt d'un brun roussâtre; elle gros sigmate blanc, et des raies transversales, ondulées tes en scie, d'un blanc assez pur, liserées de noir; prè base il y a quelques traits confus blancs, un peu plus double raie blanche, suivie d'une raie noire, ondulée; d'us trouve le stigmate, forme un large espace d'un i cad'un brun roux, marqué en dehors d'une raie noirâtre pas viennent ensuite, sur le tiers terminal, des raies et des lignes noires, ondulées.

Les ailes inférieures sont noires avec une tache be teur bandes interrompues de couleur blanche, plus ben indiquées.

Le corselet et la tête sont de la couleur des prer svec les épaulettes et la partie postérieure panachée sur le front, entre les antennes, il y a aussi un diadéi

L'abdomen est d'un brun roussatre ou d'un brun n de chaque côté, de trois taches d'un jaune orange e soir; sur le dos il existe une ligne noire interror points blancs dans les incisions.

En dessous le ventre est blanc ainsi que les palper La chemille de ce grand Sphinx vit sur plusieur de la famille des jasmiuées, principalement sur les de la trouve également sur des arbustes de la n art duits de l'ancien continent, tels que les troën Ele est verte avec le dos jaunâtre, marqué de tra sur ces côtes il y a sept bandes obliques, violette banc en dessous; ses stigmates sont blanchâtres cer la cerne de l'extrémité est jaunâtre, arquée et gra

La chrysalide est d'un brun marron avec la gaine étachée en forme d'anse.

L'insecte parfait se trouve depuis la Géorgie d'

C.il. Bd.

tion de cette chenille, qui se rapporte évidemment au Macrosila Tetrio.

Hubner, dans son Catalogue des Lépidoptères connus, place le rustica de Cramer, dans son genre (Coitus) Cocytius et le chionanthi de Smith-Abbot, qui est identiquement la même espèce avec l'atropos!

18. S. ALBIPLAGA.

Walker, Heterocera, p. 20, 2, 7. — Sph. valida, Boisd. M.

Il a le port du rustica, mais il est au moins de la taille de la femelle du Macrosila Tetrio. Ses ailes supérieures sont brunes avec deux grandes taches blanches, l'une entre la base et le stigmate, et l'autre vers le sommet; le stigmate est blanc, bien marqué, surmonté d'une tache costale de la même couleur; sur la partie brune il y a des lignes transversales ondulées noirâtres; la base est entièrement brune; sur la grande tache blanche, extra-basilaire, il y a aussi quelques traits noirs; la grande tache apicale est coupée par une raie noire fulgurale, et par quelques lignes très-obsolètes, d'un gris brunâtre; la frange est un peu entrecoupée de blanchâtre, mais beaucoup moins que dans le rustics.

Les ailes inférieures sont d'un brun noir, avec une bande transversale blanche, étroite, s'éteignant avant d'arriver à l'angle externe; cette bande est précédée en avant de deux lignes noires surmontées d'une tache blanche, située un peu au-dessus de l'angle anal.

Le corselet est brun avec tout le dessus de la tête bianc. L'abdomen est brun avec la base largement blanche; il est marqué latéralement de trois taches d'un jaune pâle, cerclées de noirâtre, et en outre, sur le dos, de deux petits traits blancs dans chaque articulation, comme chez le rustica.

Le dessous des ailes est brun avec deux raies brunâtres qui ne ressemblent nultement par la forme et par leur direction à celles beaucoup plus marquées que l'on observe dans le sistica. Le wentre est blanc. Les autranes sont roussatres.

Ce grand Sphinx habite le Brésil.

Coll. Rd.

#### SPHINX.

#### 19. S. SOLANI. Boisd

Bond. Faune de Madag. pl. 11, fig. 2. — Herrich-Schmffe Marssila solani, Walker, Heterocera, p. 206, 13.

Il est un peu plus grand que notre convolvuli. Ses la frange entrecoupée de blanc; les supérieures son avec un petit stigmate blanc et des raies noirâtres trans cadulées; l'extrémité est assez largement blanche, ou d' rousêtre avec tout le sommet brunâtre; cette partie qui souvent est interrompue vers le milieu du bord ter parcourue par des petites lignes noirâtres en zigzag.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocre, traversée par une bande noirâtre qui forme un sinus près de l'a bordure de l'extrémité est également noirâtre; et et la bande transverse il existe ordinairement une ra Dans certaines variétés de Natal, les ailes inférieure brun noir, avec la base de la gouttière abdominale et merrompue d'un jaune d'ocre, suivie un peu au-delà ine raie transversale de la même couleur, tantôt autét plus ou moins obsolète.

Le corselet est d'un gris brunâtre ou d'un brun Frisente en arrière des faisceaux de poils noirs.

L'abdomen est roussâtre sur le dos avec une ra de trois ou quatre taches d'un jaune orange, encade dessous du corps est blanc.

Le dessous des ailes est tantôt d'un gris foncé et ta wec la base lavée de jaune d'ocre dans les exemple et deux handes transversales noirâtres.

La chenille qui a été découverte par feu Rom mi dans les lles Maurice et Bourbon sur la Bringell Solanum melongena. Elle est grisâtre, tachetée de ble marquée de six raies noires, longitudinales, du malieu se réunissent en V renversé ; les trois pre poit mums d'une crête dorsale formée de poin La come du onzième segment est d'un gris clair come de six lignes. Les pattes écailleuses sont refirent trois anneaux dont l'intermédiaire est det des deux autres noires.

La chrysalide ressemble à celle du convolvu

gaîne de la trompe n'est pas détachée en forme d'anse (Marchal).

Ce Sphinx se trouve à Maurice, à Bourbon, à Madagascar et à Natal.

Coll. Bd.

## 20. S. ASTAROTH. Boisd.

Il a le port et la taille du solani. Ses ailes supérieures sont grisâtres avec des raies transversales, ondulées, d'un brun noirâtre; le stigmate est petit, blanchâtre, un peu ovale, cerclé de noir; entre celui-ci et l'extrémité il y a de gros traits noirs longitudinaux, dont deux, au-dessous de la côte, sont coupés par une raie blanche sinueuse, dont deux autres, au-dessous du sommet, sont suivis, sur l'angle apical, d'une tache blanchâtre sinueuse; outre cela, l'angle interne est marqué de gros traits noirâtres, séparés des deux traits du sommet par une large éclaircie d'un gris blanchâtre, parcourue par une petite ligne obscure, sinueuse.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocre avec une large bordure noire, précédée d'une rais médiane et d'un trait basilaire de la même couleur.

Le corselet est mélangé de grisatre et de brun; le collier est séparé de la tête par une ligne blanchâtre.

L'abdomen est d'un brun pâle avec trois taches latérales jaunes; il offre, en outre, en dessus, à son insertion au corselet, deux touffes de poils noirs, et dans chacune des incisions, deux points blancs.

Le dessous des ailes est d'un brun assez pâle avec le bord abdominal des inférieures presque blanc. Le ventre et les palpes sont blancs.

Décrit sur un individu assez défectueux appartenant à la collection de M. E. Deyrolle, où il est noté comme venant du Brésil. Est-ce bien là sa patrie? Sa grande parenté avec le solans nous inspire quelques doutes à cet égard et nous ne serions pas éloigné de croire qu'il n'en est peut-être qu'une modification.

#### DEUXIÈME GROUPE.

Abdomen annelé alternativement de noir, de blanchâtre ou de rose. Rarement sans bandes latérales.

#### SPHINX.

#### 24. S. MENEPHRON.

Crm. 265, A. — Macrosiia Monophron, Walker, He

Neus n'avons jamais vu ce Sphinx; notre desc se la figure qu'en a donnée Cramer dans sa rema graphia.

I est de la taille du rustica, avec les ailes plu arondies; leur frange est entrecoupée de noir a spérieures sont d'un brun obscur, avec de g lengitudinaux placés sur leur moitié postérieure signate, qui est hlanchâtre et situé lui-même si mir; sur le tiers postérieur de la côte il y a un bianche, bien nette, un peu bilobée, limitée en gros trait noir se dirigeaut vers le sommet; mêmes ailes paraissent très-légèrement sablée blanc et ont, avant le bord terminal, une re compue.

Les ailes inférieures sont entièrement noirâtre Le corselet est de la couleur des premières aile ément de blanc grisâtre.

L'abdomeu est brun avec une raie dorsale noi au grisatres et séparent assez nettement les ann le dessous des ailes, selon Gramer, est d'un gr Il se trouve à Amboine.

## 22. S. LUGENS.

Walker, Heterocera, p. 319, 10. — Sph. Merops. Bond. Consid. sur les Lépid. du Guatemala, p. 78

et voisin du justiciæ. Ses ailes supérieures sont mort, striées et veinées de noir; elles ont un stig surmonté, vers la côte, d'un petit point de la sur le bord interne, en tirant vers l'angle anal, également blanchâtre; sur les deux tiers infér mins, on remarque, en outre, une raie noire réparée de la frange par une bande d'un blan Les ailes inférieures sont noires avec deu

transversales sinueuses, dont la première se fléchit cerole pour gagner la gouttière abdominale. La franç gris jaunatre.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures blanc jaunâtre vers la base des ailes; les épaulettes ment hordées de brun en dessus; les antennes sont bl L'abdomen a le dos sablé d'atomes d'un jaune bril par une petite ligne longitudinale noire, obsolète; les alternativement et régulièrement annelés de noir e jusqu'à l'extrémité.

Le dessous des ailes supérieures est brun avec l'an taché de noir.

Le dessous des ailes inférieures est blanchâtre avec tache vers la base, et une bande transversale dentée fide antérieurement, noires; l'extrémité est également noire.

Décrit sur deux individus, l'un du Mexique et l'au duras.

Coll. Bd.

23. S. JUSTICIÆ. Boisd.

Walker, Heterocera, p. 220, 12.

Sph. Anteros, Ménétriés, Enum. corpor. anim. mus. Pe II, pl. 42, f. 1.

Nous avons décrit ce Sphinx sous le nom de justicie adopté par M. Walker antérieurement à celui d'Ante par Ménétriés.

Il est à peu près de la taille de notre convolvuli ailes sont un peu dentelées avec les échancrures d'un nâtre; les supérieures sont d'un gris très-obsour, st riées de noirâtre et largement rembrunies vers l'ang vers le sommet; elles ont un stigmate blanchâtre ce coupant une veine noire, et surmonté vers la c droite, d'un point de la même couleur; il y a, en c bord terminal, une raie blanchâtre un peu sinué de la frange d'une poussière grisâtre.

Les ailes inférieures sont noires, avec une petit laire et deux bandes sinuées d'un blanc sale; la pre bandes est coupée par un crochet noir récurrent; grisâtre en dessus. Le cerralet est bran entremêlé de poils grisâtres, bordé de bimehâtre à la base des ailes et plus haut d'un peu de noir. Les satemes sont brunes avec le rachis blanchâtre.

L'abdomen est noirâtre avec une ligne dorsale noire, accompagée transversalement, dans chaque incision, d'atomes d'un jeme orangé; les côtés sont annelés de noir et de blanc, mais les anneaux blancs se rétrécissent et disparaissent avant l'extrémité; tout à fait à la base il y à deux taches noires comme dans les espèces du même groupe.

Le dessous des ailes supérieures est brunâtre; celui des inférieures est blanchâtre avec d'extrémité et une double raie fexueuse, dentée en scie, de couleur noire.

Beske élevait communément ce Sphinx sur une espèce de l'asticis, arbre de la famille des Acanthacées. Il nous a envoyé la chenille dans du rhum, mais tellement détériorée qu'il est impossible de la décrire. Elle a l'aspect de celle du ligustri.

Coll. Bd.

La figure que Ménétriés a donnée de ce Sphinx est très-mévocre; par les ailes supérieures on pourrait presque croire qu'il a voulu représenter le Chersis.

#### 24. S. ANDROMEDÆ.

John Leconte in litteris.

Boisd. Consid. sur les Lép. du Guatemala, p. 74.

il est de la taille de notre ligustri et a quelques rapports avec l'Eremitus de Hubner. Ses quatre ailes ont la frange entrecoupée de blanc pur; les supérieures sont variées confusément de noir et de blanc; elles ont un stigmate blanc, un peu réniforme, surmonté à droite près de la côte, d'un très-petit point de la même suleur; elles ont, en outre, à partir de leur angle interne, sur e berd terminal, une espèce de bande blanchâtre sinuée, obso-les, qui ne remonte pas jusqu'au sommet.

Les ailes inférieures sont noires avec deux bandes blanches dant la seconde est étroite et sinuée.

Le cerselet est d'un brun-noir, bordé de blanc à la base des sies; les épaulettes sont bordées de noir en dehors et en dedans. Les antennes sont noirâtres.

L'abdomen est noirâtre sur le dos avec une petite ligne noire

interrompue, peu indiquée; il offre à sa base, deux taches noires, et de chaque vôté, cinq incisions blanches qui se rétrécissent successivement en approchant de l'extrémité; les anneaux entre ces incisions sont d'un noir profond.

Le dessous des aites est brun avec une bande noire, commune, dentée en scie, suivie sur les inférieures, d'une bande blanche.

Nous devons cette belle espèce à la munificence de notre collaborateur, John Leconte (1), qui l'avait reçue d'Abbot comme ayant été élevée aux environs de Savanah, sur une espèce d'Andromeda.

Nous possédens un individu semblable venant d'Oaxaca, et M. de L'Orza en a reçu un autre de Honduras.

#### 25. S. EREMPTUS.

Hubn. Saml. Exot. Schmett. - Walker, Heterocera, p. 221, 16.

Il est à peu près de la taille du pinastri. Ses ailes ont la frange entrecoupée de gris jaunâtre; les supérieures sont d'un gris un peu roussâtre avec un stigmate d'un blanc terne qui coupe une ligne noire, et qui est surmonté à droite, vers la côte, par un point semblable cerclé de noir; elles sont, en outre, striées et fasciées de brun noirâtre et marquées dans la moitié inférieure de leur bord terminal, d'une raie noire un peu obsolète, bordée de blanchâtre en dehors.

Les ailes inférieures sont noires avec une petite tache basilaire et deux bandes transversales d'un blanc un peu terne, dont la postérieure asses large est à peine sinuée.

Le corselet est d'un gris roussatre avec les épaulettes bordées de noir. Les autennes sont fauves.

(1) John Leconte descendait d'une famille française de la Picardie, naturalisée depuis de longues années aux Etats-Unis. Savant aussi modeste que distingué, il était véritablement le Linné du Nouveau-Monde; il avait abordé et étudié avec un égal succès toutes les branches de l'histoire naturelle: botanique, zoologie générale, eutomologie, etc., rien ne lui était étranger. Sa mort a été un grand malheur pour la science et un deuil profond pour ses amis; car il était bien l'amécus certus et le vir probus de Cicéron. Heureusement le goût den sciences est héréditaire dans la famille Leconte. Comme un autre Linné, il a laissé un fils qui marche dignement sur les traces de son père, et qui aujourd'hui est l'un de nos plus savants entomologistes: Talis pater qualis filius.

L'abdemen est d'un gris un peu jaunêtre sur le des avec une pette ligne noire; les côtés sont annelés alternativement de noir et de gris blanchâtre.

Le dessous des ailes est noirâtre avec une bande commune binchâtre, ainsi que toute la base des inférieures.

Nous avons reçu ce Sphinx de M. John Leconte sans indication de localité. La figure du mâle donnée par Hubner est trèseracte.

Selon M. Lintner qui en a décrit la chenille, Proced. Entom. Sec. Phil. III, p. 652, il se trouve dans l'état de New-York.

Coll. Bd.

#### 26. S. GORDIUS.

Cram. 247, B. — Walker, Heterocera, p. 218, 9. Sphiar poscila, Stephens.

Il est un peu plus petit que notre ligustri. Ses quatre ailes est la frange entrecoupée de blanc; les supérieures sont brunes, fortement lavées de blanc, avec des stries noires longitudinales; le stigmate est d'un beau blanc, bien indiqué; le bord interne, et les deux tiers du bord terminal sont bruns, la partie brune est précédée de deux lignes ondulées, parallèles, de la même culeur.

Les ailes inférieures sont d'un blanc un peu grisâtre, avec me bande transversale médiane et l'extrémité noires.

Le corselet est brun, bordé latéralement et postérieuremens de blanc grisâtre.

L'abdomen est grisâtre sur le dos avec une lighe noire; ses cotés sont annelés alternativement de noir et de blanc grisâtre.

Le dessous des ailes est brun sur les supérieures, blanchâtre sur les inférieures avec une bande commune noirâtre.

Nous ne savons rien sur sa chenille.

Nous en possédons un très-bel exemplaire que nous a envoyé 1. John Leconte sans indication de localité. L'individu figuré par Cramer avait été envoyé de la Virginie.

Coll. Bd.

# 27. S. KALMIÆ.

Smith-Abbot, Lepid. of Georgia, I, tab. XXXVII. — Harris, Descrip. Cal. p. 43, &. — Walker, Heterocera, p. 218, 8.

Il a le port et la taille de notre ligustri. Ses ailes ont la frange

entrecoupée de blanc; les supérieures sont d'un roux très-clair, avec des stries longitudinales d'un brun-roux et une petite ligne terminale blanche, précédée d'une série de petites taches cunéiformes, brunes; le bord interne est en outre assez légèrement noirâtre.

Les ailes inférieures sont blanchâtres avec une bande transversale assez étroite et le bord marginal noirs.

Le corselet est roux, largement bordé de blanc.

L'abdomen est roux sur le dos avec une ligne longitudinale, noire, bien marquée; les côtés sont alternativement annelés de noir et de blanc.

Le dessous des ailes est roussâtre avec les contours noirâtres.

La chenille-vit non-seulement sur le Kalmia, mais aussi sur le Chionanthus, les lilas et les troënes. Elle est tantôt d'un vert gai, et tantôt d'un vert un peu jaunâtre, avec sept bandes obliques jaunes, bordées de vert obscur en dessus; les stigmates sont orangés; la corne est bleuâtre, arquéc.

La chrysalide est d'un brun marron avec la gaine de la trompe détachée comme dans le *liquitri*.

Amérique septentrionale, état de New-York. — Coll. Bd.

## 28. S. SORDIDA.

Harris, Amer. Journal scient. XXXVI, 296, 7. — Walker, Heterocera, p. 219, 10.

Nous n'avons jamais reçu cette espèce de l'Amérique septentrionale. Voici ce qu'en dit M. Walker, qui en a vu plusieurs exemplaires au British-Museum.

Il est d'un brun grisatre en dessus, plus pâle en dessous.

Le corselet est marqué de quatre lignes noires.

L'abdomen offre deux lignes dorsales parallèles, testacées, et des bandes transverses blanchâtres interrompues.

Les ailes supérieures ont des bandes incomplètes brunes et des traits discoïdaux noirs.

Les ailes inférieures sont noires, traversées par deux bandes d'un blanc grisâtre; la frange est d'un gris cendré.

Il habite les Etats-Unis. Walker.

Il nous paraît être bien voisin de l'Eremitus.

British Museum.

#### 29. S. CANADENSIS. Boisd.

Il est un peu plus petit que le Chersis, dont il se rapproche un peu. Ses ailes supérieures sont d'un gris assez foncé, fortement veinées et striées de brun; elles offrent en outre, près du bord erminal, une ligne noire, ondulée, bordée de blanc en dehors, et tout près de leur base, une petite touffe de poils noiratres.

Les ailes inférieures sont d'un gris blanchâtre, avec la base, me bande médiane et l'extrémité noires.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, avec les epaulettes bordées de blanc latéralement.

L'abdomen est gris avec une ligne dorsale noire, et les côtés amelés alternativement de noir et de blanc grisâtre.

Le dessous des aîles est gris, plus clair sur les inférieures, avec une bande commune, noirâtre, dentée en scie.

Nous ne savons rien de ses premiers états.

Décrit sur un exemplaire unique, que le général Feisthamel avait reçu de Quebec.

Call. Bd.

# 30. S. CHERSIS.

Habner, Exot. Saml.

Sphinz cinerea, Harris, Descript. Cat. - Walker, Heterocera, p. 217, 6.

Il a la taille et le port de notre ligustri. Ses ailes supérieures sont entièrement d'un gris cendré, avec des stries longitudinales soires et une ligne sinuée de la même couleur, près du bord terminal; on voit en outre, tout à fait à sa base, une petite touse de poils noirs.

Les ailes inférieures sont noirâtres, avec la base et une bande transversale blanchâtres.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, bordé latéréement d'un peu de blanchâtre.

L'abdomen est cendré sur le dos avec une ligne longitudinale soirètre; les côtés sont noirs avec une bande blanche très-courte su chaque anneau.

Le dessous des ailes est grisatre avec une bande noire deutée es scie, s'appuyant en arrière sur un peu de blanchatre.

Décrit sur deux individus que nous avons reçus des États-

La figure donnée par Hubner est exacte, mais d'un ; peu trop foncé.

Coll. Bd.

#### 31. S. Convolvull.

Linné, — Fabr. — Hubner, — Ochs. — God. — etc. Le Sphinx à cornes de bœuf, Geoff. Hist. des Ins. t. II, 86, Le Sphinx du liseron, Engram.

Ce Sphinx est tellement connu des entomologistes (pourrions nous abstenir d'en donner ici la description.

Les ailes supérieures, dans les mâles, sont d'un gris veiné de noirâtre avec le milieu, autour du stigmate apical et l'angle anal fortement rembrunis. Chez les fem mêmes ailes sont d'un gris cendré avec des petites ve râtres sur leur milieu, et quelquefois une trainée blancl leur tiers terminal.

Les ailes inférieures sont grises avec trois bandes noi la première qui est vers la base, est coudée, la second par une ligne grisâtre, et la troisième parallèle au be ginal.

Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est alternativement annelé de noir et de r dos est gris, divisé par une petite ligne noirâtre. Le anneau noir est un peu bordé de jaune et couvert de p gris bleuâtre; le premier anneau rouge est bordé de avant.

Le dessous des ailes est d'un gris cendré avec une dot transversale poirâtre.

La chenille vit sur presque toutes les convolvulacées; rope, on ne la trouve guère que sur le liseron des cham volvulus arvensis. M. Horsfield l'a trouvée à Java sur le P maximus, espèce de haricot. Elle varie pour la couleu le vert jusqu'au brun. En Europe, la variété la plus o est d'un beau vert avec deux rangées de points noirs su et sept bandes blanches obliques; on rencontre quelque autre variété d'un vert foncé avec deux raies dorsales r sept bandes obliques de cette même couleur; plus rarem est brune avec les premiers anneaux rayés de blanchâtre

La chrysaiide est d'un brun marron avec la gaine de la très-détachée en forme d'anse.

#### SPRIMY.

Ce Sphinx, dans notre climat, se montre dans les anné depuis la fin de juillet jusqu'à la fin de septembre. commun dans toute l'Afrique ainsi qu'aux Indes orie il paraît toute l'année sans interruption. Il habite au la Nouvelle-Zélande où il vit sur les patates, Convo 12121; mais les exemplaires de ces deux localités son 2121; c'est à peine s'ils atteignent la taille du pinastri.

Ce Sphinx, de même que l'Acherontia Atropos, n'est prement parler, une espèce européenne; il nous arriv ren's du sud et nous donne une ou deux générations. salides de l'arrière-saison, que l'on garde pendant l'hiv sent jamais, dans le nord ni dans le centre de l'Europopendant qu'en Espagne, en Italie et même quelquel midi de la France, les chrysalides ne périssent pas to de temps en temps, on en voit éclore en mai et juin.

# 32. S. CINGULATA.

Fab. Ent. System. III, p. I, p. 375, 56.

Sphinz convolvelli, Cram. 225, D. — Drury, Exot. Ins. I

- xx.th-Abbot, Lepid. Ins. of Georgia, pl., tab. XXIII.

Sphinz Drurze, Donov. — Steph.

tramer, Drury et Smith-Abbot ont regardé à to ambreaun comme une variété de notre convolvuli 2008 comprenons moins, c'est que Fabricius, aproprié les tigures de Cramer et de Drury à notre péene, ait dans le même ouvrage décrit l'espèt sous le nom de cinquiata!

l. a le port et la taille du convolvuli. Ses ailes sui d'un brun-grisatre foncé, dans les deux sexes, avec rurs, sinuées, et un large espace obscur vers le sur-eurement, par une raie noire ondulée, doute déhors; le stigmate est blanc, pupillé de noir advidus de l'un et de l'autre sexe, le dessin de les forme des espèces d'anneaux noirs, liserés

Les aites inférieures sont roses avec la racine d landes noires dont la première est en demi-ce autres parallèles au bord extérieur qui est d'un

Le correlet est de la couleur des ailes supés gratire. L'abdomen est annelé de noir et de rose.

La chenille est tantôt verte, et tantôt brune; la variété brune a une bande rose et une raie dorsale rouge, qui se dilate et devient double sur le milieu de chaque anneau; les traits obliques sont jaunes et se lient inférieurement à une rais de la même couleur qui longe les pattes.

Cette chenille vit sur le Convolvulus batatas et sur plusieurs plantes de la même famille.

Dans les variétés vertes, les raies latérales et dorsales ainsi que les traits obliques sont d'un brun ferrugiaeux bordés de blanc; il n'y a pas de raie jaune le long des pattes; les stigmates sont blancs, pupillés et cerclés de ferrugineux; la corne est arquée de couleur brune.

La chrysalide est d'un brun marron avec la gaine de la trompe en forme d'anse.

Ce Sphinx est commun depuis la Géorgie d'Amérique jusqu'au Brésil; il habite aussi les Antilles. C'est par erreur que Cramer le dit de la côte de Coromandel. C'est également d'après de fausses indications que l'on a dit qu'il se trouvait en Angleterre.

## 33. S. LIGUSTRI.

Linné, — Fabric. — Hubn. — Ochs. — God. etc. Sphinx du troëne, Geoff. Hist. des Ins. t. II, 84, 7. Sphinx du troëne, Engram. 85, fig. 115 a-g.

Nous ne pouvons que répéter ioi ce que nous avons dit à propos du convolvuli, attendu qu'il est au moins aussi connu des entomologistes.

Ses ailes supérieures sont d'un gris lavé de rougeatre, veiné de noiratre avec le bord interne et le milieu d'un brun assez foncé; outre cela, le bord terminal offre deux lignes blanches flexueuses, réunies près du sommet.

Les ailes inférieures sont roses avec trois bandes noires, transversales, dont l'antérieure est rapprochée de la base et les deux autres parallèles au bord postérieur.

Le corselet est d'un brun-noir avec le milieu grisâtre et les côtés d'un blanc rosé.

L'abdomen est brunâtre sur le dos avec les côtés annelés alternativement de noir et de rose. Le ventre est blanchâtre avec trois lignes noirâtres, longitudinales.

#### SPHINX.

Le dessous des ailes est d'un gris roussâtre, avec un seiritre commune.

Esper a figuré sous le nom de Spireæ, pl. 42, cont. une variété qui ne diffère de l'espèce typique, que pare taille est plus petite, et qu'il y a à la base des premis une espèce de tache blanchâtre.

La chenille du ligustri vit en juillet et août, sur Ligustrum vulgare, les lilas, Syringa vulgaris et Pers des, Fraxinus accelsior et ornus, et même, dit-on, sur fambucus nigra. Nous l'avons trouvée aussi sur les pare du houx, Ilex aquifolia, et même dans les hois, su um lantana. Esper l'a rencontrée sur le Spirea cha:

Elle est d'un beau vert gaï avec sept bandes obliquaterieurement, et blanches postérieurement; la corne uneau est longue, arquée, d'un noir luisant en des latre en dessous; les stigmates sont d'un jaune oran cette chemille est commune à Paris, sur les lilas da et les prédies. La chrysalide est d'un brun marron avient de la chemille est commune à commune de la chemille est commune de l'inspecte par la chemille passe l'hiver en terre et l'insecte par le chemille au mois de juin de l'année suivante. Quele accèsent que la seconde année.

#### 34. S. DRUPIFERARUM.

Sm.th-Abb. Lepid. of Georgia, t. XXXVI. - Walker, 1

L'a tout à fait le port de notre ligustri, mais il Se ades supérieures sont d'un gris blanchâtre, te à che et du bord terminal, avec tout le milieu base au sommet, par un large espace longitudinal que ques veines noires.

les alles inférieures sont blanchâtres avec det ient l'une médiane, et l'autre avant le bord ur est crisitre.

Le correlet est brun, bordé de blanc un peu est de cette dernière couleur avec les antennes L'abdomen est brunâtre avec une ligne dorsal sont marqués de cinq taches blanches, encadrée Le dessons est d'un brun grisâtre avec une bi La chenille de ce Sphinz, d'après les dessins

Lepidoptères. Tome I.

dons et d'après, la figure donnée par Abbot, est tellement semblable à celle de notre *ligustri* qu'on ne pourrait peut-être pas les séparer facilement. Dans le *drupiferarum*, la corne est noire en dessus et violette en dessous.

Cette chenille vit aux Etats-Unis sur plusieurs espèces de Prunus et sur le micocoulier, Celtis occidentalis.

La chrysalide ressemble tout à fait à celle de notre *ligustri*. Un individu mâle nous est éclos à Paris à la fin de mai.

Coll. Bd.

35. S. DRYNEUS.

Hubn. Züt. fig. 463, 464.

Il est de la taille de notre Ch. Porcellus. Ses ailes supérieures sont d'un gris-cendré, un peu striées de blanc vers la base, avec une espèce de bande blanche, un peu sinuée, légèrement coupée par les nervures, commençant au sommet pour arriver obliquement au milieu du bord interne; elles ont, en outre, un stigmate blanc et une petite tache plus claire que le fond entre le milieu de la côte et le sommet.

Les ailes inférieures sont d'un gris blanchâtre, surtout vers la base, avec l'empreinte d'une bande transversale blanchâtre : elles sont légèrement dentelées avec les échancrures liserées de blanc.

Le corselet est brun, bordé de blanc en avant et sur les côtés. La tête est brune avec les antennes d'un brun roussâtre.

L'abdomen est noir avec une petite ligne dorsale, très-obsolète, plus foncée; sur les côtés, toutes les incisions sont blanches, ainsi qu'une raie latérale sous-jacente, suivie près du ventre d'une raie noire; le ventre est entièrement blanc.

Le dessous des ailes supérieures est grisâtre; celui des inférieures est plus ou moins blanchâtre, principalement vers l'extrémité.

Décrit sur un individu que nous avons reçu de Pernambuco.

Coll. Bd.

#### 36. S. Hylæus.

Drury, Ins. II, pl. 36, fig. 3. — Cram. 107, C. — Fab. Ent. IV, 373. Sphinx prini, Smith-Abbot, tab. XXXV. — Dolla Hylaus, Walker, Heterocera, p. 230, 1.

Il est de la taille d'un petit exemplaire d'Elpenor. Ses ailes supérieures offrent en petit le même dessin que celles du rustica,

#### SPHINK.

c'est-à-dire que le fond de leur couleur est tanté d'un brun roux, avec un stigmate blanc et des ra de la même couleur, divisées par des lignes noires

Les ailes inférieures sont noires, avec deux : plus ou moins marquées, l'une vers la base et l'a delà du milieu.

Le collier est entièrement brun. Le corselet (
couleur, un peu bordé de blanc.

L'abdomen est brun, avec une ligne dorsale nu cisons blanches. Le dessous des ailes est brunâts

Lachenille, dont nous possédons plusieurs dessibles ou moins foncé, avec six bandes obliques de blanc en dedans; la queue est violette, pringuates sont noirs cerclés de jaune. Elle vit de partie des Etats-Unis sur les Prinos, genre d'arbus des Célastrinées, voisins de nos houx.

la chrysalide est d'un brun-marron clair, ave la ape très-peu détachée.

Beux individus nous sont éclos en mai, do chry wins reques de New-York.

Très-commun dans l'Amérique du Nord. Not habite aussi les Antilles.

Naith a changé le nom de ce Sphinx en disa Frat, qui indiquait la nourriture de sa chenille, istable que celui d'Hylaus, qui était le nom démande pardon à la mémoire de ce savant natu état, selon la fable, le nom de deux centaures, per Atalante et l'autre par Hercule. Ce fut aus Flate grec qui se trouva à la chasse du sanglier

#### 37. S. PLEBEJA.

Fab Ent Syst. III, p. 367, 36. — Anceryw plebej

Cest plus petit que notre pinastri. Ses ai peu dentelées avec les échanceures blanches; de noir, et offrent, à partir du sommet, une do écatée, qui arrive obliquement presque au milie is algunate est blanc cerclé de noir.

Le corselet est de la couleur des ailes supér

bordé de blanchâtre près de la base des ailes, avec le collier et le bords des épaulettes marqués d'une raie noire. Les antennes sont blanches en dessus.

L'abdomen est gris, avec une raie dorsale, et deux raies latérales, de couleur noire; entre les deux raies latérales, il y a de chaque côté, une série de taches grisâtres à peine séparées les unes des autres par des incisions noirâtres.

Le dessous des ailes est noirâtre, avec deux raies transversales

rapprochées, dentées en scie, d'une teinte plus noire.

La chenille, d'après un très-beau dessin original fait en Géorgie par Abbot, est verte avec le dos un peu jaunâtre; elle a sept bandes obliques jaunes; bordées en dessus de vert obscur; les stigmates sont blancs cerclés de noir; la corne est très-peu arquée et d'un vert bleuâtre; la tête et toutes les pattes sont vertes. Elle vit sur les Bignonia radicans et capreolata, et sur la Passiflora lutea.

La chrysalide est d'un brun-marron très-clair, avec la gaine de la trompe appliquée sur la poitrine.

Ce Sphinx se trouve en Géorgie et dans la Floride. Fabricius dit qu'il habite aussi les Antilles.

Coll. Bd.

38. S. STROBI.

Boisd. Lepid. de la Californ. 2º partie, p. 67, 71.

Il est un peu plus petit que notre pinastri, dont il a le port. Ses ailes supérieures sont d'un gris cendré avec quelques stries longitudinales noires, dont une vers le sommet, et deux un peu plus petites, parallèles au-dessous de la nervure médiane, suivies en dehors d'une double ligne transversale, oblique, de la même couleur; on voit encore vers le milieu de la côte quelques taches d'un brun noiratre; le stigmate est oblitéré par du noirâtre.

Les ailes inférieures sont d'un gris blanchâtre, avec la partie postérieure noirâtre et l'angle anal marqué d'une tache cendrée.

Le corselet est gris avec une raie latérale noire à la base des ailes.

L'abdomen est gris avec une raie dorsale noire et une raie latérale de la même couleur.

Le dessous des ailes est d'un gris obscur.

M. Lorquin, qui avait envoyé ce Sphinx à Becker, croit se rappeler en avoir trouvé deux ou trois exemplaires au pied d'unarbre vert, pin ou sapin, dans la chaîne de la Juba.

Coll. Bd.

Nous craignons qu'il n'y ait là une erreur d'habitat.

## 39. S. SEQUOLE.

Boisd. Lepid. de la Calif. part. 2, p. 66, 70.

Il a le port de notre pinastri, mais il est plus petit. Ses atles paraissent un peu dentelées avec les échancrures blanches; les capérieures sont d'un gris cendré avec quelques petites veines soits; elles ont, en outre, un trait apical oblique, de la même ouleur, et une ligne transversale également noire, vers les deux ten inférieurs du bord terminal; entre cette ligne et la frange, a couleur grise paraît être un peu blanchâtre; le stigmate est rès-peut, blanchâtre et très-peu visible.

Les ailes inférieures sont brunatres.

Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdamen est gris avec une raie dorsale noire; il est, en cure, marqué sur les côtés de bandes transversales noires.

Le dessous des ailes est d'un brun un peu gris avec l'empreinte sère d'une bande transversale brunêtre.

I. Lorquin a trouvé un seul individu appliqué sur le tronc dun arbre dans une forêt de Sequoia ou Willingtonia; ce qui in fait croire que sa chenille vit sur ces gigantesques conilers.

Coll. Bd. - Très-rare.

## 40. S. JUNIPERI.

Boild. in Belegorgue. Voy. dans l'Afriq. austr. p. 595, 112.— Anceryz peri, Walker, Heterocera, p. 229, 12.

ll a le port de notre pinastri, mais il est plus petit. Ses ailes spérieures sont d'un cendré blanc avec des stries noirâtres plus u moins accusées; le sommet est marqué d'un trait noir, oblique, merrompu; l'extrémité offre, dans sa moitié inférieure, une lize double de la même conleur; le stigmate est blanchâtre, cu-somme, surmonté vers la côte de quelques petits traits noirs.

Les aîles inférieures sont brunes, un peu plus pâles vers la gouttière abdominale.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures aveç les épaulettes bordées de noir. Les antennes sont brunes.

L'abdomen est d'un gris blanchâtre avec une ligne dorsale noirâtre et une série de taches latérales de la même couleur.

Le dessous des ailes est d'un brun uniforme avec la frange blanchâtre, légèrement entrecoupée de brun.

Port-Natal et pays des Hottentots.—Selon Delegorque, on voit voltiger le soir ce Sphinx, en bourdonnant, sur plusieurs fleurs infondibuliformes; il recherche surtout les cucurbitacées. Il en a pris un individu très-pur, venant d'éclore, sur le tronc d'un arbre résineux.

Ménétriés, dans son Catalogue, écrit juniperæ, ce qui est un barbarisme imputable à Becker, à qui il arrivait souvent d'estropier les noms qu'il venait prendre sur notre collection.

### 41. S. CUPRESSI. Boisd.

#### Leconte in litteris.

Il a le port du juniperi, mais ses ailes supérieures sont un peu plus allongées et un peu plus pointues; elles sont d'un cendréblanc, comme dans le juniperi, avec des stries brunes, principalement vers la base et l'angle interne; le sommet est marqué, comme dans les espèces voisines, d'un trait oblique de la même couleur; le stigmate et très petit et à peine visible.

Les ailes inférieures sont d'un brun un peu roussâtre, avec la base plus claire.

Le corselet est d'un gris blanchâtre, avec les épaulettes roussâtres, bordées de blanchâtre à la base des ailes.

L'abdomen est d'un brun un peu roussatre, comme les ailes inférieures, avec une raie dorsale noire, qui se dilate et devient presque maculaire sur les derniers anneaux. Les côtés sont marqués d'une série de taches noires séparées par les incisions.

Le dessous des ailes est d'un gris brunâtre avec une bande transversale mal écrite.

La chenille, selon Abbot, qui nous en a envoyé un magnifique dessin, vit sur le *Cupressus thuioides*. Elle est fort jolie : elle est verte, pointillée de jaune avec une raie dorsale purpurine, se dilatant un peu dans chaque incision des six derniers anneaux;

cette raie dorsale est bordée de chaque côté par des traits d'un binopur, qui forment une espèce de bande interrompue, à chale ameau; immédiatement au-dessous sont des traits obliles du même blanc, mais qui au lieu d'être au nombre de sept ristent sur tous les anneaux; la corne est droite, purpurine à la base et noire à l'extrémité; les pattes sont d'un violet purpunn; la tête est jaunâtre, rayée de rose et de noir; les stigmates sent noirs hordés de fauve.

La chrysalide est d'un brun marron; la gaine de la trompe r'et pas détachée.

Géorgie. — Très-rare.

Coll. Bd.

## 42. S. CATALPÆ. Leconte.

Il a le port de notre *ligustri*, mais il est plus petit. Ses ailes sont un peu dentelées avec les échancrures lisérées de blanchâte; les supérieures sont d'un brun grisâtre avec un stigmate manc cerclé de noir; entre ce stigmate et la base, elles ont trois les noirâtres ondulées, dont la première nulle ou obsolète; de latre côté du stigmate, il y a une autre ligne noire, courbe, base en scie, puis une raie d'un jaune blanchâtre, suivie d'une de ligne maculaire noirâtre; le sommet offre une tache apiels brunâtre séparée d'un trait noir, oblique, par un peu de blanc unâtre.

Les ailes inférieures sont presque de la même couleur que les 12; ricures avec une bande transverse plus pâle.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, bordé de juntire latéralement, avec une raie noire sur les épaulettes; il et, en outre, bordé de blanc en arrière.

L'abdomen est de la couleur des secondes ailes avec une ligne : sale noire, précédée de deux taches de la même couleur; les sits sont marqués d'une série de taches noires; le ventre est l'un blanc jaunâtre.

La chenille de ce Sphinx est très-singulière, elle n'a aucun apport avec celles de la même tribu. Son dos, largement d'un a u-violet foncé, est marqué, à partir du quatrième anneau, sur taque segment, de deux taches blanches allongées, tendant à se dans en forme de bandes; cette même partie offre sur ses lords, de chaque côté, une série de points blancs alignés et très-rapprochés; immédiatement au-dessous de caux-ci il y a une

raie blanche marquée de quelques points noirs alignés; plus bas les côtés sont jaunes ainsi que le ventre; les stigmates sont moirs; la tête est noire avec deux lignes blanches; la corne est longue, cylindrique, très-grèle, relevée en l'air et un peu recourbée du côté de la tête; elle est noire et implantée sur un espace blanc.

Cette chenille vit en Géorgie sur le Catalpa cordifolia. Il paralt qu'elle n'est pas très-rare, car les pêcheurs qui habitent les bords du Swampy la recherchent, nous écrit Abbot, comme le meilleur appât pour prendre le poisson.

La chrysalide est d'un brun-marron clair.

Nous n'avons jamais vu ce Sphinx en nature, notre description est faite sur un beau dessin d'Abbot et d'après une note de John Leconte. Nous devions en recevoir une paire, mais la mort d'Abbot (1) a empêché cette promesse de se réaliser.

### 43. S. PINASTRI.

Linné, — Fabricius, — Hubn. — Ochs. — God. etc. Sphinx du pin, Engr. P. d'Eur. pl. 88, fig. 115 a-f.

Ce Sphinx, connu de tous les entomologistes, a les ailes supérieures d'un joli gris blanchâtre, avec un groupe de traits noirs vers leur milieu, et souvent, dans les mâles, une tache noirâtre entre la peinte apicale et le milieu de la côte; il y a aussi au sommet un trait longitudinal noir.

Les ailes inférieures sont d'un brun clair.

La frange est entrecoupée de blanc sur les quatre ailes.

Le corselet est gris avec un bande noire sur chaque épaulette.

L'abdomen est gris avec une raie dorsale noire; les côtés sont alternativement annelés de noir et de blanc.

(1) John Abbot, peintre d'histoire naturelle fort habile et professeur particulier, était établi à Savanah; il passa une partie de son existence à observer et à peindre avec une vérité scrupuleuse les divers animaux de la Géorgie, principalement les Lépidoptères, sous leurs différentes phases, les Névroptères, quelques Hyménoptères et un certain nombre de larves de Coléoptères. Le British Museum possède une belle série des dessins de cet artiste. Les Lépidoptères seuls ont été publiés avec le concours de James Edward Smith. Depuis la publication de ce splendide ouvrage, Abbot a exécuté sur le même sujet, un grand nombre de dessins encore inédits.

Le dessous des ailes est d'un brun pâle.

La chenille, dans sa jeunesse, est d'un vert jaunâtre; après les premiers changements de peau elle est verte avec tout le dos brun et trois lignes longitudinales jaunes sur chacun des côtés; le corps est, en outre, strié transversalement de noirâtre; les signates sont orangés, ceralés de noir; la tête est fauve bordée de noir luisant; la corne est également noire, arquée en arpèse.

La chenille vit exclusivement sur les conifères, spécialement sur les Pinus strobus, maritima, picea, sylvestris, rubra, Halopensis et laricio. Depuis quelques années elle n'est pas rare au bois de Boulogne.

La chrysalide est d'un brun marron avec la gaine de la trompe un peu détachée en forme d'anse; elle passe l'hiver en terre; l'éclosion a lieu au commencement de juin.

Le Sphinx du pin est commun dans une grande partie de l'Europe.

#### 44. S. CONIFERARUM.

Smith-Abbot, tab. 42. — Ancerya coniferarum, Walker, Heterocera, p 234, 2.

Il est à peu près de la taille de notre pinastri, dont il rappelle mesièrement le facies, mais ses ailes sont plus arrondies au sommet, plus larges, et n'ont nullement la frange entrecoupée de blanc; les supérieures sont d'un gris foncé et ont, vers le miseu, un gros trait noir longitudinal assez court, s'appuyant ordinarement sur une ou deux très-petites taches de sa couleur; vers le milieu de la côte, il y a une espèce de macule brunâtre plus ca moins sensible, et vers le bord terminal une ligne noirâtre, courbe et ondulée; entre cette ligne et la frange le fond devient plus obscur; l'extrémité des nervures est un peu dilatée et brune.

Les ailes inférieures sont d'un brun roussâtre avec la base un peu plus claire.

Le corselet est gris avec les épaulettes un tant soit peu plus abscures.

L'abdomen est entièrement d'un gris roussatre, sans ligne dor-

Le dessons des ailes est d'un brun clair.

Nous avons reçu d'Abbot plusieurs très-beaux dessins de la cheulle, mais pas un ne ressemble à celui qu'il avait envoyé primitivement, et tel qu'il est reproduit dans l'ouvrage d' Cette chenille, qui n'a pas de corne, est ordinairement plus ou moins clair, avec une raie dorsale blanche l rose; elle a le long des pattes une raie semblable, celle-ci et la raie dorsale une raie latérale jaune; l'e anale se termine par deux petites pointes roses; la tête rayée de noire; les stigmates sont jaunes cerdés de n l'ouvrage de Smith elle a la même forme, mais elle avec deux bandes latérales entrecoupées alternativemen et de gris presque blanc; la tête est semblable.

Elle vit en Géorgie sur le *pinus palustris*, et probable plusieurs autre espèces du même genre.

La chrysalide est d'un brun marron; elle n'a point la la trompe détachée.

Coll. Bd.

45. S. HARRISII. Clemens.

Hyloicus Harrisii, Grote, Trans. americ. Entomol. Soc. p. 115. — Ellema Harrisii, Lintner, Entomol. Contrib. pl. 9, 10, 11, page 37.

Il a le port d'un pinastri, mais il est d'un tiers plu peu près de la taille du Dryneus figuré par Hubner. Il gris-cendré légèrement brunâtre. Ses ailes supérieures fa dentelées, ont les petites dentelures liserées de blanc séparées par une série de très-petites taches cunéifor brun-noirâtre, placées sur l'extrémité de chaque nervu la base il y a deux raies transversales noirâtres, sinuées l'extrémité une espèce de bande maculaire transverse par des taches cunéiformes noirâtres, dont la pointe er en dedans; cette bande est précédée d'une raie de la leur.

Les ailes inférieures sont d'un gris-cendré avec plus obscure.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures : lier et le bord des épaulettes bordés d'un peu de bru-Le dessous des ailes est d'un gris-cendré, travers

Le dessous des ailes est d'un gris-cendré, traver mâle, sur le tiers terminal par une raie obscure.

La chenille, comme celle du coniferarum, est dép corne sur le onzième segment. Elle est verte, un pe aux extrémités avec une raie dorsale un peu interrom rire, d'un brun-rougeâtre, et avec une raie latérale jaune et une ande sous-stigmatale blanche; outre cela, ses pattes écailleuses aux roses ainsi qu'une raie ventrale.

Un trouve cette chenille dans le courant de septembre aux en-

La chrysalide conique, d'un brun foncé, est dépourvue de rine détachée sur la poitrine; ellé passe l'hiver en terre et éclot l'imée suivante.

#### 46. S. PINEA.

Elema pineum, Lintner, Entomol. Contrib. p. 37, pl. 12, 13.

Il a tellement le port et la taille du précédent, qu'on le prencuit volontiers pour une vériété dont le dessin serait effacé. Il d'un gris-cendré plus foncé. Sée ailes supérieures offrent, ins la cellule discoïdale, une espèce de tache obscure en forme dire, et vers l'extrémité une bande transverse courte, mal citte, formée par des taches obsolètes un peu cunéiformes; de cela, le bord terminal est plus rembruni que dans Hartini.

Les ailes inférieures sont d'un blanc sale avec l'extrémité bruitre et la base un peu blanchâtre.

Le corselet est grisatre avec le collier et le hord des épau-

L'abdomen est grisatre, sans bandes transversales.

La femelle est d'un ton plus clair que le mâle.

Lachenille a une si grande ressemblance avec la chenille de servisii, que M. Lintper a confondu ensemble les premières n'il a trouvées. Les deux espèces vivent à la même époque sur prises strobus, dans l'Etat de New-York.

M. Lintner a créé pour cette espèce, pour Harrisii et probai-ment pour le coniferarum, un genre propre sous le nom
illems, auquel il assigne pour caractères le défaut de bandes
resserates sur l'abdomen de l'insecte parfait et l'absence de
sine détachée sur la poitrine de la chrysalide. Ces caractères
in paraissent un peu trop légers pour justifier la création d'un
i-me nouveau; car chacun sait que les sphingides à trompe
inse ongue, ont la gaîne plus ou moins détachée en forme
inse. Ainsi, ce fourreau est bien plus développé dans le convolruie et le cinquiata que dans le Ligustri, tandis qu'il l'est beaucoup moins dans le pinastri dont la trompe est plus courte. Ches

certaines espèces de Chærocampa, dans l'Acteus, par exemple, la gaine est au moins aussi détachée que dans le convolvuit, etc. Les caractères donnés par M. Lintner à son genre Ellema, constituent, à la vérité, un petit groupe, mais nous ne les croyons pas suffisants pour que nous osions retirer du genre Sphinæ proprement dit les insectes dont il s'agit.

N'ayant pas encore reçu ces deux Lépidoptères figurés par M. Lintner, notre description est extraite du travail de cet entomologiste.

L'Amérique du Nord est la patrie par excellence des Sphinx. Nous n'avons que trois espèces pour l'Europe entière, tandis qu'il y en a plus de vingt dans les Etats-Unis, sans compter tous ceux qui restent à découvrir dans les régions encore inexplorées de ce vaste territoire.

## 47. S. ABIETINA. Boisd.

Cette grande espèce, qui a 10 à 16 centimètres d'envergure, ressemble, par la forme et la couleur, à notre pinastri; ses quatre ailes ont la frange entrecoupée de blanc, elles sont de la même teinte que dans le pinastri; elles ont un petit stigmate blanc, sous lequel existent deux longs traits noirs longitudinaux parallèles, suivis, du côté du bord terminal, de quelques petites taches de la même couleur, formant presque une raie transversale; la côte offre aussi trois ou quatre taches noirâtres, et le sommet une raie presque droite, de la même couleur, se réunissant à la dernière tache costale.

Les ailes inférieures sont noires, avec la gouttière abdominale plus pâle, et deux petites taches cendrées vers l'angle anal.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, bordé latéralement de noir et marqué, en arrière, de deux taches de la même couleur.

L'abdomen est gris avec une raie dorsale noire, et sur chacun des côtés une raie latérale de la même couleur, mais moins nette.

Le dessous des ailes est brunâtre, plus pâle sur les inférieures où l'on voit l'empreinte de deux bandes plus obscures.

La femelle est notablement plus grande que le mâle.

Décrit sur deux très-beaux individas que nous avons reçus de l'Himalaya. Quoique nous ne connaissions pas la chenille de ce

Sphins, nous croyons pouvoir assurer, qu'en raison de sa grande malogie avec le *pinastri*, elle doit vivre sur quelque espèce de suifères propre aux montagnes de l'Inde.

#### 48. S. LANCEOLATA.

Felder, Novara, Exp. Zoolog. Theil. Band II, Abth. 2, pl. 78, fig. 3. — Boisd. Consid. sur les Lépid. du Guatemala, p. 73.

Sphiaz aquinoctialis, Boisd. M.

Ce grand Sphinx a de 12 à 16 centimètres d'envergure. Ses aims supérieures un peu allongées, sont d'un gris blanchâtre comme dans notre pinastri; elles ont sur le milieu deux traits a.irs longitudinaux parallèles, au-dessous d'un stigmate blanc sees petit; entre ces deux raies et le bord extérieur, existe une irne noire sinuée, plus ou moins distincte, et au sommet un ang trait flexueux, presque horizontal, de la même couleur.

Les ailes inférieures sont noires avec deux bandes d'un blanc sele, dont l'une vers la base et l'autre vers le milieu; le bord entérieur est d'un gris un peu cendré ainsi que l'angle anal.

Le corselet est de la couleur des premières ailes avec une bade noire sur les épaulettes.

L'abdomen a une raie dorsale noire très-peu accusée, et chacun ée ses côtés est alternativement annelé de noir et de blanc grisâtre.

Le dessous des ailes est d'un brun pâle avec la trace de deux bandes un peu plus obscures.

Decrit sur deux individus male et femelle ex larva.

Mexique. Coll. Bd. — M. de L'Orza en a reçu un exemplaire res-défectueux de Guatemala.

Nous supposons que la chenille de ce beau Sphinx doit vivre an Mexique sur quelque espèce de ces nombreux conifères propres à cette contrée équipoxiale.

#### 49. S. CASUARINÆ. Boisd.

Hecrosia casuarina, Walker, Heterocera, p. 210, 19.

Il est à peu près de la taille du convolvuli. Ses ailes ont la france entrecoupée de noir et de blanc; les supérieures sont d'un gris cendré avec quelques petits espaces maculaires blancs; elles sont marquées au milieu d'une large tache noire, un peu arrondie, qui va jusqu'à la côte, mais qui n'arrive pas jusqu'au bord

interne; en dehors de cette tache on aperçoit une ligne transversale, courbe, de la même couleur, dentée en soie; en arrière de celle-ci, on voit encore dans les individus bien frais, la trace d'une autre raie noirâtre, interrompue; outre cela, il y a vers le sommet un trait noir longitudinal qui se lie à un autre trait transversal venant de l'extrémité de la côte; le stigmate est oblitéré par la grande tache noire.

Les ailes inférieures sont noires avec deux taches cendrées vers l'augle anal, dont la plus interne est surmontée d'un petit espace blanchâtre.

Le corselet est gris comme les premières ailes, avec une bordure blanche surmontée d'une bande noire.

L'abdomen est gris sur le dos, avec une raie dorsale noire; les côtés sont d'un brun-noir avec les anneaux un peu plus foncés.

Le dessous des ailes est d'un brun pâle avec une tache noirâtre sur la côte des supérieures, et deux bandes communes obsolètes de la même couleur.

La chenille, dont nous n'avons aucune description, est, selon M. Jules Verreaux, assez commune à la Nouvelle-Hollande, sur les Casuarina, genre d'arbres que Jussieu avait placé dans les conifères, mais qui constitue aujourd'hui la famille des Casuarinées.

50. S. COLLARIS.

Macrosila id., Walker, Heterocera, p. 201, 5.

Nous ne connaissons pas ce Sphinx qui, selon M. Walker, est très-voisin du lichenea.

Il est d'un gris blanchâtre en dessus et blanc en dessous.

Le corselet est d'un brun foncé en avant, avec quelques marques brunes sur les côtés.

L'abdomen offre une raie dorsale brune fortement interrompue, et de chaque côté une rangée de taches transversales noirâtres.

Les ailes supérieures ont un stigmate blanc et des lignes obliques, transverses de couleur brune; outre cela elles offrent une raie roussâtre qui s'étend de la base à une bande transverse ondulée de la même teinte.

Les ailes inférieures sont brunes avec la base blanchâtre et deux bandes transverses d'un blanc grisâtre.

Les ailes sont brunes en dessous.

Saint-Domingue, Jamaique. Walker.

#### 51. S. ANALIS.

Felder, Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 78, f. 4.

Il a le port et la taille du Sphinælichenea. Ses ailes supérieures sont d'un gris cendré, avec des bandes transverses, ondulées, mirâtres, bordées par des raies blanchâtres, dentées en scie; le stigmate est blanc placé sur une bande très-noire partant de la côte; cette bande coudée brusquement au niveau de la nervure médane, se prolonge en coupant l'aile un peu obliquement, jusqu'à la frange du tiers terminal inférieur; outre cela, il y a au sommet de l'aile, une autre bande noire qui part de la côte et se replie pour gagner la pointe apicale, en limitant un espace dispique d'un gris cendré; la frange est entrecoupée de noir et de blanc.

Les ailes inférieures sont noires et offrent vers l'angle anal ieux taches un peu oblongues, d'un blanc grisâtre, surmontées d'un double zigzag de la même couleur.

Le corselet est d'un brun grisâtre, marqué postérieurement d'une tache noire en fer à cheval. L'abdomen est gris, avec la première articulation, une ligne dorsale et une bande latérale en feston d'un noir foncé.

M. Felder l'a reçu de Shangal. Est-ce bien là sa patrie?

## 52. S. LICHENEA. Boisd.

Rénétriés, Enum. corp. anim. Mus. petrop. p. 89, nº 1471. Macrosila lichenea, Walker, Heterocera, p. 204-9.

E est de la taille du convolvuli. Ses quatre ailes ont la frange entrecoupée de blanc et de brun; les supérieures, chez les individus bien frais, sont lavées de verdâtre; le fond de leur couleur et d'un brun grisâtre, avec des raies transversales blanches, courbes, sinuées; sur la portion du milieu qui supporte un stigmate blanc, bien tranché, existe un espace assez large, presque la parcouru par quelques petites lignes noirâtres, très-peu sensibles, limité en dedans par une double raie blanche, et en dehors, par une ligne de la même couleur dentée en scie; vers l'estrémité terminale, on voit trois taches noires, alignées, un peu ovales, plus ou moins bien écrites, un peu entourées de

blanchâtre; il y a, en outre, vers le sommet, une raie noire courte, qui se lie à une liture apicale de la même couleur.

Les ailes inférieures sont noires, un peu plus claires vers la base, marquées vers la région anale d'un espace blanchâtre, coupée en deux par une nervure, la partie interne de cette tache offre ordinairement une petite macule noirâtre.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, bordé de blanc latéralement.

L'abdomen est aussi de la couleur des premières ailes, avec une petite ligne dorsale noirâtre, interrompue et peu indiquée; les premières articulations latérales sont noires, et limitées en dessous par une bande longitudinale de la même couleur, un peu interrompue sur les derniers anneaux.

Le dessous des ailes supérieures est brun; celui des inférieures a le disque blanchêtre avec deux bandes noirêtres.

Brésil, Coll. Bd.

Beske élevait cette espèce très-communément aux environs de la Nouvelle-Fribourg. Il ne nous a rien dit des premiers états de ce Sphinx, de sorte que nous ignorons si sa chenille vit sur les arbres ou sur les plantes basses.

## 53. S. FORESTAN.

Cram. 394, B. - Macrosila Forestan, Walker, Heterocera, p. 203, 8.

Il est presque de la taille du Macrosila Hasdrubal. Ses ailes ont la frange entrecoupée de noir et de blanc. Les supérieures sont presque blanches, avec des lignes transversales, les unes sinuées, les autres dentées en scie, d'un gris brunâtre; sur le milieu de ces mêmes ailes, existe sous la côte, un espace obscur, coupé en avant par quelques traits bruns et lavé de ferrugineux sur son côté externe; ce même espace est marqué d'un stigmate blanc; vers l'extrémité terminale on voit quatre eu ainq taches alignées, plus obscures que la teinte générale, de forme ovale, plus ou moins effacées; il y a, en outre, vers le sommet, une ligne noire tortueuse qui remonte sur la côte.

Les ailes inférieures sont noires, et offrent vers l'angle anal un petit espace blanchâtre.

Le corselet est de la couleur des premières ailes, avec une bande latérale noire. L'abdomen est gris, avec une ligne dorsale noirâtre, interrompue; ses côtés sont marqués de trois taches blanches encadrées de noir profond.

Le dessous des ailes est brun; celui des inférieures a le disque argement blanchatre avec deux bandes brunes.

Brésil, Coll. Bd.

Ce Sphinx doit être commun aux environs de la Nouvellefribourg. Beske l'élevait chaque année, en grande quantité, si an en juge par les envois qu'il faisait en Europe.

La figure donnée par Cramer sur un exemplaire de Surinam, : et pas de ces plus correctes, de même que le nom qui devsait ètre Florestan.

### 54. S. NESTOR. Boisd.

#### Mecrosila obliqua? Walker, Heterocera, p. 208, 15.

Il a près de 13 centimètres d'envergure. Ses ailes supérieures ant blanchâtres, avec des raies transversales ondulées, noirâres; sur le milieu de leur surface, au-dessous de la côte, existe m large espace trapézoïde d'un brun un peu marron, coupé par une bande oblique, noire, qui va du bord terminal au milieu de a côte; le stigmate est petit, blanchâtre, oblitéré en partie par respace brun. Un peu avant l'extrémité marginale, il y a une ligne noirâtre; on voît en outre, tout à fait au sommet, une peute ligne noire anguleuse.

Les ailes inférieures sont noires, avec un espace cendré assez grand à l'angle anal, surmonté, dans la gouttière abdominale, d'une tache blanche.

Le corselet est d'un gris un peu blanchâtre avec les épaulettes legement brunes.

L'abdomen est brun avec une raie dorsale noire; il est marqué de chaque côté d'une série de taches blanchâtres, encadrées de

Le dessous des ailes est entièrement brun.

Diccit sur un très-bel exemplaire femelle que nous avons reçu la l'Himalaya.

Nous pensons que le Macrosila obliqua, décrit brièvement par 1. Walker, pourrait bien être une variété de notre Nastor.

## 55. S. JASMINI. Boisd.

Il est de la taille du *pinastri*. Ses ailes ont la frange entrecoupée de blanc et de noir par le bout des nervures; les supérieures sont d'un gris blanchâtre, avec des traits horizontaux et des raies transversales noirs; le stigmate est cendré. Vers le sommet il y a un trait poir horizontal accolé à une petite liture apicale.

Les ailes inférieures sont noires, avec la base largement d'un beau jaune orangé et l'angle anal marqué d'un petit espace d'un gris sendzé.

Le corselet est gris et offre en avant une raie noire en forme d'Y renversé; les épaulettes sont bordées de blanc à la base des ailes et marquées d'une bande brune longitudinale; sa partie postérieure est également limitée par une raie transversale de la même couleur.

L'abdomen est grisâtre, avec une ligne dorşale noire et une raie de la même couleur sur chacun de ses côtés.

Le dessous des ailes est gris, avec une bande commune brunâtre et la base des supérieures jaune.

Décrit sur un individu unique très-pur, dont M. Goudot nous a dit avoir élevé la chenille sur un jasmin, à Madagascar, aux environs de Tananarive. Mais était-ce bien un véritable jasmin? On a donné si souvent ce nom à des plantes appartenant à d'autres familles!

Coll. Bd.

## 56. S. JASMINEARUM. Boisd.

Boisd. in Guérin, Iconògraph. du Règne animal de Cuvier, pl. 84, fig. 1 et 1 a.

Il est à peu près de la taille d'un ligustri, peut-être un peu plus petit. Ses ailes ont la frange entrecoupée de brun; les supérieures ont, à partir du milieu, un gros trait noir longitudinal qui s'étend de la cellule discoïdale à la frange; elles ont en outre des raies noirâtres, transversales, courbes, ondulées, dont celles de la base sont un peu obsolètes, tandis que celle qui précède le stigmate est au contraire très-profioncée et semble finir sous le trait longitudinal par un trait plus court. Outre les trois raies parallèles, un peu effacées, qui suivent le stigmate, il y en a une quatrième plus accusée, un peu interrompue, formant, dans sa

#### SPHINX.

partie inférieure, des espèces d'anneaux oblongs ; le si de la couleur du fond, placé sur un espace roussâtre.

Les ailes inférieures sont noirâtres, avec l'appare bande transversale plus pâle.

L'abdomen est brunâtre, avec une ligne noire. L'abdomen est brunâtre, avec une ligne dorsale ne compue et une raie latérale de la même couleur.

Le dessous des ailes est d'un brun grisâtre.

La chenille, d'après un beau dessin que nous avon mains, est verte, avec des traits blancs sur le dos et ébliques peu prononcées de la même couleur; la sept qui va gagner la base de la corne est un peu roussé es verte, légèrement chagrinée; la tête et les pattes : ses sont vertes; les pattes écailleuses sont ferrugineu mates sont blancs cerclés de noir.

Selon John Leconte, elle vit sur diverses espèc Fraximus.

Li chrysalide est d'un brun marron.

lecrit sur un individu mâle unique, éclos à Pari Lai d'une chrysalide que nous avions reçue de John Seine temps que le dessin de la chenille.

Amérique septentrionale. Coll. Bd.

## 57. S. PAMPHILUS.

Cramer, 394, E. - Dolba Pamphilus, Walker, Heter

Nous n'avons jamais vu ce Sphinx dans aucune ce description est faite sur la figure qu'en a donnée li est un peu plus petit que notre ligustri. Ses ai son d'un blanc-sale roussâtre, principalement da poèrieure; elles sont marquées de raies noires, samenses; le stigmate est de la couleur du fond, sie à la côte par une petite ligne pareillement qui précède le stigmate est divisée, dans le sens de une ligne blanchâtre; la pénultième est aussi d'une ligne blanchâtre; la pénultième est aussi d'une ligne blanchêt celle qui précède la frange est fleves le sommet à une ligne noire, tortueuse, ap de trois traits de la même couleur. Il y a en ou ple interne, deux points blanchâtres, alignés ti la frange est entrecoupée par de petits traits no

Les ailes inférieures sont noires, avec trois petites taches d'un blanc roussatre, un peu triangulaires, alignées, presque marginales.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures avec les épaulettes bordées de noir.

L'abdomen est d'un gris roussatre avec les articulations noires. Surinam.

Malheureusement on ne reçoit plus rien de la Guyane hollandaise. Il y a un certain nombre d'espèces, que Cramer a figurées de cette localité, que nous n'avons jamais reçues de Cayenne.

### 58. S. BRONTES.

Drury, Ins. II, pl. 29, fig. 4. - Boisd. Sp. Gener. pl. 15, fig. 6.

Il est de la taille de notre ligustri. Ses ailes ont la frange noire entrecoupée de blanc; le fond de la couleur des supérieures est gris, avec des raies noires, doubles, transversales, courbes et ondulées; le stigmate est d'un blanc pur, assez grand; il y a, en outre, au sommet une ligne noire, tortueuse, presque horizontale, et trois ou quatre petites taches blanches plus ou moins bien indiquées, dont une entre le stigmate et l'extrémité terminale, et une ou deux vers le bord interne.

Les ailes inférieures sont brunâtres, avec la base et deux bandes transversales d'un gris blanchâtre.

Le corselet est gris, entouré de noir avec un peu de blanc à la base des épaulettes; la partie noire, située en arrière, est aussi bordée de blanc en dedans.

L'abdomen est brunâtre, avec quelques taches obsolètes grisàtres sur le dos et une raie médiane noire; il est marqué de chaque côté d'une rangée de taches d'un blanc grisâtre, entourées de noir, principalement du côté du dos.

Le dessous des ailes supérieures est brunâtre, celui des inférieures blanchâtre, avec deux bandes noirâtres communes.

La chenille, dont nous possédons de beaux dessins, est d'un vert plus ou moins pâle, avec sept bandes obliques, blanchâtres, ombrées de vert foncé; la tête est verte avec deux petites lignes rouges; la corne est assez forte, peu arquée, d'un vert lavé de rose. Elle vit sur presque toutes les espèces de frênes, particulièrement sur les Fraxinus americana, simplicifolia et platycarpos.

La chrysalide est d'un brun-marron foncé.

Les individus que nous possédons sont éclos à Paris, vers la ée de mai, de chrysalides que John Leconte nous avait envoyées & New-York.

La figure de ce Sphinx, dans l'ouvrage de Drury, est fort maurass. Si cet auteur consciencieux n'avait pas dit que l'exemplaire pi lui a servi venait de New-York, nous n'aurions pas osé y rapreter l'espèce que nous venons de décrire.

II. Grote dit, dans son mémoire sur les Sphingides de Cuba, me le Sphinx que nous avons figuré n'est pas le Brontes de Drury, mais bien le Repentinus de Clemens. Comme Drury est très-exact si fait de localités, et qu'il dit positivement que l'exemplaire par la eu sous les yeux a été envoyé de New-York à Fothergill, sons persisterons dans notre opinion jusqu'au moment où l'on persisterons dans notre opinion jusqu'au moment où l'on aus aura montré un Sphinx des Etats-Unis semblable en tout à gure donnée par Drury.

II. Grote figure, comme le véritable Brontes, un Sphinx de l'aba que nous n'avons pas vu, et qui constitue peut-être une epice nouvelle; mais il oublie que Drury n'a pas connu un seul impdoptère de ce pays, et que dans la figure donnée par cet entenologiste, l'abdomen n'offre aucune tache, tandis que dans ce- qu'il représente, il y a une raie dorsale noire intérrompne et les taches latérales de la même couleur. Si c'est une espèce partière, nous engageons le savant M. Grote à lui laisser le nom couleurs, comme il le propose.

Cette espèce est commune dans plusieurs états de l'Amérique 21 Nord; elle varie beaucoup pour la teinte et pour l'intensité 22 dessin noir. Malheureusement elle est très-sujette à tourner es gras, de sorte que les taches de l'abdomen disparaissent. Tel 221 peut-être le cas de l'exemplaire qui a servi de modèle à 1917.

## 59. S. INEXACTA.

Mecrosila inexacta, Walker, Heterocera, p. 208, 14.

Nons ne connaissons pas ce Sphinx qui, selon M. Walker, est de mile moyenne. Il est en dessus d'un brun-obscur ferrugineux, d'unchitre en dessous.

L'abdomen offre trois rangées de taches d'un brun noir, dont se dorsale. Les supérieures sont d'un brun noirâtre avec quelques gros points irréguliers plus obscurs, plus ou moins fondus avec la teinte générale; outre cela, le bout des nervures est un peu grisâtre chez les individus bien frais.

Les alles inférieures sont d'un jaune-fauve vif avec une bordure noire assez large.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, sans auoune tachte.

L'abdomen a, sur chacun de ses côtés, cinq à six taches noires transversales, coupées par des anneaux étroits d'un gris pâle, placés dans les incisions.

Le dessous des ailes est brun avec le disque d'un jaune un peu fauve.

Nous l'avons reçu de Cayenne.

Mérian donne, pl. 62, fig. 2, une figure grossière qui pourrait bien appartenir à ce Sphingide. Elle représente la chenille sur le Carica papaya. Celle-ci paraît être brunâtre avec les côtés variés de blanchâtre; la queue est très-arquée, blanchâtre; sur le troisième anneau, elle a une plaque écailleuse noire transversale.

## 4. A. CAHUCHU. Boisd.

Il a le port et la taille de l'Alope, mais ses ailes sont un peu moins fortement dentelées.

Les supérieures sont brunâtres vers leur bord interne et vers la région anale, d'un gris roussâtre vers l'extrémité ainsi que du côté antérieur et basilaire; outre cela, elles ont, avant le bord terminal, des raies ou stries longitudinales courtes, parallèlez, plus claires que le fond, et marquées chacune de deux petits points noirs allongés; tout à fait près de la frange il existe aussi quelques traits noirs; il y a encore sur la côte deux ou trois taches brunes qui sont les rudiments de bandes transversales.

Les ailes inférieures sont d'un beau jaune d'ocre avec une bordure noire, plus étroite que dans *Alope*, marquée à l'angle anal de deux petits traits grisatres obsolètes.

Le corselet participe de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est gris avec deux petites lignes dorsales noirâtres, parallèles; sur les côtés, le milieu des anneaux est un peu brun avec les intervalles grisâtres. Le ventre est d'un blanc légèrement vineux.

Le dessous des ailes est brun avec le bord interne des supéneures et toute la région abdominale des inférieures d'un jaune forre.

Nous ne connaissons pas la chenille qui, selon Beske, vit sur le caoutchou, probablement le Siphonia elastica, qui a pour sympyme le Siphonia cahuchu.

L'insecte parfait est rare. - Coll. Bd.

#### 5. A. CARICAL

Line. Mus. Ind. Ulric. p. 330, 10. — Clerck, Icon. tab. 47, f. 1. — Fib. Ent. Syst. part. I, p. 378, 67. — Sphinx Cacus, Gram. 46, E. — Fib. Ent. Syst. 361, 18.

Luné a donné le nom de caricæ au Sphingide dont il va être postion, en y rapportant, à tort, comme type, une mauvaise irure de l'ouvrage de M<sup>110</sup> de Mégian, qui ne représente nullement l'aspèce décrite par lui dans son Mus. Lud. Ulric., et figurée par Clerch avec les ailes assez fortement dentées. Le Sphinx rementé avec sa chenille, par Mérian, sur le Carica papaya, n'a same ressemblance avec le Cacus de Cramer, qui est bien idenque avec le caricæ de Linné.

Il est de la taille d'un petit Ach. Atropos. Ses ailes sont un per dentelées; les supérieures sont d'un brun-noirâtre brillant, vet des raies courbes, transversales, bien écrites, un peu onnées, de couleur noire; à la place du stigmate il y a une petite ache annulaire de la même couleur; on voit en outre, tout à la base, près du bord interne, un faisceau de poils blancs.

Les siles inférieures sont d'un jaune d'ocre, avec des rayons zirs qui s'étendent depuis la frange jusqu'au-delà du milieu; angle anal est noir, coupé par deux petites lignes grisâtres.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

Labdomen est gris en dessus, annelé sur les côtés, alternatirement de noir et de blanc grisâtre; outre cela, il offre à sa base, se le dos, une petite bande noire transversale, suivie d'une pete raie étroite de la même couleur; on voit encore sur chaque r'é une petite touffe de poils blanchâtres.

Le dessous des ailes est grisâtre, avec le disque largement d'un sans d'ocre.

La chemille, dont nous n'avons vu aucun dessin, a été élevée L'Gyenne par M. Lacordaire et par M. Année, sur des ApocyLes supérieures sont d'un brun noirâtre ave points irréguliers plus obscurs, plus ou moins teinte générale; outre cela, le bout des nervures sâtre chez les individus bien frais.

Les ailes inférieures sont d'un jaune-fauve wi dure noire assez large.

Le corselet est de la couleur des ailes supéri oune tachte.

L'abdomen a, sur chacun de ses côtés, cinq à transversales, coupées par des anneaux étroits placés dans les incisions.

Le dessous des ailes est brun avec le disque d' fauve.

Nous l'avons reçu de Cayenne.

Mérian donne, pl. 62, fig. 2, une figure grossit bien appartenir à ce Sphingide. Elle représente le Carica papaya. Celle-ci paraît être brunâtre variés de blanchâtre; la queue est très-arquée, bi troisième anneau, elle a une plaque écailleu versale.

## 4. A. CAHUCHU. Boisd.

Il a le port et la taille de l'Alope, mais ses ai moins fortement dentelées.

Les supérieures sont brunâtres vers leur bord la région anale, d'un gris roussâtre vers l'extrém côté antérieur et basilaire; outre cela, elles ont, terminal, des raies ou stries longitudinales cou plus claires que le fond, et marquées chacune points noirs allongés; tout à fait près de la frang quelques traits noirs; il y a encore sur la côte d ches brunes qui sont les rudiments de bandes tra

Les ailes inférieures sont d'un beau jaune d bordure noire, plus étroite que dans *Alope*, mas anal de deux petits traits grisâtres obsolètes.

Le corselet participe de la couleur des premièr L'abdomen est gris avec deux petites lignes der parallèles; sur les côtés, le milieu des anneaux es avec les intervalles grisâtres. Le ventre est d'ument vineux. us des ailes est brun avec le bord interne des supétoute la région abdominale des inférieures d'un jaune

connaissons pas la chenille qui, selon Beske, vit sur m, probablement le Siphonia elastica, qui a pour sy-Siphonia cahuchu.

parfait est rare. - Coll. Bd.

#### 5. A. CARICÆ.

i. lud. Ulric. p. 350, 10. — Clerck, Icon. tab. 47, f. 1. — yst. part. I, p. 378, 67. — Sphinx Cacus, Cram. 46, E. — yst. 361, 18.

donné le nom de caricæ au Sphingide dont il va être en y rapportant, à tort, comme type, une mauvaise ouvrage de M<sup>110</sup> de Mézian, qui ne représente nullece décrite par lui dans son Mus. Lud. Ulric., et figurée tvec les ailes assez fortement dentées. Le Sphinx rece sa chenille, par Mérian, sur le Carica papaya, n'a emblance avec le Cacus de Cramer, qui est bien idene caricæ de Linné.

a taille d'un petit Ach. Atropos. Ses ailes sont un s; les supérieures sont d'un brun-noirâtre brillant, s courbes, transversales, bien écrites, un peu on-tleur noire; à la place du stigmate il y a une petite s de la même couleur; on voit en outre, tout à près du bord interne, un faisceau de poils blancs. Frieures sont d'un jaune d'ocre, avec des rayons ment depuis la frange jusqu'au-delà du milieu; poir, coupé par deux petites lignes grisâtres.

de la couleur des ailes supérieures.

gris en dessus, annelé sur les côtés, alternatit de blanc grisâtre; outre cela, il offre à sa base, e tite bande noire transversale, suivie d'une pela même couleur; on voit encore sur chaque effe de poils blanchâtres.

les est grisatre, avec le disque largement d'un



nées du genre *Plumieria*. Nous ne savons pas si elle vit sur le Carica.

Le caricæ habite Cayenne et Surinam. — On le reçoit bien moins souvent que les espèces congénères. — Cell. Bd.

Fahricius a décrit deux fois ce Sphingide; une première fois sous le nom de Cacus, d'après Cramer, et une seconde, sous celui de caricæ, en copiant la phrase de Linné.

### 6. A. PEDILANTHI. Boisd.

Il est un peu plus petit qu'un Ch. elpenor. Ses ailes supérieures sont d'un brun-grisâtre brillant, avec des nuages noirâtres à la base et sur la côte; il existe en plus, au-dessus de l'angle anal, une bande longitudinale noire, courbée en quart de cercle; outre cela, la plupart des nervures, principalement vers l'extrémité, sont blanches, très-pointillées de noir.

Les ailes inférieures sont d'un joli jaune d'ocre, avec une bande noire marginale, marquée à l'angle anal de deux petits traits grisâtres.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures avec deux petites crêtes relevées sur sa partie antérieure; les épaulettes sont un peu bordées de noir.

L'abdomen est gris, avec des anneaux noirs coupés par la raie

Le dessous des ailes est grisatre, avec tout le disque des inférieures et le bord interne des supérieures jaune d'ocre.

Feu Année a élevé la chenille de cette jolie petite espèce, à Cayenne, sur une Euphorbiacée du genre *Pedilanthus*, dont il ignorait le nom spécifique.

Cayenne. — Rare. — Coll. Bd.

### 7. A. MENECHUS. Boisd.

Ménétriés, Enum. corp. anim. mus. Petrop. p. 91, 1497.

Il est plus petit qu'Ello. Ses ailes supérieures un peu arrondies au sommet, sont panachées de blanc et de brun; cette dernière couleur forme à la base, près de la côte, une grosse tache oblongue, au milieu, deux espèces de bandes confondues inférieurement, et, enfin, un peu avant le sommet, une autre hande un peu effacée avant d'arriver au bord interne; les nerrures de l'extrémité sont blanches, coupées par cette dernièrehande.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocre, avec une trèsarge bordure noire, marquée à l'angle anal d'un espace cendré, oupé par un petit trait noirêtre.

Le corselet est d'un blanc grisatre, avec le collier brun.

L'abdomen est gris, avec des anneaux bruns, non interrompus. Le dessous des ailes est brun avec le bord interne des supéneures et le bord abdominal des inférieures d'un jaune d'ocre.

cette petite espèce a été élevée de la chenille, à Cayenne, par

Call. Bd.

#### 8. A. LEACHII.

Swains, Zoolog. illustr. part. I, pl. 15.

li est de la taille d'Alope, et très-voisin du Menechus, dont il n'est peut-être qu'une grande variété Brésilienne. Ses ailes su-jeneures offrent le même dessin. Les ailes inférieures sont d'un aune d'ocre avec la bordure de moitié moins large; l'espace endré de l'angle anal est coupé par deux petits traits noirs panièles. Le corselet est marqué sur les épaulettes de deux peutes lignes noires. Le collier est brun comme dans le Menechus; le anneaux de l'abdomen sont noirs et non brunâtres, un peunterrompus par la raie dorsale.

Le dessous des ailes est largement d'un jaune d'ocre sur leur isque jusqu'à la côte.

Beske élevait cette espèce de la chenille; car presque tous ses caus renfermaient quelques beaux individus de cet Anceryx.

Coll. Bd.

#### 9. A. RIMOSA.

Grote, Proceedings of the Entomol. Society of Philad. vol. V, no 1, p. 71, pl. II, f. 1. — Andæ, Boisd. M.

Il a le port et la taille du Leachii et du papayæ. Ses ailes sont dentées, avec les échaucrures alternativement brunes et blanches; le supérieures sont blanches, variées et panachées de brun noir; cette couleur forme à la base, près de la côte, une grosse tache, et rers le centre, des bandes irrégulières réunies au milieu et en bes par un gres trait également d'un brun noirâtre; on voit

encore, à l'extrémité vers le milieu du bord terminal, une bande transversale, noire, très-courte.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocre, avec une bordure noire, qui se prolonge un peu en petits rayons sur les nervures; l'angle anal est cendré, coupé par une ligne noire.

Le corselet participe tout à fait de la couleur des premières ailes ; le collier est brun

L'abdomen est d'un gris-cendré blanchâtre, avec des anneaux d'un noir profond interrompus par la raie dorsale.

Le dessous des ailes est d'un jaune d'ocre, avec la côte et les contours d'un brun pâle.

ll se trouve à Cuba, à Haïti et au Brésil. -- Coll. Bd.

## 10. A. PAPAYÆ. Boisd.

Il est de la taille d'un Alope et assez voisin du Menechus, par sa couleur. Comme ses ailes sont assez fortement dentées, il serait possible que ce fût cette espèce que Mile de Mérian a voulu représenter sur sa pl. 64, au lieu du caricæ de Linné.

Les ailes supérieures sont d'un blanc un peu grisatre, panachées, et comme fasciées de noirâtre; cette couleur forme, vers le milieu de la base, un gros trait court, longitudinal; près du milieu du bord terminal il y a en outre quelques taches alignées en forme de bande courte, également noirâtres.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ore avec une large bordure noire, marquée à l'angle anal d'un espace cendré coupé par deux petits traits noirs parallèles.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures. Il n'y a pas de collier brun.

L'abdomen est gris, avec des anneaux bruns, interrompus par la raie dorsale.

Le dessous des ailes est d'un brun grisâtre, avec la moitié abdominale des inférieures d'un jaune d'ocre. Le ventre est d'un gris-blanchâtre un peu vineux.

Nous sommes redevable de cette espèce à Année, qui en a élevé la chenille à Cayenne sur le Garica papaya.

## 11. A. PELOPS. Boisd.

Il a le port du Menechus. Ses ailes ne sont que faiblement

denière conleur forme trois taches sur la côte, dont celle placée près de la base et la troisième, sont plus grandes et plus foncées; la uche intermédiaire est réunie à une raie transversale qui n'en est que la continuation; entre cette raie, il y a aussi à l'angle interne trois ou quatre petites lignes transversales, noires, onduires, parallèles; on voit encore au-dessous de la troisième tache estale un espace longitudinal roussatre, que l'on n'observe dans nœune des espèces voisines; les nervures de l'extrémité sont blanches pointillées de noir, comme ches les Anceryæ du même rroupe.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocre, avec une très-large brdure noire et un petit espace cendré à l'angle anal.

Le corselet participe de la couleur des premières ailes; il offre me petite ligne noire transversale sur le prothorax.

L'abdomen est gris, avec des annesux noirs interrompus par la nie dorsale.

Le dessous des ailes est brun, avec le dessous des inférieures à couleur jaunâtre.

Nous ignorons la patrie de cette espèce qui nous a été généreusment offerte par M. de l'Orza.

Note. Les sept espèces qui précèdent ont toutes les ailes supérœures mélangées et comme panachées de blanc et de noir, avec les ailes inférieures d'un jaune d'ocre, ce qui, au premier coup d'eil, leur donne une certaine ressemblance. Pour arriver à leur étermination exacte, nous recommandons d'examiner avec soin les caractères que nous avons exposés. Nous avons essayé de le lure du mieux qu'il nous a été possible. Nous nous estimerons beureux si nous y sommées parvenu.

# 12. A. Excelsion

Cette grande espèce est au moins de la taille d'un Sph. rustics. Ses ailes supérieures très-faiblement dentelées sont d'un brun tecur, depuis la base jusqu'au-delà du milieu, ensuite blanches, unées de noirâtre; entre la base et le milieu, il y a une réunion le traits blancs, irréguliers, qui forment une espèce de tache mélangée de brun; le stigmate et noir, suivi d'une rouse tache costale blanche, marquée d'un point noirâtre; la parte blanche de l'extrémité est variée et sablée de brunâtre; elle

offre en outre, non loin du sommet, une raie noirâtre, oblique, qui va de la côte au milieu du bord terminal.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocre, avec une large bordure noire, marquée à l'angle anal d'un petit espace cendré, coupé par deux petites lignes noires.

La tôte et le corselet sont entièrement bruns.

L'abdomen est gris, avec des anneaux noirs interrompus par la raie dorsale; outre cela, les incisions sont liserées de blanc; le ventre est blanc marqué de six points noirs.

Le dessous des ailes est brun, avec le bord interne des supérieures, et les trois quarts des inférieures jaune d'ocre.

Nous avons eu cette espèce de feu Becker, qui ne savait pas ou qui ne se rappelait plus de quelle partie de l'Amérique méridionale il l'avait reçue.

#### 13. A. MERÍANÆ.

Grote, Proced. of the Ent. Soc. of Philad. vol. V, no 1, p. 75, pl. II, f. 2.

Anceryx omphalex, Boisd. Consid. sur les Lép. du Guatemala, p. 72.

Il est de la taille de l'Anceryx Ello. Ses ailes supérieures sont dentées, d'un brun noirâtre avec des taches d'un gris blanchâtre, disposées ainsi : une petite à la base, appuyée en arrière sur un faisceau de poils blanchâtres, une autre petite sur le milieu de la côte, une allongée, elliptique, au sommet, et enfin, la quatrième, assez grande, située sur le milieu du bord interne, se terminant à l'angle anal, en forme d'aile d'oiseau.

Les ailes inférieures sont d'un roux ferrugineux avec une bordure brune de médiocre largeur, et l'angle anal un peu cendré.

Le conselet est d'un brun noirâtre bordé largement, jusqu'à l'insertion des secondes ailes, par du gris blanchâtre; l'écusson est de cette dernière couleur.

L'abdomen est d'un gris cendré avec des anneaux noirs, interrompus par la raie dorsale.

Le dessous des ailes est grisatre avec le disque ferrugineux et la région abdominale des inférieures blanche.

Ce beau Sphingide a été élevé de chenille par Beske, sur un Omphalea, mais nous ignorons si c'est sur le lactescens on une autre espèce Brésilienne.

il est rare. M. de L'Orza en a reçu un très-mauvais exem-

plaire dans un envoi de Nicaragua. M. Poey l'a aussi découvert à Caba.

Coll. Bd.

#### 14. A. LASSAUXII. Boisd.

Il est un peu plus grand que l'Anceryx Ello-et a tout à fait le port du Merianæ. Ses ailes supérieures sont dentées, d'un brus-neir enfumé, avec des taches grisàtres disposées ainsi : une petite très-obsolète sur le milieu de la côte; une allongée, elipique au sommet, comme dans Merianæ, et une troisième ases grande, située sur le milieu du bord interne, se terminant en forme d'aile d'oiseau à l'angle anal, comme nous en voyons un exemple dans notre Noctua pinastri.

Les ailes inférieures sont entièrement noires avec un espace cendré à l'angle anal.

le corselet est brun, bordé jusqu'à l'insertion des secondes siles, per du gris.

L'abdomen est d'un gris obscur avec des anneaux très-noirs, interrompus par la raie dorsale; les intervalles qui les séparent sont plutôt blancs que gris.

Le dessous des ailes est brun avec la région abdominale des mérieures blanche.

Décrit sur une espèce unique que nous avons reçue du nord du Brésil, de M. Lassaux (1). Ce naturaliste avait trouvé la chenille sur une espèce de Rutacées qui croît au bord des eaux.

C'est la seule espèce d'Anceryx, à notre connaissance, dont les siles inférieures ne seient ni d'un jaune d'ocre ni ferrugineuses.

Abdomen sans anneaux noirs. Ailes inférieures ferrugineuses.

#### 15. A. ŒNOTRUS.

Cramer, 301, C. — Grote, Proced. of Ent. Soc. of Philad. p. 77, pl. II, f. 3.

Il est à peu près de la taille d'Ello, mais ses ailes sont plus

(i) Lassaux, élève du jardin des Plantes, était un naturaliste plein d'avenir qui a enrichi le Muséum d'Histoire naturelle de plusieurs animaux très-rares et les serres de plantes d'un haut intérêt. Victime, comme tant d'autres, de son zèle pour les sciences, la mort l'a enlevé il y a peu d'années dans la force de l'âge, à sa famille et à ses amis-

fortement dentelées avec les échancrures grisativieures sont d'un brun noirâtre varié d'un peu (quelques raies transversales plus obscures, fondu générale; elles ont, en outre, vers l'angle anal, tache grisatre mai définie, imitant grossièrement seau comme dans Alope.

Les ailes inférieures sont d'un roux ferrugineur dure noirâtre, de moyenne largeur, qui se prolon; forme de rayons, sur les nervures, quelquefois j du disque.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieur deux lignes brunes, parallèles, qui se font sentir. I qu'à l'extrémité de l'abdomen; celui-ci est gris au d'un cendré blanchâtre, très-peu indiquées.

Le dessous des ailes est brunâtre avec le disque ferrugineux, et deux petites raies transversales râtres.

Cayenne, Antilles, Brésil. — Plus rare qu'Ello. de chenille sur le manioc.

Coll. Bd.

## 16. A. MELANCHOLICA.

Grote, Procedings of Ent. Soc. of Philadelph. vol. V,

Il a tout à fait le port de l'Œnotrus, dont il est, voisin, mais ses ailes supérieures sont sensiblemes et plus pointues au sommet. Elles sont d'un brun mâle et un peu plus grisâtres dans la femelle comme dans Œnotrus et espèces voisines, sur le terne, une espèce de tache grisâtre en aile d'oises

Les ailes inférieures sont aussi d'un ferrugis avec une bordure noirâtre, assez étroite, précédée nervures noires un peu obsolètes.

Le corselet est d'un brun noirâtre avec une raie les épaulettes.

L'abdomen est d'un gris brunâtre, marqué dorsales parallèles, bien distinctes, d'une couleur

Le dessous des ailes ressemble beaucoup à ce il est de même brunâtre avec le disque rougeâtre

Cette espèce paraît être asses commune à Haïti aussi à Cuba et au Brésil. — Coll. Bd.

#### ANCERYK.

#### 17. A. JANIPHÆ. Boisd.

Il est à peu près du port du Ch. Celerio. Ses ailes émtelées, sont allongées, un peu étroites, d'un brés taches d'un gris roussâtre, dont deux petites, m presque nulles sur la côte, une bien marquée et res le sommet, et enfin, une autre un peu en d'oiseau, située vers l'angle anal, comme dans plu espèces du même genre.

Les ailes inférieures sont d'un roux ferrugineux a dare brunâtre assez étroite, marquée à l'angle a space cendré.

Le corselet est brun, bordé latéralement de blan L'abdomen est gris avec deux lignes dorsales l

Le dessous des ailes est ferrugineux sur le di contours brunâtres.

La poitrine est blanche ainsi que le ventre, qui buit petits points noirs.

lecrit sur un individu mâle que nous avons reç Nous avons donné à cette espèce le nom de jar Exposition que sa chenille pouvait vivre sur le Emboldt et Bonpland on fait le genre Janipha.

Call. Bd.

#### 18. A. RHÆBUS.

Boisd. Consid. sur les Lépid. du Guatemala, p. 72

Rest un peu plus petit que le Ch. Celerio, et uque l'obscura. Ses ailes supérieures simplement d'un gris cendré, striées de brun, avec deux te ses bande longitudinale d'un brun noir; cette 1 un peu au-dessous du milieu et s'étend de la ba de elle devient un peu rameuse.

Les ailes inférieures sont d'un roux-ferrugine petite bordure brune du côté de l'angle anal.

Le corselet est brun, largement bordé par une se commence au-dessus des yeux.

L'abdomen est d'un gris très-légèrement v

Le dessous des ailes est ferrugineux sur le disque, l'extrémité; la région abdominale des inférieures es ventre est blanc, marqué de chaque côté de quatre petit

Décrit sur des individus ex larva, que nous av Mexique et de Honduras. C'est l'espèce la plus éléga Coll. Bd.

19. A. PIPERIS. Boisd.

Sphina: Penasus? Fab. Knt. Syst. III, 1, p. 360, 15.

C'est peut-être cette espèce que Fabricius a décr lection du D' Hunter; nous sommes assez porté à la en fussions-nous certain, que nous n'adopterions ; le nom de *Penœus*, appliqué antérieurement par ( autre Sphingide du genre *Zonilia*.

Il est à peu près de la taille d'un petit exemplai ailes supérieures assez fortement dentées, sont st sur un fond d'un cendré blanchâtre; elles ont, à lieu de la côte, une bande oblique noire, un peu in va se terminer à l'angle anal, puis en dehors, éga côte, une grosse tache du même noir.

Les ailes inférieures sont d'un rouge ferrugine bordure brunâtre assez large, marquée vers l'any espace cendré.

Le corselet est grisâtre, marqué de quelques lis longitudinales.

L'abdomen est d'un gris vineux, avec les annplus foncés, et une double ligne dorsale brune.

Le dessous des ailes est ferrugineux, avec les contor la région abdominale des inférieures est blanche.

Brésil. — Rare. — Coll. Bd.

Beske, qui a élevé cette espèce, nous a dit av chenille sur le *poivre*. Mais qu'entendait-il par ce 1 était-ce véritablement une des nombreuses espè Piper ou bien un Capsicum?

#### 20. A. OBSCURA.

Fab. Ent. Syst. III, p. I, p. 361, 17. — Sphinæ Sthene Saml.

Fabricius n'a connu que la femelle. Il est un p

que notre Ch. Porcellus. Ses alles supérieures sont d'un gris blanc comme dans la femelle d'Ello; elles offrent, principalement sur la côte, les traces de bandes transversales brunâtres, trèscfacées. Dans le mâle, au contraire, qui est beaucoup moins blanchâtre, les bandes brunes sont très-accusées; chez le mâle comme chez la femelle il y a un très-petit point noir vers le milieu de la côte.

Les ailes inférieures sont d'un rouge un peu ferrugineux, sans bordure dans le mâle, avec une petite bordure brunâtre chez la femelle; chez l'un et l'autre sexe on voit un petit espace cendré l'angle anal.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est entièrement gris sans trace d'anneaux.

Le dessous des quatre ailes est ferrugineux. Le ventre est blane, et marqué, comme le dit Fabricius, de chaque côté de quatre petits points noirs.

Ce petit Anceryx est très-commun aux Antilles. M. Hornbeck Elevait en quantité à Saint-Thomas sur le Jatropha manihot.

Commun. Coll. Bd.

Les figures de ce Sphingide dans l'ouvrage d'Hubner, sont d'une matitude parfaite.

#### 21. A. GUTTULALIS.

Walker, Heterocera, VIII, p. 227. — H.-Schzeff. Corresp. Blatt, p. 60. — Grote, Proced. of the Ent. Society of Philad. p. 79.

Nous ne comaissons qu'un seul exemplaire de cette espèce qui est à peu près de la taille de l'obscura.

Ce petit Anceryx est gris en dessus et blanchâtre en des-

La tête et la partie antérieure du corselet sont marquées d'une ligne médiane brune, un peu obsolète.

L'abdomen est d'une teinte très-légèrement lilacée, avec une le dorsale blanche, très-peu marquée.

Les ailes supérieures offrent une ligne médiane, longitudinale, airâtre, et plusieurs petites taches de la même couleur, assez sen indiquées.

Les ailes inférieures sont brunes, avec la base légèrement ferngineuse. Le dessous des ailes est d'un brun pâle; celui des inférieures est blanc à la base et le long du bord interne.

La frange est blanche.

Saint-Domingue. Walker. British museum. — Cuba. Museum Nation.

### 22. A. Pallida.

Grote, Proced. of Ent. Societ. of Philad. vol. V, nº 1, p. 78, pl. I, f. 6. — A.? Suillus, Boisd. M.

Nous ne sommes pas très-certain que cette espèce soit ici parfaitement à sa place, quoique nous l'ayons toujours mise dans notre genre Ancerux.

Elle est à peu près de la taille de l'obscura (Stheno Hubn.). Ses ailes supérieures sont d'un gris cendré uniforme, avec une strie longitudinale, obsolète, noirâtre, et quelques petites taches brunâtres très-peu indiquées à l'extrémité des nervures.

Les ailes inférieures sont brunes, un peu plus obscures à l'extrémité, avec la région anale assez largement blanchâtre.

Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est d'un blanc cendré, avec l'apparence de deux raies dorsales un peu plus foncées.

Le dessous des ailes supérieures est cendré; celui des inférieures est presque entièrement blanc.

Décrit sur un individu mâle que nous devons à l'obligeance de feu Sommer d'Altona, qui l'avait reçu de la Havane.

Rare. - Coll. Bd.

Nous lui trouvons de grands rapports avec le guttulalis, et ce n'est qu'avec doute que nous le décrivons comme une espèce propre.

# GENRE PACHYLIA. Boisd. — Ménétriés. — Sphinx auctorum.

Chenilles: A peu près inconnues, sauf celle du ficus, qui est verte, striée transversalement de jaune, avec la tête et l'extrémité anale noires, ainsi que la corne du onzième segment, qui est arquée de longueur moyenne.

Insecte parfait : Antennes longues, un peu grêles, terminées par un crochet très-prononcé. Palpes couverts de poils

sarés; leur second article bien distinct, fortement appliqué sar le front. Trompe au moins aussi longue que le corps. Yeux gros et saillants. Corselet très-robuste. Abdomen cylindrico-conique, terminé dans le mâle par un petit pinceau ansi. Ailes larges sans dentelures; les supérieures toujours un peu arquées à leur angle anal.

Les Pachylia sont propres aux régions intertropicales de l'Amérique.

### P. Robusta.

### Oryca robusta, Walker, Heterocera, p. 197, 1.

Ce Sphingide est l'un des plus beaux de la création. Il a 14 centimètres 1/2 d'envergure. Ses quatre ailes sont larges, sans deutelures, d'un vert olive; les supérieures ont sur leur milieu m grand espace trapésoide d'un vert olive très-foncé, s'étendant de la côte au bord interne; cet espace est limité, du côté de la base, par une raie droite d'un blanc-violâtre, et en dehors par une bande transversale de la même couleur, plus large du côté de la côte, et suivie elle-même d'une ligne noire transversale, très-peu ondulée; avant l'extrémité de l'aile, il y a une bande brune, arquée, dont la convexité est tournée en dedans, qui s'étend de l'angle apical à l'angle interne; le fond compris entre la concavité de cette bande et la frange est d'un gris-olive cisir.

Les ailes inférieures sont traversées par deux bandes noires, dont l'antérieure plus étroite et la postérieure sablée de grisviolètre du côté de l'angle interne; la frange de la gouttière abdominale et celle de l'angle anal sont d'un jaune-orangé vif.

Le corselet est d'un beau vert-olive, ainsi que l'abdomen; celui-ci est court, un peu obtus, marqué vers la base, sur chacun de ses côtés, de deux gros traits noirs longitudinaux, puis de seux taches d'un beau jaune, séparées par un trait noir transversal; outre cela, un peu avant l'extrémité, sur l'antépénul-tème anneau, il existe une large ceinture d'un brun-marron fracé; les côtés, près du ventre, sont d'un rouge minium avec une rangée de petits fascicules jaunes.

Le dessous du corps et des ailes sont d'un rouge brique avec des raies transversales noires.

Décrit sur un individu femelle ex larve que nous avons reçu

du Brésil. Nous nous rappelons en avoir vu un second exemplaire dans la collection de M. Marchand, à Chartres, provenant, nous a-t-il dit, d'un achat qu'il avait fait chez M. Buquet. — Très-rare.

Ce beau Sphingide, avec ses quatre ailes concolores, pourrait à la rigueur former, avec l'Achemenides, un sous-genre particulier.

#### 2. P. ACHEMENIDES.

### Cramer, 225, F. C.

Nous n'avons jamais vu cette espèce; notre description est faite sur la figure qu'en a donnée Cramer.

Il est de la taille des plus petits individus de ficus. Ses ailes supérieures ont le bord terminal un peu concave; elles sont brunes, couvertes de poils verdâtres, avec deux raies transversales noirâtres, droites, dont une entre la base et le milieu, et l'autre vers le bout de la cellule discoïdale; outre cela, l'extrémité est largement noirâtre et nettement coupée, près de la frange, par une large bordure d'un brun roux, un peu en croissant.

Les alles inférieures sont de la couleur des supérieures avec un bout de bande noirêtre sur leur angle externe.

Le corselet est tout à fait de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est raccourci, obtus, brunâtre, avec trois taches latérales d'un blanc-grisâtre, coupées transversalement de chaque côté par deux bandes noires.

Le dessous des ailes, selon Cramer, est d'un jaune-brunâtre, avec deux bandes transverses plus obscures et une teinte olivâtre vers leur bord extérieur.

Surinam.

### 3. P. Fious.

Clerck, 40, f. 2. — Linné, Mus. lud. ulr. 383. — Cramer, 246, E. — Drury, Ins. II, 28, 1. — Fabr. etc. — Variété *Crameri*, Ménétr. Enum. corp. animal. Mus. Petr. Part. II, p. 133. — *Ficus* femelle, Cram. 394. Var.

Il varie beaucoup pour la taille; il y a des individus de certaines provenances qui n'ont pas plus de 9 centimètres d'envergure, tandis que très-souvent, dans d'autres régions, ils atteignent jusqu'à 14 centimètres, Le Ficus est très-commun, il fait partie des collections les plus modestes, et a été figuré et décrit par une foule d'auteurs.

Ses ailes supérieures sont d'une teinte olivâtre tirant sur le jeunâtre, avec des lignes transversales ondulées noirâtres, plus et moins distinctes, ou presque fondues dans la teinte générale; le sigmate est noir, à peine pupillé de jaunâtre; l'extrémité de la côte, vers le sommet, est toujours marquée d'une tache presque ovalaire, ou triangulaire, blanchâtre, bien tranchée.

Les ailes inférieures sont d'un jaune sale, terreux, avec l'extrémité et une bande médiane noires; ce qui distingue surtout « Sphingide de toutes les espèces connues, c'est une petite saillie de l'angle anal marquée, dans toutes les variétés, d'une petite tache d'un blanc de neige.

Le corselet et l'abdomen sont de la couleur des ailes supérieures; celui-ci offre quelquefois, sur le côté des premiers anneux, les traces de bandes transversales noirâtres.

La chenille, dont nous n'avons vu aucun dessin, quoiqu'elle sit fort commune sur plusieurs espèces de figuiers, est, d'après lician, de couleur verte striée transversalement de jaune, avec la tète, le premier anneau et la partie anale noirs; la corne est sorte et arquée.

On rencontre souvent une variété de Ficus dont les deux sexes set entièrement d'un brun-noirâtre sur le corps et sur les quatre ales; mais cette variété conserve toujours sa tache blanchâtre au sommet des ailes supérieures et la petite tache blanche sur la punte anale des inférieures. Cramer l'a figurée pl. 394, comme Ficus femelle; Hubner, dans son Catalogue, lui donne le nom de Sycs et le place dans son Coitus Enyo à côté de Japix, de Pylas, tadis qu'il met le Ficus typique dans son Coitus Pholus avec Cranter et strigitis!! Ménétriés en a fait, aussi sans raison, une espèce sous le nom de Charocampa Crameri, et M. Grote sous celui d'inormala.

Ce Sphingide est commun dans toute l'Amérique méridionale et sux Antilles. Il varie beaucoup pour la couleur, chez les deux sues. Beake, qui l'a élevé souvent au Brésil, a obtenu de la même chemille, tantôt des individus olivâtres et tantôt des individus acirs et quelquefois des exemplaires complétement intermédiares.

### 4. P. TRISTIS. Boisd.

Ménétriés, Catal. corp. anim. Mus. Petrop. Part. I, p. 91, 1510. Pachylia resumens, Walker, Heterocera, p. 190, 2.

Il est de la taille des plus petits individus de Ficus, dont il a le port. Ses ailes supérieures sont grisâtres avec quelques lignes brunâtres ondulées, plus ou moins bien marquées, et quelques ombres olivâtres dont une s'étend sous forme de bande oblique, du milieu de la côte à l'angle interne, près duquel on remarque deux ou trois points noirs; le stigmate est très-petit et noir; outre cela, le bord terminal est un peu d'un gris-blanchâtre.

Les ailes inférieures sont d'un gris-jaunâtre terreux avec une large bande médiane noire ainsi que la bordure, depuis l'angle externe jusqu'au milieu, où elle s'éteint bien avant l'angle anal.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est grisatre avec les côtés légèrement rosés chez les exemplaires très-frais; les incisions des trois premiers anneaux sont noires, principalement sur les côtés.

Dans les femelles, le dessin du dessus des ailes supérieures est moins accusé, et les incisions noires de l'abdomen sont moins bien accentuées sur le dos.

Le dessous des ailes est d'un gris-roussâtre avec trois lignes obsolètes, transversales, noirâtres, très-fines et très-ondulées sur les inférieures; il y en a quatre sur les supérieures, dont la dernière, très-anguleuse, est précédée en dedans d'une teinte un peu rougeâtre.

La chenille, selon Beske, vit sur les Fious. L'insecte parfait est très-commun au Brésil et à Cuba.

### 5. P. INCONSPICUA.

Walker, Heterocera, p. 190, 3.

Nous ne connaissons pas cette espèce, qui est à peu près de la taille du tristis.

ll est brun en dessus et testacé en dessous.

L'abdomen est marqué de deux rangs de taches noires, et en plus, vers la base, de deux bandes interrompues de la même couleur.

Les ailes supérieures offrent trois lignes obliques ondulées,

xirâtres; outre cela, la couleur du fond est un peu plus intense extre la troisième ligne et le bord extérieur.

Les ailes inférieures sont un peu plus pâles que les supérieures avec deux raies d'un brun foncé, l'une sur le disque et l'autre sur le bord marginal; il y a encore entre ces deux raies une lime endulée obscure.

Jamaique. — Collection de M. Saunders. — Walker.

GENRE ZONILIA. Boisd. — Walker. — Ménétriés. — Moore. — Sphinx auctorum.

Chenilles: Atténuées antérieurement, de couleur verte re brune, pointillées, munies d'une corne sur le onzième mnesu, et marquées de quelques traits obliques sur les côtés.

Insecte par ait: Antennes de longueur moyenne, terminées par une petite pointe légèrement recourbée en crochet. Trompe de la longueur du corps. Palpes ascendants, couverts de petits poils fins, très-serrés, avec leur second article recourbé et collé sur le front. Abdomen pointu, le plus ordinairement fascié de noir et d'une couleur pâle. Ailes supérieures sans dentelures, à bord interne droit, généralement marquées, au moins dans l'un des sexes, d'un signate double ou triple, d'un blanc d'argent, ou d'une bande transversale blanchâtre située au-delà du milieu.

Les Zonilia sont propres au continent indien, aux îles de l'Afrique et à la côte de Guinée. Leur couleur est le vertaire foncé, le vert bronzé ou le marron.

#### 1. Z. MORPHEUS.

Sphina idem, Gramer, 149, D. — Zonilia Morpheus, Walker, Hist. Lepid. Mus. Heter. VIII, p. 194. — Moore, Catal. of Lepid. of Ind. : up. p. 269, 619.

Sphar Hespera, Fab. Ent. S. III, part. I, 372. — Deilephila Morphous, loisd. Faun. de Madag. p. 75.

Il est d'un tiers plus petit que le Ch. Elpenor. Ses ailes supéceures sont d'un brun olivâtre plus ou moins foncé avec les ondes transversales plus obscures; elles ont, en outre, vers le bord terminal, une espèce de bande marginale, plus claire que le fond, élargie dans son milieu, pointue à ses deux extrémités, limitée en dedans par une ligne sinueuse obscure.

Les ailes inférieures sont entièrement d'un brun roussatre.

Le corselet est de la même nuance que les ailes supérieures.

L'abdomen est olivâtre sur le dos, d'un gris rosé sur les côtés avec chaque anneau marqué latéralement d'une bande noire transversale.

Le dessous des ailes est brunâtre avec deux lignes parallèles plus obscures.

Chez la femelle et quelquefois chez le mâle, on voit à l'extrémité de la cellule discoïdale deux points inégaux d'un blanc argenté.

La chenille, d'après un beau dessin exécuté au Bengale par le capitaine Shervill, est tantôt verte et tantôt brunâtre; elle est très-atténuée antérieurement, marquée de chaque côté d'une bande, commençant au milieu du corps, devenant bifide à sa partie postérieure pour se perdre à la base de la corne et dans les pattes anales; outre cela, il y a quelques traits obliques sur les anneaux qui précèdent la bande blanchâtre.

Elle vit très-communément sur des arbres qui portent au Bengale les noms de Kurounda et d'Epi-tres.

La chrysalide est brune.

Le Zonilia Morpheus est commun au Bengale, à Ceylan, sur la côte de Coromandel, etc. Goudot l'a aussi trouvé à Madagascar.

### 2. Z. PENÆUS.

Cram. 88, D. — Hopffer, in Peters Reise nach. Mozambiq. ? tab. 27, f. 11.

Z. Penœus, Walker, Heter. 193, 2.

Le mâle Sphinz funcbris, Fab. Ent. Syst. III, part. I, p. 371. — La femelle Sphinz didyma, Fab. p. 371, 48.

Il est un peu plus grand que le Morpheus. Ses ailes sont moins arrondies au sommet. Les supérieures sont d'un brun-bronzé olivâtre, comme dans le Morpheus, mais les ombres brunes, quoique peu distinctes, sont disposées obliquement de dedans en dehors.

Les ailes inférieures sont verdâtres avec l'extrémité noirâtre. Le corselet est de la même couleur que les ailes supérieures. L'abdomen est olivêtre sur le dos, marqué de chaque côté de larges anneaux noirs séparés par des incisions blanches très-troites.

Le dessous des ailes est brunâtre avec des lignes transversales pirs obscures, dont la dernière va se terminer à l'angle apical às supérioures.

Ches la femelle dont le dessin est beaucoup plus marqué, il y a deux ou trois petits points blancs argentés à l'extrémité de la cellule discoïdale.

Nous avons reçu mâle et femelle de M. Westermann, de Copenhague, qui nous les a envoyés comme les véritables funchris et didyma typiques de Fabricius. Ils viennent tous les deux de la sée de Guinée, quoique Fabricius donne l'Amérique pour patrie à son didyma. Nous avons vu deux exemplaires pris aux environs de Port-Natal.

La figure donnée par Cramer est exagérée; celle de la plande 27, dans le voyage de Peters, est faite d'après un individu qui avait perdu un peu sa couleur olivâtre. Il ne nous est pas bien démontré d'ailleurs, qu'elle appartienne au Penœus. Nous la rapporterions plus volontiers au tridyma.

### 3. Z. TRIDYMA.

Van der Hoeven, Beschijving neeuwe Lepid. pl. 5, f. 2.

Cette belle espèce est de la taille d'Œnopion. Ses ailes supénsures sont panachées de brun, de gris et de rougeâtre; la base et rougeâtre, séparée de la partie brune qui occupe le milieu et la surface, par une raie transversale blanchâtre, fortement aquieuse, doublée de noir; au-delà de l'espace brun, il y a une àvable ligne noire, fine, ondulée, précédée sur la côte et au bord neme d'un espace grisâtre; cette double ligne est suivie d'une lande rougeâtre interrompue, puis vient une raie noire sinueuse qui va du sommet à l'angle interne, et enfin le bord marginal qui est largement noirâtre, et marqué entre les nervures de quelques taches rougeâtres, cunéiformes, obsolètes; outre cela, a voit vers l'extrémité de la cellule discoldale trois petites taches d'un blanc argentin disposées en triangle, surmontées sur is côte d'un espace d'un gris blanchâtre.

les ailes inférieures sont d'un brun-clair, un peu olivâtre avec

Le corselet est olivâtre avec les épaulettes un p noir.

L'abdomen est olivâtre en dessus, avec des a d'un noir profond et les incisions hlanches, étroir ment sur le dos.

Le dessous des ailes est brun avec trois petite tres, parallèles, anguleuses.

Décrit sur un individu ex larva que M. Wer reçu de la côte de Guinée et dont nous sommes générosité.

La figure que M. Van der Hoeven a donnée de laisse rien à désirer.

Très-rare. - Coll. Bd.

### 4. Z. COMMA.

Hopffer, in Peters Reise nach. Mozamb. pl. 27, 12.

Il a environ 7 centimètres et demi. Ses ailes : longées comme dans le tridyma sont d'un ver avec cinq ou six lignes transversales, ondulées de et une tache d'un blanc d'argent en forme de vi à l'extrémité de la cellule discoïdale; le bord te sâtre, et cette teinte est séparée de la couleur gé bande brune; outre cela, il part de la côte, en del argentée, une autre bande oblique brune, mal de se réunir à la précédente.

Les ailes inférieures sont verdâtres avec l'ext principalement vers l'angle apical.

La tête et le corselet sont d'un vert olivâtre.

L'abdomen est d'un grisâtre un peu rosé sur le outre, marqué entre chaque articulation, d'une tas versale un peu liserée de blanchâtre.

Le dessous des ailes est d'un gris verdâtre av brunes transversales.

Décrit sur un individu mâle que nous avons Nous ne savons pas si la femelle a une tache a chez le mâle ou si elle en est dépourvue, comme dinairement dans la femelle de *Penœus*.

### 5. Z. VAU.

Walker, Heterocera, p. 197, 11.

Il est d'un vert olivâtre en dessus et roussâtre en dessous.

Le corselet a les côtés d'un gris cendré.

L'abdomen est gris, avec des bandes noires interrompues.

Les ailes supérieures ont la base, une tache costale et le bord entérieur nuancés de violâtre; elles sont, en outre, marquées sur le disque, d'une tache d'argent en forme de V.

Les ailes inférieures ont la base violâtre.

Le dessous des ailes est ferrugineux.

Décrit par M. Walker au British Museum, sur un individu dont la patrie est inconnue.

### 6. Z. SUBVARIA.

Walker, Heterocera, p. 196, 9. - Zonilia Antipoda, Boisd. M.

Il a tout à fait le port et la taille du Morpheus. Ses ailes supérieures sont d'un gris-jaunâtre, traversées par des lignes géminées, ondulées, parallèles, noirâtres; elles ont, à l'extrémité de la cellule, deux petites taches d'un blanc argentin, dont la supérieure ponctiforme, est quelquefois réunie avec celle qui est audessous; leur extrémité est brune, et cette partie obscure est séparée de la couleur du fond par une espèce de raie sinuée.

Les ailes inférieures sont entièrement d'un rouge-ferrugineux. Le corsolet est de la couleur des ailes supérieures, mais un peu plus olivâtre.

L'abdomen est d'une teinte olivâtre avec les anneaux fasciés latéralement de noir.

Le dessous des ailes est grisâtre avec le disque des supérieures servagineux; elles sont traversées par deux lignes noirâtres un peu ondulées.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande. Les deux exemplaires de sotre collection viennent de Swan-River. — Rare.

### 7. Z. METAPYRRHA.

Walker, Heterocera, p. 196, 10.

Il a tout à fait le port du subvaris. Ses ailes supérieures, un

peu bronzées, sont traversées par des lignes noirâtres, obliques et ondulées; outre cela, elles ont la côte d'un brun tanne, et l'extrémité de la cellule discoïdale marquée d'une petite tache blanche.

Les ailes inférieures sont d'un rouge-ferrugineux comme dans l'espèce précédente.

Le corselet est d'un brun-verdâtre, marqué de deux lignes blanches.

L'abdomen est d'un brun-roussâtre avec les anneaux fasciés latéralement de noir.

Le dessous des ailes est d'un brun-grisâtre traversée par deux lignes obscures; la poitrine et les palpes sont blancs.

Nous ne savons pas au juste de quel point de la Nouvelle-Hollande vient l'unique individu que nous possédons.

### 8. Z.? BUBASTUS.

Cramer, 149, E. — Calliomma Bubastus, Walker, Heterocera, p. 112, 6.

Encore une espèce que nous n'avons jamais vue en nature. Elle est un peu plus grande que le Morpheus, dont elle diffère au premier coup-d'œil, par ses ailes supérieures un peu tronquées au sommet et sinuées sur leur bord terminal. Leur couleur est le brun-olivâtre, plus obscur au milieu, avec des bandes transverses d'un vert-olive pâle; sur l'espace brun du milieu, il y a, vers l'extrémité de la cellule discoïdale, deux points d'un blancargentin; la base de l'aile offre une tache semi-lunaire bordée, en dehors, par une petite ligne verte et marquée d'un point jaune.

Les ailes inférieures sont verdâtres avec une bande transversale et l'extrémité d'un noir foncé.

Le corselet est verdâtre.

L'abdomen est également verdâtre, marqué seulement de quatre taches noires sur les derniers anneaux.

De la côte de Coromandel, selon Cramer. Est-il hien des Indes orientales?

### 9. Z. FUMOSA. Boird.

Walker, Heterocera, p. 193, 3.

A peine de la taille d'un Ch. Porcellus, il est entièrement d'un

hem olive; ses ailes supérieures offrent quelques ondes un peu plus obscures, un peu obliques de dehors en dedans; elles ont pour caractère essentiel, le sommet échancré; cette échançrure est précédée d'un petit espace grisatre marqué de deux pelites lignes noires parallèles.

Les ailes inférieures ont l'extrémité plus noire que la base.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est jaunâtre, sans anneaux noirs; les incisions sont legrement blanches sur les côtés.

Le dessous des ailes est jaunâtre avec le disque des supérieu-

Décrit sur un individu unique, que nous avons reçu de la

Le British Museum possède un exemplaire pris au Congo.

### 10. Z. ACUTA.

Walker, Heterocera, p. 195, 7.

Il est un pen plus petit que le Morpheus, et d'une conleur ferragineuse en dessus.

Les ailes supérieures de couleur sombre du côté de la basé, not un peu glauques vers l'extrémité terminale; elles sont, en oure, traversées par quelques lignes noires, maculaires.

Les ailes inférieures sont brunes avec la trace d'une bande

Le corselet est marqué d'une ligne blanche sur chaque épau-

L'abdomen offre deux rangs de taches dorsales noires; il est plus pâle sur les côtés avec une rangée latérale de traits noirs.

Le dessous des palpes et la poitrine sont blanchâtres.

Hindostan. - Coll. de M. Saunders. - Walker.

Nous n'avons jamais vu cette espèce.

### 44. Z. CHIRON.

Commer, 137, E. - Walker, Heter. p. 196, 8.

Nons n'avons jamais vu cette espèce, que quelques auteurs myortent, avec doute, au Morpheus comme variété. Ses ailes supérieures sont d'un brun-olivâtre obscur avec quelques bandes transverses plus foncées; leur base est jaunâtre.

Les ailes inférieures sont d'un brun-noir. Le corselet est jaunâtre.

L'abdomen est également jaunâtre en dessus aveneaux noirs bien prononcés sur les côtés, très-étroits

Côte de Coromandel. Décrit d'après Cramer. Si l cet iconographe est exacte, comme nous le supposons doit constituer une espèce à part.

### 12. Z. ARGENTIFERA.

Walker, Heterocera, p. 194, 4.

Il a le port et la taille du Rhadama. Ses ailes supér d'un vert-olive avec deux bandes transverses légèrem tées, convergentes; entre ces deux bandes elles sont, marquées vers l'extrémité de la cellule discoïdale, d lancéolée d'un blanc-d'argent brillant.

Les ailes inférieures sont d'un vert olivâtre avec u noirâtre.

Le corselet est d'un vert olivâtre avec une ligne bla chaque épaulette.

L'abdomen est marqué de bandes blanches dilat côtés et séparées par des taches noires carrées.

Le dessous du corps est d'un blanc sale.

Port-Natal. - Collection de M. Saunders. Walker.

### 13. Z. RHADAMA. Boisd.

Il a le port et la taille de l'Œnopion; ses ailes supér d'un vert-olivâtre obscur; elles ont, au-delà du m bande droite régulière, comme chez Œnopion, mais c verdâtre sale; cette bande est précédée, vers l'extrés cellule discoïdale, de trois points d'un blanc argentir obliquement, et dont celui du milieu est plus gros qu autres; cette même bande est suivie, vers l'angle in sommet, d'une éclaircie de sa couleur; on voit encore jour, près de la base, la trace d'une bande d'un gris un peu oblique.

Les ailes inférieures sont d'un vert olivâtre avec noire, comme chez Œnopion et tridyma.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est olivâtre en dessus avec des anneaux d'un noir profond et des incisions blanches, très-rétrécies sur le dos où «Les s'éteignent en partie.

Le dessous des ailes est brun avec tout le disque des inférieures d'un gris-jaunâtre.

Madagascar. Décrit d'après un individu unique qui nous a été efert par fou Marchal (1).

### 14. Z. MALGASSICA.

Felder, Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 76, f. 2.

Il est d'un tant soit peu plus petit qu'Œnopion. Ses ailes supéneures sont d'un vert-olivâtre avec deux bandes transverses d'un res-blanchâtre, dont la première, entre la base et le milieu, est un peu courbe, sinuée et interrompue par une raie courte, obliges, venant de la côte; la seconde bande, qui est entre le milieu et l'extrémité, est droite, régulière, un peu élargie au sommet; ele est suivie, en dehors, d'une ligne noire dentée en scie.

Les ailes inférieures sont grisâtres avec la bordure noire et

Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est grisâtre sur le dos avec des taches latérales : ires, séparées par des articulations blanches.

Le dessous des ailes est brun avec le disque des inférieures un peu roussâtre.

Nous devons ce Zonilis à feu le Dr Coquerel, qui l'a trouvée l Nossi-Bé, près de Madagascar.

### 15. Z. Fo. Boisd.

Walker, Heterocera, p. 195, 6.

Il est un peu plus petit que le Morphous, et il a presque le part du Sphinz hylœus. Ses ailes supérieures, dont la frange est

.! Marchai (Romarin) était un excellent observateur qui a résidé prodant quinze années à l'île Maurice. Il s'est occupé plus spécialement des Lépidoptères que des autres ordres. La science entomologie est redevable à cet ami regretté, de la découverte de plusieurs especes nouvelles qui avaient échappé aux recherches de M. Desardum.

entrecoupée de brun et de blanchâtre, sont d'une teir tirant un peu sur le jaunâtre, avec des raies transvers lées d'un brun-noirâtre; le stigmate est assez pror blanc-jaunâtre.

Les ailes inférieures sont d'un brun-noirâtre av moins foncée et la frange jaunâtre.

Le corselet est un peu plus olivâtre que les ailes su L'abdomen est olivâtre avec des anneaux noirs, bies sur les côtés, mais peu indiqués sur le dos.

Décrit au British Museum, sur un individu unique Indes orientales.

16. Z. ZEBU. Boisd.

Pachylia æquivalens? Walker, Heterocera, p. 191, 5.

Il est à peu près de la taille de l'Œnopion. Ses ailes sont d'un brun-olivâtre avec des raies irrégulières tr mal écrites, un peu brunâtres; elles ont, en outre, ractère essentiel, une bande étroite brune, parfaite lière, s'étendant obliquement du milieu de la côte à terne.

Les ailes inférieures sont d'un brun-noirâtre.

Le corselet est de la couleur des ailes ainsi que l'a Le dessous des ailes est d'un gris-brunâtre avec des versales plus obscures.

Décrit au British Museum sur un individu unique che établissement avait recu de Sierra Leone.

Nous croyons que le Pachylia æquivalens de M. W même espèce que le Zonilia Zebu, que nous avo British Museum. Probablement que l'étiquette a été é, est à remarquer que ce savant entomologue a cons noms que nous avions donnés aux sphingides du seum.

#### 17. Z. ARDENIA.

Lewin, Prodrom. Ent. pl. 2. — Cizara Ardeniæ, Walker p. 120, 1.

Il est un peu plus petit que le Morpheus. Ses ailes sont d'un brun olive avec la côte, le bord externe et terne entourés par une ligne d'un blanc un peu lavé tre; outre cela, elles ont, un peu au-delà du milieu,

#### ZONILIA.

lette transversale blanche, droite, très-régulière, tra son sommet, se réunissant à la ligne blanche de la c du bord interne; elles ont encore à la base, près l'a côte, une petite tache d'un blanc rosé marquée d'un

Les ailes inférieures sont noires avec la gouttière et une liture anale d'un blanc-rougeâtre.

Le corselet est d'un brun-olivâtre avec les épaulett bordées de blanc rosé sur chacun de leurs deux côté L'abdomen est olivâtre en dessus, un peu blanchâ sur les côtés; les derniers anneaux sont plus pâles.

Le dessous des ailes est roussatre avec des lignes dentées en seie.

La chenille, d'après la figure qu'en a donnée Le fait la forme de celle de Morpheus. Elle est verdà' pontillée de blanc; son ventre est ferrugineux, e est separée de celle du dos par une raie longitu qui ne va pas jusqu'à la corne; celle-ci est un p rugineuse en dessous, verdàtre et pointillée de h outre cela, il y a de chaque côté, seulement au-de premières paires de prattes membraneuses, des l'Emphes. Cette chenille vit aux bords des torres rès, sur le Grevillea sericea.

La chrysalide est d'un brun obscur.

Nous avons reçu cette curieuse espèce de M. I de premier ordre, qui l'a trouvée aux environs il cait alors en représentation extraordinaire.

Rare. - Coll. Bd.

### 18. Z. ŒNOPION.

Hubn. Exot. Saml. — Deilephila (Enopion, Boi p. 73. — Philampelus (Enopion, Walker, Heteroce

Il est un peu plus petit qu'un Sphinx ligust feures sont d'un brun-marron avec deux band versales, parfaitement droites et régulières, d lase et l'autre un peu au-delà du milieu; s de cette dernière, la couleur du fond forme u un espace d'un brun-grisàtre luisant, s'étendan

Les ailes inférieures sont olivâtres avec l'ex

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est olivâtre, marqué latéralement d'une tache noire sur chaque anneau.

Le dessous des ailes est brun.

Il se trouve à Madagascar, aux îles Maurice et Bourbon et à Natal.

Coll. Bd.

### GENRE MADORYX. Boisd. — Sphina auctorum.

Callomma, Walker.

Chenilles: Encore peu connues. Celles sur lesquelles nous avons quelques renseignements ont certains rapports avec celles des *Philampelus*; elles sont cylindriques ou un peu aplaties; leur tête est petite, un peu rétractile sous le premier anneau; elles n'ont pas de cornes, au moins dans l'âge adulte, mais le onzième anneau est un peu relevé en bosse. Elles vivent sur les vignes, les plantes de la famille des Onagraires et quelquefois sur les figuiers. Quand elles sont arrivées à leur croissance, elles ne descendent pas en terre pour se chrysalider, elles filent, entre les feuilles ou dans les gerçures des écorces, une coque légère comme certaines espèces de Bombicites (Chavannes).

Chrysalides: Coniques, terminées par une pointe peu prononcée.

Insecte parfait: Antennes assez longues, grêles, terminées par un crochet assez prononcé. Trompe aussi longue que le corps. Palpes un peu divergents, ayant le second article bien distinct, dilaté et collé sur le front. Yeux de grandeur moyenne. Corselet robuste. Abdomen cylindrique, obtus, terminé, chez les mâles, par une petite brosse ou par un pinceau de poils. Ailes supérieures échancrées et dentées, marquées sur le disque d'une ou de deux petites taches d'un blanc argentin.

Les *Madoryx* sont propres aux régions équinoxiales de l'Amérique. Nous ne connaissons encore qu'un petit nombre d'espèces.

### 1. M. OICLUS.

#### Cramer, 216, C.

Il est à peu près de la taille du Zonilia Morpheus. Ses ailes supérieures sont sinuées et échancrées avec le sommet prolongé, bins et falqué; le fond de leur couleur est brun, avec des raies transverses noirâtres, courbes, sinuées, dont les intervalles sont coupés par du gris blanchâtre; la partie qui avoisine le bord reminal est variée de cendré et d'un peu de noirâtre, avec une me oblique, brune qui va du sommet au bord interne; cette est suivie d'une ligne noire, courte, flexueuse qui ne descend pisqu'au milieu; sur la pointe apicale, il y a une petite lunce noire; outre cela, le stigmate est d'un blanc argenté surponté d'un point semblable; ou voit encore à la base, tout près d'origine de la côte, un très-petit point argenté.

Les ailes inférieures sont d'un brun-noir avec une bande trans-

Le corselet est d'un gris cendré, marqué de deux points trèsrin à la base des épaulettes.

L'abdomen est gris avec les anneaux bruns; il est, en outre, zaqué à sa base, de deux taches très-noires.

Le dessous des ailes est d'un brun cendré avec deux petites limes noirâtres dentées en soie, et un petit point blanc sur le caque des supérieures.

Le ventre est ferrugineux avec deux rangées de petits points

il se trouve à Cayenne et à Surinam. Selon Année, il vivrait sur une vigne sauvage.

Coll. Bd.

Ille de Merian a donné, pl. 39, la figure grossière d'un Maioryz qui nous paraît appartenir à un grand exemplaire femelle l'oiciss. Elle représente la chenille sur une plante de la famille les Onagraires du genre Jussica.

### 2. M. LYNCUS, Boisd.

Il a tout à fait le port et la taille de l'Oiclus. La dentelure des Lies est semblable. Les supérieures sont d'un vert-olivâtre pâle avez quelques lignes transversales, plus obscures, à peine visibles; elles ont sur la côte, tout près de la base, une tache d'un vert-olive foncé, marquée d'un petit point blanc argentin et circonscrite en partie, par une petite ligne blanchâtre; le disque offre une tache argentée, surmontée d'un point de la même couleur; leur angle interne est marqué de deux petits points noirs.

Les ailes inférieures sont d'un gris-blanchâtre sale avec une grosse tache médiane noire, ainsi qu'une bande marginale sur leur angle externé.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, marqué à sa base de deux points noirs.

L'abdomen est grisâtre avec le dos un peu roussâtre, et une bande latérale noire sur chaque anneau.

Le dessous des ailes est d'un blanc brunâtre avec une raie transversale, brune, très-obsolète, et un petit point blanc sur le disque des supérieures. Le ventre est d'un gris jaunâtre.

Cette belle espèce a été élevée à Cayenne par le capitaine Catherneau, qui l'a envoyée à son ami le général Feisthamel. Elle fait aujourd'hui partie de notre collection.

Nous n'en connaissons pas d'autre exemplaire.

### 3. M. Pluto.

Cramer, 216, R. — Linné, Mus. Lesk. 95, 184. — Calliomma Pluto, Walk. Heter. p. 111, 3.

Il est à peu près de la taille d'un lineata. Ses ailes supérieures sont dentées et échancrées avec le sommet un peu faiqué; elles sont brunes avec des raies noirâtres, transverses, un peu fondues avec la teinte générale; sur le quart antérieur de la côte, elles ont une raie bien marquée d'un blanc un peu cendré, qui se courbe en demi-cercle pour gagner le milieu basilaire : l'espace compris entre cette bande et le corselet est marqué de deux petits traits jaunes; avant le bord terminal, on voit une ligne fulgurale noire, commençant au-dessous d'un trait transverse, blanc, perpendiculaire, pour aller se perdre le long du bord interne; cette raie fulgurale est environnée de cendré-blanchâtre; il y a, en outre, sur le disque deux petites taches argentées dont la supérieure est un peu plus petite; le sommet est largement d'un gris cendré; dans les exemplaires bien frais, on remarque encore entre le bord terminal et la raie fulgurale deux points blancs pupillés de noir.

Les ailes inférieures sont d'un brun clair avec une grosse tache

minal est largement noir avec toute la région anale d'un gris cendré, marquée d'une tache brune.

Le corselet est brun avec les épaulettes cendrées.

L'abdomen est gris; il offre à sa base quatre taches noires un peu transversales et à l'extrémité quatre taches d'un brun-marron.

Le demous des ailes est brunâtre pointillé de noir. Le ventre est ferragineux ponctué de blanc.

Cayenne, Surinam. M. Chavannes l'a élevé de chenille au Régil.

Coll. Bd. - Rare.

### 4. M. FAUNUS. Boisd.

Il a un peu le port de Pluto, mais ses ailes supérieures sont moins échancrées et comme un peu tronquées au sommet; elles sont d'un gris cendré avec le disque et le sommet un peu rous-stres; leur base offre, sous la côte, une tache brune marquée d'un très-petit point d'un jaune doré; les lignes transversales sont très-obsolètes, visibles seulement vers le bord interne; de la tache roussâtre triangulaire du sommet, descend obliquement vers l'angle interne, une ligne droite, d'un brun rougeâtre; la partie comprise entre cette ligne et la frange est grisâtre avec une petite tache brune près de l'angle anal. Outre cela, il y a comme dans Pluto, au-dessous du milieu de la côte, une petite tache d'un blanc un peu doré, surmontée d'un point de la même coulent.

Les ailes inférieures échancrées à l'angle anal, sont d'un gris rougeatre, avec une tache médiane noirâtre et une bande marginale de la même couleur, précédée d'une petite ligne transversale également noirâtre.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, marqué à sa base de deux petites taches ferrugineuses.

L'abdomen est grisâtre avec deux des derniers anneaux marqués chacun de deux petites taches ferrugineuses.

Le dessous des ailes est d'un gris rougeâtre avec trois petites lignes transversales, dentées en scie, peu indiquées; celui des supérieures offre comme dans *Pluto* un point discoïdal blanc. Le rentre est un peu ferrugineux. Décrit sur un individu unique pris à Cayenne pas vant entomologiste Lacordaire (1) de très-regrettable :

Très-rare. — Coll. Bd.

### 5. M. TRIPTOLEMUS.

Cramer, 216, F. — Caliomma Triptolemus, Walker, p. 111, 4.

Il a le port et la taille de *Pluto*; ses ailes sont éch dentées, mais non falquées au sommet. Elles sont me gris et de brun avec quelques petites lignes ondulées, elles ont, près de la base, une petite ligne transvers ne dépassant pas le milieu, précédée du côté du cor arc noir; sur la partie la plus rembrunie du milieu, tache d'un blanc argentin, en forme d'Y couché, et ve terminal une ligne angulaire noire, se liant, près du un trait noir un peu oblique; outre cela le bord interne de blanc.

Les ailes inférieures sont noires, marquées au-delà d'une bande grisâtre; la bordure est d'un brun grisâtr vient tout à fait cendré en approchant de l'angle anal.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures épaulettes brunes, liserées de blanc en dessus; il offre raie médiane brune, et deux taches de la même cou base.

(1) Théodore Lacordaire, professeur d'anatomie comparversité de Liége et doyen de la faculté des sciences, s'était as jeunesse de différentes branches de l'entomologie, soit p voyages dans l'Amérique du Sud, soit en France; mais se notre époque il était impossible à un seul homme d'embr fois l'étude de tous les ordres, il finit par consacrer ses loisir, spécialement à celle des Coléoptères. C'est alors qu'il ce travail gigantesque, ce Genera, qu'à force de persévéran à peu près arrivé à mener à bauffon, était sur le point d'éti lorsque, le 18 juillet 1870, il fut enlevé à sa famille, à ses 1 amis, à ses collègues et aux sciences naturelles par une affec rable. Sa mort est un deuil pour les savants de tous les p principalement pour moi qui, depuis quarante années, étai lui de la plus étroite amitié. C'était mon alter ego. Bd.

L'abdomen est grisâtre, avec les trois premiers anneaux noirs, parés par des incisions d'un jaune citron. Il y a aussi sur le dos la bande longitudinale grise; les derniers anneaux sont en outre marqués de chaque côté de la bande dorsale, d'une petite tache ceire allongée.

Le dessous des ailes est brun, avec un petit point discoidal lanc, et deux raies communes, brunâtres; leur extrémité offre me bande briquetée, irrégulière, bordée de grisâtre, près de la lange. Le ventre est ferrugineux avec deux rangées de petits pais blancs comme dans Pluto.

Nous possédons une variété femelle dont l'abdomen n'a nullezent les incisions jaunes, mais qui a sur le milieu du dos deux andes blanches transversales.

Cette belle espèce a été élevée de chenille au Brésil par M. Cavannes; nous l'avons aussi reçue de Cayenne.

Rare. - Coll. Bd.

### 6. M. DEBORREI.

Cette magnifique espèce est d'un tiers plus grande que le Imptolemus. Ses ailes supérieures sinuées et non dentées sont un cendré-obscur satiné; elles sont traversées obliquement uters antérieur de leur bord interne, presque jusqu'à la côte, par une large bande d'un brun noir, précédée sur la côte, non in du sommet, par une tache triangulaire de la même couleur; à bande oblique est marquée vers l'extrémité de la cellule discollale d'un gros trait allongé d'un blanc d'argent, surmonté de leur points également argentés, dont l'un est excessivement petit et peu indiqué; outre cela, on voit à la hase de l'aile, une tache prine, arrondie en dehors, ne descendant pas jusqu'au bord intene, et sur la moitié inférieure du bord terminal, une espèce de bande marginale brune assez large.

Les ailes inférieures sont dentées d'un gris cendré, avec la base la moitié extérieure du bord terminal d'un brun noir.

La tôte est grise ainsi que le corselet, avec une raie médiane, brune, qui se termine en arrière en forme d'Y.

Labdomen est d'un gris un peu violatre avec un cercle brun su l'avant-dernier segment, interrompu sur le dos.

Le dessous des ailes est d'un brun tanné, avec une petite tache blache sur le disque des supérieures. Décrit sur un individu femelle ex larva, élevé au Brésil par Beske. — Mus. de Bruxelles.

Nous avons dédié cette espèce à M. Deborre, l'un des conservateurs du musée royal de Bruxelles, et secrétaire de la Société entomologique de Belgique.

### 7. M. PAN.

Cramer, 216, D.

Nous ne connaissons cette espèce que par la figure qu'en a donné Cramer. Elle est à peu près de la taille de notre porcellus. Ses ailes sont découpées comme dans Pluto; le fond de leur couleur est brunâtre, avec de petites lignes transverses noirâtres, et quelques taches grisâtres mal arrêtées sur la côte; près de leur base on voit deux petites raies d'un cendré bleuâtre; il y a aussi au milieu du bord terminal un assez grand espace marginal de cette dernière couleur, traversé par deux petites lignes noires; outre cela, il existe sur le disque dans la partie la moins rembrunie de l'aile, au lieu du stigmate, un gros point d'un blanc d'argent, et sur le bord interne près de la base une tache oblongue d'un jaune d'ocre foncé.

Les ailes inférieures sont fauves dans leur moitié antérieure, d'un noir brunâtre dans la moitié postérieure avec la frange jaunâtre.

Le corselet est de la couleur des premières ailes, avec les épaulettes liserées de noir en dessus.

L'abdomen est d'un gris-brunâtre obsour, avec six petites taches noires disposées deux par deux sur les anneaux du milieu.

Le dessous des ailes est d'un brun rougeâtre, avec deux lignes communes ondulées, noirâtres. Le ventre est rougeâtre.

Décrit d'après Cramer qui le dit de Surinam.

### 8. M. PSEUDOTHYREUS.

Hemerophanes Pseudothyreus, Grote, Proced. of the Ent. Soc. of Philad. vol. 5, no 1, p. 46, pl. 1, fig. 1.

Nous croyons avoir aperçu cette espèce à l'exposition de M. Gundlach, en 1867; malheureusement nous n'avons pas eu l'occasion de l'examiner en détail; en conséquence, nous ne garantissons pas qu'elle appartienne véritablement à notre genre Madoryx. Au premier coup d'œil, elle a un certain rapport avec les Sphinx

én groupe de Lugubris, mais comme il n'y a pas de carène sur le corselet et que d'ailleurs, selon M. Grote, le mâle est dépourvu de la brosse en éventail, il ne faut pas songer à la placer dans le même genre.

Notre description est extraite du mémoire de M. Grote.

Il est à peu près de la taille du Sphinx lugubris dont il a la denseure anguleuse. Ses ailes supérieures sont d'un brun pâle, traversées par plusieurs raies ondulées, noirâtres, dont trois entre le milieu et la base, et une quatrième très-anguleuse près de l'exremité du bord terminal; outre cela, il y a au-dessous de la côte, sur un espace rembruni, deux taches-blanches dont l'inférieure plus grande ressemble un peu à une L renversée, et dont la supérieure plus petite est oblongue ovalaire; on voit encore, à partir du sommet, sur le bord marginal quelques traits noirs.

Les ailes inférieures sont brunâtres traversées par une bande médiane noire, derrière laquelle le fond est plus pâle et marqué d'une fine ligne ondulée, noirâtre; le bord marginal est également noirâtre.

Le corselet est brun, avec une ligne noire sur la tête et le collier, et de petits traits de la même couleur sur les épaulettes.

L'abdomen est un peu plus obscur que le corselet, avec deux aches latérales noires près de sa base.

Le dessous des ailes est plus pâle que la face opposée, traversé par une ligne noirâtre ondulée.

Il se trouve à Cuba, et fait partie du museum de Philadelphie.

Nous croyons que cette espèce est bien la même que le Calhomme? Oiclus, mentionné par le savant M. Herrich-Schæffer,
Corresp. Blatt. p. 57.

Si le mâie, ainsi que le dit M. Grote, est dépourvu de pinceau anil, ce sphingide serait mal placé avec les autres Madoryx; mais il faut tenir compte que ce pinceau terminal est quelquefois assez caduque: nous avons vu des Triptolemus mâles chez lesquels il avait dispara.

## TRIBU DES DÉILÉPHILIDES.

Cette tribu, extrêmement nombreuse, mériterait certainement d'être séparée en deux ou trois, si les premiers états de toutes les espèces nous étaient connus. Malheureusement, en dehors de celles qui habitent l'Europe, plus des trois quarts des chenilles qui vivent sur des végétaux exotiques nous sont encore totalement inconnues. Celles que nous avons vues, soit en nature, soit sur des dessins qui nous ont été communiqués, sont lisses avec la tête globuleuse; elles sont souvent ornées de couleurs assez vives et fréquemment de taches ocellées. Celles de ces chenilles qui pourraient constituer une tribu particulière ont les trois premiers anneaux plus minces que les autres, très-rétractiles et susceptibles de s'allonger en manière de trompe. Les unes et les autres sont ordinairement pourvues d'une corne sur le onzième segment. Cette corne, dont l'usage nous est inconnu, est exceptionnellement remplacée, dans quelques espèces, par une petite plaque verruqueuse. Chez quelques autres, la corne n'existe qu'au premier age et disparaît complétement lorsqu'elles sont adultes.

La métamorphose a lieu dans la terre ou sous les débris de végétaux comme pour les autres Sphingides.

L'insecte parfait a pour caractères : des antennes droites ou presque droites; une trompe qui ne passe pas ordinairement la longueur du corps.

Cette tribu est répandue sur les deux continents.

GENRE DEILEPHILA. Ochsenheimer. — Sphinx. Fab. — Latreille. — Godard, etc. — Sphinges Legitime. Linné.

Chenilles: Cylindriques, à peu près d'égale grosseur dans



toute leur longueur, de couleur assez vive, avec la tâte arrondie, assez petite, non rétractile; à une seule exception ; rès, pourvues d'une corne sur le onzième segment. Métamorphoses presque à la surface du sol, dans une coque informe composée de débris de végétaux ou de molécules de terre réunis par quelques fils de soie. Chrysalides cylindrico-coniques, avec la pointe anale assez prononcée.

l'asecte parfait: Antennes droites, de la longueur de la tête et du corselet réunis, légèrement dentelées, presque d'égale grosseur dans les deux sexes, terminées par un petit crochet. Trompe un peu plus courte que le corps. Palpes épais, dépassant le chaperon, recouverts de poils courts, tris-serrés. Corselet large avec les épaulettes bien distinctes. Abdomen conique, marqué de taches latérales noires et blanches. Ailes supérieures bien entières; ailes inférieures roses avec des bandes noires.

Les Deilephila constituent l'un des plus beaux genres dans la famille des Sphingides. Les espèces sont souvent très-voisines les unes des autres, mais bien distinctes par leurs chenilles. Ces Lépidoptères habitent les parties tempérées de l'ancien et du nouveau continent. L'Europe est la partie du monde la mieux partagée à cet égard.

### 4. D. HIPPOPHAES.

Esper, Schmett. II. Th. tab. 38, Cont. 13, fig. 1, 2.—Hubner, Sphing. tab. 32, f. 109. — God. etc.

Ochsenheimer, Schmett. von europ. Eur. 3, p. 221, 3.

Il a le port et la taille de l'Euphorbiæ. Ses ailes supérieures sont d'un gris cendré, avec le bord terminal longé par une large tande olivâtre, très-légèrement sinuée en dedans; le stigmate est noir, petit et placé sur une légère trainée olivâtre; la base est d'un noir profond avec le bord interne lavé de blanc.

Les ailes inférieures sont roses, avec deux bandes noires dont l'antérieure plus large couvrant la base, la postérieure étroite, parallèle au bord terminal et suivie tout près de la frange, de gris lavé de rose; outre cela, entre les deux bandes noires, le bord abdominal offre une tache blanche.

Le corselet est d'un vert olivâtre, avec les épaule de blanc latéralement (1).

L'abdomen est également olivâtre, avec deux tael noires, entrecoupées de blanc.

Le dessous des ailes est d'un gris rosé.

Ce Sphingide, ou plutôt sa chenille, n'est pas rare torrents dans les départements de l'Isère et des B Godart dit que de son temps il se vendait encore à cents francs la pièce; aujourd'hui on peut s'en proment une paire pour trois francs.

La chenille dont nous avons donné la figure dar graphie, Sphingides pl. 9, fig. 3, 4, est d'un vert en dessus et d'un vert blanchâtre en dessous. Son vert de petits points blancs disposés par séries tra sur le dos deux raies longitudinales qui s'arrête anneau, et vont se terminer sur les côtés de la dilatation d'un fauve orange; près des pattes et blanche; au-dessus d'elle sont les stigmates d'un bordés de noir; elle vit en juin et juillet, puis en octobre, exclusivement sur l'Hippophae rhamnoids

### 2. D. BIGUTTATA.

Walker, Heterocera, p. 172, 15. — D. eleagni, Boisd.

Il est d'un tiers plus grand que notre hippophat port et un peu le facies. Ses ailes supérieures so cendré obscur avec le bord terminal longé par une olivâtre, nullement sinué en dedans. Le stigmate e petit; outre cela, il existe le long de la côte quatre tres mal définies, qui se fondent un peu avec l nérale.

Les ailes inférieures sont noires, traversées pa bande rose fortement sinuée antérieurement, denta et se terminant vers le bord abdominal par une ta le bord terminal est d'un gris-rosé.

Le corselet est d'un vert-olive foncé, bordé de b ment.

(1) Bordé latéralement signifie seulement à la base p tion des ailes; des deux côtés : c'est lorsque le bord de aussi plus ou moins lisèré de blanc du côte de la ligr L'abdomen est également d'un vert-olive foncé avec deux taches latérales noires, entrecoupées de blanc. Les antennes sont roussitres et non blanches comme dans l'hippophaes.

Le dessous des ailes est d'un gris-brunâtre avec une infinité de petites hachures noirâtres; elles offrent, en outre, l'apparence d'une hande transversale d'un gris rose; le ventre est gris.

Décrit sur un exemplaire unique, très-pur, que nous devons à l'obligeance de M. Lucien Buquet. Il nous l'a offert comme ayant été pris dans les indes orientales ou à l'île Maurice. Il est très-probable qu'il vient de cette localité, car le British Museum possède un exemplaire recueilli à Madagascar.

Kous lui avions donné le nom d'Elæagni à cause de son analogie avec notre hippophass.

### 3. D. Annei.

Geérin, Mag. de Zool. 1839, Ins. pl. 2. — Walker, Heterocera, p. 171,

Il a le port de notre hippophaes, mais il est près de moitié plus grand. Ses ailes supérieures sont d'un gris blanchâtre avec le bed terminal longé par une large bande olivâtre, nultement simée en dedans; le stigmate est nul; outre cela, il existe sous le milieu de la côte une tache oblongue olivâtre.

Les ailes inférieures sont roses avec deux bandes noires, dont l'antérieure, large et dentée, couvre la base, et la postérieure, asse étroite, est parallèle au bord terminal, lequel est d'un rose gristre.

Le corselet est d'un vert olive, avec les épaulettes bordées de Nanc latéralement.

L'abdomen est également d'un vert olive; il offre de chaque coté quatre taches transversales noires, alternant avec des taches blanches de la même grandeur.

Le dessous des ailes est d'un gris-brunâtre avec une hande médiane, commune, d'un rose pâle, et une tache très-noire à l'angle anal des inférieures. Le ventre est d'un gris-jauuâtre un pen rosé.

Nous avons reçu un mâle du Chili, et une femelle beaucoup plus grande, du Pérou.

Rara. - Coll. Bd.

### 4. D. EUPHORBLE.

Linné, — Fabricius, — Hubner, — Esper, — Ochs. — God. — etc. Le Sphinx du tithymals, Geoffroy, Engramelle, etc.

Il n'y a pas une collection, si mince soit-elle, qui ne renferme cetta espèce.

Ses ailes supérieures sont d'un gris rougeâtre avec trois taches orbiculaires et une bande sinueuse d'un vert-olive obscur.

Le dessus des ailes inférieures est d'un rouge rose avec deux bandes noires, dont l'antérieure est placée à la base et la postérieure parallèle au bord terminal; entre ces deux bandes il existe, en outre, une tache blanche arrondie, au milieu du bord abdominal.

Le corselet est d'un yert-olive foncé, bordé latéralement de blanc. L'abdomen est également d'un vert olive; il offre de chaque côté cinq bandes blanches, transversales, dont les deux premières, plus larges et plus courtes, sont bordées de noir en avant.

Le dessous des ailes est rouge avec un gros point noir sur le disque des supérieures.

L'euphorbiæ varie beaucoup; certains exemplaires ont le dessus des ailes supérieures rose ou lavé de rouge; d'autres ont les ailes inférieures d'un rouge ochracé; enfin, nous en avons vu chez lesquels la seconde bande noire avait disparu, etc.

La chenille est ordinairement d'un noir luisant lorsqu'elle est adulte, pointillée de jaune. Chacun de ses côtés est marqué de deux rangées longitudinales de taches rondes, jaunes ou blanches, ou même quelquefois rougeâtres. Il règne le long du dos et au bord des pattes, une raie rouge. Les pattes, la tête, l'anus et la base de la corne sont d'un rouge foncé. Nous avons trouvé une variété entièrement rouge avec les taches blanches cerclées de noir, sans aucun autre dessin. Dans sa jeunesse la chenille est verte avec la raie dorsale et la raie latérale jaunes.

On trouve cette chenille communément à la fin de juin et au commencement de juillet, dans presque toute l'Europe, sur plusieurs espèces d'Euphorbia, principalement sur les E. cyparissias, Esula, Gerardiana et paralias. Dans les anuées chaudes la chrysalide éclot après trois semaines de métamorphoses; dans le cas contraire, l'insecte parfait ne paraît qu'au commencement de juin de l'année suivante.

### 5. D. ESULÆ.

Boisd. Icones II, pl. 30, f. 1, p. 25.—Duponch. Supplem. pl. 2, p. 18.

Voici une espèce sur l'authenticité de laquelle il s'est élevé bien des doutes chez les Entomologistes allemands. Ils prétendent, pent-être ont-ils raison, qu'elle a été [abriquée par un habile artiste avec certaines variétés obscures d'euphorbiæ. Dans deus les cas, l'auteur de cette coupable falsification, si falsification il y a, a su tirer un bon parti de sa mauvaise foi, car chaque exemplaire a été vendu très-cher en France. Nous-mêmes acus avons payé 40 francs pour une paire.

Il se rapproche beaucoup, par la taille, de l'hippophaes, cependant, en l'examinant bien, on y trouve à peu près les mêmes caractères que dans l'euphorbiæ. Ses ailes supérieures sont d'un cra-ardoisé blanchâtre avec une tache basilaire, une tache dis-idale et une bande transverse sinuée, d'un vert-olivâtre obscur; is partie du fond qui borde intérieurement la bande transverse est plus ou moins blanchâtre. La tache discoïdale est précédée, comme dans euphorbiæ et Nicea, entre le sommet et la côte, d'une petite tache olivâtre plus ou moins marquée.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande transverse à per près du même rouge que dans hippophaes. Cette bande offre, comme dans les espèces du même groupe, une tache blanche près du bord abdominal.

Le corselet est d'un vert-olivâtre foncé, bordé de blanc latéra-

L'abdomen est plus obscur que le corselet et il a sur chacun de ses côtés quatre bandes blanches, dont les deux premières plus luges, plus courtes, sont bordées antérieurement par une bande 2 re.

Le dessous des ailes est d'un rouge plus pâle que dans l'eu-

Cette soi-disant espèce nous a été vendue comme venant du mid de l'Italie. Nous en avons vu huit exemplaires parfaitement. semblables, chez M. Buquet, naturaliste à Paris. Duponchel s'ut assez porté à la regarder comme un hybride de l'euphorbue et de l'hippophaes, opinion inadmissible, par la raison que l'hippophaes ne se trouve pas en Italie.

### 6. D. NICÆA.

Depruner, Lep. pedemont. p. 85, no 173. — God. Paj III, pl. 47 ter, f. 1.

Sphinx cyparissies, Hubn. Sph. tab. 24, f. 115. — £ Hubn. Sph. 149, 150.

Cette grande espèce ressemble à un euphorbiæ, très-exagérée. En effet, elle approche presque, pour d'un Sph. convolvuli. Ses ailes supérieures offrent i même dessin que dans l'euphorbiæ. Le fond de leu d'une teinte plus pâle; les bandes olivâtres sont à mêmes, sauf que celle de la base offre, au milieu c de l'aile, un faisceau de poils blancs bien indiqué.

Les ailes inférieures sont beaucoup moins rouges leur extrémité est toujours d'un gris cendré.

Le corselet et l'abdomen n'offrent aucune différer En dessous, le corps et les ailes sont simplemen rosé, jamais rouges.

Il est toujours assez rare. Il se trouve en Langued vence.

Collect. Bd.

La chenille que nous avons figurée dans notre (Sphingides, pl. 1, fig. 3, 4, et pl. XI, fig. 1), est la p nous connaissions; elle n'a pas le moindre rappo de l'euphorbiæ. Lorsqu'elle est adulte, elle est d'un plus ou moins foncé ou un peu vineux; elle n'e pointillée; elle a sur le dos deux rangées de tac renfermées chacune au milieu d'un gros cercle noi sont disposées au commencement de chaque anne les deux premiers les cercles noirs sont incomplets e pas entièrement la tache jaune; sur le premier, la est presque en forme de 7 et s'avance jusqu'au mil Au-dessus des pattes il y a également une rang jaunes, un peu plus petites, bordées en dessus et el un arc noir, dont l'arc supérieur porte les stigma blanchâtres: au-dessus de chaque patte membrai en outre, un petit trait noir; la corne est rugueuse, d'un noir profond; la tête est d'un gris de perle av noire. Dans sa jeunesse, la petite chenille est verte

ches blanches entourées de noir. Elle vit quelquefois de compague avec celle de l'euphorbiæ sur les Euphorbia peplis, pilosa, Nuccensis et serrata. Selon M. Gustave Daube, qui a eu l'obligrance de nous envoyer cette magnifique chenille, elle est trèsrare sux environs de Montpellier; les montagnes des Cevennes, les territoires du Vigau, Alais, Anduze et Uzès, sont des localités et l'on est à peu près sûr de la rencontrer en juillet et en septembre.

### 7. D. LATHYRUS. Boisd.

Walker, List. Lepid. Brit. Mus. Het. pt. VIII, p. 472. — Moore, Catal. of Lep. of Ind. comp. p. 274, 632.

Il a le port et la taille de notre euphorbiæ, mais il est bien meins brillant. Ses ailes supérieures, qui offrent à peu près le même dessin que dans l'euphorbiæ, sont beaucoup plus ternes, mement sablées d'atomes olivâtres; la bande, d'un vert-olive, de l'estrémité est moins nette et moins sinuée en dehors.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande médiane rose, asses étroite, se fondant vers le bord abdominal avec une tache blanche; le bord terminal est d'un gris rosatre.

Le corselet est comme dans notre euphorbiæ; les antennes sont brunes et non blanches, comme dans notre espèce.

L'abdomen est marqué de chaque côté, dans sa moitié antérieure, de deux taches noires entrecoupées par deux taches blanches de grosseur égale.

Le dessous des ailes est d'un gris faiblement rosé avec deux raies communes noirâtres, se réunissant vers le bord abdominal des inférieures, et précédées sur le disque des supérieures, d'une petite tache obscure. Le ventre est entièrement grisâtre.

Il est très-rare dans les collections. Il habite le nord des Indes. Collect. Bd.

#### 8. D. DAHLII.

Boisd. Ind. méth. 1<sup>rt</sup> édit. p. 33.—Hubn. Suppl. tab. 36, f. 161-164.

— Treitschke, suite d'Ochsenh. t. X, Suppl. p. 132. — Boisd. Icones, pl. 50, f. 2-3. — Dup. Suppl. à God. Crep. II, pl. 1, f. 1.

Il est intermédiaire entre l'euphorbiæ et le lineata. Ses ailes supérieures sont d'un vert olivâtre avec une bande transverse sinuée d'un blanc plus ou moins lavé de jaunâtre, marquée près de la côte d'une tache ovale, olivâtre, précédée en dedans d'an

petit point noirâtre; leur extrémité postérieure e une bande d'un gris de perle un peu rosé, divisée vures blanches presque comme dans le lineata.

Les ailes inférieures sont rouges avec deux bande l'antérieure large occupe la base, et la postérieure au bord terminal; entre ces deux bandes, il existe les espèces du même groupe une tache blanche abdominal.

Le corselet est d'un vert olivâtre avec les épaul de blanc des deux côtés.

L'abdomen est du même vert que le corselet, me que côté de trois taches noires. Les incisions sont terrompues sur le dos; les trois premières sont e beau violet, lorsque l'insecte est vivant.

Le dessous des ailes est comme dans l'euphorbiæ.

Il varie un peu. Il y a des individus qui ont la band divisée dans le sens de sa longueur par une raie obse d'autres, les nervures blanches sont peu prononcées reconnaîtra toujours facilement cette espèce à ses tratérales noires et à ses épaulettes bordées de blanc et en dedans.

Il remplace en Sardaigne et en Corse notre euphoriaujourd'hui répandu dans toutes les collections.

Nous avons figuré la chenille dans notre lconograph gides, pl. 3, fig. 1, 2. Le fond de sa couleur est noirâtr brun foncé, piqué-de points d'un blanc jaunâtre beau petits que chez l'euphorbiæ, placés de môme en séries tra de chaque côté du corps, on voit sur chaque anneau, plus noire que le fond, portant deux taches oblongues c jaunâtre, dont l'inférieure est un peu rousse; il y a lieu du dos une raie longitudinale, un peu sinuée, d'un orangée légèrement obscure. Les côtés offrent une bar sur laquelle on voit à chaque anneau une tache oran quelques variétés, la bande disparaît, mais les taches 1 tête est d'un rouge obscur ainsi que la région anale; la rouge, chagrinée et arquée; les stigmates sont blancs bord

On trouve cette chenille assez communément en ma puis en septembre et en octobre, au bord de la mer, s phorbia paralies et myrsinites. On ne la rencontre ja l'intérieur des terres ni dans les montagnes.

### 9. D. TITHYMALI.

Boisd. Icones, pl. \$1, fig. 1.: - Dup. Suppl. & God, pl. X, f. 1 et 1 5.

Il est intermédiaire entre le Dahlii et le Zygophylli. Ses ailes supérieures sont d'un vert olivâtre, avec une bande transverse, sinuée, d'un blanc plus ou moins jaunâtre, un peu plus étroite que dans le Dahlii, mais marquée de même près de la côte d'une tache ovale olivâtre, précédée en dedans d'un petit stigmate noi-rêtre; le bord postérieur est longé par une bande d'un gris de perle, saupendrée d'atomes ou de hachures et divisée comme dans le Dahlii par des nervures blanchâtres.

Les ailes inférieures sont rouges avec deux bandes noires, dont l'antérieure plus large occups la base, et la postérieure paralièle au bord terminal; il y a, en outre, sur le bord abdominal une tache blanche frrondie.

Le corselet est d'un vert olivêtre avec les épaulettes bordées de blanc latéralement et en dessus.

L'abdomen est du même vert, marqué de chaque côté de deux sebes noires comme dans l'euphorbiæ; les incisions sont blanches interrompues sur le dos.

Le dessous des ailes est beaucoup plus grisâtre que dans l'eushorbiæ et le Dahlii, couvert de hachures noires.

Il se trouve dans le sud de l'Andalousie? M. Lucas l'a pris en Algérie; il est très-commun aux îles Canaries où, selon MM. Berthelot et Webb, l'on rencontre fréquemment la chenille sur l'Euthertia piscatoria.

### Coll. Bd.

Il diffère de l'euphorbiæ par ses épaulettes bordées de blanc des deux côtés, par la bande blanche transverse plus étroite et par ses nervures blanches.

Il se distingue du Dahlii en ce que les côtés de l'abdomen n'ent que deux taches noires.

Godart a connu notre tithymali, car il dit, vol. III, p. 477:

M. Ochsenheimer donne, sous le nom de Zygophylli, un Sphinx très-abondant à Ténériffe. » Si cet auteur, de regrettable mé-aoire, avait vu en nature le Zygophylli, il n'aurait certainement pas commis cette erreur.

### 10. D. CALVERLEYI.

Grote, Proced. of the Ent. Soc. of Philadelphia, vol. V, nº 1, p. 56, pl. 1, fig. 4.

Nous n'avons jamais vu cette espèce que nons considérons comme l'une des plus remarquables de l'île de Cuba. Notre description est faite d'après la figure qu'en a donnée le savant M. Grote.

Il a le port de l'euphorbiæ et du galii. Ses ailes supérieures, dont les nervures sont un peu blanchâtres, sont d'un brun légèrement olivâtre avec une bande d'un blanc un peu jaunâtre, sinuée des deux côtés; cette bande élargie, dans sa partie inférieure, commence assez près de la base et va se terminer au sommet; elle est surmontée vers la côte d'une éclaircie de sa couleur; le bord postérieur offre une bandé terminale comme dans Daucus et galii, mais plus large.

Les ailes inférieures sont noirâtres avec une bande médiane d'un rouge terne, un peu coupée par les nervures, se terminant, sur la gouttière abdominale, comme dans les espèces congénàres, par une tache blanche; le bord terminal est rougeâtre.

Le corselet est d'une couleur olivâtre, plus foncée sur les épaulettes qui sont bordées de blanc des deux côtés.

L'abdomen est d'un brun olivâtre; le premier segment est marqué de chaque côté d'une tache noire et les deux suivants d'une tache latérale blanche.

Cuba. — Décrit par M. Grote sur un exemplaire unique faisant partie de la collection de M. Poey, laquelle appartient aujour-d'hui au Musée de Philadelphie.

Cette rare espèce semble former un trait d'union entre notre tithymali et notre galii.

### 11. D. ZYGOPHYLLI.

Ochsenheimer, III, p. 226, 5. — Hubner, Sphing. tab. 27, f. 123. — Boisd. Icones, pl. 51, fig. 2. — Dup. Suppl. II, pl. 3, fig. 1.

Il est plus petit que notre euphorbiæ, et il se rapproche un peu davantage du galii. Ses ailes supérieures sont d'un vertolivâtre un peu terne avec une bande transverse, comme dans le galii. Cette bande est très-étroite, presque linéaire, aminole dans son milieu, sinuée et dentée sur son côté interne, d'un blanc un peu jounâtre; cette même bande envoie, en outre, vers l'extrématé de la cellule discoïdale, un petit prolongement linéaire en arrière d'un petit stigmate noir. Le bord postérieur est longé par une bande d'un gris olivâtre.

Les ailes inférieures sont d'un rouge rose avec deux bandes soires, dont l'antérieure assez large occupe la base, et la posténeure est parallèle au bord terminal qui est un peu plus pâle que le disque; le bord abdominal offre entre les deux bandes une tache blanche arrondie, coupée antérieurement par un peu de noir.

Le corselet est d'un vert olive avec les épaulettes bordées de lanc des deux côtés.

L'abdomen est aussi d'un vert olive, marqué de chaque côté ée deux taches noires comme dans l'suphorbiæ et le galii; les ameaux suivants sont bordés de blanc sur les côtés dans les incaions.

Le dessous des ailes et le ventre sont d'un gris jaunâtre avec às atomes plus obscurs.

On dit que la chenille de cette rare espèce vit en Tauride sur Zygophyllum jabago, plante de la famille des Rutacées assez commune dans quelques localités de l'Algérie.

Coll. Bd. - Nos individus viennent de Kislar.

### 12. D. GALIL.

Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 268, 38. — Hubn. Sphing. tab. 12, f. 64. — Cchseah. Schmett. von Europ. III, p. 217, 2. — God. etc. — Sphinz Emborbies, Linn. Mus. ulr. 336, 16.

Sphinz Chammerii, Harris, Cat.

Le Sphinz de la Garance, Engram.

Delephila intermedia? Kirby, Faun. boreali-americana, p. 302, 423.

Il a tont à fait le port et la taille de l'euphorbiæ. Ses ailes sureneures sont d'un vert-olive foncé, avec une bande blanchâtre
d'un blanc un peu jaunâtre, bidentée en avant et sinuée en
urière; cette bande commence un peu avant le milieu du bord
interne et va se terminer en pointe au sommet; le bord terminal
st d'un gris-cendré luisant.

Les ailes inférieures sont d'un rose terne avec deux handes soires, dont l'antérieure large, occupe la base, et la postérieure est parallèle au bord terminal; l'espace compris bandes offre, au bord abdominal, une tache hi accolée par son côté extérieur à une tache d'un ro

Le corselet est d'un vert olive comme dans l'est L'abdomen est également d'un vert olive, av points blancs sur le dos.

Le dessous des ailes est nuancé de gris et de un point noir à l'angle anal des inférieures.

La chenille est ordinairement d'un vert bronzé dorsale jaune; elle offre de chaque côté une rangé de taches arrondies d'un jaune soufre, bordées det l'anus sont d'un rouge obscur. On trouve quariété d'un vert plus clair chez laquelle la raitaches latérales sont presque blanches; chez cette nu tête et l'anus sont de couleur rose. La corne est au ou rosée.

Cette chenille se trouve en juillet sur le caille lium verum, la garance, Rubia tinctorum, et se nord de la France sur l'épilobe des marais. Nous une année dans le jardin d'un horticulteur à Pari lonia. Dans l'Amérique septentrionale on trouve qui ne diffère en rien du type européen. Sa el le nord des Etats-Unis sur les épilobes, ainsi q nom de Chamænerii que Harris lui a donné.

M. Clemens le réunit avec raison au galii.

Linné a connu le galii, mais il l'a regardé com de l'suphorbiæ. Voy. Mus. Lud. ulricæ.

Le D. intermedia de Kirby nous paraît être une Canadienne de notre galii, cependant il dit qu ailes supérieures est lavée de rose.

## 13. D. CELENO. Bolsd.

Il a le port de notre galii, mais il est beaucoi Ses ailes supérieures sont d'un vert olivatre, a oblique d'un blanc un peu jaunâtre; cette bande sommet au bord interne, offre, sur le côté qui r des dents aiguës qui se prolongent sur les nervures nal est longé par une bande grise; outre cela, il près du bord interne, une tache noire.

les siles inférieures sont d'un rouge un peu terne, avec deux bandes très-noires, dont l'antérieure large sinuée occupe la base, et la postérieure assez étroite est parallèle au hord terminal, lequel est d'un gris rosatue; l'espace compris entre ces deux bandes est marqué près de l'angle anal, sur le bord abdominal, d'une tache blanche.

Le corselet est d'un vert olivâtre, avec épaulettes bordées de lunc des deux côtés, mais asses faiblement en dessus. Les anzenes sont brunâtres avec la massue plus pâle.

L'abdomen est de la couleur du corselet, avec une raie dorsale l'anchâtre un peu obsolète; il est en outre marqué, de chaque vé, de trois ou de quatre taches noires alternant avec autant de més blanches.

Le dessous des ailes est grisâtre, pointillé de brun, avec la trace cune bande commune, un peu rougeâtre; celui des inférieures fre deux taches noires, l'une à l'angle anal et l'autre vers le mieu de la gouttière abdominale; celui des supérieures est marix su-dessous du milieu de la côte d'une tache ovale noirâtre. Cette espèce habite les environs de Buenos-Ayres, l'Uruguay et chili.

Coll. Bd.

14. D. OPHELTES.

Cramer, 285, B.

Nous n'avons jamais vu ce Sphingide qui, selon Cramer, habirrait à la fois le cap de Bonne-Espérance et la côte de Coromanavi.

D'après la figure de cet iconographe, il a le port et la taille du meats. Ses ailes supérieures sont d'une couleur olivâtre, avec met jusqu'à la base qu'elle envahit totalement; la partie anieure de cette bande offre des taches noires dont une arrondie in de la base, et les autres allongées, se fondant en partie dans a couleur olive; la côte est jaunâtre, et le bord terminal est longées me bande marginale grise, comme dans les espèces du même me upe.

les ailes inférieures sont rouges, avec deux bandes noires, dont im assez large occupe la base, et dont l'autre assez étroite est paralièle au bord terminal, laquelle est suivie d'une raie grise mise de jaunêtre près de la frange; l'espace compris entre ces

deux bandes est marqué sur le bord abdominal d'une nâtre.

Le corselet est olivâtre, bordé latéralement de jam L'abdomen est d'un olivâtre pâle sur le dos, un pet latéralement; il est marqué de chaque côté, près d'une grosse tache noire.

### 15. D. LINEATA.

Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 368, 39. — Ochsenh. — Panz — God. etc. — Sphinz Livornica, Hubn. Sphing. tab. 25, Livournien, Engram. — Kæchlini, Fuesly.

Il a le port et la taille de l'euphorbiæ. Ses ailes supé d'un brun olivâtre, avec sept nervures blanches; l'ex minale est bordée de gris cendré luisant; elles sont et versées du sommet au milieu du bord interne, par étroite d'un blanc jaunâtre, et marquées près de la petite tache blanche.

Les ailes inférieures sont roses, avec deux bandes i l'antérieure plus large et la postérieure presque margir de gris; la tache blanche abdominale est un peu tran lieu d'être arrondie comme dans les espèces du même

Le corselet est d'un brun olivâtre, avec les épaulet de blanc des deux côtés.

L'abdomen est également d'un brun olivâtre, ave latérale antérieure marquée de deux taches noires, et par du blanc; les anneaux suivants ont les incision coupées par des points noirs. Dans quelques individt du dos se réunissent pour former une ligne continue.

Le dessous des ailes est d'un gris brunâtre, ave noirâtre discoïdale sur les supérieures, et un petit ; vers l'angle anal des inférieures.

La chenille dont nous avons donné deux figures leonographie (Sphingides, pl. 5, f. 3, et pl. II, f. 2), v. couleur: le plus ordinairement elle est d'un brun un peu bronzé en dessus, avec une raie dorsale d'un cur, plus ou moins verdâtre dans son milieu; au-dess ligne il y a de chaque côté, une série de taches noire chacune d'une tache jaune arrondie; ces taches jaun nies ensemble par une ligne sous-jacente de la més

an-dessous de cette ligne et sous le ventre on voit quelques points noirâtres. Les stigmates sont verdâtres, un peu bordés de noir. La tête est d'un rouge obscur ainsi que le dessus de l'anus. La come est rouge, plus longue que dans ses congénères.

On la rencontre assez souvent d'un vert clair, pointillée de b'anc avec la raie dorsale, les taches latérales, la tête, l'anus et la hase de la corpe d'un rose incarnat.

Cette chenille est très-polyphage, on la trouve au bord des chemins et dans les champs sur beaucoup de plantes de familles rest éloignées.

Le lineata n'est pas très-rare dans les parties méridionales de l'Europe; il est très-commun en Algérie. Il se trouve aussi fort avant dans l'Orient, nous en avons reçu des exemplaires du Cachemire et de Darjeeling.

M. Danbe nous a écrit dans le temps, que d'après ses propres obsernions, cette espèce ne serait point indigène du midi de la France, nais qu'elle nous arrivait de la côte nord de l'Afrique ou du midi de l'Espagne, attendu que chaque année il en avait vu en picin jour, un grand nombre traverser la Méditerranée. Selon cet extomologiste, elle nous donne, comme le Celerio, une et quelquesois deux générations dans les années chaudes, mais jamais, di-il, les chrysalides qui n'ont pas eu le temps d'éclore à l'aumne n'ont produit leur papillon l'année suivante. — Gustave laube.

### 16. D. DAUCUS.

Cramer, 125, D. — Lineata, Smith-Abbot, Lep. ins. of Georgia, pl. 39. — Fabricius, Ent. Syst. III, 1, p. 368, 39. — Deilephila Daucus, Boisd. Lep. de la Californie, p. 63, 68.

Fabricius a décrit cette espèce américaine comme le lineata : Europe. Il cite à la fois comme synonymes le Kæchlini de i saly et le Daucus de Cramer, puis il dit daus sa description : Thorax virescens striis tribus albis duplicatis, » ce qui s'appuiue parfaitement à l'espèce des Etats-Unis qui a toujours six mes blanches sur le corselet, tandis que la nôtre n'en a que putre. Il ajoute en outre : Habitat in Europæ gallio vero, in service.

 offre de chaque côté une série de quatre à sinq tau alternant avec des taches blanches; au-dessous de les côtés sont d'un rose un peu roux; enfin, il y a sur petite ligne médiane, très-étroite, d'un blanc argen d'un peu de noir dans chaque incision. Le dessus d à peu près semblable. En dessous, la tache anale des est beaucoup plus noire et mieux marquée. Les am brunes et n'ont jamais le bout de la massue blanc e le lineats.

La chenille dont nous possédons plusieurs dessins en Abbot, est verte, elle a de chaque côté du dos une taches oblongues-allongées, jaunes ou d'un fauve roi en dessus et en dessous par un croissant noir; quel taches tendent à se réunir presque en une bande co stigmates sont de la couleur des taches, liserés de noi est assez longue, jaune ou d'un fauve roux, ainsi que

Cette chenille est, comme sa congénère, assez poly la trouve sur une foule de plantes basses.

Le Deilephila Daucus est commun en Géorgie, en Vir Coll. Bd.

### 17. D. VESPERTILIO.

Fab. Ent. Syst. III, 1, 369, 40. — Hubn. Sphing. tab. II — Ochs. Schmett. von Europ. III, p. 228, 6. — God. Pap. III, pl. XVII ter, etc.

Il est de la taille de l'euphorbiæ. Ses ailes supéri d'un gris cendré avec un stigmate blanc, suivi de de transverses, un peu plus obscures que le fond, peu marq l'antérieure est légèrement arquée et la postérieure fie

Les ailes inférieures sont d'un rouge fleur de pêche base et le bord terminal noirs: la frange est blanche.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est également d'un gris cendré avec le la moitié antérieure blancs et coupés par deux taci transversales.

Le dessous des ailes est gris avec une bande rosat disque des supérieures.

Cette espèce n'est pas rare dans les régions sous-alp Suisse, des départements de l'Isère et des Basses-Alp trouve aussi en Italie et dans les montagnes du Lyons La chenille que nous avons figurée dans notre Iconographie Sphingides, pl. 7, f. 6), est en dessus d'un cendré noirâtre avec une multitude de petites lignes transversales plus obscures. Elle L de chaque côté, une rangée de taches incarnates, entourées de res et cerclées de noir; ces taches sont quadrangulaires, arronnées à leurs angles; les stigmates sont jaunes bordés de noirâtre; à omième anneau est dépourvu de corne; le dessous du corps est d'un gris un peu incarnat avec les pattes roses.

On la trouve en juillet et à la fin de septembre sur l'épilobe i seuilles de romarin, Epilobium angustisolium. Elle ne mange soire que la nuit; pendant la chaleur du jour, elle se tient cauve sous les pierres ou sous les herbes qui entourent la plante.

Fabricius, dans sa Mantissa, avait donné à ce Sphingide le nom le Vempyrus, mais dans son Entomologie systématique, il a simplé le nom de Vespertilio que lui avait imposé Fuesly et Exer. Nous avons de la peine à comprendre que Fabricius ait sa rapporter comme synonyme du Vespertilio, le Chærocampa Inyelia figuré par Cramer, pl. 226!

### 18. D. VESPERTILIOIDES.

Sphinz Vespertilioides, Boisd. Ann. de la Soc. Linn. de Paris, 1827, v.l. VI, pl. 6, f. 4. — Boisd. Icones, pl. 49, f. 3, p. 22.

Ce Sphingide n'est certainement qu'un hybride du Vespertilio et de l'hippophaes; la chenille aussi bien que l'insecte parfait dirent la fusion complète des caractères propres à l'un et à l'autre. Ces sortes d'accouplements sont très-rares dans la nature. Le respertitio est peut-être la seule espèce en Europe qui se prête a ces mariages adultérins. Treitschke nous a écrit dans le temps, à propos d'hybrides, qu'il avait trouvé accouplées des Zygènes despèces différentes.

Cet bybride a les ailes supérieures d'un gris-cendré un peu le mehâtre, avec le bord postérieur longé par une bande oblique, beaucoup plus foncée et d'une couleur ardoisée à son extrémité près de la frange; le côté interne de cette bande est un peu niué; la côte est d'un gris olivâtre; la base et une partie du le rei interne sont garnis de poils blancs, divisés par une touffe de poils noirs, formant une bande courte; outre cela, il y a un petit stigmate noirâtre suivi d'une tache elliptique de la même couleur, médiocrement marquée.

Les ailes inférieures sont d'un rouge fieur de pê base et le bord postérieur noirs à peu près comme pertilio.

Le corselet est cendré avec les épaulettes bordées : par une raie blanche.

L'abdomen est de la couleur des ailes supérieur côtés entrecoupés par deux bandes alternativement blanches.

La chenille que nous avons figurée dans notre Icon que nous avons trouvée nous-même sur l'Epilobius lium, au bord du Drac, près de Grenoble, offre dans et son dessin, un mélange des caractères que l'on ren celles de l'hippophaes et du Vespertilio. La partie a son corps est un peu moins renflée que dans celle teinte générale, elle est d'un vert plus obscur que cel pophaes et de même pointillée de blanc, mais les plus rares, plus gros, à peine indiqués en dessus s antérieure des anneaux. Les deux lignes dorsales s sensibles, marquées comme dans le Vespertilio d'u taches rougeatres, mais plus petites; ces taches sont ( d'une teinte obscure, et au-dessous d'elles, il y a un n'est pas marqué de petits points blancs. Les deux te de la corne sont comme dans l'Hippophaes; celle-ci tite, presque nulle; les côtés offrent une bande lo blanche. Elle s'est chrysalidée à la fin de juillet; le pa est éclos à la fin de septembre.

Il paraît que le Vespertilio mâle s'accouple aussi avec l'hippophaes femelle, car on a trouvé des chenill sur l'hippophae rhamnoides qui différaient un peu de nous avons trouvées sur l'épilobe. C'est une de ces c l'hippophae qui a produit à Feisthamel le Sphinz A à l'état d'insecte parfait, est complétement semblal Vespertilioides.

Le Vespertilioides est, en raison de son origine, très les collections; nous n'en possédons que deux exemp qu'à présent, il n'a été observé qu'aux environs de 6 dans quelques localités du département des Basses-Al

### 19. D. EPILOBII.

keisd. Icones, pl. 51, fig. 3, p. 24. — Duponch. Suppl. t. II, pl. XI, t.i.

Voici une autre hybride au moins aussi rare que le Vespertilindes; c'est le fruit de l'accouplement du Vespertilio femelle sue le mâle de l'esphorbiæ.

Il ne présente auoun caractère spécial. Ses ailes supérieures ent grisatres; elles ont, à leur base, une tache d'un brun-olivate bordée des deux côtés par des poils blancs; dans la cellule ésoïdale elles ont une tache irrégulière, mal écrite, de la même soleur; sur le côté externe de cette tache, on voit une raie oblique, un peu plus pâle, descendant de la côte au bord interne; soin, vers le bord terminal, on remarque une bande oblique d'un brun-olivâtre, très-légèrement sinuée sur son côté interne; la portion située entre cette bande et la frange est d'un cendré elecur.

les ailes inférieures sont d'un rouge fleur de pêcher avec la base et la bordure noires. L'angle anal est d'un blanc très-faiblement rosé; entre la frange et la bordure noire, la couleur est du cendré pâle.

Le corselet est olivâtre bordé latéralement de blanc.

L'abdomen est d'un cendré un peu olivâtre avec deux taches attèrales noires entrecoupées de blanc.

Note. Il ne se distingue du Vespertilioides que par les caracères suivants : corselet olivâtre au lieu d'être d'un gris-cendré; undes des ailes plus obscures, plus prononcées, dont celle qui lage le bord terminal plus anguleuse et moins fondue avec la teinte de l'extrémité; le rose des ailes inférieures occupant mans d'espace et le dessous des ailes supérieures offrant sur le disque une tache noire ovale comme chez euphorbiæ et Dahlii.

Cet hybride est extrêmement rare. Nous en avons reçu un exemplaire de feu Merk. Il n'en existait alors qu'un second ann la collection de Donzel.

La chenille que nous avons figurée dans notre Iconographie, Sphingides, pl. 9, fig. 2, a la même forme que celle de l'euphortic, elle est de même d'un noir foncé, mais les petits points tentent à disparaître et ne sont pas visibles en dessus; les trois remises anneaux offrent seulement les rudiments d'une raie dorsale rouge. Sur les côtés du dos il y a une série de taches jaunes arrondies, au-dessous desquelles il en existe une ou deux autres très-petites; les côtés près des pattes sont marqués d'une raie rouge interrompue, tendant à disparaître. Le ventre offre aussi des traces rougeatres en dedans; la corne du onzième anneau est noire et très-petite.

Cette chenille, qui nous a été envoyée par Merk, Lépidoptériste plein de zèle et d'ardeur, a été trouvée par lui aux environs de Lyon, sur l'Epilobium angustifolium.

GENRE ELIBIA. Walker. — Chærocampa. Boisd. olim.

Chenilles: Inconnues.

Insecte parfait: Antennes longues, grêles, amincies insensiblement en pointe oncinée. Palpes obtus, épais, couverts de poils serrés, remontant au-dessus du chaperon. Yeux gros et très-saillants. Trompe plus longue que le corps. Corselet médiocre. Abdomen assez mince, allongé, conique. Ailes larges.

Les *Elibia*, dont nous ne connaissons encore que quatre espèces, sont propres aux Indes orientales. Ils se distinguent de toutes les autres espèces par leurs ailes très-larges proportionnellement à leur corps relativement assez grêle. Ces quatre espèces ont sur le dos une raie longitudinale blanche.

## 1. E. RUBIGINOSA.

Ampslophaga rubiginosa, Bremer, Beitr. zur Schmett. Faun. des Nördl. China's, tab. IV, f. 1. — Ménétriés, Enum. corp. animal. Mus. Petr. Part. II, pl. 12, f. 2.

Nous n'avons jamais vu cette espèce qui, d'après les figures données par M. Bremer et par Ménétriés, nous paraît appartenir au genre Elibia. Elle est d'un tiers plus petite que le Dolichus avec le sommet des ailes supérieures un peu pointu. Ces ailes sont un peu ferrugineuses, traversées par des raies brunes, cour bes, parallèles, dont celle qui est située un peu au-delà du milieu, est beaucoup plus large que les autres; outre cela, celle de l'extrémité, qui est très-fine, part de la pointe apicale, et devient flexueuse.

....



Les alles inférieures sont noirâtres avec le bord abdominal un per lerrugineux.

le corselet est de la couleur des premières alles, bordé latéra-

L'abdomen est brun avec une ligne dorsale, longitudinale, d'un sinc pur, s'étendant de la base de la tête jusqu'à l'extrémité mit.

Le dessous des ailes est d'une couleur ferrugineuse claire; celui inférieures est traversé par deux petites lignes noirâtres.

Schon M. Bremer, il se trouve aux environs de Pékin. — Décud'après les figures données par M. Bremer et par Ménétriés.

#### 2. E. DOLICHUS. Boisd.

Chevecampa Dolichus, Westwood, Cabin. orient. Ent. pl. 30, f. 1. — Luiz Dolichus, Walker, List. Lep. Brit. mus. Het. pt. VIII, p. 149. — T.ore, Cat. of Lepid. of india Comp. p. 273-631.

E a de 12 à 13 centimètres d'envergure. Ses ailes supérieures :: d'un gris olivâtre, traversées obliquement par une dizaine :: lignes brunes parallèles, dont celle du milieu et celle qui part :: sommet sont plus larges et plus obscures; outre cela, il y a :: petit stigmate blanchâtre entouré d'un espace brunâtre un :: oblong, mal défini.

Les ailes inférieures sont noires avec la moitié antérieure d'un ven-bienatre; leur bord extérieur est deutelé avec les échancrures blanches.

Le corselet est bordé latéralement d'un peu de gris-blannitre.

L'abdomen est un peu verdâtre avec une large rais dorsale L'hâtre, qui s'étend de la base des antennes jusqu'à l'extré-L'e nale.

Le dessous des ailes inférieures est un peu rougeâtre avec .- u raies maculaires, parallèles, noirâtres; celui des supérieures :- brun avec l'extrémité grise, précédée d'une espèce de bande :- citre. Le ventre et la poitrine sont d'un blanc rougeâtre.

Ce grand sphingide, très-bien figuré par M. Westwood, habite - zed des Indes.

Dicrit sur deux individus frais. - Coll. Bd.

## 3. E. DOLICHOIDES.

Philampelus Dolichoides, Feider, Novara, Exp. Zc Abth. 2, tab. 76, f. 8.

Il est un peu plus petit que notre Dolichus. Se res, un peu sinuées au-dessous du sommet, soi elivâtre avec trois bandes transverses étroites, parallèles, équidistantes, noirâtres, bordées de leur côté interne, allant de la côte au bord intelles ont, avant le bord terminal, une raie sinus couleur.

Les ailes inférieures sont entièrement br frange d'un blanc grisatre.

Le corselet est d'un vert olivâtre.

L'abdomen est un peu plus grisâtre avec i blanche, qui s'étend du sommet de la tête ju anale, comme dans le Dolichus.

Décrit d'après la figure donnée par M. Felder.

Il se trouve dans l'Himalaya.

#### 4. E. LINIGERA. Boisd.

Il a le port de Dolichus, mais il est de moitié ailes supérieures sont d'un gris olivâtre avec troparallèles, d'un brun-olive, dont celle de la balarge; entre celle-ci et la suivante, il y a un petichâtre entouré de brun; entre la dernière bande couleur devient un peu plus obscure.

Les ailes inférieures sont noires avec la moitié vert-bleuâtre; leur bord extérieur est dentelé a crures blanches.

Le corselet est d'un ferrugineux olivâtre, bord ralement.

L'abdomen est d'un brun-olivâtre tirant sur l une raie dorsale blanche s'étendant de la base d trémité anale.

Le dessous des ailes est rougeatre.

Elevé de chenille, à Manille, par M. Lorquin,

eavoyée en débris, dont il nous a été impossible de reconnaître la nature.

Décrit sur un individu unique. — Coll. Bd.

GENRE AMBULYX. Boisd. — Westwood. — Walker. — Moore, etc. — Sphinx auctorum.

Les chenilles des Ambulyx sont encore très-imparfaitement connues. Beske nous a envoyé dans de l'alcool cèlle du Strigilis, mais elle nous est arrivée dans un tel état de décomposition, qu'il nous est impossible d'en rien dire. Nous ne savons même pas si elle vit sur des plantes heracées ou sur des arbres. Il devait nous faire connaître celle de l'Eurycles et du Lycidas, si une mort inattendue ne l'avait empêché de tenir sa promesse.

lasecte parfait: Antennes grêles, de longueur moyenne, terminées par un très-petit crochet. Palpes couverts de poils serrés, avec les deux premiers articles bien séparés, bien istincts. Trompe à peine de la longueur du corps. Yeux de randeur moyenne. Corselet assez robuste. Abdomen conque ou un peu obtus à l'extrémité. Ailes longues sans dentelures; les supérieures pointues au sommet ou offrant souvent une petite échancrure à l'angle apical. Ailes inférieures colorées en jaune ou en rouge, traversées par plusieurs bandes noires.

Les Ambulyx habitent les Antilles, l'Amérique méridionale, les Indes orientales et Madagascar. Toutes les espèces effrent pour caractère accessoire d'avoir à l'extrémité des rés supérieures en dessous, une bande terminale pâle, et presque toujours en dessus un gros point ou une tache à leur base.

- + Ailes supérieures échancrées au sommet.
- 1. S. Ailes inférieures rouges.

### 1. A. PALMERI. Boisd.

il est à peu près de la taille d'un D. lineata. Ses ailes supé-

rieures, à peine échancrées au sommet, sont d'un gris-blanchêtres luisant, marquées de plusieurs taches d'un brun noir, savoir : una petit point tout à fait à la base sur une partie blanchêtre, suivi de deux grosses taches superposées, liserées de blanchêtre, dout une un peu échancrée en dedans sur le bord interne, et l'autre sur la côte; après ces deux taches vient une ligne transverse, oblique, droite; outre cela il y a également sur la côte quatre autres tâches brunes, dont la dernière, située vers l'angle apical, est beaucoup plus grande, plus foncée, et un peu liserée de blanchêtre; il y a encore, non loin de l'angle interne, une partie un peu plus obscure que la teinte générale précédée d'une tache brune.

Les ailes inférieures sont d'un rouge carmin, traversées par deux bandes parallèles, noirâtres, dont la postérieure est trèsétroite et un peu obsolète; la bordure est large, d'un brun noir; l'angle anal est blanchâtre marqué de deux points noirs.

Le corselet est grisatre, largement encadré latéralement, et en arrière, par du brun noir. L'abdomen est d'un gris blanchâtre, un peu plus obscur sur le dos.

Le dessous des ailes est d'une teinte roussatre pâle, avec le base des supérieures largement rougeatre.

Cette charmante espèce habite le Brésil, où elle a été élevée de la chenille par M. Palmer.

Décrit sur un individu unique faisant partie de notre collection

### 2. A. CRETHON. Boisd.

Il a le port des espèces suivantes, mais l'individu mâle que nous avons sous les yeux est plus petit. Ses ailes supérieures sont d'un brun pâle, avec des ombres plus foncées et des lignes transverses ondulées; la base est marquée d'un petit point noir sur un fond blanchâtre, suivi, en dehors, d'une double raie oblique, brune, allant du bord interne à la côte; outre cela, on voit sur la côte, vers le sommet, une tache quadrangulaire allongée, d'un brun noirâtre, et deux autres petites taches de la même couleur, dont l'une est située au dessous du second rameau de la nervure médiane et l'autre vers l'angle anal.

Les ailes inférieures sont roses, traversées par deux bandes noires, dont la postérieure est étroite et la bordure largement noirâtre.

Le corselet est de la même teinte que les ailes supérieures, avec les épaulettes brunes.

Le dessous des ailes supérieures est d'un jaune roussatre, avec des mies noiratres, très-sinueuses, et un stigmate noiratre pupilé de jaunatre qui reparaît un peu en-dessus; la base est largument rose sans aucune trace de bande noire; celui des infénieures et d'un gris blanchâtre, marqué vers la région anale d'une tache jaune entourée de brunâtre.

Décrit sur un individu défectueux envoyé du Pérou ou de la Boivie, dans un livre.

Call. Bd.

#### 3. A. GANNASCUS.

Stoll, Suppl. à Cramer, pl. 35, fig. 3 et 3 B.

Il est à peu près de la taille du Strigilis. Ses ailes supérieures sont d'un brun-grisatre à reflet luisant, traversées par des lignes endulées, noirâtres; outre cela, elles ont à la base un petit point soir suivi d'une bande transverse, oblique, d'un brun noir, un pen interrompue au-dessus de la nervure médiane, légèrement iserie de blanchâtre; on voit encore sur la côte, en tirant vers l'angie apical, une tache d'un noir brun très-bien marquée, et non loin de l'angle anal deux autres taches brunes, liserées d'un peu de blanchâtre, dont la supérieure arrondie et beaucoup plus grosse.

les ailes inférieures sont d'un rouge carmin, traversées par tous bandes noires dont l'intermédiaire plus étroite; les nervures tout également noires; ce qui rend les ailes comme quadrillées; l'angle anal est grisâtre.

Le corselet est de la couleur des premières ailes, avec les épaulettes largement d'un brun noir. L'abdomen est d'un gris lavé de rese avec le dos plus obscur.

Le dessous des ailes est d'un brun-pâle lavé de rose; celui des supérieures, dont la base est largement carminée, est marqué dans sa partie antérieure de trois bandes noires et sur la côte, près de sommet, d'une tache brune bien marquée, correspondant à celle de la surface opposée.

Nous avons en cette espèce de Becker, sans indication de localité. Stell la dit du Cap de Bonne-Espérance, mais elle est si volsine des autres, que nous la regardons positivement comme indigène de quelque point de l'Amérique centrale.

#### 4. A. ROSTRALIS.

Felder, Novara, Exp. Zoolog. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 7. Boisd. Consid. sur les Lépid. du Guatemal. p. 68.— A. James,

Il a le port et la taille du Strigilis et du Gannascus. supérieures sont d'un brun-cendré clair, luisant, avec t de la région apicale lavée de blanchâtre; elles sont me la base, sur une partie blanche, d'un point noir; un loin d'une bande transverse, oblique, de la même coul gulière sur ses bords, allant sans interruption, du bord la côte; outre cela elles ont plusieurs petites lignes transondulées, plus obscures que le fond, et sur la côte, non sommet, et aussi au-dessus du milieu du bord interne, a arrondie d'un brun un peu olivâtre.

Les ailes inférieures sont roses, avec les nervures et tre transverses noires, ce qui les rend tessellées.

Le corselet est cendré, largement encadré de brun e et sur les côtés.

L'abdomen est grisâtre, marqué sur le dos, dans la pl individus, de trois points noirs alignés.

Le dessous des ailes est jaunâtre, avec la base des su largement rose tachetée de noir.

Nouvelle-Grenade, Nicaragua. — Coll. Bd.

#### 5. A. DAPHNE. Boisd.

Ambulya Gannascus, Walker, Heterocera, p. 121, 2. — Catal.

Cette belle espèce a le port et la taille du Strigilis et de précédentes. Ses ailes supérieures sont d'un brun-violé avec une nuance plus obscure vers l'extrémité; elles se quées près de la base d'un point d'un brun noir entoure châtre, suivi en dehors, d'une bande transverse, oblique liserée de jaunâtre, légèrement irrégulière sur ses bor le plus ordinairement saus interruption, du bord intecôte; outre cela elles offrent deux taches d'un brun noi comme dans les espèces précédentes, l'une sur la côte du sommet, l'autre au-dessus du bord interne, en tiral du côté de l'angle anal; on voit encore, tout à fait sur

agis, une petite tache brune bordée d'un peu de blanc jauaire.

Les siles inférieures sont d'un joli rose, avec trois bandes transvenies, noires; les nervures sont également noires, mais moins disting que dans les espèces précédentes. Ce qui fait que dans selle-ci le rose occupe une plus grande surface et qu'elles sont moins tessellées; outre cela, la gouttière abdominale et l'angle seel sont d'un cendré grisâtre; ce dernier est marqué d'une liture mine faiblement liserée de jaunâtre.

Le correlet est de la couleur des premières ailes, fortement enméré de brun noirâtre sur les côtés et en arrière. L'abdomen et aussi de la couleur des ailes supérieures, marqué sur le dos fue rangée de trois ou quatre gros points bruns alignés.

Le dessous des ailes est roussâtre; celui des supérieures a la moité basilaire rose, marquée de trois bandes noires comme dans les trois espèces précédentes.

Décrit sur deux individus très-purs élevés de chenilles au Bréal, par Beske.

Coll. Bd.

Nota. Ménétriés a pris cette espèce pour le Gannascus de Stoll, qui diffère du Daphne par le dessin de ses ailes supérieures, et par la tache noire du dessous de ces mêmes ailes qui est bien maquée, et placée sur la côte près du sommet, par ses ailes inférieures et par son corselet qui n'est pas encadré de brun en artière, etc.

### 6. A. EURYSTHENES.

Felder, Movara, Exp. Zoolog. Theil. Bnd. II, Abtheil. 2, pl. 77, f. 5.

lest presque de la taille du Gannascus et du Rostralis, avec les siles supérieures un peu plus étroites, un peu plus pointues et un peu moins échancrées au sommet; elles sont d'une teinte blanchêtre jusqu'au-delà du milieu, et ensuite rembrunies jusqu'à l'entémité; tout près de la base elles offrent deux très-petits points d'un vert olive, séparés par une nervure; ceux-ci sont suivis d'une bande transverse, allant de la côte au bord interne, bien extère, sinuée en dedans, très-droite au contraire sur son côté externe; à l'extrémité de la cellule discoldale on voit une espèce d'œul oblong, cerclé de brun, tenant lieu de stigmate; outre cela, ces mêmes ailes sont marquées de lignes brunes, dentées et on-

dulées principalement sur la partie rembrunie de l'extrémité; elles ont sur la côte, près du sommet, une tache d'un vert olive, un peu oblongue, plus grande que dans les espèces du même groupe.

Les àiles inférieures sont roses, avec une bordure noire assez large, précédée de deux lignes pareillement noires, dont la postérieure est dentée en scie.

Le milieu du corselet est blanchâtre, avec les épaulettes largement d'un vert olive ainsi que le prothorax. L'abdomen est grisâtre.

Cet Ambulyx habite la Colombie et fait partie de la collection de M. Felder.

S. Ailes inférieures jaunes ou fauves.

### 7. A. STRIGILIS.

Sphinæ idem, Linné, Mantissa, I, 538. — Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 364, 26. — Cramer, 106, B. — Drury, Ins. I, tab. 28, f. 4, etc.

Il a de 10 à 13 centimètres d'envergure. Ses ailes supérieures, un peu échanorées à l'angle apical, sont d'un gris-brunâtre pâle, à reflets souvent un peu violâtres, avec quelques stries transverses plus obscures; elles sont en outre marquées de plusieurs taches d'un brun olivâtre, dont quatre le long de la côte et deux le long du bord interne; il y a encore un point à la base et quelques hachures de la même couleur sur l'angle anal.

Les ailes inférieures sont d'un roux fauve, avec trois raies transversales brunes, étroites, et un peu obsolètes, dont la postérieure est un peu coudée ; la bordure est brune et assez étroite.

Le corselet est de la couleur des premières ailes, avec les épaulettes d'un brun olivâtre, ainsi que les deux premiers segments de l'abdomen; celui-ci est d'un jaune grisâtre, avec des raies latérales obliques un peu plus foncées.

Le dessous des ailes est d'un fauve un peu roux, avec des lignes transverses d'une couleur plus intense.

Cette espèce est la plus commune; on la trouve aux Antilles et dans une grande partie de l'Amérique méridionale.

Coll. Bd.





# 8. A. TIGRINA.

Felder, Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 77, f. 4.

Il a le port du Strigilis. Ses ailes supérieures sont un peu plus choures, avec la tranche du bord terminal d'une couleur brustire; elles sont marquées près de la base, d'un point brun, suivi d'une hande de la même nuance, montant du bord interne à la savure médiane et surmontée, un peu en dehors, d'une petite tache un peu ocellée, de la même couleur; outre cela, on voit, comme dans les espèces du même groupe, des raies transversales sauées, plus obscures que le fond, et sur la côte près du sommet une tache brune.

Les aîles inférieures sont d'un jaune un peu orangé, traversées par trois bandes parallèles noires, coupées par des nervures de la même couleur; la bordure est noirêtre.

Le torselet est jaunâtre au milieu, avec les épaulettes largement d'un brun offvâtre. L'abdomen est d'un jaune roussâtre.

Il se trouve à Venezuela et probablement dans une grande partie de l'ancienne Colombie.

### 9. A. EURYCLES.

Boisd. in Herrich-Schmff. 102.

Il a le port et la taille du Strigilis. Ses ailes supérieures sont d'un blanc un peu grisatre dans le mâle, et d'un brun-violâtre très-pâle dans la femelle; elles sont traversées par plusieurs lignes sinueuses, ondulées, olivâtres, et marquées de bandes et de taches de la même couleur, mais d'une teinte plus intense, disposées ainsi: trois le long de la côte, dont la première, dans la plupart des individus, se prolonge obliquement du milieu de la côte au bord terminal, et la troisième, placée non loin du sommet, est un peu quadrangulaire; il y a, en outre, une bande longitudinale le long du bord interne, précédée en dedans d'un gros trait oblique; le lord terminal offre aussi une espèce de bande de la même couleur.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocre, traversées par très bandes noires, dont les deux postérieures sont très-étroites et coudées; ces trois bandes sont coupées par des nervures également noires; la bordure est brune et aussi étroite que dans le Strigilis. Le corselet est de la couleur des premières ailes, avec les épaulettes brunes. L'abdomep est roussatre avec des traits obliques plus foncés.

Le dessous est d'un jaune d'ocre, avec des lignes brunes transversales, ondulées sur les ailes.

Il se trouve à Cayenne et au Brésil. Beske l'élevait de chenille. Coll. Bd.

Nota. Cette espèce varie un peu pour le dessin des ailes supérieures.

### 10. A. ASTYGONUS. Boisd.

Il est plus petit que l'Eurycles. Ses ailes supérieures sont un peu plus blanchâtres, mais elles offrent à peu près le même dessin.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocre plus pâle, traversées seulement par deux bandes brunes parallèles, dont la postérieure, très-étroite, n'est nullement coudée. Ces deux bandes sont coupées par des nervures de la même couleur; la bordure est brune et assez étroite.

Le corselet est de la couleur des premières ailes avec les épaulettes d'un vert-olive foncé, ainsi que les deux premiers segments de l'abdomen; celui est d'un jaune d'ocre un peu grisatre avec des traits obliques plus foncés.

Le dessous est d'un jaune-d'ocre tirant un peu sur le vert.

Décrit sur un individu male, que M. Lucien Buquet nous a donné, comme venant du Brésil.

Coll. Bd.

† Ailes supérieures non échancrées au sommet.

§§ Ailes inférieures jaunes ou fauves.

#### 11. A. Substrigilis.

Westwood, Cabinet orient. Ent. pl. 30, f. 2. — Walker, List. Lepid. Brit. mus. Het. pt. VIII, p. 122. — Moore, Cat. of Lepid. of Ind. Company. p. 266, 612. — Variété? A. Moorei, Boisd. M. — Var.? Schauffelbergeri, Bre ner, Beit. zur Schm. Nörd. China's, p. 53.

Il a presque le port du strigilis. Ses ailes supérieures sont d'un gris-jaunâtre pâle avec cinq raies transverses ondulées, noirâtres; outre cela, elles ont, près de la base, un gros point



arrodi d'un fauve-lèun, surmonté, près de la côte, d'un trait leur; leur extrémité est pointillée de gris noirêtre avec une rais anté-terminale brune, allant du sommet à l'angle interne; entre este rais et la frange la couleur devient fauve.

Les ailes inférieures sont d'un jaune fauve, un peu pointillées de brun, avec trois bandes transverses noires, parallèles, dont la deuxième est crénelée et la dernière courte.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures avec les épaulettes d'un brun ferrugineux.

L'abdomen est d'un gris jaunâtre.

Le dessous des ailes est fauve avec des irrorations brunes et me raie auté-terminale noirâtre, comme en dessus.

Sylbet. — Décrit sur un individu appartenant au British museum.

Note. L'exemplaire que nous avons décrit chez M. Horsfield sous le nom de Moorei, et dont nous possédons un individu-femelle recueilli à Java, forme peut-être une espèce particulière; ses ailes supérieures sont hrunâtres, à reflet un peu violâtre; elles sont marquées, au lieu de stigmate, d'une tache réniforme; les igas ondulées sont un peu plus distantes; la raie anté-margiale est doublée, en dedans, par une raie d'un jaune-verdâtre; les ailes inférieures sont d'un jaunâtre obscur, très-fortement paintillées de brun entre les deux dernières bandes; elles ont, en outre, une tache d'un brun-noirâtre à leur base.

Il est probable que le Schauffelbergeri de la Chine, décrit par III. Bremer et Grey, n'est qu'une variété locale du substrigüis.

## 12. A. SUBOCELLATA.

Felder, Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, tab. 76, fig. 3.

Il a le port et la taille du substrigilis, particulièrement de la vanété Moorei. Ses ailes supérieures sont d'un brun-griaâtre obscur, traversées au milieu par une large bande d'un gris-jau-aître pâle; elles ont, près de la base, trois ou quatre gros points moratres, cerclés de blanchâtre, alignés transversalement, et sur la bande transverse, un stigmate blanchâtre, suivi, en dehors, d'un ou deux points noirâtres; outre cela, le bord terminal oftre une raie noirâtre transverse suivie d'une bande marginale d'un gris-jaunâtre.

Les alles inférieures sont d'un jaune testacé, traversées par deux raies brunes assez étroites, dont la postérieure crénelée; leur bordure est étroite et de la même couleur.

Le corselet est brunâtre.

L'abdomen est plus pâle, principalement sur les côtés.

Le dessous des ailes inférieures est d'un fauve testacé avec quelques irrorations brunes.

Décrit sur un individu défectueux, trouvé par M. Lorquin en Cochinchine.

Il paraît qu'il varie un peu pour la couleur des ailes supérieures, car un individu de Java, figuré par M. Felder, est d'une teinte roussatre.

Coll. Bd.

### 13. A. RUBRICOSA.

Walker, Heterocera, p. 122, 4.

Nous ne connaissons pas cette espèce qui, d'après M. Walker, s'éloigne plus du strigilis que les autres espèces, par ses ailes supérieures comparativement plus larges avec le bord terminal plus droit et moins oblique.

ll a 58 lignes anglaises d'envergure.

Il est ferrugineux en dessus et jaune en dessous.

La tête est blanchâtre avec une bande testacée. Les antennes et les palpes sont blancs.

Le corselet est blanchatre en avant avec les côtés cendrés.

L'abdomen est d'un brun tanné, fascié de gris sur le bord des segments.

Les ailes supérieures sont grises à la base avec trois bandes jaunâtres, dont la première, située près de la base, s'étend le long de la côte pour se réunir à la seconde, qui est oblique, et dont la troisième, qui est sous-apicale, va presque jusqu'à la côte.

Les ailes inférieures sont d'une teinte rosée avec la côte testacée; la base est d'un brun roussatre ainsi qu'une bande transverse.

Le dessous des ailes est traversé par des lignes obliques, ferrugineuses, ondulées.

Hindostan. — Coll. de M. Saunders. — Walker.



## 14. A. COQUERELII. Boisd.

Il est près de moitié plus petit que les espèces précédentes. Ses ailes supérieures sont d'un blanc-jaunâtre lavé d'un peu de molet, avec des taches et des bandes d'un brun-olive; elles ont; près de la base, deux taches asses grandes, dont l'une sur le bard interne et l'autre sur la côte; ces deux taches sont suivies d'une très-petite ligne tortueuse peu indiquée, puis d'une raie transversale, un peu sinuée, dilatée sur la côte; outre cela, elles ent deux bandes longitudinales de la même teinte, dont une plus courte sur l'extrémité du bord interne, et dont l'autre plus longue, cunéiforme, située dans la première bifurcation de la nervure médiane, va rejoindre une bande marginale et reçoit de la côte un trait transversal.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'oore gai, traversées par deux très-petites ligues, peu marquées, d'une teinte brunâtre; la tordure est brunâtre, médiocrement large, un peu cendrée en smère.

Le corselet est de la couleur des premières ailes avec les épaneues et la base de l'abdomen d'un brun-olive.

L'abdomen est grisatre.

Le dessous est d'un jaune d'ocre très-clair.

Décrit sur un individu unique, qui a été pris à Nossi-Bé, près de Madagascar, par feu le docteur Coquerel (1), qui a eu l'obligeance de s'en dessaisir en notre faveur.

### 15. A. LYCIDAS. Boisd.

Il est d'un tiers plus petit que le strigilis, avec ses ailes supéneures très-aignés et presque falquées; leur couleur est le brun-

(i) Le docteur Charles Coquerel, chirurgien de la marine, entomoogiste très-distingué et excellent observateur, a publié dans les Anaules de la Société entomologique des notes fort intéressantes sur les
mectes de Madagascar et sur les métamorphoses de plusieurs Coemptères. Il nous a aussi fait connaître certaines espèces de Diptères
dunt les larves vivent à Cayenne aux dépens de l'homme et détermiaux quelquefois la mort. Ce jeune docteur, regretté de tous ses colegues, a succombé à l'île de la Réunion, il y a trois ans. C'est pour
perpétuer le souvenir de ce savant enlevé à la fleur de l'âge, à ses
parents et à ses amis, que nous lui avons dédié os Sphingide.

roux avec cinq taches ou gros points d'un brun-olive liserées de blanc et disposées ainsi : à la base une grosse tache oblique allant du bord interne à la nervure médiane; plus haut, sous les nervures costales, un point ovoïde; au milieu, une petite tache; sur la côte; en tirant vers le sommet, une tache arrondie bien nette; enfin, sur l'angle anal, une tache oblongue coupée par deux petites stries transversales blanches.

Les ailes inférieures sont fauves, marquées, vers l'angle anal, d'une tache d'un blanc jaunâtre, environnée d'un peu de brun, et suivie de deux petits points noirs légèrement cerclés de blanchâtre.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures avec les épaulettes olives bordées d'un peu de blanc inférieurement.

L'abdomen est roux avec le premier anneau d'un roux-olivâtre.

Le dessous est fauve avec une lunule noire sur le disque des supérieures, correspondant à la tache du dessus.

Décrit sur un mâle et une femelle élevés de chenille, au Brésil, par Beske.

Coll. Bd.

# GENRE PHILAMPELUS. Harr. - Sphinx auctorum.

Chenilles: Grosses, cylindriques, presque d'égale grosseur aux deux extrémités, avec la tête petite, globuleuse, un peu rétractile sous le premier anneau. Ces chenilles, dans leur jeunesse (au moins celles que nous connaissons), sont pourvues, sur leur onzième segment, d'une petite corne grêle, allongée. Elles perdent cet appendice lorsqu'elles sont tout à fait adultes.

Chrysalides: Grosses, assez allongées, munies d'une pointe anale assez saillante.

Insecte parfait: Tête un peu proéminente; antennes assez longues, assez grêles, terminées par un crochet trèsprononcé. Palpes épais, entièrement couverts de poils serrés. Yeux gros et saillants. Trompe assez développée, de longueur moyenne. Corselet très-robuste. Corps gros, cylindrico-conique. Ailes bien développées, sans échancrures



ni dentelures; les inférieures avec une hande anté-terminale noire, précédée, vers le milieu de la gouttière abdominale, d'une tache également noire de forme variable.

Les Philampelus sont propres au nouveau continent. Leurs chenilles, ainsi que la nom l'indique, vivent sur divenes espèces de vignes ou sur quelques plantes de la famille des Onagraires.

## 1. P. LABRUSCE.

Linné, Mus. Lud. ulr. 332. — Syst. nat. 2, 800, 14. — Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 377, 66. — Clerck, Icon. 47, f. 3. — Cram. 184, A, — etc.

Envergure, environ 12 centimètres. Ailes supérieures d'un beauvert pistache, offrant sur leur milieu un triangle d'un vert plus locé, suivi en dehors d'une tache ferfugineuse; il y a en outre, srès du bord terminal, un petit point brun sur chaque nervure.

Ailes inférieures d'un jaune pâle à l'extrémité, d'un noir bleu sa milieu, avec une tache centrale d'un bleu pâle; cette partie d'un noir bleu s'appuie en arrière sur une bande d'un bleu pâle, suivie elle-même d'une bande noire; entre le bord abdominal si tache du milieu, il y a une tache d'un reuge fersugineux qui se prolonge en pointe jusqu'à l'angle interne.

Le corselet et l'abdonnen sont d'un beau-vert pistache.

Le dessous des ailes est jaune, traversé par deux lignes brunes; le disque des supérieures est vert. Le wentre est également jaunitre, marqué de cinq points blancs de chaque côté.

La chenille qui vit sur plusieurs espèces de vignes et de Cissus, est encore mal connue.

Solon Mérian, elle est brune sur le dos, avec les côtés panachés de blanc et une plaque mobile blanche sur le onzième anneau. Il est probable que dans le premier âge elle est pourvue d'une sons caduque, remplacée plus tard par la plaque dont il s'agit.

Le labrusce habite la Guyane, le Brésil et les grandes Anulles; il est très-répandu dans les collections.

### 2. P. PHORBAS.

Cramer, 53, B. — Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 365, 30. — Walker, Heterocera, p. 179, 10. — Pandion, Cram. 321, A.

Il a le port et la taille du labrusca. Ses ailes supérieures sont Légidoptères. Tome I. 13

d'un vert obseur, marquées de traits bleuâtres, dont un tout fait transversai avant le milieu; les autres sont asses courts, groupés vers le milieu du bord interne et près de l'extrémité de l'extrémité de le côte; en outre, il y a une raie oblique bleuâtre qui descend de la pointe apicale, en se courbant dans son milieu, mais n'arrivan pas jusqu'au bord inférieur; le stigmate est brun, plus ou mois large.

Les ailes inférieures sont d'un jaune orange avec deux larges bandes noires, dont celle du milieu est comme déchiquetée sur ses bords, tandis que la postérieure forme une très-grosse tache sur l'angle externe; quelquefois celle-ci s'allonge pour se réunir à la première vers l'angle anal; c'est ce qui arrive dans le Pherbas de Cramer.

Le carselet det vert.

L'abdomen est vert en dessus, jaunâtre sur les côtés, marqué de deux larges raies noires parallèles s'étendant depuis les yeux jusqu'à l'extrémité anale.

Le dessous des ailes est d'un jaune verdâtre, avec deux petites raies transversales brunes.

Décrit sur un individu appartenant au Museum national.

Cette espèce est toujours très-rare. Sa patrie semble être semble ment la Guyane hollandaise. On ne la reçoit jamais de Cayenne.

### 3. P. CAPRONNIERI. Boisd.

Il a le port du *Phorbas*, mais, outre qu'il est d'un tiers plus petit, ses ailes supérieures sont pointues au sommet. Le fond de leur couleur est d'un gris un peu violacé, avec une tache hesilaire, deux bandes transverses et une tache costale anté-apicale, d'un vert-pistache foncé; la tache basilaire est un peu noirète, arrondie et située près du bord interne; la bande qui la suit es sinuée en dehors et comme étranglée dans son milieu, terminisérleurement par une dilatation extérieure d'un vert claire troisième, élargie sur la côte, forme un triangle renversé et traverse pas l'aile entièrement. Outre cela, il y a quelques petits lignes ondulées, transverses, un peu obsolètes, et une raie oblique brunâtre aliant se perdre dans la pointe apicale.

Les ailes inférieures sont d'un jaune orangé, avec une large bande noire traversant l'aile verticalement, et une large bordune la même couleur à peu près comme chez le Phorbas; l'angle mal est un peu cendré, coupé par deux lignes noires.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, avec une médiane brune; les épaulettes sont largement bordées en dessus par une bande verte et brune.

L'abdomen est grisâtre et offre de chaque côté une bande longitadinale d'un brun roussâtre, allant des épaulettes jusqu'à l'avant-dernier segment. Cette bande offre deux dilatations inféneures très-prononcées à son extrémité.

Le dessous des ailes est d'un gris roussâtre, avec deux raies transverses noirâtres; celui des supérieures présente en plus une raie oblique, brune, vers la pointe apicale, correspondant à celle de la face opposée; celui des inférieures a la gouttière abdomitale d'un jaune d'ocre.

Décrit sur un individu femelle élevé de chenille sur les bords de l'Oyapock. — Coll. Bd.

Catte belle espèce vient se placer tout près du Phorbas, dont che est très-voisine. Nous l'avons dédiée à notre collègue M. Ca-pranier, président de la Société entomologique de Belgique, comme un faible témoignage de notre estime.

### 4. P. ANCHEMOLUS.

Cramer. 224, C.

Envergure 13 à 14 centimètres. Cette grande espèce est voisine de Satellities. Ses ailes sont variées de brun foncé luisant et de pis violâtre; elles sont traversées par de nombreuses raies brundres, sinuées, plus ou moins nettes; la moitié antérieure est legement brune vers le bord interne; la partie postérieure est legement beaucoup plus foncée que la teinte générale, dont elle est séparée par une raie oblique de couleur pâle qui va du milles de la côte aboutir à la première nervure médiane pour gater le bord interne. Outre cela, il y a une tache brune sur la les près du sommet et une tache semblable sur l'angle interne, laptelle est surmontée d'un gros point de sa couleur; le stigmate est noirâtre, ordinairement accompagné d'un ou de deux petits toints de sa couleur.

Les ailes inférieures sont d'un blanc verdâtre à la base, avec l'estrémità largement d'un brun noir et une grosse tache également poire en face le milieu du bord abdominal; outre cela, il

y a à l'angle anal une petite bande transversale d'un gris rostre, marquée de deux ou trois petites lunules noires plus ou moins visibles.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, avec les épaulettes et une large raie médiane brunes.

L'abdomen est brun en dessus, grisâtre sur les côtés, avec les incisions un peu blanchâtres; outre cela, il offre sur le dos une suite de taches triangulaires de la même couleur que les côtés, et à sa base une tache latérale brune.

Le dessous des ailes est rougeâtre, traversé par deux lignes noirâtres.

Cette grande espèce n'est pas très-rare au Brésil et à la Guyane. Année a trouvé plusieurs fois sa grosse chenille, à Cayenne, sur une vigne sauvage, probablement un Cissus.

Coll. Bd.

En examinant bien ce grand Sphingide, on y retrouve presque les mêmes caractères que dans le Satellitia, mais ce n'est pas une raison pour les réunir. Notre euphorbiæ et notre Nicæa, et plusieurs espèces du même groupe, offrent aussi presque les mêmes caractères, et cependant les chenilles qui les produisent sont très-différentes.

### 5. P. SATELLITIA.

Linné, Mantiss. I, 539. — Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 370, 42. — Drury Ins. I, tab. 29, f. 1, 2. — *Licaon*, Hubn. Exot. Saml.

Envergure 11 à 12 centimètres. Les ailes supérieures sont d'ur gris-blanchâtre plus ou moins lavé d'olivâtre; elles sont traver sées par des raies brunâtres, sinuées, ordinairement très-obsoliètes. Sur le milieu du bord interne, il y a une grosse tache d'ur brun olive, carrée lorsqu'elle est isolée, mais se prolongeant que quefois jusqu'à la base; le stigmate est très-noir, accompagn d'un ou de deux points de la même couleur, que Linné a comparés aux satellites qui accompagnent la lune. Un peu au-de de ces points noirs, il y a une ligne oblique de couleur pâle que du milieu de la côte, aboutir à la première nervure médiai pour gagner le bord interne; la partie comprise entre cette ligiet l'extrémité est souvent plus obscure que la teinte général outre cela, il y a une tache d'un brun olive, triangulaire, sur côte, près du sommet, et une tache semblable sur l'angle internaquelle est surmontée d'un gros point de sa couleur.



Les ailes inférieures sont d'un gris-blanchâtre pâle à la base, avec une grosse tache noire en face le milieu du bord abdominal et une bande transversale de la même couleur, devenant tout à fait maculaire en arrivant à l'angle anal. Celui-ci est rose dans la gouttière abdominale; la bordure est d'un gris rosé.

Le corselet est de la vouleur des premières ailes, avec une raie médiane et les épaulettes d'une couleur olive foncée.

L'abdomen est olivâtre en dessus, grisâtre sur les côtés, avec les incisions liserées de blanchâtre; outre cela, il offre sur le dos me suite de taches triangulaires grises.

Le dessous des ailes est d'un brun clair, traversé par deux peutes lignes noirâtres.

Il se trouve aux Antilles. Nous ne savons pas s'il habite le contoent américain.

M. Hornebeck a élevé plusieurs fois sa chenille sur des vignes sauvages.

Coll. Bd.

La figure de ce Sphingide, donnée par Hubner, ne laisse rien à décirer.

### 6. P. PANDORUS.

Hubner, Exot. Saml. f. 3, 4. - Ampelophaga, Leconte.

Envergure 9 centimètres environ. Ailes supérieures sinuées à l'extrémité, d'un gris-blanchâtre lavé de rose; elles ont depuis le milieu du bord interne jusqu'à la base une large bande d'un vert olive, coupée carrément, et vers l'angle anal une tache de la même couleur; le stigmate est noir accompagné de deux points semblables; la seconde nervure est rose, et partage obliquement la couleur du fond, de la couleur olive qui occupe le restant de la surface; cette partie foncée s'éclairoit un peu vers l'extrémité vù elle est divisée par quelques petites lignes transverses, ondulées, un peu plus obscures, très-obsolètes; outre cela, on voit le long de la côte deux ou trois petits traits verdâtres et vers le semmet, comme dans les espèces voisines, une tache d'un vert siève.

Les alles inférieures sont d'un blanc verdâtre à la base, avec une grosse tache noire en face le milieu du bord abdominal et une bande transverse de la même couleur, se terminant vers l'angle interne par quatre taches très-noires surmontées d'une petite ligne ondulée brunâtre peu marquée; au-dessus des petites taches noires, il y a un espace rose qui se prolonge jusqu'à l'angle anal; la bordure est olivâtre, assez pâle.

Le corselet est d'un gris légèrement verdatre, avec les éparlettes d'un vert-clive fonce ainsi que la trace d'une petite ligne médiane, très-peu indiquée.

L'abdomen est d'un vert-olive foncé à sa base, d'un vert pile en dessus avec les côtés d'un gris blanchâtre; outre cela, il offe sur le dos une bande grisàtre.

Le dessous des ailes est jaunâtre avec deux lignes communes, transverses, plus obscures; le disque des supérieures est plus on moins noirâtre.

Cette espèce n'est pas rare aux Etats-Unis, car il y en avait toujours un certain nombre d'exemplaires dans tous les envois de feu John Leconte et d'Abbot.

Nous avons aussi reçu le dessin de la chenille; malheureusement il a été égaré, de sorte que nous ne pouvons rien en dire, si ce n'est qu'elle vit sur une espèce de vigne.

Hubner place ce Philampelus à côté du nerii dans son Coitss Daphnis, tandis qu'il met son Licaon qui en est si voisin dans son Coitus Pholus à côté de ficus et de Strigilis!!

### 7. P. EACUS.

Cramer, 285, E.

Nous ne connaissons cette espèce que par la figure de Cramer. Elle a le port et la taille du Pandorus dont elle est assez voisine. Ses quatre ailes sont d'un vert pâle; les supérieures sont traversées par un grand nombre de petites raies courbes, brunes; ces mêmes ailes ont, surtout pour caractère distinctif, une bande oblique d'un jaune une peu testacé, s'étendant entre la première et la seconde nervures médianes depuis le milieu presque jusqu'à l'extrémité; au-dessous de cette bande, il y a sur le bord interne une grosse tache d'un brun olive qui va presque jusqu'à la base; cette même bande est bordée en dessus par une autre d'un brun olivâtre qui remonte vers la côte pour se dilater en un grand triangle de sa couleur; il y a, en outre, au sommet, vers le bout de la côte, une tache brune allongée.

Les ailes inférieures ont une grosse tache noire en face le milieu du bord abdominal et une bande transversale de la même couleur, dentée en arrière et suivie d'une bordure grisâtre. Le cerrelet est d'un gris blanchâtre avec les épaulettes brunes et une petite ligne médiane de la même couleur, assez courte ; il offre aussi en arrière deux petites taches brunes, triangulaires.

L'abdomen est gris avec des anneaux bruns dilatés sur le milieu du dos.

Il est de Surfnam.

### 8. P. PISTACINA. Boisd.

Cette espèce ne ressemble à aucune autre. Elle est de la taille dun petit nersi. Ses ailes supérjoures légèrement falquées et un peu évidées au-dessous du sommet, sont d'un gris blanchâtre, cèrement lavées de verdâtre; le stigmate est noirâtre; entre c-lui-ci et la base, il y a trois bandes transverses sinuées, d'un tert elive; au-delà de ce même stigmate, on voit une bande curbe d'un vert-elive clair, sinuée en dehors, et avant l'extrémité, une bande irrégulière de la même couleur.

Les ailes inférieures sont d'un jaune blanchâtre avec une borline d'un noir assez foncé, ainsi que les nervures et une tache assiàire obsolète.

Le consellet est d'un vert olive avec les épaulettes bordées la-

L'abdomen est roussâtre.

Le dessous des ailes est ochracé, sablé de hoir; le disque des sepérieures est noirâtre, marqué en dehors d'une tache beaucoup p'us noire.

Décrit sur un exemplaire unique que nous avons reçu de linas Geraes, au Brésil.

Nous plaçons provisoirement ce Sphingide dans le genre Phiimpelus, d'où peut-être on devra le retrancher un jour.

### 9. P. CRANTOR.

Cramer, 404, 348. — Pab. Ent. S. III, 1, p. 375, 58. — Smith-Abbot, vol. I, pl. 47. — Sph. Achemon, Drury, Ins. II. tab. 29, f. 1.

Les ailes supérieures sont d'un gris un peu roussatre faible-dent rosé; elles sont marquées sur le milieu du bord interhe d'une grosse tache carrée brune, d'une autre un peu trianguaire vers le sommet et d'une troisième plus petite, géminée près le l'angle interne, également brunes; outre cela, le fond est un

peu rembruni dans son tiers postérieur, et l'on voit sous la côte quelques petits traits bruns obsolètes.

Les ailes inférieures sont roses, avec une bande anté-marginale étroite, noire, maculaire dans la moitié qui va gagner l'angle interne, suivie d'une bordure d'un gris brupâtre rosé; outre cela, vers le tiers inférieur de la gouttière abdominale, il y a un espace d'un rouge vineux qui se fond plus ou moins avec la couleur rose.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, avec les épaulettes marquées d'une tache brune triangulaire.

L'abdomen est grisâtre.

Le dessous des ailes est roussatre, avec le disque des supérieures d'un rouge rose.

La chenille, dont nous possédons un fort beau dessin et en outre une description détaillée par M. Lorquin, est verte dans sa jeunesse avec six bandes obliques jaunes, et une come ou plutôt une queue filiforme, très-grêle, très-longue, arquée du côté de la tête; cet organe est toujours en mouvement et oscille dans tous les sens comme pour écarter les parasites importuns. A la dernière mue, cet appendice disparaît; la chenille prend une couleur brunâtre, plus pâle sur le dos, avec deux raies longitudinales obscures; son corps est pointillé de noir, avec six bandes obliques jaunes liserées de noir; la queue est remplacée par une plaque écailleuse qui ressemble à un œil.

Elle vit en Virginie, en Georgie, dans le sud de la Californie et à la Jamaïque sur plusieurs espèces de vignes sauvages.

L'insecte parfait n'est pas rare dans les collections.

C'est d'après un renseignement inexact que Cramer indique cette espèce comme des Indes orientales.

### 10. P. VITIS.

Linné, Mus. Lud. utr. p. 354, 14. — Cramer, 268, E. — Merian, Surin. 47.

Il est d'un tiers plus grand que le *kineala*, Ses ailes supérieures sont d'un brun-olive foncé, avec quatre nervures blanches; elles ont une bande longitudinale blanche, quelquesois faiblement rosée, qui part du milieu de la base pour aboutir au sommet; cette bande est coupée transversalement et obliquement par une bande semblable qui, du bout de la côte où elle est un peu arquée, arrive vers le milieu du bord interne; outre cela, il y a un stig-

mate blanc entouré d'un ou deux points noirs, et un peu avant le milieu, sur le bord interne, un trait transversal blanc surmonté près de la côte, au-dessus de la bande longitudinale, d'une ache de la même couleur; la bordure est d'un gris ardoisé.

Les ailes inférieures sont d'un gris verdâtre, avec une grosse tache noire, presque carrée, vers le milieu du bord abdominal; de la partie inférieure de cette tache part une raie noirâtre, transverse, qui va gagner le bord interne; la bande antémarginale est également noire, précédée d'une petite ligne transversale brune; la bordure est grise; outre cela, la gouttière abdominale est marquée d'un large espace d'un rouge carmin.

Le corselet est gris, avec les épaulettes et une raie médiane d'un brun olive.

L'abdomen offre à sa base une bande transversale d'un brun sive, bordée en arrière par une petite ligne blanche, et sur chaque côté une tache très-noire; il est gris sur les côtés, avec le dessus des agneaux d'un brun olive, coupé par une bande . longitudinale grise, assez étroite; toutes les incisions sont liserées de blanc.

Le dessous des ailes est grisatre, avec l'angle anal des inféneures rose.

Il se trouve dans une grande partie de l'Amérique méridionale.

Année l'a élevé de la chenille, à Cayenne, sur une vigne saurage; Beske l'a également élevé au Brésil sur une plante du même genre.

Coll. Bd.

## 11. P. HORNEBECKIANA.

Harris, Descrip. Catal. p. 19 (nota).

Nous avons eu de fréquents rapports avec notre ami, M. Hornebeck, mais nous n'avons jamais reçu de lui cette espèce, que nous ne connaissons que pas la description qu'en a fait Harris.

D'après cet entomologiste, elle a le port et la taille du Jussieæ. Ses alles supérieures sont d'un brun-olivâtre avec les nervures et le bord marginal blades; elles ont, en outre, deux bandes en sautair d'un blane argentin, et sur le milieu, au bout de la cel-le discoidaje, deux points noirs très-rapprochés.

Les ailes inférieures sont d'un tendré-olivâtre avec la bordure plus obscure, et une bande transversale noirâtre; outre cela, elles sont marquées, vers l'angle anal, d'une tache carrée d'un brun-olivâtre.

Le corselet est d'un brun-grisatre avec une raie frontale, les épaulettes et le premier anneau de l'abdomen d'un brun-olivitre; le dos est olivatre avec une raie longitudinale grisatre.

Envoyé de l'île de Saint-Thomas, à Harris, par M. Homebeck.

Nota. D'après la description de Harris, nous lui trouvons une si grande ressemblance avec le vitis de Linné, que nous sommes presque certain que c'est la même espèce, ou tout au plus une variété insignifiante.

## 12. P. Jussirææ.

Hubn. Exot. Saml. — Sphinæ vitis, Cramer, 267, C. — Drury, I, 26, f. 1. — Smith-Abbot, Lepid. of Georg. pl. 40. — Sph. fasciatus, Sulzer, Gesch. 20, 1.

La plupart des auteurs ont pris cette espèce pour le vitis de Linné, et l'ont décrite ou figurée comme telle. Au premier coup-d'œil, en effet, elle lui ressemble passablement, mais on l'en distingue bien facilement par les caractères suivants: La bordure des ailes inférieures est d'un beau rose et non grise; la bande anté-marginale n'est point précédée d'une ligne brune; la tache noire est beaucoup plus petite, appuyée en arrière sur une bande rose; la raie transversale noirâtre qui se réunit à cette tache n'existe nullement dans le Jussiææ. Sur les ailes supérieurs il y a un petit stigmate noir renfermé dans un petit triangle blanc; il n'y a pas de tache sur le tiers antérieur de la côte; l'abdomen est dépourvu, à sa base, de la bande transversale d'un brun-olive bordée de blanc en arrière; les incisions ne sont pas liserées de blanc, au contraire, le corps est d'un gris-rosâtre avec une bande olivâtre longitudinale de chaque côté du dos, etc.

Il est beaucoup plus commun que le précédent. Il se trouve dans une grande partie de l'Amérique méridionale, aux Antilles et dans les Etats du Sud de l'Amérique du Nord.

La chenille, lorsqu'elle est petite, est verte avec des bandes obliques blanchâtres, et une petite queue grêle, caduque, comme dans l'espèce précédente. Lorsqu'elle est adulte, elle est d'une couleur jaunâtre, striée transversalement de noir et fassiée sur chaque anneau de rouge-vineux ou de rouge pâle; elle a, es

utre, une raie dorsale blanche et sept bandes obliques latériles, de la même couleur; la tête, la région anale et les pattes membraneuses sont d'un rouge-vineux; les stigmates sont luncs cerclés de noir; le onzième anneau, où était la petite meue du premier âge, est un peu relevé en bosse. — Lorquin.

Cette chenille vit sur plusieurs espèces de vigne, mais de préference sur le Jussicea decurrens, plante très-commune dans les leux marécageux.

Il sut que les chentiles, par un instinct particulier, trouvent me certaine analogie entre les Vinifères, les Onagraires et les Ribiacées, car celles de plusieurs espèces vivent indistinctement az l'une ou l'autre de ces familles.

Coll. Bd.

### 13. P. STRENUA.

Médétriés, Enum. corp. animal. mus. Petrop. Part. II, pl. 12, f. 3.

Nous n'avons jamais vu cette grande et belle espèce, qui fait passage du vitis de Linné au Typhon de Klug. Notre descripa est faite sur la figure qu'en a donné Ménétriés.

Les ailes supérieures sont d'un brun-olivâtre avec toutes les cervures blanches; elles sont traversées dans leur tiers basilaire su une bande blanche asses large, un peu arquée; au-delà du mileu il y a une bande courbe transversale, également blanche, un peu plus large que la précédente; vers le sommet on un une bande oblique d'un gris-blanchâtre, qui ne se réunit a, comme dans vitis et Jussiana, à celle qui la précède; le stigmate est noir, placé sur un petit espace blanchâtre; il n'y a pas la bande longitudinale.

Les ailes inférieures ont l'angle externe aigu; elles sont d'un cur vardâtre dans leur moitié antérieure; le reste de leur surce est brun à reflet violâtre; la gouttière abdominale est d'un ce carmin vif, qui touche à une grosse tache carrée, noire aporté en arrière sur deux taches cunéiformes blanches, suivies es de la frange d'une ligne noire en zigzag.

Le corselet est brunâtre avec les épaulettes d'un brun olive, ne raie médiane de la même couleur.

L'abdomen est brunâtre avec une raie dorsale grise, et les inisses liserées de blanc.

Le dessous est d'un rouge brique; celui des supérieures, dont

le disque est un peu verdâtre, offre, vers le sommet, une rale oblique d'un rose-blanchâtre.

Ce Philampelus, probablement unique dans les collections européennes, a été envoyé d'Haïti au musée de Saint-Pétersbourg, par M. Sievers.

14. P. TYPHON.

Klug, Neue Schmett.

Envergure de 12 à 13 1/2 centimètres. Les ailes supérieures sont d'un gris-blanchâtre un peu rosé; elles ont, près de la base, une ligne transversale brune, à peu près droite, puis trois autres lignes qui, de la côte, vont aboutir à une grosse tache carrée d'un brun-olive, placée sur le milieu du bord interne; au-delà du milieu il y a, au-dessous de la côte, un espace presque triangulaire d'un brun-olivâtre, marqué en haut d'une tache costale blanche; au-delà de cet espace on voit une ligne transversale blanchâtre, courbe, un peu ondulée, accolée extérieurement à une bande brune irrégulière, étranglée dans son milieu; le bord terminal est largement brunâtre avec le sommet d'un grisblanchâtre; toutes les nervures de l'extrémité sont blanches comme dans les trois espèces précédentes.

Les ailes inférieures sont d'un blanc rosé vers la base, ensuite d'un rouge-violet pourpre avec une bande anté-marginale noire, étroite, maculaire, bordée de blanc et surmontée de trois ou quatre petites taches cunéiformes d'un blanc bleuâtre.

Le corselet est gris avec les épaulettes brunes.

L'abdomen est gris avec les incisions plus pâles, et les côtés des anneaux lavés de rose-violet.

Le dessous des ailes est rougeâtre avec une ligne transversale brune.

Mexique. Très-rare. — M. N. et British Museum.

Décrit sur un individu très-pur, appartenant au British Museum. C'est très-probablement le plus bel exemplaire qui existe dans les collections.

GENRE ALEURON. Boisd. — Tylognathus. Felder. — Enyo. Walker.

Chenilles: Totalement inconnues.

Insecte parfait: Tête avancée en une sorte de museau



points. Antennes longues, assez grêles, terminées par un cochet recourbé. Palpes très-contigus, couverts de poils éailleux, très-serrés. Trompe de la longueur du corps. Yeux de grandeur moyenne. Corselet relevé en carène sur le dos comme dans le genre *Epistor*. Abdomen conique, seez allongé. Ailes supérieures dentées, échancrées et arquées à l'angle interne; ailes inférieures sinuées, à bordure noire.

Les Aleuron sont propres à l'Amérique méridionale. Au premier coup-d'œil, ils se rapprochent un peu du genre Tylognathus de Felder. Leurs ailes anguleuses leur donnent un peu le facies de certains Smérinthes.

+ Abdomen avec des anneaux noirs.

#### 1. A. OROPHILOS. Boisd.

Il est de la taille d'un grand exemplaire du Smerinthus tiliæ. Ses ailes supérieures, fortement dentées et un peu échancrées, sont d'un gris olivâtre, avec des bandes olives un peu roussâtres, sen andulées, disposées ainsi : une très-large à la base, une seconde, élargie et un peu hifide près de la côte, se rétrécissant inmensiblement pour arriver au bord interne ; le stigmate est petit et soir, suivi d'une raie également olivâtre, étroite, un peu coudée sur la côte ; l'extrémité offre en outre quelques lignes ondulées, brunâtres, coupées obliquement de l'extrémité du bord costal au milieu du bord terminal par une bande oblique olivâtre.

Les ailes inférieures sont d'un blanc-roussatre sale, avec une lande transversale noire, très-dilatée du côté du bord abdomial; la bordure est noire, élargie du côté de l'angle externe, précédée d'une petite ligne noirâtre, très-obsolète.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est d'un gris-blanchâtre sale, avec quatre anneaux dorsaux noirs qui descendent très-peu sur les côtés, et dont les deux premiers sont plus grands que les deux suivants.

Le dessous des ailes est d'un brun grisatre, avec trois lignes parallèles, communes, ondulées, de couleur brune. Le ventre est d'en bianc rusé.

Brésil. — Coll. Bd. — Très-rare.

# 2. A. CARINATUM. Boisd.

Perigonia carinata, Boisd. M. olim. — Enyo carinata, Walker, leterocera, p. 117, 9.

Il a le port et la taille du Smerinthoides. Il est brun en dessus et plus pâle en dessous.

Ses ailes supérieures ont un reflet luisant, un peu violatre; elles sont traversées par des lignes brunes très-ondulées et assez noubreuses.

Les ailes inférieures sont d'un brun foncé avec des espaces plus clairs.

La crète du corselet est saillante.

L'abdomen a, vers la base, des bandes transversales noires interrompues sur le dos et alternant avec des bandes d'un griscendré.

Décrit au British Museum sur un exemplaire venant du Para-Cette espèce se place naturellement à côté de l'*Orophilos*.

#### 3. A. CHLOROPTERA.

Enyo chloroptera, Walker, Heterocera, p. 118, 10. — Sph. id. Perty, Del. anim. pl. 31, f. 3. — Boisd. Consid. sur les Lépid. du Guatemals, p. 71.

Il est de la taille d'un Smerinthus tiliæ. Ses ailes supérieures, dentées et échancrées, sont d'un ton olivâtre, avec deux larges bandes transversales, beaucoup plus obscures que la teinte générale, située entre la base et le stigmate; celui-ci est noir, trèpetit, suivi, en tirant vers l'extrémité, d'une large bande un per oblique, d'une couleur olivâtre foncée, descendant jusque sur l'angle anal; le sommet est plus pâle, légèrement d'un gris-violâtre luisant.

Les ailes inférieures sont d'un brun noir, avec la base game de poils verts, et une bande transversale assez large d'un tongtisâtre sale, assez obsolète.

Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est un peu roussatre, avec quelques poils vers se base et deux anneaux noirs, interrompus sur le dos.

Le dessous des ailes est d'un gris roussaire, avec quatre petits lignes noiraires, parallèles, dentées en scie. Le ventre est d'un blanc rosé. Cayenne. Coll. Bd. — Nous avons décrit, grâce à l'obligeance de M. E. Gray, cette espèce au British Museum, sur deux individus parfaitement purs, l'un de Honduras et l'autre du Para.

# ++ Abdomen unicolore.

# 4. A. SMERINTHOIDES.

Felder, Rovara, Exp. Zoolog. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 82, f. 5.

De la taille d'un petit individu du Smerinthus tilie. Les ailes supérieures, dentées et échancrées, sont d'un brun rougeâtre, avec des lignes transversales ondulées, les unes plus obscures et les autres plus pâles que le fond; le stigmate est très-petit et noir; sur le bord terminal, il y a en outre une espèce de bande marginale grisâtre, sinuée et bordée sur son côté interne par une ligre noirâtre, ondulée.

Les ailes inférieures sont rougeâtres, avec une bande marginule noire, qui s'éteint insensiblement avant d'arriver à l'angle anal.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est rougeatre sans aucunes taches.

Le dessous des ailes est d'un gris rougeâtre, avec des petites liques transversales, ondulées, plus obscures; l'extrémité est bordée par une bande brunâtre, commune, sinuée en dedans; le disque des supérieures est d'un brun-noir.

Nous possédons deux individus dont nous ne savons pas au juste la patrie, probablement le Brésil.

La figure que donne de cette espèce M. Felder est très-exacte.

# 5. A. PUDENS. Boied.

Il a le port et la taille du Smerinthoides, mais ses ailes supérieures sont plus longues et plus étroites. Elles sont d'un brunchivaire tirant un peu sur le rougeatre, dentées et échanerées, met des lignes transversales, endulées, plus obscures que le fond. Le stigmate est très-petit et noir; sur le bord terminal, il y a en autre une bande marginale d'un brun-noir, sinuée et anguleuse sur son côté interne.

Les ailes inférieures sont rougeatres, avec une bande margi-

nale noire qui s'amincit en arrivant à l'angle anal, et qui offre une petite dent saillante dans son tiers supérieur.

Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est d'un brun roussatre.

Le dessous des ailes est rougeâtre, avec quelques lignes transversales, obsolètes, et une bordure brunâtre mal arrêtée.

Nous avons reçu cette espèce du Brésil.

# 6. A. PHILAMPELOIDES.

Tylognathus philampeloides, Felder, Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 75, 11.

Au premier coup-d'œil on prendrait ce Sphingide pour un *Philampelus* voisin du *Pandorus*, mais par ses ailes supérieures anguleuses dentées, avec l'angle interne arqué, etc., sa véritable place nous paraît être dans le genre *Aleuron*.

Ses ailes supérieures sont d'un gris-luisant un peu violâtre, avec une bande basilaire et des raies transverses d'un vert-olivâtre sombre, au nombre de six ou sept; vers l'extrémité, la teinte olivâtre devient plus intense et coupe obliquement l'aile, de la côte au milieu du bord terminal, de manière qu'il reste au sommet un espace triangulaire gris, divisé par une petite ligne obsolète.

Les ailes inférieures sont dentelées, d'un jaunatre sale, couleur de terre d'ombre, avec une bordure noire rétrécie vers l'angle anal, précédée d'une raie transversale noiratre; la frange est entrecoupée de blanc.

Le corselet est d'un vert olivâtre. L'abdomen est grisâtre.

Le dessous des alles est jaunâtre, avec des raies transversales noirâtres.

Amazone, Cayenne. — Coll. Bd.

# GERRE EVERYX. Boisd. — Sphinx auctorum.

Chenilles: Lisses, non chagrinées, à tête petite, arrondie, rétractile dans le repos comme chez notre Smerinthus populi, pourvues d'une corne sur le onzième anneau et marquées de bandes latérales obliques.

Insecte parfait : Antennes assez longues, un peu plus fortes et un peu denticulées dans les mâles, terminées par

me pointe assez longue repliée en crochet. Tête un peu réirée sous le corselet. Palpes à articles indistincts, recouverts de poils écailleux. Trompe plus courte que le corps. Yeux assez petits. Ailes supérieures sinuées à l'extrémité et m peu pointues au sommet; leur bord interne sinué avec l'angle anal arqué. Abdomen non fascié, épaulettes se confondant avec la couleur du corselet.

Les deux espèces les plus connues habitent l'Amérique septentrionale, une autre le nord de l'Inde. Quant aux deux sutres, nous ne connaissons leur patrie que d'une manière regue.

Les Everyx ont plus ou moins de facies de certains Smérintes avec lesquels ils ont, du reste, quelques points de contact par la forme de leurs ailes et la brièveté de leur trompe; mais leurs chenilles lisses, à tête petite, globulese, indiquent suffisamment qu'ils ne peuvent être placés dess la même tribu.

# 1. E. MYRON.

Cramer, 247, C. — Sphinx Pampinatrix, Smith-Abbot, Lepid. of Corg. pl. 28.

Il a le port et la taille d'un Smerinthus tilia. Ses ailes supétieures sont d'un gris-jaunâtre ou d'un gris faiblement lavé de virdâtre; elles sont traversées par deux bandes d'un vert olive, l'une entre la base et le stigmate, et l'autre entre celui-ci et l'extémité; la première, de largeur moyenne, est régulière, la settade, plus large, se dilate inférieurement et s'étend jusque sur l'angle anal; cette dernière est souvent divisée dans sa partie lafficieure par une raie ou une éclaircie de la couleur du fond; le sigmate est d'un vert-olive.

Les ailes inférieures sont entièrement d'un fauve-roux avec

Le corselet est de la couleur des premières ailes avec les spaniettes d'un vert elive bordées latéralement de gris jaunâtre.

Le corps est entièrement grisâtre. Le dessous des ailes est d'un roux clair avec deux petites limes transversales plus obscures.

Lépidoptères. Tome 1.

La chenille, assez bien figurée par Abbot, est d'un vert-jaunaire sur le dos, marquée sur les côtés de taches triangulaires blanches, séparées de chaque côté, de la couleur du dos, par une raie d'un vert obscur; les taches blanches sont bordées par des traits obliques d'un vert assez foncé; les trois premiers anneux sont d'un vert pâle avec des lignes longitudinales vertes; la tie est d'un vert pâle avec des lignes longitudinales vertes; la tie est d'un vert pâle; la région anale et la corne sont blanches; les stigmates sont orangés. Cette chenille vit en Virginie, en Georgie et daus quelques autres parties des Etats-Unis, sur plusieus espèces de vignes, ce qui lui a fait donner par Smith le nom de Pampinatrix. Il paraît qu'elle varie passablement; nous avont des dessins où les côtés sont entièrement blanchâtres avec des traits obliques roussâtres; les pattes et la corne du onzième anneau, ainsi que la tête sont d'un rose terne.

La chrysalide ressemble à celle de notre Smerinthus tilia.

Plusieurs individus sont éclos chez nous, à Paris, au mois de mai, de chrysalides reçues d'Amérique.

Harris, Clemens et Walker décrivent ou mentionnent sous le nom de *Versicolor* une espèce voisine que nous ne connaissous pas, mais que nous croyons assez distincte.

# 2. E. CHOERILUS.

Cramer, 247, A. — Sphinx azalea, Smith-Abbot, Lep. of Georg-pl. 27.

Il est un peu plus grand que Myron. Ses ailes supérieures, siblement moins sinuées, ont le sommet un peu plus aigu; elles sont d'un gris-violâtre, traversées par des bandes brunes et mar quées d'un très-petit stigmate de la même couleur; entre la base et celui-ci, il y a deux bandes brunes, dont l'antérieure plus étroite et moins marquée; entre le stigmate et l'extrémité, il y s' d'abord une bande brune, régulière, assez large, puis une rais ondulée de la même couleur; l'intervalle qui les sépare est son vent plus clair que la teinte générale, ou même un tant soit pe jaunâtre, divisé par une petite ligne obscure, interrompue, pres que ponctiforme; on voit encore, avant le sinus, la trace d'un raie brunâtre flexueuse.

Les ailes inférieures sont d'un roux-testacé ferrugineux aw l'angle anal très-légèrement grisatre.

Le corselet est d'un roux ferrugineux.

L'abdomen est d'une teinte roussatre.

Le dessous des ailes est ferrugineux avec trois lignes transverses plus obscures, très-obsolètes.

La chenille est d'un vert blanchâtre, striée longitudinalement de vert plus foncé; ses côtés sont plus pâles avec des traits obliques d'un vert foncé; les stigmates sont orangés; le ventre et les pattes sont d'un blanc verdâtre ainsi que la tête; la corne du ensième anneau est un peu violette. Elle vit sur plusieurs espèce d'Azales en Georgie, Virginie, etc.

La chrysalide ressemble à celle de notre Smerinthus tiliæ, mais elle est d'une couleur plus claire.

L'insecte parfait nous est écles plusieurs fois, à Paris, en mai, de chrysalides envoyées par Abbot; nous ne le regardons pas comme très-rare.

# 3. E. ASTYANOR. Boisd.

il est de la taille des plus grands exemplaires du Smerinthus cilie. Ses ailes supérieures sont d'un brun un peu violacé, luisant, avec des taches ou bandes plus obscures, se fondant un peu avec la teinte générale; il y a au milieu du disque une tache brune assez grande, précédée, du côté de la base, de deux handes étroites, et suivie du côté du bord terminal d'une large bande brune, interrompue, formant une grosse tache vers le sommet, appuyée sur la côte, et une tache semblable sur l'angle interne; outre cela, il y a sur la pointe apicale une tache également brune.

Les ailes inférieures sont ferrugineuses avec l'extrémité rembranie.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est d'un brun un peu roussâtre.

Le dessous des ailes est d'un rouge ferrugineux; celui des supérieures offre, à l'extrémité, une bande marginale brune, bien nette, crénelée en dedans, et sur le tiers postérieur de la côte, deux traits transverses également bruns. Le ventre est d'un brun ferrugineux.

Décrit sur un individu unique que nous avons eu de Becker, sans pouvoir obtenir un renseignement positif sur sa provenance. Son analogie avec *Myron* nous indique suffisamment qu'il est d'origine américaine, probablement du Mexique.

# 4. E.? PROLUS.

Cramer, 87, B.

Nous rapportons au genre Everyz une espèce de sphingides que nous n'avons jamais vue, et qui pourrait bien appartenir à un autre groupe. Voilà sa description d'après la figure donnée par Cramer:

Il est à peu près de la taille du Chærilus dont il a un peu le port, mais ses ailes supérieures sont plus aiguës au sommet: elles sont brunâtres depuis la base jusqu'au-delà du milieu, avec une éclaircie grisâtre; elles sont ensuite traversées dans leur tiers postérieur par trois bandes parallèles d'un brun-noir, dont les intervalles sont, jusqu'à la frange, d'un rouge-incarnat un peu obscur.

Les ailes inférieures, profondément échancrées vers l'angle anal, sont d'un rouge incarnat à leur base et ensuite d'une couleur brunâtre.

Le corselet est brunâtre.

L'abdomen est d'un brun grisatre.

Selon Cramer, le dessous des ailes est semblable, pour la couleur, au-dessus des inférieures.

Des Indes occidentales (Cramer).

#### 5. E. ORNEUS.

Sphina Orneus, Westwood, Cabinet orient. pl. 6, fig. 3.

Nous ne connaissons pas cette espèce qui, d'après l'excellente figure qu'en a donné M. Westwood, semble devoir se placer à côté du Myron, dont elle a le port et presque la taille.

Les ailes supérieures, moins sinuées à l'extrémité que dans Myron, sont d'un gris-roux un peu fauve avec deux bandes transversales d'un cendré blanchâtre, bordées de brun; le stigmate est brun; la première bande est placée entre la base et le stigmate, la seconde entre celui-ci et le bord terminal; outre cela, le bord interne est d'un cendré-blanchâtre, coupé par cinq petits traits noirs.

Les ailes inférieures sont d'un rose un peu testacé avec l'angle anal marqué d'une tache d'un gris bleuâtre.

Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est roussatre.



Le dessous des ailes est d'un rouge briqueté avec des lignes transversales brunâtres, dont trois sur les inférieures et une soule sur les supérieures (Westwood).

Il habite l'Asie centrale et fait partie de la collection de M. Hearsay.

# 6. E. MARGINATA.

Derepsa marginata, Walker, Heterocera, p. 185, 5.

comme nous n'avons pas vu cette espèce africaine, nous ne sommes pas certain qu'elle appartienne véritablement à notre gene Everyx.

Il est de la taille du Ch. porcellus, d'une couleur ferrugineuse suc les antennes testacées.

Les ailes supérieures sont nuancées de violâtre, sauf une tache tiangulaire située sur le milieu, et un espace près du bord extireur ainsi qu'une raie le long du bord terminal, qui sont brus.

Les ailes inférieures sont d'un brun nébuleux avec la frange roussitre.

L'abdomen est marqué de bandes violatres, courtes.

On rencontre une variété dont le fond des ailes supérieures est gristre et dont les ailes inférieures ont une bordure brune.

Port-Natal. - British Museum. - Walker.

Ce sphingide a les ailes supérieures moins pointues et moins sinueuses que le type américain. Walker.

GENRE EUCHLORON. Boisd. — Philampelus. Walker.

Nous établissons ce sous-genre sur une espèce unique qui tient à la fois des Chærocampa et des Philampelus.

La chenille nous est inconnue.

Insecte parfuit: Antennes assez longues, un peu grêles, principalement dans la femelle, terminées par un très-petit crochet. Palpes écartés, écailleux, courts, n'arrivant pas à la hauteur du front. Trompe aussi longue que le corps. Yeux assez grands. Corselet bombé. Abdomen long et conique. Ailes bien entières; les supérieures un peu arquées à l'angle anal, de couleur verte. La seule espèce que nous connaissions habite les parties intertropicales de l'Afrique.

# E. MEGERA.

Linné, Mus. Lud. ulr. p. 338, 18. — Clerck, Icon. tab. 47, f. 2. — Lacordairei, Boisd. Faun. de Mad. pl. II, f. 1. — Philampeius Megara, Walker, Heterocera, p. 170, 11.

Il est un peu plus grand que le nerii. Ses ailes supérieures sont d'un beau vert avec un petit stigmate noir; leur base est noire près du bord interne avec quelques petits faisceaux de poils grisâtres; l'extrémité est d'un ton un peu plus pâle que le reste de la surface et offre quelques ondes brunes; sur le bord interne près de l'angle anal, il y a une tache brune.

Les ailes inférieures sont d'un beau jaune orangé, avec une tache noire à leur base et une bande courte, transversale, de la même couleur, n'atteignant pas le bord externe; elles ont, en outre, une bande marginale sinuée également noire, rétrécie et fortement teintée de gris noirâtre du côté du bord abdominal.

La tête et le corselet sont d'un vert brillant.

L'abdomen est aussi d'un beau vert en dessus; il est d'une teinte jaunâtre sur les côtés, où il offre une rangée de petites taches d'un blanc doré, formées par de petits faisceaux de poils écailleux.

Le dessous des ailes est d'un rouge briqueté avec une bande verte vers l'extrémité des supérieures.

Cette belle espèce, dont nous ignorons les premiers états, se trouve à la côte de Guinée, à Madagascar et à Bourbon.

Collection Bd. — Toujours assez rare.

GENRE ACOSMERYX. Boisd. — Philampelus. Moore. — Enyo. Walker.

Chenilles: Non ocellées, à tête rétractile, pourvues d'une corne sur le onzième anneau.

Insecte parfait: Antennes de longueur moyenne, un peu plus fortes dans les mâles, terminées par un petit crochet. Palpes ne dépassant pas le chaperon, fortement appliqués sur le front, couverts de poils écailleux, très-serrée. Trompe aussi longue que le corps. Yeux de grandeur moyenne. Corselet assez robuste, sans épaulettes bien distinctes. Abdomen assez développé, conique dans les mâles, un peu obtus chez les femelles. Ailes dentelées ou ondulées avec le sommet échancré, de couleur peu brillante, variées de brun et de grisâtre.

Les Acosmeryx sont propres aux Indes orientales et aux lles de l'Archipel indien; ils se rapprochent beaucoup des Charocampa du groupe de nerii. M. Moore réunit ce sousgenre aux Philampelus de Harris. Hubner place l'Anceus de Cramer dans son Coitus Enyo avec le lugubris et le ficus de Linné!!

#### 1. A. ANCEUS.

Splinz Anceus, Cr. 388, A. — Enyo Anceus? Walker, List. Lepid. Brit. mus. Heter. pt. VIII, p. 119. — Philampelus Anceus? Moore, Cat. of Lepid. of ind. Compan. I, p. 270, 634.

Nous ne sommes pas certain que l'Anceus de MM. Walker et More soit bien l'espèce figurée par Cramer dont nous possédons un très-bel exemplaire pris à Amboine par Lorquin.

Il a juste 7 centimètres et demi d'envergure. Ses ailes supérieures, un peu sinuées, nullement dentelées, sont d'un gris-violitre un peu luisant; elles ont, entre la base et le milieu, trois bandes transversales, brunes, arquées, dont l'antérieure est courte, et la postérieure beaucoup plus prononcée, réunie à la seconde vers le bord interne; le point discoïdal est jaune entouré d'un peu de brun; en dehors de ce point, il y a une large bande brune, oblique de dedans en dehors, divisée par en bas en quatre raies sinueuses descendant sur le bord interne; le bord apical est brun, précédée d'une tache transversale de la même couleur, précédée elle-même sur la côte, d'un espace d'un gris blanchâtre divisé par deux ou trois traits brunâtres un peu sinués.

Les ailes inférieures sont brunes avec l'extrémité largement miraire.

Le corselet est de la couleur des premières aules. L'abdomen est d'un gris violatre avec des raies ob'iques plus obscures.

Le dessous des ailes est d'un brun violâtre sur les inférieures avec doux raies géminées noirâtres; celui des supérieures est d'un brun tanné avec l'extrémité plus obscure et quelques marques blanchâtres sur la côte en avant du sommet.

La chenille, d'après un dessin fait à Java par Horsfield, a la tête rétractile. Elle est verte avec une tache brune sur le des, à la base de chaque articulation; elle a, en outre, une bande latérale blanche, qui va du deuxième anneau à la base de la corne; les stigmates sont noirs cerclés de blanc; entre ceux-ci et les pattes membraneuses, on voit des traits obliques d'un blanc verdâtre. Elle vit sur une espèce de Cissus. Est-ce bien la chenille du véritable Anceus? ou n'est-ce pas plutôt celle de l'espèce suivante?

Notre exemplaire vient d'Amboine. M. Moore l'indique comme de Java et du Bengale.

#### 2. A. ANCEOIDES. Boisd.

Philampelus sericeus? Walker, Heterocera, p. 181, 13.

Envergure 8 centimètres. Cette espèce, malgré ses quatre ailes dentées, a bien plutôt le port des Chærocampa du groupe de nerii que du véritable Anceus.

Ses ailes supérieures sont un peu luisantes, variées de gris violâtre et de brun noirâtre; cette dernière couleur forme deux bandes transverses, entre la base et le stigmate, dont l'antérieure étroite et incomplète, et la seconde large; en dehors du stigmate qui est petit et jaune, il y a une raie noirâtre, droite, transversale, se fondant extérieurement avec une bande oblique de dedans en dehors, mal définie, de la même couleur; l'extrémité est variée de gris violâtre et de brun noirâtre.

Les ailes inférieures sont brunes dans le mâle; dans les femelles, elles offrent ordinairement une bande transversale testacée plus ou moins bien indiquée.

Le corselet participe de la couleur des premières ailes. L'abdomen est d'un grisâtre obscur, fascié obliquement de brunâtre.

Le dessous des ailes inférieures est presque entièrement fauve, avec la côte brunâtre, entrecoupée de blanchâtre; celui des supérieures est brun, avec une bande fauve, très-étroite du côté du sommet et très-large dans sa partie inférieure. Le ventre est fauve avec les articulations plus obscures.

Chez les femelles, on voit souvent en dessus une tache jau-

sitre située un peu au-dessus de l'angle interne des sûles supérieures.

Ness avons reçu cette espèce de Bornéo, des iles Philippines et du nord des Indes. Plusieurs entomologistes la confondent avec l'Anceus de Cramer.

Nots. Nous ne connaissons pas le Sericeus de M. Walker qui n'est peut-être qu'une variété de l'espèce que nous venons de décire.

# 3. A. NAGA.

Moore, Catal. of the Lepid. of ind. Comp. p. 271, 626. — Shervillii, Soisd. M.

Il a le port et la taille d'un nerii. Ses ailes supérieures sont variées de noir sur un fond cendré; entre la base et le milieu, il y a quatre raies brunes courtes, partant de la côte pour venir se terminer sur une bande oblique de la même couleur; celle-ci est suivie de plusieurs raies noires, surmontées antérieurement par une bande noire, oblique, bien marquée, partant de la côte pour se diriger vers le milieu du bord terminal qu'elle n'atteint pas; entre cette seconde bande oblique et le sommet, le fond est pris avec deux ou trois raies et une bande anguleuse noires; le milieu du bord terminal est noirâtre ainsi que la petite lunule placée sur l'échancrure de la pointe apicale.

Les ailes inférieures sont d'un gris blanchâtre, avec une bande transversale et la bordure d'un brun noirâtre.

Le corselet est gris.

L'abdomen est également gris avec des chevrons bruns.

Le dessous des ailes est varié de rouge et de gris cendré.

La chenille de cette espèce unique, dans notre collection, a été élevée à Darjeeling par le capitaine Shervill, sur des vignes sauvages. D'après la description qu'il a eu l'obligeance de nous conner, elle a des rapports avec celle du nerii, mais elle est dépourvue de tache oculaire sur le quatrième anneau.

Coll. Bd.

#### 4. A. SHERVILLII. Boisd.

il est à peu près de la taille de l'espèce précédente, mais ses me sont pas dentelées, seulement les supérieures ont le summet un peu échancré; ces dernières sont d'un gris cendré, zarquées, entre la base et le stigmate, de trois ou quatre petites

raies transverses, brunes; celui-ci est noirâtre, assez petit, suivi d'une bande oblique d'un brun foncé, qui va du milieu de la côte à l'angle interne; entre cette bande et le bord interne, on voit trois raies obscures, un peu ondulées, et quelques raies semblables entre le sommet et cette même bande; le bord extérieur offre vers le milieu, une espèce de bordure noirâtre; la petite échancrure apicale est aussi bordée de noirâtre.

Les ailes inférieures sont brunes avec la base largement grisâtre; il y a aussi vers l'angle anal un espace grisâtre.

Le corselet est d'un gris cendré.

L'abdomen est gris avec les articulations un peu brunâtres.

Le dessous des ailes est d'un gris un peu roussâtre, avec des raies communes, ondulées, un peu brunâtres; les supérieures offrent, en outre, près du bord terminal, une ligne noire anguleuse, précédée d'une espèce de bande testacée.

Décrit sur un individu très-pur, élevé de chenille à Darjeeling, sur un laurier rose, *Nerium*, ou sur une vigne sauvage, par le capitaine Shervill.

# 5. A. DAULIS. Boisd.

Il est à peu près de la taille d'un Anceus. Ses ailes supérieures un peu échancrées et évidées vers le sommet, sont d'un gris un peu violacé, avec le stigmate jaune; entre celui-ci et la base, il y a trois bandes courbes, de couleur brunâtre, dont l'antérieure étroite est peu accusée, et la troisième est plus large et mieux marquée; au-delà du stigmate, on voit une bande en forme d'ombre, oblique, allant du milieu de la côte à l'angle interne; au-dessous de cette dernière, il y a quatre raies brunes, aboutissant au bord interne; toute la région apicale, en dehors de la bande oblique, est variée de brun et de gris; le bord terminal est brun ainsi que le liseré de l'échancrure; il y a encore entre la bande oblique et le bord interne un point jaune.

Les ailes inférieures sont d'un brun ferrugineux.

Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est d'un brun grisatre.

Le dessous des ailes est d'un brun ferrugineux, avec deux raies doubles, plus obscures sur les inférieures, et un espace d'un blanc un peu grisâtre sur la côte des supérieures, avant l'extrémité apicale.

Dicit sur un individu unique et dont nous ignorons la pa-

Call Bd.

#### 6. A. SOCRATES. Boisd.

Il est à peu près de la taille d'un Ch. Elpenor. Ses ailes supérieures sont d'un gris violâtre, avec un petit stigmate jaune, précéé, du côté de la base, de trois raies brunes, courbes, plus ou mas bien écrites; de l'autre côté du stigmate, il y a une bande blique, brune, en forme d'ombre, qui va du milieu de la côte boutir à l'angle interne; de cette bande partent deux eu trois ares de la même couleur, obsolètes, arrivant sur le bord interne; aute la partie comprise entre la bande oblique et le sommet afre deux bandes brunâtres; le milieu du bord terminal est de même couleur jusqu'à la pointe apicale.

Les ailes inférieures sont grisatres avec une large bordure noitire.

Le corselet et l'abdomen participent de la couleur des ailes.

Le dessous des ailes est d'un brun un peu ferrugineux; celui :s supérieures offre au sommet une tache ferrugineuse, bordée :a dedans par une tache blanche, un peu triangulaire.

Décrit sur une espèce unique élevée de chenille, à Manille, par .

M. Lorquin, sur une plante laiteuse dont il ignore le nom et la famille.

Coll. Bd.

# GENEE EUCHERYX. Bolsd. — Sphinx et Chærocampa auctorum.

Chenilles: Cylindriques, à tête petite, globuleuse, rétractile sous les premiers anneaux, pourvues d'une petite corne sur le onzième segment. Ces chenilles, selon M. Hornebeck, vivent sur plusieurs plantes de la famille des Onagraires, relles que Justica, Isnardia, etc., et sur les vinifères. La rétamorphose a lieu presque à la surface du sol, dans une reque légère formée de débris de végétaux ou de petites relécules de terre.

Chrysalides: Coniques, un peu comprimées antérieurement, terminées par une pointe assez longue. Insecte parfait: Antennes moyennes, un peu plus forts dans les mâles, terminées par un petit crochet. Palpes entièrement recouverts de petits poils très-serrés, à articles indistincts. Trompe un peu moins longue que le corps. Yeux de grandeur moyenne. Corselet assez robuste. Abdomen conique, terminé, dans les mâles et quelquefois dans les femelles, par un petit pinceau de poils. Ailes sepérieures sans dentelures, mais avec un sinus à l'extémité qui leur donne au sommet une forme un peu falquée; leur bord interne sinué profondément.

Les *Eucheryx* sont propres aux Antilles et à l'Amérique méridionale.

# 1. E. LICASTUS.

Cramer, 381, A. B. - Sphinx Parce, Fab. Ent. Syst. III, 4, p. 372, 38.

Il est à peu près de la taille du lineata. Ses ailes supérieurs varient pour la couleur du fond, qui est quelquefois grise, mais le plus ordinairement d'un roux testacé, avec trois ou quatre teches d'un blanc grisâtre sur la côte, et une sur le bord interne; leur disque est marqué d'une belle tache argentée, envoyant vers la côte un petit rameau bifide en forme d'Y; outre cela, il y a toujours à la base, près de l'insertion de l'aile, un petit point blanc, et à l'extrémité, près du sinus, une éclairaie grisâtre marquée d'un croissant noir.

Les ailes inférieures sont d'un roux-ferrugineux vif, avec l'angle anal noirâtre en avant, et grisâtre en arrière.

Le corselet est de la couleur des premières ailes, avec de belles épaulettes d'un joli-brun ferrugineux.

L'abdomen est d'un gris roux, et offre sur le milieu du dos deux ou trois petites taches, un peu plus foncées, à peine indiquées.

Le dessous des ailes et le ventre sont ferrugineux.

Ce beau Sphingide habite les grandes et les petites Antilles, la Guyane et le Brésil. Les individus de cette dernière provenance ont les ailes supérieures et l'abdomen d'un gris cendré. C'est ce type Brésilien que Fabricius a décrit sous le nom de Parce.

Il y a des localités où il ne paraît pas être très-rare: M. Hornebeck trouvait chaque année sa chenille à Saint-Thomas, sur la vigne ou sur des plantes de la famille des Onagraires. Il n'en est pas de même au Brésil, où Beske ne la rencontrait que très-rarement sur une espèce de Cissus.

Coll. Bd.

# 2. E. NOMIUS. Boisd.

Il est un peu plus grand que les précédents. Ses ailes supérieures sont d'un beau brun, avec une tache semi-elliptique, d'un blanc carné ou un peu violâtre, disposée longitudinalement sur le milieu de la côte; elles ont, en outre, près de la base, une petite ligne courbe, blanche, très-fine, très-peu marquée, et sur le tiers postérieur du bord interne, une tache d'un cendré blanchâtre, marquée d'un point blanc; le sinus est bordé par une bande d'un brun marron, liserée de blanc sur sa convexité.

Les ailes inférieures sont d'un blanc roussâtre dans leur moitié antérieure, et d'un noir brunâtre dans leur moitié postérieure, avec l'angle anal d'un gris cendré.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, avec les épanlettes d'un beau brun, un peu lisérées en dessus de blanc argentin à un certain jour.

Le dessous des ailes est d'un brun un peu violâtre; celui des supérieures offre, le long de la côte, deux taches allongées d'un blanc violâtre, et à l'extrémité terminale, la même bande brune que sur la face opposée.

Décrit sur deux individus élevés de chenille au Brésil, dont . l'un nous provient d'un envoi fait à Becker par M. Palmer, et l'autre d'un envoi de Beske.

Rare. - Coll. Bd.

#### 3. E. CROESUS.

Daiman (1), Anal. Entomolog. p. 48, 22. — Sphinx Thorates, Hub. Lit. 1. 525-526.

Pergesa Thorates, Walker, Heterocera, p. 151, 2.

li a le port du *Licastus*, mais il est généralement un peu plus petit. Ses ailes supérieures, chez les individus mâles, bien frais,

(1) Le professeur W. Dalman, naturaliste suédois, inspecteur de l'Académie de Stockholm, est mort en 1828, à l'âge de 41 ans. C'étai 'un de nos plus savants entomologistes. On peut juger par les quel-ques travaux qu'il a laissés, ce que la science aurait pu attendre d'un el homme.

et qui n'ont pas été ramollis, sont d'un beau vert pistache, ave deux bandes transversales blanchâtres, l'une près de la bes d' l'autre un peu avant le milieu, suivies en dehors d'une raie d'un noir verdâtre; outre cela, on voit, près du sinus de l'extrémité, une raie blanchâtre, doublée de noirâtre sur sa convexité.

Les ailes inférieures sont d'un brun noir, traversées par une bande d'un jaune fauve.

Le corselet est vert, bordé latéralement de blanchâtre, avec les épaulettes paraissant, à un certain jour, saupoudrées d'atomes dorés.

L'abdomen est verdâtre en dessus, avec les côtés entièrement dorés.

Le dessous des ailes est varié de jaune et de vert, avec trois raies transversales brunes, et le disque des supérieures d'un brun roux. Le ventre est entièrement d'un jaune doré.

La femelle a les ailes supérieures et le corselet d'une couleur roussatre, mais non d'un beau vert pistache; elle offre le même dessin que le mâle; son abdomen est d'un gris un peu roussatre, marqué sur le dos de trois points alignés d'un jaune doré.

Cette jolie espèce se trouve aux Antilles. Nous ne savons pas si elle habite aussi le continent. M. Hornebeck l'élevait de la chenille à Saint-Thomas, et en a rapporté en France un certain nombre d'exemplaires d'une pureté remarquable.

Coll. Bd.

# 4. E. DEPUISETI, Boisd.

Il est un plus grand qu'un Ch. porcellus. Ses ailes supérieures sont falquées et les inférieures sont denticulées. Les premières, arquées à l'angle interne, sont d'un vert-olivâtre foncé, avec trois lignes transverses, brunes, presque régulières, dont une, entre le stigmate et la base et les deux autres, parallèles entre celui-di et l'extrémité; on voit encore chez quelques individus l'apparence d'une ligne sinueuse, obsolète, près du bord terminal; le stigmate est noir.

Les ailes inférieures sont brunes, avec la frange entrecoupée de blanc et l'angle anal un peu roussâtre.

Chez la femelle, l'angle interne des premières ailes est brunâtre, et les ailes inférieures ont une espèce de bande transversale, peu marquée, d'un gris-sale ochracé. Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, avec une igne blanche au-dessus des yeux.

L'abdomen est aussi d'un vert olivâtre, avec deux rangées de laches d'un jaune un peu doré sur chacun de ses côtés.

Le dessous des ailes est jaunâtre, avec deux bandes transverses truns, et le disque des supérieures noirâtre.

M. Depuiset a reçu ce Sphingide du Brésil, où il ne paraît pas for très-rare, mais d'où il nous arrive toujours en assez mauvais cut, comme les espèces prises au vol par des personnes inhabiles. Coll. Bd.

(2 Sphingide, avec sa parure modeste, fait un assez triste effet i die des espèces congénères.

GENRE CHCEROCAMPA. Duponchel olim. — Deilephila. Ochs. — Duponchel. — Beisd. olim. — Chærocampa, Philampelus, Darapsa, Unzela, Daphis. Walker.

Le genre Charocampa a été créé par seu Duponchel pour certains Sphingides dont les chenilles ont les premiers anceux rétractiles. Peu de temps après, ce même auteur supprima ce genre et réunit les Lépidoptères qui en faisaient partie aux Deilephila; mais le trouvant suffisamment caractérisé sous ses divers états, nous l'avons adopté pour notre propre compte, et la plupart des entomologistes ent suivi notre exemple.

Chenilles: Lisses, pourvues ordinairement, sur le quatrième segment, d'une tache en forme d'œil, et quelquefois de taches semblables des deux côtés du corps; leur couleur est, en général, verte ou brune, souvent, dans la même espèce, avec les trois premiers anneaux plus minces que les aitres, très-rétractiles et susceptibles de s'allonger en forme trompe ou de museau comme le groin d'un cochon, d'où nom de Chærocampa. Leur onzième segment est pourvu d'une corne, remplacée quelquefois par une petite plaque cornée.

Chrysalides: Cylindrico-coniques, atténuées et comme omprimées antérieurement, quelquefois avec la gaîne de la trompe un peu détachée. Insecte parfait: Antennes linéaires, droites ou presque droites, de la longueur de la tête et du corselet réunis, terminées par un petit crochet. Trompe rarement plus longue que le corps, souvent un peu plus courte. Palpes épais, séparés à leur extrémité, dépassant un peu le chaperon. Yeux généralement assez gros et assez saillants. Front large et proéminent. Corselet robuste avec les épaulettes bien indiquées. Abdomen allongé, conique. Ailes supérieures ordinairement entières, rarement un peu dente-lées ou un peu échancrées au sommet.

Les Chérocampes sont très-nombreux et doués, comme les Sphinx, d'un vol puissant et soutenu qui leur permet de se transporter à de très-grandes distances. Ils habitent les deux continents.

Nous les partageons en douze groupes dans chacun desquels nous avons essayé de réunir les espèces qui ont entre elles le plus d'affinité.

## PREMIER GROUPE.

## DAPHNIS et DARAPSA. Moore. - Walker. - Felder.

# 1. C. NERII.

Linné, Syst. nat. 1, 2, p. 798. — Fab. — Cram. — Hubn. — Ochs. — God. etc. — Le Sphinz du Laurier rose, God. — Le Sphinz du Nérion, Engr.

Cette belle espèce est tellement connue des Entomologistes de tous les pays, qu'il est presque superflu d'en donner ici aucune description.

Ses ailes supérieures sont agréablement marbrées de vertolive, de rose et de blanc.

Les ailes inférieures sont noirâtres depuis la base jusqu'audelà du milieu, et ensuite d'un brun-verdâtre jusqu'à l'extrémité; ces deux couleurs sont séparées par une raie blanche sinuée.

Le corselet est d'un gris-verdâtre un peu rosé, avec les épaulettes et le collier d'un vert-olive foncé.

L'abdomen est, en dessus, d'un vert-olive avec les trois pre-



mins anneaux bordés de blanc; sur les anneaux suivants il y a des handelettes olivâtres obliques, bordées de blanc.

Le dessous des ailes est verdâtre avec une raie commune Manche, commençant au sommet des supérieures pour aboutir L'angle anal des inférieures.

La chenille est ordinairement d'un beau vent, plus rarement d'un vert-grisatre, pointillé de blanc, avec les anneaux d'un vert-jeunâtre; elle offre de chaque côté, sur le quatrième segment, un grand cui l·leu bipullé de blanc, cerclé de noir, et le long du corps, à partir du quatrième anneau, une bande latérale blanche, qui va se perdre à la base de la corne; celle-ci est curle, d'un vert-jaunâtre et peu arquée; les stigmates sont beirs cerclés de jaune.

Cotte chenille vit en Europe exclusivement sur les lauriers-rose, Josium. Nous l'avons rencontrée plusieurs fois dans les jardins de Paris, mais presque toujours sur le léurier à fleurs doubles, Josium adorum, dont les feuilles sont moins coriaces. On en touve érdinairement plusieurs sur le même pied. En 1842, qui était une année fort chaude, nous en avons élevé une demi-tousine provenant d'œufs que nous-avions découverts sur une feuille de laurier-rose dans notre jardin, au commencement de juliet. Nons avons entouré tout l'arbuste d'une immense gaze, et à la fin de septembre nous avons obtenu six très-beaux exemplaires. Nous aurions été plus heureux si les fourmis n'étaient pu venues enlever une partie des jeunes chenilles au moment de leur sortie de l'œuf.

Cette magnifique espèce est très-commune aux Indes orientales et dans une grande partie de l'Afrique, pendant presque tate l'année. En France, on ne la voit que de temps en temps, dans les années chaudes, lorsque les vents du sud ou du sudent nous en apportent quelques individus. Ces individus trouvant chez nous une nourriture assurée pour leur progéniture, donnent une et quelque iois deux générations, mais les chrysalides provenant de cette seconde génération n'éclosent plus, si les froids précoces arrêtent leur évolution. Toute chrysalide qui passe l'hiver n'éclôt jamais. Il faut donc, pour que l'espèce reparaisse chez nous, une nouvelle migration. Nous croyons donc put ce joil sphingide n'est pas plus indigène de la France que les Arrepos, convolvuli et Celerio. Le nerii est doué d'un vol sou-

tenu et puissant; il s'est avancé quelquefois jusqu'en Angleterre et même au-delà.

Selon MM. Sherwill et Lorquin, la chenille ne vit pas exclusiment, dans l'Inde, sur le Nerium oleander, mais encore sur d'autres espèces de Nerium. A l'île Maurice, selon Marchal, on trouve la chenille en février, avril, juin, septembre et décembre. La chrysalide éclôt au bout de vingt jours.

# 2. C. PROTRUDENS.

Felder, Novara, Exp. Zool. Thefl. Bad. II, Abth. 2, pl. 76, f. 7.—C. neriastri, Bd. M.

Il est un peu plus petit que le nerii, dont il a le port. Ses ailes supérieures sont d'un gris-violatre brillant; elles ont à la base une tache brune précédée d'un point basilaire de la même couleur; puis, ansuite, une raie transversale droite, se fondant avec une grande bande haune, profondément sinuée en dehors, où elle forme deux angles très-saillants; entre ces deux angles, vers l'angle interne, il y a un espace un peu plus clair, d'un brunviolatre; vers le tiers apical, le fond de la couleur est plus clair, séparé d'une partie un peu plus obscure par une raie courbe un peu blanchâtre; il y a aussi au sommet une lunule brune.

Les ailes inférieures sont d'un gris-blanchâtre, lavé de jaunâtre, avec la bordure brune.

Le corselet est d'un brun un peu violatre.

L'abdomen est d'un gris-brunâtre avec les anneaux un peu plus obscurs, et la base du premier segment d'un brun noir en dessus.

Le dessous des ailes est grisâtre; celui des supérieures est bordé de noir; et il y a une tache de la même couleur vers l'angle anal des inférieures.

Cette charmante espèce, dont nous ne possédons qu'un seul exemplaire, a été élevée à Halmeira par M, Lorquin, sur un laurier-rose sauvage (sic).

## 3. C. HYPOTHOUS.

Cramer, 285, D. — Darapsa Hypothous, Walker, List. Lep. Brit. mus. Het. pt. VIII, p. 186. — Moore, Catal. of Lepid. of ind. Comp. p. 371, 637.

Il a le port et la taille d'un grand nerii. Ses ailes supérieures



sent marbrées de brun-olivâtre et de gris-violâtre; vers leur bes elles offrent une grande tache arrondie d'un brun-olivâtre liserée de blanc, précédée d'un point de la même couleur; audél de cette tache; il y a une bande transverse, d'un blanc violâtre, divisée par une ligne brune qui s'élargit vers la côte; pais vient une large bande d'un brun olivâtre, fortement simée en dehors, suivie d'une bande d'un gris-violâtre, bordée, en dehors, par une ligne oblique blanchâtre; entre cette dernière ligne et le sommet, le fond est olivâtre; l'extrémité apicale st marquée d'une lunule brune surmontée d'une tache blanche; l'angle anal est, en outre, d'un gris-violâtre marquée d'une tache livâtre.

Les ailes inférieures sont brunes avec une bande transversale # bord abdominal d'un blanc grisâtre.

Le corselet est d'un gris violâtre avec les épaulettes d'un brun live, liserées de blanc.

L'abdomen est d'un brun un peu olivâtre en dessus, avec la me plus obsoure et une bande blanche transversale sur le se-

Le dessous des ailes est d'un gris un peu briqueté avec une mie blanchâtre oblique, allant du sommet des supérieures à 'angie abdominal des inférieures; outre cela, l'angle anal des patre ailes est marqué d'une grosse tache ferruguieuse et leur lisque d'un point blanc.

M. Lorquin a trouvé la chenille aux îles Philippines et à Céèbes, sur plusieurs arbustes, dont l'un, à en juger par des déris difficiles à déterminer, nous paraît être une Apocyuée?

Cette chemilie est d'un vert obscur sur le dos aves une bande mérale blanche, qui se continue jusqu'à la base de la corne; se-dessous de cette hande il y a, à partir du quatrième segment, né chaque anneau, une tache elliptique brune, marquée de trois etites taches ocellées; la corne est arquée, d'un vert-blanchâtre ves l'extrémité noirâtre.

Ce sphingide se trouve aux Moluques, aux îles Philippines et Java. Horsfield a élevé plusieurs fois sa chenille dans cette raiere localité, sur le Guettarda speciosa, Linn.

Coll. Bd.

# 4. C. ANGUSTANS.

Daphnis angustans, Feld. Novara, Exp. Zoolog. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 76, fig. 6.

Il est d'un tiers plus petit que le nerii. Ses ailes supérieures, dont le fond est d'un gris très-faiblement lavé de violâtre, présentent les caractères suivants : tout-à-fait à la base, il y a un gros point noirâtre suivi d'une tache de même couleur, un peu bilobée; un peu avant le milieu, une raie noire droite, allant de la côte à la nervure médiane; la dernière moitié de l'aile, qui est noirâtre, offre trois raies un peu plus obscures, et, avant l'extrémité, un espace de la couleur du fond, de forme un peu ovoide, s'appuyant sur la côte; l'extrémité apicale est marquée, comme dans los espèces du même groupe, d'une lunule brune, et plus bas, près de la frange, de deux autres lunules plus petites; ces diverses lunules sont liserées de gris-blanchâtre.

Les ailes inférieures sont d'un brun noir, traversées, un peu au-delà du milieu, par une zaie tortueuse blanche.

Le corselet est varié comme les premières ailes.

L'abdomen set d'un gris abscur avec le premier segment noir, bordé de blanc en arrière.

Il se trouve à Amboine. Décrit sur l'ouvrage de M. Felder.

#### 5. C. HESPERUS. Boisd.

Il est d'un tiers plus petit que le neril. Ses ailes supérieure sont d'un gris-luisant un peu violâtre, avec une tache basilais brune, précédée d'un petit point de la même couleur et suividanne petite ligne courbe, également brune; au-dalà du stigmat on voit une large bande brunâtre transversale, sinueuse en di hors, et vers la région du sommet, qui est un peu obscur, un ligne courbe blanchâtre; il y a aussi à l'extrémité apivale un lunule brune.

Les ailes inférieures sont blanchâtres avec une baude m diane et la bordure d'un brun-noir.

Le corselet est de la couleur des premières ailes avec lépaulettes d'un brun-olive foncé, liserées de blanc latéralemes

L'abdomen est roussatre en dessus.

Le dessous des ailes est d'un gris ferrugineux avec une re

plus claire allant du sommet des supérieures à l'angle anai des inférieures.

Décrit sur un individu un peu avorté, élevé de shenilla, aux les Philippines, par M. Lorquin, sur une plante qui nous psnit être le Guettarda microphylla?

#### DEUXIÈME GROUPE.

## 6. C. ALEOTO.

Lines, Mus. Lud. ulr. p. 387. — Fab. Eat. S. III, 1, p. 451. — Crap. pl. 437, D. — Drury, Ins. exot. 41, pl. 27, fig. 4. — Var. Dellephila Craica, Boisd. Icones, pl. 20.— Duponchel, Suppl. pl. 1, f. 3.— Treitsch. Seppl. 1, p. 438.

Il est au moins de la taille du lineata. Ses ailes supérieures sont d'un gris-olivatre pâle, plus foncées à l'extrémité, avec six lignes obliques légèrement olivatres, dont la première et la quatième, qui va aboutir au sommet, sont généralement plus marquées que les autres; le stigmate est noir et très-petit; outre cela, il y a une petite touffe de poils noirs à la base de l'aile.

Les ailes inférieures sont rouges, avec une grande tache trèsnoire à la base, qui vient se perdre à l'angle anal dans un espace d'un blanc-rosé; la bordure est brunâtre et étroite.

Le corselet est de couleur olive, bordé latéralement de blanc.

L'abdomen est d'un gris olivâtre en dessus, avec les côtés plus pales, sans trainée d'atomes dorés; il est, en outre, marqué de chaque côté, vers sa base, d'une tache très-noire, précédée d'une teuffe de poils blancs.

Le dessous des ailes est rougeatre.

La chenille, d'après un très-beau desain fait à Darjeeling, par le capitaine Shervill, ressemble presque complétement, dans son premier âge, à celle de Clothe. Lorsqu'elle est adulte, elle est le plus ordinairement verte, et quelquefois d'une couleur vineuse; elle a sur le troisième segment, de chaque côté, une tache oculaire noire, cerclée de jaune et pupillée de blanc, s'alignant avec na taches ovalaires d'un jaune pâle. Elle est commune dans l'inde sur différentes espèces de vignes.

L'Alecto est assez commun à Java et au Bengale. Il a été trouvé en Europe, par feu l'amiral d'Urville, dans les îles de l'archipel grec; à Constantinople, par M. de Rivière; dans les

fles de la Grèce, par le D' Bartels, médecin de la flotte russe dans la Méditerranée, et au Caucase, par Ménétriés. Quoi qu'il en soit, cette espèce n'est pas plus indigène de l'Europe que le Celerio. Quelques individus apportés par les vents de l'Est donnent, sur quelques points de l'Europe orientale, une ou peutêtre deux générations, puis disparaissent sans continuer de se reproduire.

Le nom de Cretica donné par nous à une variété prise en Europe, qui ne diffère des exemplaires de l'Inde que par des lignes parallèles plus manquées, doit être rayé de la famille des Sphingsies. Quant à l'individu que nous avons représenté depuis, comme le mâle de ce Cretica, pl. 49, fig. 2, il n'est lui-même qu'une variété mâle de Clotho. L'un est l'autre avaient été élevés de chenilles sur des vignes par M. de Rivière, dans le jàrdin de l'ambassade, à Constantinople, et envoyés par lui au célèbre Latreille, comme mâle et femelle. Il n'est pas très-étonnant que notre ambassadeur, qui était peu versé dans l'étude des Lépidoptères, ait pu confondre deux espèces qui ne diffèrent guère que par la couleur des ailes inférieures, surtout lorsque les chenilles de ces deux espèces se ressemblent presque complétement dans leur jeunesse.

#### 7. C. Suffusa.

· Walker, Heterocera, p. 146, 32. — Moore, Catal. of Lepid. of ind. Comp. p. 375, 636. — Ch. Hector, Boisd. M.

Il a le port d'Alecto, seulement il est un peu plus grand. Ses ailes supérieures sont d'une couleur olivâtre luisante, avec une bande blanche brillante, assez large, allant du milieu du bord interne au sommet, cette bande, divisée par deux très-petites lignes parallèles, de la couleur du fond, est bordée en avant par une bande olivâtre, surmontée d'une éclaircie longitudinale blanchâtre; en arrière de la bande blanche, toute la partie olivâtre est divisée par deux raies plus foncées; le bord terminal est d'un gris-rosé luisant. Outre cela, la côte et le bord marginal sont liserés de blanc.

Les ailes inférieures sont d'un rose carmin avec une grosse tache noire à leur base et une bordure d'un brun noir.

Le corselet est olive ainsi que le dessus de l'abdomen avec une bande dorsale, grise ou d'un gris-rosé clair, allant du mileu des épaulettes à l'extrémité anale. Les côtés sont d'un gris us peu rosé.

Le dessous des afles est d'un rouge brique, avec le bord marpial un peu grisâtre.

Décrit au British Museum sur deux très-beaux exemplaires vemut de Hong-Kong. Nous avons reçu cette même espèce d'Asmu, mais nos exemplaires sont heaucoup moins splendides que son du British Museum; ces derniers sont tellement frais qu'on moirait qu'ils ont été élevés dans un des jardins de Lonfra.

Nous l'avions décrit sous le nom d'Hector, mais probablement setre étiquette aura été perdue, ce qui est cause que M. Walker lui a substitué le nom de Suffusa.

## 8. C. THYELIA.

Linné, Mus. Lud. ulr. 360, 20? — Cramer, 236, K, F. — Clerck, Icona, tab. 46, f. 4? — Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 378, 70? — Sphinz harheries, Fab. Op. cit. 46. — Sulzer, Gesch. tab. 20, f. 3. — Ch. Kim, var. Walker, Heterocera, p. 137, 17.

Nous ne sommes pas parfaitement certain que l'espèce que lous décrivons ici, soit bien le véritable *Thyelia* décrit par Linné las son *Museum Ludovice utrice*, et figuré par Clerck. L'exembaire du célèbre naturaliste suédois est décrit et figuré avec les iks inférieures entièrement noirâtres, et non rouges avec une stite berdure noirâtre.

Celui dont il va être question est tout-à-fait identique avec ladividu figuré par Cramer; il répond au *Boerhaviæ* de Fabriinset de Sulzer.

Il est de la taille d'un Porcellus. Ses ailes supérieures sont d'un ris-olivatre pâle, tirant quelquefois sur le gris-roussâtre, avec ne bande oblique d'un brun-olive, plus ou moins marquée, mmen, ent vers le tiers antérieur du hord interne, et allant éteindre vers la côte à quelque distance du sommet; en arrière e cette bande il y a plusieurs petites lignes parallèles, olivâtres us ou moins accusées, dont la principale va gagner la pointe picale; le stigmate est très-petit et à poine visible.

Les ailes inférieures sont rouges avec une bordure brune trèsroite, expirant avant d'arriver à l'angle analqui est d'un rouge 1 peu grisatre. Le corselet est d'une couleur olivâtre, houdé latéralement à blanc.

L'abdomen est d'un gris roussatre avec les derniers anneux marqués d'une bande latérale dorée.

Le dessous des ailes est rougeâtre avec deux lignes transverse brunes, et le disque des supérieures rouge.

Ce petit Chærocampa est très-commun aux Indes orientales. Nota. Fabricius, p. 369, nº 40, le rapporte comme variété at Vespertilio. Plus tard, p. 371, il le décrit sous le nom de Bostieviæ. Enfin, p. 378, nº 70, il le décrit de nouveau, d'après Crames, sous celui de Thyelia.

## 9. C. Eson.

Cramer, 226, C. — Boisd. Faun. de Mad. p. 71, 2. — Charocenes Thyelia, var. Moore, Catal. of Lepid. of ind. Comp. p. 276, 628. — Walker, List. Lepid. Mus. Brit. Het. pt. VIII, p. 437.

C'est à tort, selon nous, que MM. Moore et Walker regardent cette espèce comme la même que Thyelia, ils sont trop bons observateurs pour les avoir réunies, s'ils avaient eu sous les yeur le véritable Eson.

Il est à peine plus petit qu'Alecto avec les ailes proportionnellement plus étroites. Les supérieures sont d'un gris-olivâtre trant un peu sur le jaunâtre, avec une bande oblique d'un brunolivâtre, plus ou moins nette, commençant vers le tiers antérieur du bord interne et allant s'éteindre vers la côte, à quelque distance du sommet; cette bande est suivie, en arrière, de cinq à six petites lignes parallèles, d'une teinte olivâtre, dont une ou deux, plus foncées et plus accusées que les autres, vont expiser dans la pointe apicale; le stigmate est noir et très-petit; outre cela, il y a à la base de l'aile une tache noire.

Les ailes inférieures sont rouges avec la base très-noire, et un petite bordure brune n'allant pas jusqu'à l'angle anal, qui et un peu jaunâtre.

Le corselet est de couleur olive, bordé latéralement de blanc.
L'abdomen est d'un gris jaunâtre avec les côtés couleur d'or.
Le dessous des ailes est d'un rouge jaunâtre, sablé de noirâtre, avec le disque des supérieures noirâtre, limité en dehors par une raie noirc.

Cette espèce est commune à Maurice, à Bourbon et à Madagascar. Cramer le dit de la côte de Coromandel, ce qui n'est pas tès-certain, car dans plus d'une circonstance il a donné la côte de Coromandel pour patrie à des Lépidoptères d'une toute autre contrée. Nous croyons nous rappeler en avoir reçu un ou deux individus de la côte orientale d'Afrique.

La chenille, selon Marchal qui l'a élevée fréquemment à l'île Maurice, est d'un noir violâtre ou couleur lie de vin et comme marbrée. La tête et les premiers anneaux sont d'un jaune rous-sitre, avec une tache oculaire noire de chaque côté du troisième segment; le long des pattes elle est marquée d'une raie noire anguieuse; la corne est blanche avec la base d'un noir foncé. Elle vit indifféremment sur la vigne et sur les balsamines, Impaliens balsamine.

# 10. C. ECHECLUS. Boisd.

Il a tout-à-fait le port d'Eson dont il est extrêmement voisin, et dont il ne diffère que par les caractères suivants: Le corselet est plutôt jaunâtre qu'olivâtre, mais il est marqué sur le milien d'une hande d'un gris un peu rose; les ailes supérieures n'ont pas de tache noire à leur base; les ailes inférieures sont à peu près semblables.

L'abdomen n'offre pas de différences notables; le dessous des ales est de la même teinte, sauf que le disque des supérieures est rouge au lieu d'être d'un brun noir.

Il se trouve aux iles Philippines. Feu Lorquin a trouvé la chenile aux environs de Jalajala, sur une plante dont il ignore le nom.

Quatre Chérocampes de ce groupe sont asses voisins les uns des autres, mais bien distincts par les caractères suivants :

- 1º Thyelia a les ailes fuférieures entièrement rouges avec une petite bordure brune; il est de moitié plus petit que les trois autres.
- 3º Echeclus a une large bande d'un gris-rosé sur le corselet et point de tache noire à la base des ailes supérieures.
- 4º Alecto a de chaque côté une tache noire à la base de l'abdomen, et point de trainée d'atomes dorés sur les côtés.

# 44. C. Kotschyl.

Deilephila Kotschyi, Kollar, Ueber den Charakter der Insecten-Franz von Südpersien, p. 12, nº 11.

Nous ne connaissons pas ce Chérocampe, que M. Kollar adcrit sur un très-mauvais exemplaire unique.

Voici ce qu'il en dit : Il a le port et la taille du Capensis; quatre ailes sont d'un jaune-ochracé livide; les supérieures set marquées d'une raie obsolète qui va obliquement du sommet milieu du bord interne. Les antennes et le corpa sont également d'un jaune-ochracé livide.

Il a été pris en Perse par M. Kotschy. — Kollar ajoute que l'exemplaire rapporté par ce voyageur avait été très-détérione par suite d'un long voyage.

#### .12. C. CAPENSIS.

Linné, Mus. Lud. ulr. p. 349, 17. — Hubner, Exot. Saml. — Waller, Heterocara, p. 139, 21. — Sph. Eas, Cram. 226, F.

Il est de la taille d'Alecto. Ses ailes supérieures sont d'un verpale assez frais dans le mâle, et d'un brun olivâtre chez la femelle, avec une raie droite plus obscure que le fond, bifide ves la côte, située sur le tiers postérieur de l'aile; outre cela, elles sont marquées dans les deux sexes, sous le milieu de la côte, en dehors du stigmate, d'une grosse tache obscure mal arrêtée.

Les ailes inférieures sont rouges avec le bord marginal de la couleur des premières ailes.

Le corselet et l'abdomen sont dans chacun des sexes, de la couleur des ailes supérieures; celui-ci offre, latéralement à se base, une ou deux touffes de poils roses. Les épaulettes sont des latéralement de blanc ou de blanc-rosé, mais cette couleur ne s'étend pas jusqu'aux yeux.

Le dessous des ailes est d'un brun-tonné clair chez la femelle, et d'un blanc verdâtre chez le mâle, avec le disque des supérieures rose, dans l'un et l'autre sexe.

Il se trouve assez fréquemment au cap de Bonne-Espérance, la Natal, etc.

Coll. Bd.

#### 13. C. CECROPS.

Cramer, 226, B. - Walker, Heterocera, p. 145, 30.

Cramer a figuré sous le nom de Cecrops, une espèce, ou peutètre une variété du Capensis, que nous n'avons jamais vue. Elle diffère du Capensis de Linné, en ce que la ligne placée sur le tiers postérieur des premières ailes est courbe vers la côte, au leu d'être bifide, en ce que la base est ombrée par une tache emblable à celle qui existe sous le milieu de la côte, et enfin, en ce que les ailes inférieures ont une petite bordure noirâtre, prédie d'une raie maculaire de la même couleur. Pour le reste le Curops ressemble au Capensis.

Il est à regretter que M. Trimen (1) qui a fait tant d'observations intéressantes sur les Lépidoptères du Cap, n'ait pas élevé me certaine quantité de chenilles du Capensis, pour s'assurer al n'y avait qu'une seule espèce ou s'il en existait une deuxième, comme le dit Cramer.

## 14. C. SCROFA.

Boisd, Faun. de l'Gcéanie, p. 185, 3.— Walker, Heterocera, p. 147, 35.

Il est un peu plus grand que notre Porcellus. Il varie pour la caleur, qui est tantôt d'un gris cendré, comme dans le Vesperche, et tantôt d'un gris-brunâtre. Dans la variété cendrée, on perçoit un stigmate noirâtre extrêmement petit, suivi d'une mère transversale un peu plus obscure que la teinte générale, et un peu avant l'extrémité, une rangée oblique de petits points mans. Dans la variété brunâtre, les ailes supérieures sont pointers de brun, l'ombre transverse est bien indiquée et le bord minal, en dehors de la rangée de petits points bruns, est presce de la couleur de la bande transverse.

(f. H. Beland Trimen a résidé pendant un certain nombre d'années L'Cap de Bonne-Espérance. Entomologiste distingué et excellent obcritaire, il a étudié et recueilli la plupart des Lépidoptères Rhoaucères de cette contrée où il a découvert un certain nombre d'escon nouvelles. Avec les matériaux qu'il a réunis, il a publié en deux aties la Faune des Lépidoptères diurnes de cette partie de l'Afrique estrate; ouvrage plein de remarques intéressantes et d'une critique Dans l'une et l'autre variété, les ailes inférieures sont rouge avec une petite bordure noire.

Le corselet est de la couleur des premières ailes avec les épulettes bordées latéralement de blanc.

L'abdomen est de la couleur du corselet; les antennes sui blanches et courtes.

Le dessous des ailes est gris dans la variété cendrée avec le dique des supérieures rouge; il est entièrement rougeâtre dans l'autre variété.

Ce joli petit sphingide rappelle un peu notre Vespertilio; 1se trouve à la Nouvelle-Hollande.

Coll. Bd.

## TROISIÈME GROUPE.

# 15. C. CHARIS. Boisd.

Walker, Heterocera, p. 136, 15. — Ménétriés, Knima. corp. mis-Musée Petrop. p. 93, 1540.

Il est d'un tiers plus petit que le Celerio avec les ailes moiss allongées; les supérieures sont d'un brun-roux légèrement olivitre, avec une bande oblique blanche ou blanchâtre, s'étendantés milieu du bord interne, où elle est accolée intérieurement à une tache très-blanche, à l'angle apical. Cette bande est divisée, des le sens de sa longueur, par deux petites lignes peu marquées de la couleur du fond. A partir du côté interne de cette même bands, les nervures sont blanches jusqu'au milieu de la surface; le sigmate est noir; la bordure terminale est d'un gris-luisant faiblement rosé, divisée par une petite ligne brune.

Les ailes inférieures sont rouges avec une bordure brune sessition et la frange blanche.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures avec les épuilettes bordées latéralement de blanc.

L'abdomen est d'un brun un peu roussatre, avec deux petits lignes dorsales, blanches, parallèles; les côtés offrent une bande d'atomes dorés.

Le dessous des ailes est d'un jaune rougeâtre, avec le disque des supérieures presque rouge.

Port-Natal. Nous avons reçu de MM. Delegorgue et Walhberg des individus très-purs, probablement élevés de la chenile.

Becker en avait aussi reçu quelques exemplaires de l'Angleterre.

Coll. Bd. — Cette jolie petite espèce n'est peut-être pas plus rare à Natal que le Celerio.

# 16. C. OSYRIS.

Dalman, Analect. Ent. p. 48, 21. — Boisd. Icones, pl. 49, fig. 1. — Duponchel, Suppl. II, pl. X, fig. 2. — Walker, Heterocera, p. 135, 14.

Il ressemble un peu au Celerio par ses ailes supérieures, mais il est d'un tiers plus grand; elles sont d'un brun olivâtre, avec une bande médiane oblique, d'un blanc-argentin rosé, s'étendant de la base à la pointe apicale, divisée dans le sens de sa longueur par une petite raie très-fine, plus foncée. En avant de cette bande, il yen a une autre moins prononcée, partant du milieu de la base pour s'unir, vers le sommet, avec la précédente, précédée vers la côte d'un petit stigmate noir; en arrière de la raie médiane, le bord interne est liseré de blanc argentin; le bord terminal de l'aile est d'un gris-rosé blanchâtre, divisé par une petite ligne brune; la base de l'aile offre une petite touffe de poils noirs qui se prolonge un peu, comme dans le Celerio, sur la nervure médiane.

Les ailes inférieures sont d'un joli rose carmin avec deux bandes noires, dont la supérieure interrompue forme une tache quadrangulaire vers le bord abdominal; la postérieure est plus étroite, anté-marginale, suivie d'une bordure d'un gris rosé.

Le corselet est de la couleur des premières ailes avec une raie intérale et une raie médiane d'un gris-blanchâtre rosé; les épaulettes sont divisées longitudinalement par une raie d'un jaune d'es.

L'abdomen est d'un gris olivâtre en dessus, avec deux lignes d'un blanc rosé, parallèles, très-rapprochées sur le milieu du dus; les côtés sont d'un gris rosé, marqués vers leur Lase de rois bandes transversales noires, et sur les anneaux suivants d'une ligne dorée un peu interrompue.

Le dessous des ailes est à peu près comme dans la Celerio.

Cette superbe espèce a été élevée de la chenille sur une vigne, an environs de Cadix, en 1822, pendant l'occupation de cette tille par l'armée française. Dans la collection d'Auguste de Bor-

deaux, il y en avait un exemplaire venant du Maroc. L'individa décrit par Dalman avait été rapporté de la côte d'Afrique.

Cette espèce est d'origine africaine; ce n'est qu'accidentellement qu'elle a été prise dans le midi de l'Espagne. Elle est tost aussi exotique que le Celerio.

Très-rare. Coll. Bd.

#### 17. C. CELERINA. Boisd.

Walker, Heterocera, p. 136, 16.

Cette charmante petite espèce, qui est tout au plus de la taille d'un Porcellus, a tout à fait le port du Celerio. Ses ailes supérieures sont d'un brun-olivâtre luisant, marquées, comme dans le Celerio, d'une bande oblique argentée qui arrive jusqu'à la pointe apicale, et de petites lignes blanches, parallèles aux nervures; le stigmate est blanc.

Les ailes inférieures sont d'un rose carmin avec une bordum brune assez étroite.

Le corselet est bordé latéralement de blanchâtre, avec les éparlettes sablées d'atomes dorés. Les antennes sont brunâtres.

L'abdomen est olivâtre avec une raie dorsale blanche, divisée longitudinalement par une ligne brune; les côtés sont jaunâtres, ornés d'une bandelette longitudinale dorée.

Le dessous des ailes est d'un jaunâtre testacé, avec une bordus mal arrêtée, brunâtre, et des atomes épars de la même couleur. Le ventre est marqué d'une raie longitudinale blanche.

Ce rare et beau *Chærocampa* est du Congo; il fait partie de la belle collection du British museum, où nous avons pris sa description, grâce à l'obligeance de M. E. Gray.

## 18. C. CELERIO.

Linné, Syst. nat. II, p. 800, 12. — Fab. — Happ. — Hubn. — Ochstück. — God. — etc. — Le Phénix, Engr. — Sph. Tisiphone? Linn. Has. lud. ulr. p. 359.

Il est parfaitement connu de tous les entomologistes, ét il a été figuré par beaucoup d'auteurs. Une longue description devient presque superflue. Les ailes supérieures sont d'un brun olivâtre avec une bande oblique d'un blanc argentin, qui commence sur le tiers antérieur du bord interne et finit en pointe à l'angle api-

cei; près de la frange, il y a une autre bande d'un blanc un peu argentin et quelques traits longitudinaux de la même couaur, parallèles aux nervures; le stigmate est très-petit et noir.

Les ailes inférieures sont d'un rouge carmin vers leur base, enuite noires, avec une bande transverse, rose, divisée par des cervures noires; la frange est liserée de blanc.

Le corselet est olivâtre, bordé latéralement de blanc, avec le milieu d'un gris blanchâtre; sur le milieu de chaque épaulette, il v a une petite ligne longitudinale d'un jaune doré.

L'abdomen est olivâtre avec une raie dorsale, argentée, divile longitudinalement par une petite ligne noire, très-fine, un peu interrompue; il y a en outre, sur chaque côté, à partir du troisième anneau, une série de petits traits géminés d'un blanc arcentin ou doré.

Le dessous des quatre ailes est brunâtre, lavé de rougeâtre vers l'estrémité.

la chenille, dont nous avons figuré deux variétés dans notre leongraphie, Sphingide, pl. 13, fig. 1-3, est tantôt brune et tantôt verte; elle est marquée, sur le quatrième et le cinquième segment, de deux yeux noirs à iris jaune, pupillés de blanc; outre se'a, son corps est longé de chaque côté par deux lignes jaunâtres, dont la supérieure s'étend du sixième anneau jusqu'à la cace de la corne, et l'inférieure, formée par des espèces de peuts croissants, va de la tête à l'anus; la corne est droite, de longueur moyenne.

La chrysalide est d'un brun-roussâtre pâle, avec les stigmates et l'enveloppe des ailes d'un brun noirâtre.

La chenille vit sur la vigne en juillet et en septembre.

Le Celerio se montre, en Europe, dans le commencement de millet et à la fin de septembre. Dans certaines années, il remonte quelquefois au-delà de Paris.

Nous ne regardons pas pour cela cette espèce comme indigène, attendu qu'elle ne peut se perpétuer chez nous. Elle nous arrive, dans les années chaudes, apportée par les vents de l'Afrique ou de l'Orient. Les chrysalides, surprises par le froid de l'automne, n'relesent pas en Europe, tandis qu'en Afrique et dans l'Inde, ce Sphingide paraît presque sans interruption.

Le Celerio est commun sur la côte orientale et occidentale de l'Afrique, au cap de Bonne-Espérance, à Natal, à Madagassar, aux lies Maurice et Bourbon, dans l'Inde, dans les iles de l'Archipel

indien et même à la Nouvelle-Hollande. Les exemplaires de cette dernière provenance sont les plus beaux que nous ayons vas.

Nous sommes à peu près certain que le Sphinx Tisiphone à Linné, Mus. lud. ulricæ, est le même que le Celsrio, du Spinatur. du même auteur.

### 19. C. SILHETENSIS. Boisd.

Walker, List. Lep. Brit. Mus. Het. pt. VIII, p. 143. — Charocann Bisecta, Moore, Catal. of Lepid. of ind. Comp. 278.

Il est à peu près de la taille de l'Oldenlandice, ou même un pur plus petit. Ses ailes supérieures sont d'un gris jaunâtre, avec un bande oblique, d'un brun olive, allant de l'origine de la bant la pointe apicale. Cette bande est bordée en dessous par une le gne blanche, suivie de plusieurs petites lignes très-obsolètes, divâtres; le bord terminal, qui est un peu plus pâle, offre auxiquelques petites lignes brunâtres, très-fines, visibles seulement chez les exemplaires très-frais; le stigmate est noir et très-petit; outre cela, toute la partie comprise entre la bande oblique et le bord interne est beaucoup plus pâle que celle qui regarde la côte.

Les ailes inférieures sont brunâtres, avec une bande transvers d'un gris jaunâtre plus ou moins prononcée.

Le corselet est olivâtre, avec les épaulettes bordées légèrement de blanc sur les côlés, au point d'insertion des ailes.

L'abdomen est aussi olivatre en dessus, avec une raie domblanche, qui commence au milieu du corselet pour se termina à la région anale. C'est à cause de cette raie unique que le savet zoologiste Horsfield lui avait donné le nom de bisecta (compé et deux).

Le dessous des ailes est rougeâtre ou jaunâtre, avec le disque des supérieures plus obscur.

La chenille, selon M. Lorquin, varie pour la couleur. Le plus ordinairement elle est brunc, avec le ventre d'un gris incarnat; d'autres fois elle est presque verte avec le ventre blanchâtre; elle a tout le long du corps, à partir du troisième anneau, une rapée d'ocelles ovalairés, dont le premier est le plus grand et pepillé de brun; les suivants sont surmontés de deux points noiss géminés; les stigmates sont blancs, cerclés de noir; la corne de onzième segment est très-courte, presque nulle. Elle vit sur plasieurs plantes de la famille des Nyctaginées.

Les exemplaires élevés à Célèbes par M. Lorquin sont plus pens et beaucoup plus foncés que ceux de l'Inde, de Java et de Manille.

Call. Rd.

# 20. C. JAPONICA.

Boisd. in Lorza, Lepid. du Japon à l'Exposit. universelle, p. 36, 79.

Il a le port et la taille de l'Oldenlandiæ de Fabricius, dont il est assez voisin. Ses ailes supérieures sont d'un gris-olivâtre obscar, avec une bande oblique d'un blanc-grisâtre terne, s'étendant du milieu du bord interne à la pointe apicale. Cette bande est divisée par une très-petite ligne brune et bordée en avant par une bande d'un brun olivâtre; elle est suivie en arrière d'une raie brune et de deux petites lignes plus pâles que le fond.

Les ailes inférieures sont brunes, traversées un peu au-delà du milieu par une bande rougeatre, se dilatant vers le bord abdominal.

Le corselet et la tête sont olivâtres, avec les épaulettes légèrement bordées de blanc latéralement.

L'abdomen est olivâtre sur le dos, avec les côtés largement d'un june doré.

Le dessous des ailes est rougeâtre, avec le disque et l'extrémité des supérieures de couleur brunâtre.

Décrit sur un individu unique dans notre collection, lequel 2003 a été envoyé, il y a plus de trente ans, par M. Dehaan (1). Les chenilles de cette rare espèce avaient été élevées au Japon par M. Siebold.

# 21. C. GERYON. Boisd.

Il est d'un tiers plus grand que le Celerio, dont il a le port; il a but à fait la taille de l'Osyris.

(i) Willem Dehaan, naturaliste hollandais, conservateur de la colaction entomologique du Musée de Leyde, est mort en 1833. Il a

denné dans divers recueils plusieurs travaux intéressants sur les
actamorphoses des insectes, sur les Orthoptères et sur les Lépidoplers. En dernier lieu, il a publié, avec notre concours, un volume
pasthame complétant les recherches anatomiques de Lyonet, ouvrage
que l'auteur n'avait pu terminer entièrement, mais dont toutes les
planches étaient gravées par lui-même.

Lipidoptères. Tome I.

Ses ailes supérieures sont d'un brun-olive foncé, avec une bande blanche un peu argentine, s'étendant du tiers antérieur du bord interne à la pointe apicale. Cette bande est divisée, dans le sens de sa longueur, par deux petites lignes extrêmement fines de couleur jaunâtre; la bordure de l'extrémité est d'un blanc grisâtre, divisée par une ligne brune; le stigmate est noir et très-petit; outre cela, il y a sur le disque deux ou trois stries longitudinales d'un blanc argentin, et à la base une tache grisâtre.

Les ailes inférieures sont noires, avec une tache d'un gris blanchâtre à la base et une bande anté-marginale, étroite, de la même couleur.

Le corselet est d'un brun olive, bordé légèrement de blanc latéralement, avec une bande médiane grise; les épaulettes sont divisées par un filet d'or. Les antennes sont d'un beau rose.

L'abdomen est blanchâtre jusqu'au milieu, marqué à sa base, sur chacun de ses côtés, d'une grosse tache noire, il est ensuite roussâtre sur le dos. Il a dans toute sa longueur deux petites lignes parallèles blanches, séparées l'une de l'autre par une ligne roussâtre; les côtés sont blanchâtres avec une raie d'argent sur les derniers anneaux.

Le dessous des ailes est brunâtre sur les supérieures et un peu rougeâtre sur les inférieures.

Cette belle espèce est encore fort rare dans les collections. Deux des individus que nous possédons ont été élevés de chenilles à Madagascar, aux environs de Tananarive, sur une espèce de vigne sauvage, par Goudot. Feu notre regretté confrère le D' Coquerel nous a rapporté de Nos-Bé un exemplaire un peu plus petit.

Il est probable que ce beau Chærocampa habite aussi la côte orientale d'Afrique, comme cela a lieu pour la plupart des Sphingides de Madagascar, que l'on retrouve à Natal, Mozambique, Zanzibar et même quelquefois au Sénégal.

# 22. C. OLDENLANDLE.

Fab. Ent. S. III, 1, p. 370, 44. — Lewin, Prodrom. Ent. pl. 3. — Walker, List. Lepid. Brit. Mus. Het. pt. VIII, p. 142, 26. — Moore, Cat. of Lep. of ind. Comp. p. 278, 644. — Gortys, Hubner, Exot. Saml.

Il a le port et la taille d'un Celerio de moyenne grandeur. Ses ailes supérieures sont d'un gris-olivâtre plus ou moins foncé avec une hande blanche, oblique, un peu argentine, s'étendant du milieu du bord interne à la pointe apicale. Cette bande, parfaiiment régulière, est bordée en dessus par une bande d'un brun divitre, et en dessous par une raie d'un brun olivâtre, divisée, dans le sens de sa longueur, par une petite ligne blanche; le stigmale est noir et très-petit; le bord extérieur est d'un cendré luisant, divisé par une très-petite ligne brunâtre.

Les ailes inférieures sont noirâtres, avec la base et une raie mié-marginale d'un gris jaunâtre.

Le corselet est de la couleur des ailes, bordé latéralement de gris cendré et marqué d'une raie médiane de la même couleur; les épaulettes sont coupées par une bande d'un jaune doré.

L'abdomen est olivâtre, avec deux lignes dorsales d'un blanc argentin, parallèles et un peu tremblées; les côtés sont d'un jeune doré.

Le dessous des ailes est rougeâtre avec des atomes et une raie

La chenille, figurée par Lewin et par feu le Dr Horsfield (1), ct d'un noir brun avec les incisions largement bordées de jaune t les côtés marqués de gros points de la même couleur. Sur

(1) Le docteur Thomas Horssield, conservateur du Muséum de la compagnie des Indes, botaniste et zoologiste connu de tous les savous, a, à l'imitation des auteurs du Catalogue de Vienne, classé les Lépidoptères d'après des caractères tirés de leurs premiers états. A est effet, pendant un long séjour à Java, il a amassé de nombreux matériaux; il dessina et peignit avec une exactitude minutieuse les métamorphoses d'un grand nombre de chenilles, dont la connaissance contribue puissamment aujourd'hui à coordonner les genres d'une maière plus naturelle.

Lors de notre voyage à Londres, il a mis à notre disposition avec the obligeance parfaite, l'Album des dessins qu'il avait exécutés à lava, ainsi que la précieuse collection de Lépidoptères de l'honorable compagnie des Indes.

La 1828 et 1829, il donna le catalogue descriptif des Diurnes de lava, avec des planches coloriées représentant leurs métamorphoses. Impais lors, il a publié avec le concours de M. Fred. Moore, en 1837 et en 1858, peu de temps avant sa mort, le catalogue général des Léphoptères appartenant à cette riche compagnie avec la description des espèces inédites. Ce dernier ouvrage, d'une utilité incontestable, est devenu indispensable à tout entomologiste qui s'occupe des Léphéoptères de l'Inde.

chacun de ses côtés, il y a en outre une rangée de sept taches oculaires fauves, cerclées de blanc et coupées par un petit trait jaune; le ventre est blanchâtre, pointillé de noir; la tête et la queue sont noires.

Selon M. Horsfield, elle vit à Java sur une espèce de Cissa. M. Lorquin l'a élevée sur une plante qui, à en juger par les dé-

bris, semble appartenir aux Rubiacées.

Cette espèce habite Java, Sumatra, Manille, Celèbes, la Nonvelle-Hollande et la Chine.

Dans une note à l'ouvrage de Lewin, il est dit: « Nous croyons avoir vu cette même espèce venant du cap de Bonne-Espérance.» C'est une erreur, l'auteur confond l'Oldenlandiæ de Fahricius avec notre *Epicles* (Gordius Cramer), qui est une espèce voisine propre au Cap.

Ce Sphingide n'est pas très-rare dans les collections.

M. Walker décrit, sous le nom de Firmata, un chérocampe de la Nouvelle-Hollande, qui, pour nous, n'est qu'une variété plus brillante de l'Oldenlandiæ.

## 23. C. EPICLES. Boisd.

Gordius, Cramer, 367, A. — Ch. Gordius, Walker, Heterocert, p. 138, 19.

Il a le port et la taille du Celerio. Ses ailes supérieures sont d'un gris-cendré olivâtre, avec une bande blanche oblique, s'étendant du milieu du bord interne à la pointe apicale; cette bande, parfaitement régulière, est bordée en dessus par une bande d'un brun olivâtre, et en dessous par deux lignes de couleur olivâtre; le stigmate est noir et très-petit; le bord terminal est d'un gris-cendré luisant, avec une tache noire bien marquée sur l'angle anal.

Les ailes inférieures sont d'un gris-roussâtre sale, avec trois bandes transversales brunâtres, dont une au milieu asses large et les deux autres très-étroites, linéiformes, vers l'extrémité.

Le corselet est de couleur olive, bordé latéralement de gris cendré et marqué d'une bande médiane assez large, de la même couleur, s'étendant jusqu'au troisième anneau du corps; les épaulettes sont coupées par une raie d'un jaune doré.

L'abdomen est olivâtre en dessus, avec deux lignes dorsales d'un blanc argenté paraissant être tressées; les côtés sont un per junitres; cette couleur est séparée de celle du dos par une raie temée d'un blanc argenté.

Le dessous des ailes est d'un brun ferrugineux, avec des raies teasverses obscures.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance et en Caffrerie.

E. Drège a élevé les chenilles de cette espèce; il les a trouvées sur une plante qui porte le nom d'hedyotis caffra.

Décrit sur deux individus très-purs. — Coll. Bd.

Camer ayant figuré antérieurement, pl. 247, un Sphinz sous le nom de Gordius, nous avons, pour éviter la confusion, substitut, à celui dont il est ici question, le nom d'Epicles.

### 24. C. CAJUS.

Cramer, 146, F. — Walker, Heterocera, p. 139, 20.

Ha le port et la taille de l'Oldenlandiæ. Ses ailes supérieures sent d'un gris-cendré un peu olivâtre, avec une bande longituénale, oblique, se dirigeant du milieu du bord interne vers le semmet; cette bande est bordée, de chaque côté, par une large mie noire, divisée par une ligne d'un jaune testacé; outre cela, il y a tout le long de la côte une raie d'un blanc jaunâtre bordée de noir en dehors, et à la base une tache également d'un blanc me peu jaunâtre, bordée de jaune testacé.

Les ailes inférieures sont noires à la base, ensuite d'un blanc grisatre, avec une raie transversale noire, très-étroite, sinuée; à bordure est d'un gris brunâtre.

Le correlet est olivâtre.

L'abdomen est également d'une couleur olivatre, avec une mie dorsale d'un jaune testacé; les côtés sont d'un blanc testacé evec quelques atomes dorés.

Le dessous des ailes est d'un gris brunâtre, un peu plus clair ser le disque des supérieures.

Très-rare. — Coll. Drège.

M. Walker le regarde comme pouvant être une variété de l'Olfanlandiæ; il sait cependant aussi bien que nous, que ce Chéromape ne se trouve pas en Afrique.

### 25. C. PHOENYX.

Boisd. in Herrich-Schæffer, 478.

Il a le port et la taille du Celerio. Ses ailes supérieures sont d'un gris-olivâtre très-pâle, avec des stries longitudinales brunes, et trois ou quatre des premières nervures d'un blanc un peu argentin; le stigmate est blanc marqué d'un petit point noir; outre cela, il y a, sur le tiers postérieur de l'aile, une bande transverse, oblique, un peu sinueuse, d'un gris couleur de bois, commençant au milieu du bord interne pour aboutir au sommet; cette bande est divisée, dans le sens de sa longueur, par trois petites lignes rousses parallèles, et bordée en dedans par une raie blanche, principalement dans sa partie inférieure; outre cela, le bord terminal est d'un gris-tanné clair, avec une tache noire sur l'angle anal.

Les ailes inférieures sont entièrement noirâtres, avec la gouttière abdominale grisâtre.

Le corselet est d'un brun olive, avec les épaulettes bordées de blanc latéralement, et de jaune doré en dessus.

L'abdomen est olivâtre en dessus, avec une raie dorsale dorée un peu tressée; les côtés sont jaunâtres, et offrent, à partir du quatrième anneau, une rangée de petites taches argentées disposées deux par deux.

Le dessous des ailes est d'un brun rougeatre pointillé de noir. Il se trouve à Java. Notre exemplaire vient de Samarang.

### 26. C. Vigit.

Guérin, in Delessert, Souven. Voy. dans l'Inde, pl. 23, f. 1. — Panacra Vigil, Moore, Cat. of Lepid. of ind. Comp. p. 270, 622. — Panacra Lignaria, Walker, Lepid. Heter. of Brit. M. p. 156.

Il est presque de la taille d'un Celerio. Les ailes supérieures ont toute la moitié costale d'un brun olivâtre, avec quelques légères éclaircies grisâtres et un petit stigmate noir environné de blanc grisâtre; l'autre moitié est d'un blanc un peu grisâtre, et forme une large bande terminale, sinuée près du sommet, commençant sur le tiers inférieur du bord marginal; cette large bande terminale offre quelques petites lignes très-peu marquées, flexueuses, légèrement obscures; elle est marquée en outre, près

& l'angle anal, d'une tache noirâtre, et vers le sommet, d'un trait oblique de la même couleur.

Les ailes inférieures sont noirâtres, avec une bande transverule d'un gris-jaunâtre sale.

Le corselet est d'un brun clivâtre, bordé latéralement de blanc. L'abdomen est d'un brun clivâtre en dessus, strié de noirâtre, J'un gris plus pâle sur les côtés, avec les derniers anneaux marqués chacun de deux taches géminées d'un blanc argentin.

Le dessous des ailes est d'un brun rougeâtre pointillé de noir. Nous possédons quatre exemplaires de cette espèce, achetés successivement chez Becker, qui nous a dit, tantôt qu'elle venait de Chine, tantôt de Java, et une autre fois de Ceylan; de sorte que nous ignorons s'il se trouve ailleurs que dans cette dernière lecalité.

27. C. ORPHEUS. Boisd.

Boisd. in Herrich-Schæffer, 104.

Il a un peu le port du Celerio, mais il est au moins d'un tiers plus petit avec les ailes plus arrondies au sommet. Les supériures sont variées d'olivâtre et de jaunâtre, avec une raie blanche, oblique, sinueuse, commençant sur le tiers antérieur du bord interne pour se terminer, en s'arrondissant, sur la côte, en peu avant le sommet; cette raie est coupée dans les sens de a longueur par une ligne noire, et bordée en arrière, par une autre ligne de la même couleur; elle limite vers le milieu du bord interne une grosse tache noire; outre cela, le stigmate est noir, très-petit, précédé du côté de la base de quelques traits ransverses, noirâtres; l'extrémité terminale est blanchâtre, lavée d'un peu de jaunâtre avec une petite ligne noire interrompue, placée tout près de la frange.

Les ailes inférieures sont noirâtres avec quelques éclairçies

Le corselet est olivâtre avec deux petites lignes noires sur les épanlettes.

L'abdomen est d'un gris olivâtre avec cinq raies parallèles, poirâtres, dont la dorsale est moins marquée que les autres.

Le dessous des ailes est d'un brun jaunâtre avec une double raie noirâtre, commune. Le ventre et la poitrine sont blanchères.

Nous ne savons pas au juste d'où vient l'individu que nous

possédons. M. Herrich-Schæffer, qui a donné une excellente figure de cette espèce, dit que celui qu'il a figuré d'après un exemplaire de la collection de Stuttgard, a été rapporté du Cap de Bonne-Espérance.

## QUATRIÈME GROUPE.

## 28. C. YORKII. Boisd.

Il est à peu près de la taille de l'Oldenlandiæ de Fabricius. Ses ailes supérieures sont d'une couleur brunâtre assez claire, rayées longitudinalement de brun plus foncé, avec une bande anté-apicale, sinuée, blanchâtre, argentée; leur bord terminal est cendré avec une tache noire vers l'angle anal.

Les ailes inférieures sont brunatres.

Le corselet est d'un brun faiblement olivâtre, bordé latéralement de blanc.

L'abdomen est d'un brun olivâtre en dessus, avec les côtés marqués de petites taches argentées, alignées et disposées deux par deux comme dans le *Brennus* de Cramer.

Cette espèce assez différente des autres Chérocampes a été rapportée du cap York et fait partie du British museum où nous l'avons décrite sur un exemplaire unique. C'est le seul individu que nous ayons vu jusqu'à présent.

Très-rare.

### 29. C. Brennus.

Cramer, 398, B. - Walker, Heterocera, 144, 29.

Il est de la taille du *Cræsus* (*Thorates* Hubn.). Ses ailes supérieures sont grisâtres, fasciées de brun; la bande la plus large est placée au milieu, en avant du stigmate, et suivie d'une petite ligne noirâtre anguleuse; avant le bord terminal, il y a une autre bande brune, sinueuse, biside à son extrémité supérieure.

Les ailes inférieures sont d'un ferrugineux vif avec une bordure d'un brun noir.

Le corselet est olivâtre bordé latéralement de blanc, avec une raie médiane grise.

L'abdomen est olivâtre sur le dos, rougeâtre sur les côtés, marqué de chaque côté, à partir du milieu de sa longueur, de taches d'argent, alignées, disposées deux par deux; chaque angée se compose de quatre taches géminées.

Disrit sur un individu unique qui nous a été rapporté des îles Arrow par feu l'amiral d'Urville (1).

L'individu figuré par Cramer avait été pris à Amboine.

Cette espèce doit être rare, car M. Lorquin ne l'a trouvée ni ax les Moluques ni à Arrow.

## CINQUIÈME GROUPE.

30. C. CAICUS.

Cramer, 125, F. — Fab. Ent. Syst. III, Part. I, 375, 57. — Anceryz Caicus, Walker, Heterocera, p. 228, 10.

Voici une espèce que nous ne plaçons qu'avec doute dans le

(i) L'amiral Jules Dumont d'Urville, notre compatriote, notre ami. dont nous avons été le collaborateur pour la partie entomologique 🕯 voyage de l'Astrolabe, n'était pas seulement un grand navigateur; mis, il était en même temps botaniste distingué et zoologiste plein de zile. Il a recueilli, dans ses voyages de circumnavigation, une foule matériaux scientifiques d'une grande valeur. Il a publié plusieurs ménoires remarquables, entre autres une flore des îles Malouines. A la suite d'une expédition dans la mer Noire et dans les îles de la crice, il a rapporté en France la célèbre Vénus de Milo. Il a fait trois his le tour du monde : une première fois comme second de Duperrey, sur la Coquille, de 1822 à 1825; une seconde comme commandant l'expédition de l'Astrolabe, avec mission d'explorer l'Océanie. Dans ce plaible et dangereux voyage au milieu des récifs et des bancs de comax, il reconnut dans l'île de Vanikoro, le lieu où avait péri l'infortuné Lapérouse; il découvrit plusieurs petites lles encore inconnues « aous fit même l'honneur de nous en dédier une. Enfin, dans son wisième voyage également sur l'Astrolabe, qu'il appelait sa vieille lerque, il s'avança fort avant dans les glaces du pôle antarctique, en afrontant les plus grands périls, et découvrit dans ces tristes régions quelques terres nouvelles, entre autres la terre Adélie, à laquelle il donna le nom de sa femme. Après avoir échappé en mer à mille dangers, il périt avec sa femme et son fils unique dans l'épouvantable catastrophe qui eut lieu sur le chemin de ser de Versailles, le 8 mai 1842.

II. d'Urville possédait aux environs de Toulon, à la Juliade, lieu où Il avait l'intention de se retirer un jour, une précieuse collection, en beaux exemplaires, des insectes et des plantes recueillis dans ses divers voyages. Nous ne pouvons citer sans regret trois ou quatre individus magnifiques du rare Ornithopteræ Durvillis. Hélas! le tout est tombé entre les mains des ignorants et a été perdu pour la science. genre Chærocampa, quoique Lacordaire, qui a élevé la chenille à Cayenne, nous ait dit que d'après ses souvenirs elle avait la tête rétractile et des taches oculaires. Si elle n'avait pas les ailes parfaitement, entières, on serait tenté de la réunir aux Anceryx.

Elle a le port et la taille d'un Celerio. Ses ailes supérieures, sans la moindre dentelure, sont d'un blanc jaunâtre, avec les stries longitudinales noirâtres entre les nervures du bord terminal; elles ont, en outre, vers le milieu, sur la nervure médiane, deux ou trois raies longitudinales d'un blanc argentin, fortement ombrées de brun en arrière; le stigmate est blanc et peu visible.

Les alles inférieures sont d'un roux-ferrugineux vif, marquées à l'extrémité d'une série de petites taches noires oblongues.

Le corselet est de la couleur des premières ailes avec les épaulettes liserées de blanc latéralement, marquées, chacune sur leur milieu, d'une raie d'un brun olivâtre.

L'abdomen est grisâtre avec six bandes noires, transversales, séparées sur le dos par une bande longitudinale de la couleur du fond.

Le dessous des ailes est d'un rouge brique avec les contours un peu plus pales.

Cayenne, Cuba, Surinam. — Coll. Bd. — Assez rare.

## SIXIÈME GROUPE.

## 31. C. EROTUS.

Cram. 104, B. — Fab. Ent. S. III, 1, p. 363, 28. — Ch. Erotus, Walker, Heterocera, p. 146, 34. — Var. Eras, Boisd. Faune de l'Océanie, p. 183, 4. — Feistham. Voy. de la Favorite, pl. 5, f. 2. — Variété mâle, Sapor, Boisd. M.

Il est un peu plus grand que les plus grands exemplaires du lineata. Ses ailes supérieures sont d'un brun un peu clair dans le mâle et d'un brun un peu violâtre dans la femelle, avec des bandes nuageuses, transversales, mal arrêtées, d'une couleur plus foncée; le stigmate est blanc et très-petit.

Les ailes inférieures sont d'un beau-jaune orange avec une bordure d'un brun noirâtre, assez étroite, se prolongeant trèslégèrement sur les nervures, principalement chez le mâle. Les antennes sont d'un jaune roussâtre.



Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, largement bedé de blanc jaunâtre latéralement.

L'abdomen est d'un roux jaunâtre chez le mâle et d'un brun vissux chez la femelle.

Le dessous des ailes est d'un jaune fauve dans le mâle, et rougettre chez la femelle.

Il babite surtout la Nouvelle-Hollande et la Nouvelle-Calédonie. Nous en avons reçu aussi un exemplaire de Taïti. Cramer a dit qu'il ignorait la patrie de l'individu qu'il a figuré.

Dépuis quelques années, on le reçoit assez fréquemment de la Mouvelle-Hollande.

### 32. C. PALLICOSTA. Boisd.

Walker, List. Lep. Brit. mus. Het. pt. VIII, p. 145. — Moore, Cat. of Lepid. of ind. Comp. p. 276, 637.

Il est de la taille d'un grand exemplaire de lineata. Ses ailes sepérieures sont d'un brun-clair luisant avec un stigmate blanc, et l'empreinte de deux bandes transversales, un peu plus obsures que le fond; outre cela, le bord de la côte et une partie du bord interne sont liserés de blanc.

Les ailes inférieures sont d'un rouge ferrugineux avec la frange

Le corselet est de la couleur des premières ailes, bordé de blanc latéralement.

L'abdomen est d'un brun rougeatre.

Le dessous des ailes est d'un rouge un peu ferrugineux.

Nord des Indes. — Coll. Bd.

Becker, qui n'y voyait pas très-clair, a mal lu le nom de cette espèce sur notre collection, et lui a substitué celui de Callicosta, sus lequel il l'a envoyé à quelques-uns de ses correspondants.

#### SEPTIÈME GROUPE.

### 33. C. SACLAVORUM.

Boisd. Faun. de Madag. pl. 10, f. 6.

Il est un peu plus grand que le Thyelia. Ses ailes supérieures lont un peu luisantes, d'un gris olivâtre, un peu plus pâles vers estrémité avec deux raies brunes obliques dont l'antérieure est

peu prononcée; la seconde qui va, du tiers postérieur du bord interne, à la côte est beaucoup mieux indiquée; entre ces deux raies, on aperçoit, mais difficilement, des petites lignes paralèles; le stigmate est noir et petit, environné d'une ombre un peu plus foncée que la teinte générale.

Les ailes inférieures sont noires avec la frange plus pâle, et une éclaircie d'un gris incarnat vers la région anale.

Le corselet est olivâtre avec une raie latérale d'un gris blaschâtre.

L'abdomen est olivâtre en dessus avec une trainée latérale, peu apparente d'un jaune roux qui offre à peine quelques atoms dorés.

Le dessous des ailes est couleur de terre d'ombre avec le disque des supérieures noirâtre.

Décrit sur deux individus pris à Madagascar par feu Sganzia, capitaine d'ártillerie de marine.

Coll. Bd.

### 34. C. BALSAMINÆ. Boisd.

Walker, Heterocera, p. 138, 18. Ménétriés, Enum. corp. animal. Mus. Petrop. p. 92, 1535.

Il a le port d'un Celerio, mais il est d'un tiers plus petit. Se ailes supérieures sont grisâtres, faiblement lavées d'olivâtre ches les exemplaires très-frais, avec une bande oblique d'un brun olive, commençant près de la base du bord interne et allant finis sur la côte en avant du sommet. Cette bande est suivie de cinq à six petites lignes parallèles, transverses, obliques, qui vont juqu'à la pointe apicale; le stigmate est petit et noir.

Les ailes inférieures sont couleur de terre d'ombre, traversés au milieu par une bande noire qui n'atteint pas le bord abdominal.

Le corselet est olivatre avec les épaulettes faiblement bordés latéralement, de gris blanchâtre.

L'abdomen est grisâtre avec des petites stries longitudinales plus obscures; les côtés sont dorés, médiocrement brillants. Cette teinte métallique est coupée par une raie longitudinale obscure.

Le dessous des ailes est d'un gris jaunâtre avec des raies noirâtres interrompues.

Cette espèce a été élevée à Madagascar par Goudot sur des Balsamines. Elle se trouve aussi assez fréquemment à Natal. Nous en avons également reçu deux exemplaires de la Cazamance. Nous la croyons répandue dans une grande partie de l'Afrique.

## 35. C. CLOTHO.

Drury, Ins. Exot. II, pl. 28, f. 1. — Walker, List. Lepid. Brit. mus. het. pt. VIII, p. 141. — Moore, Cat. of Lep. of ind. Comp. p. 277, 641. — Variété Cretica mâie, Boisd. Icones, pl. 49, f. 2. — Varietas Cyrme, Westwood, Orient. Cab. pl. 6. f. 1.

Il varie un peu pour la taille, qui est de 8 à 10 centimètres. Il a le port d'Alecto. Ses ailes supérieures sont d'un vert-olive plus ou moins clair, avec une raie transversale oblique, brune, commençant sur le tiers postérieur du bord interne pour aller aboutir à la pointe du sommet; le stigmate est noir, suivi en dehors d'une ombre olivâtre, obscure, en forme de tache mal arrêtée; outre cela, il y a une tache noire à la base, et la côte est plus ou moins d'une teinte olivâtre, plus obscure que le fond de l'aile.

Les ailes inférieures sont noires, avec un espace jaunâtre trèsfaiblement incarnat, en forme de bande sur la région anale.

Le corselet est d'un vert olive, bordé de blanc latéralement.

L'abdomen est d'un vert olive, avec les côtés d'un gris jaunâtre; outre cela, il offre de chaque côté, vers sa base, une tache noire aussi marquée que dans Alecto.

Le dessous des ailes est d'un jaune grisâtre, sablé d'atomes noirâtres, avec le disque des supérieures noir.

La chenille, d'après les beaux dessins du capitaine Shervill, est ordinairement d'un vert tendre, avec un œil à iris ferrugineux sur le quatrième segment; outre cela, elle a une bande blanche latérale, qui s'étend jusqu'à la base de la corne; celle-ci est d'un rouge vineux; les stigmates sont ferrugineux. Dans sa jeunesse, elle est d'une teinte vineuse qu'elle conserve quelquefois jusqu'à sa métamorphose; lorsqu'elle est encore petite, il est difficile de la distinguer de celle d'Alecto. Après sa seconde mue, sa quene devient beaucoup plus courte.

Il est facile de comprendre que M. de Rivière ait pu confondre ensemble ces deux chenilles dans son jardin de Constantinople.

Elle est, dit M. Shervill, très-commune dans l'Inde sur différentes espèces de vignes.

L'insecte parfait habite Java et le Bengale. M. Lorquin l'a aussi

pris aux îles Philippines et en Chine. Ce n'est qu'accidentellement qu'il a été trouvé à Constantinople.

Notre Cretica mâle de Turquie, au lieu d'avoir une seule mis oblique, en a cinq ou six parallèles, toutes d'un léger-brun olivâtre et peu prononcées; chez ce même individu, il y a très-peu de jaunâtre vers l'angle anal; mais à l'exception des ailes supérieures qui sont presque comme dans Alecto, il offre les mêmes caractères que le Clotho de l'Inde. Le Cyrene de M. Westwood est un individu décoloré et devenu jaunâtre.

### 36. C. RHESUS. Boisd.

Il est presque d'un tiers plus petit que le Clotho. Ses ailes supérieures sont d'un gris-olivâtre luisant, avec six raies obliques, dont la première et la quatrième sont plus larges et plus fortement marquées que les autres; cette dernière commence au milieu du bord interne, et va aboutir à la pointe du sommet; le stigmant est noir, et la côte est longée par une raie olive.

Les ailes inférieures sont noires avec l'angle anal jaunâte, précédé en dehors d'une tache un peu arrondie de la même conleur.

Le corselet est d'un vert olivâtre, bordé latéralement de blanchâtre avec cinq lignes vertes qui se continuent jusqu'à l'extémité anale.

L'abdomen est d'un gris un peu olivâtre; les côtés sont d'un gris pâle et marqués, près de la base, d'une tache noire précéde d'une autre tache d'un blanc jaunâtre.

Le dessous des ailes est d'un gris-rougeatre pale.

Ce chérocampe a été élevé aux îles Philippines par M. Lorquin, qui a trouvé la chenille sur une plante grimpante dont il ignore le nom.

Décrit sur deux individus très-frais.

Coll. Bd.

#### 37. C. LUCASI. Boisd.

Walker, List. Lepid. Brit. mus. Het. pt. VIII, p. 141. — Moore, Catalof Lepid. of ind. Comp. p. 277, 613.

Il est un pou plus petit qu'Alecto, dont il a tout à fait le portses ailes supérioures sont olivâtres, à peu près comme ches le Clotho, avec une raie obscure, oblique, transversale, commen-

çant sur le tiers postérieur du bord interne pour finir à la pointe apicale. Cette raie est précédée, en avant, par plusieurs lignes obscures, empâtées, au-dessous du stigmate, par une teinte olivâtre foncée, formant une espèce de bande courte; elle est suivie de très-petites lignes un peu plus obscures que la teinte générale, très-peu visibles et très-obsolètes; le stigmate est noir.

Les ailes inférieures sont d'un brun noirâtre, avec toute la région anale lavée de jaunâtre sale.

Le corselet est olivâtre, bordé latéralement de blanchâtre un pen rosé.

L'abdomen est olivâtre en dessus avec des stries dorsales, longitudinales, légèrement obscures et très-peu accusées.

Le dessous des ailes est rougeâtre avec le disque des supérieures noir.

Selon M. Lorquin, la chenille est ordinairement brune sur le dos ou d'un brun un peu vineux, avec les côtés plus pâles, pointillés de noir et marqués de traits obliques noirâtres; la couleur du dos est séparée de celle des côtés par une raie blanchâtre qui va se perdre à la hase de la corne; les stigmates sont noirs cerclés de blanc; outre cela, il y a de chaque côté, sur le quatrième anneau, une tache oculaire noire à iris d'un blanc jaunâtre; la corne est assez forte et très-arquée. Dans sa jeunesse, cette chemille est verte.

Elle vit, dit M. Lorquin, aux îles Philippines sur une plante qui ressemble un peu à une vigne sauvage, mais dont il ignore le nom.

Ce Chérocampe pareit être assez commun dans l'île Luçon; il habite aussi l'île de Java et le nord des Indes.

Coll. Bd.

### 38. C. Butus.

Cramer, 132, A. — Gnoma?? Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 376, 61.

Nous n'avons jamais vu en nature le Butus de Cramer. Il a quelques rapports avec le Lucasi, mais ses ailes supérieures, falquées au sommet, sont d'un gris légèrement verdâtre, avec le bord terminal plus pâle; le stigmate est petit et noir, appuyé en dehors sur une espèce d'ombre obscure; elles sont en outre traversées par une raie brune qui s'étend du tiers postérieur du bord interne à la pointe apicale; outre cela, la côte est un peu verdâtre.

Les ailes inférieures sont entièrement noires avec une bordus grise.

Le corselet est d'un vert assez clair, bordé de blanc latémisment.

L'abdomen est verdâtre sur le dos, avec les côtés d'un gris pile sans aucune marque.

Décrit d'après l'ouvrage de Cramer.

Nous croyons que Fabricius s'est trompé en rapportant son Gnoma au Butus de Cramer, car il dit que l'abdomen est marqué, de chaque côté, d'une tache noire, et que les ailes inférieurs sont grises, traversées par une large bande noire. Il n'y a risa de pareil dans l'espèce que Cramer figure comme venant de la côte de Coromandel.

## 39. C. JUGURTHA. Boisd.

Il est au moins de la taille de Clotho. Ses ailes supérieures suiverdâtres, avec trois raies obliques d'une couleur plus obscure, dont la première, qui est près de la base, est pou marquée, tands que les deux autres, situées au-delà du milieu, sont mieux insquées. Entre la première de ces deux bandes et le stigmate, et voit, près de la côte, une ombre un peu plus obscure que la teinte générale.

Les ailes inférieures sont d'un brun-pâle, un peu verdâtre, 2700 l'empreinte d'une bande transversale, grisâtre, à peine sensible.

Le corselet et l'abdomen sont entièrement d'une couleur vardâtre comme les ailes supérieures, sans aucune marque.

Le dessous des ailes est d'un gris jaunâtre avec deux raies communes, noirâtres, un peu maculaires, peu prononcées.

Décrit sur un individu femelle, unique, pris à Bakel, dans le haut du fleuve du Sénégal.

Coll. Bd.

### 40. C. PLACIDA.

Darapsa placida, Walker, Heterocera, p. 186, 8.

Il est un peu plus petit que le Ciotho. Sa couleur est roussissé en dessus et d'un blanc roussatre en dessous.

Le corselet est blanchâtre avec les épaulettes ferrugineuses, triangulaires.

Les ailes supérieures ont à la base une tache ferrugineuse, &

elle sont traversées par deux larges bandes grises, interlignées, dest l'interne est mieux marquée que l'extérieure, qui devient chalète dans sa partie inférieure.

Les ailes inférieures sont brunes, traversées par une bande étaite, ondulée, de couleur jaune.

Sunatra. — Collections de M. Saunders, Walker,

## HUITIÈME GROUPE.

## PERCESA. Walker.

# 41. C. CASTOR. Boisd.

Progesa Castor, Walker, List. Lepid. Brit. Mus. Het. pt. VIII, p. 153. – Moore, Catal. of Lep. of ind. Comp. p. 273, 630.

Il est à peu près de la taille d'un Celerio. Ses ailes supérieures tat de couleur olivâtre, avec un stigmate noirâtre, un peu pulé de blanchâtre. En dehors de ce stigmate, elles sont traveries par une ombre plus obscure que le fond. Près du bord terinal, on voit une bande blanche plus ou moins bien marquée, faclée et un peu interrompue par les nervures; outre cela, il a çà et là quelques points brunâtres peu prononcés, disposés l'lignes transverses.

Les ailes inférieures sont noires, avec une bande transversale d'un une légèrement testacé, un peu interrompue par les nervures. Le corselet est de la couleur des premières ailes, bordé de blanc téralement.

L'abdomen est olivâtre en dessus, marqué, sur chacun de ses és, de deux rangées de poils d'un fauve doré.

## Call. Bul.

## 42. C. ACTEUS.

Cramer, 248, A. — Pergesa Acteus, Walker, List. Lepid. Brit. Het. • VIII, p. 133. — Moore, Catal. of Lep. of ind. Comp. I, p. 272, 629. Uest de la taille d'un Elpenor, mais ses ailes supérieures sont Lépidoptères. Tome 1. un peu échancrées au dessous du sommet; elles sont d'un jaupâtre tirant sur le gris roussâtre, traversées obliquement du sommet au bord interne par une large bande verte, d'une couleur plus intense dans sa partie antérieure; le stigmate est petit et noirâtre; outre cela, il y a sur le bord terminal une bande brunâtre, irrégulière, élargie du côté du sommet.

Les ailes inférieures sont d'un noir brunâtre, avec une bande anté-marginale ochracée, plus ou moins marquée, élargie à l'angle anal.

Le corselet et l'abdomen sont verts en dessus, avec une bande longitudinale, grisâtre; les épaulettes sont bordées latéralement de grisâtre; les côtés de l'abdomen sont d'un gris jaunâtre.

Le dessous des ailes est d'un jaune rougeâtre avec des raies transverses brunes.

La chenille, selon Horsfield qui l'a élevée à Java sur une plante de la famille des Aroides, est d'un vert plus ou moins clair, avec une tache oculaire sur le quatrième anneau et une série de six taches semblables, moitié plus petites, non pupillées, sur les anneaux suivants; la corne du onzième segment est très-courte.

Ce Sphingide se trouve à Java et au Bengale. Lorquin l'a aussi élevé aux îles Philippines sur une plante qu'il ne connaît pas.

Coll. Bd. — Nous ne le regardons pas comme très-rare.

# NEUVIÈME GROUPE.

# 43. C. HELOPS: Boisd.

Philampelus Helops, Walker, Heterocera, p. 180, 12.

Il a le port et la taille d'un grand Equestris. Ses ailes supérieures sont olivâtres, traversées par des lignes obliques, parallèles, peu indiquées; le stigmate est noirâtre, assez grand et transverse; vers la hase de l'aile, le fond est d'un gris blanchâtre, marque d'une grande tache olivâtre, arrondie, cerclée de blanc, se réunissant à une autre tache située tout près de la base; outre cela, le bord terminal est d'un gris-cendré luisant, teinté d'olivâtre vers le sommet.

Les ailes inférieures sont d'un brun noir, avec une bande courte, d'un gris jaunâtre, vers l'angle anal.

Le corselet est olivâtre avec une tache scutellaire blanchâtre, et les épaulettes bordées latéralement de la même couleur.

L'abdomen est en dessus de couleur olivâtre, plus foncé vers la base; il est marqué, sur chacun de ses côtés, d'une grosse tache noire, et ensuite d'une bande d'un jaune doré qui se prolonge jusqu'à l'extrémité anale.

Le dessous des ailes est d'une couleur briquetée, fascié et bordé

Cette rare espèce se trouve à Moulmein, dans les Indes orientales, d'après l'indication qui nous a été donnée au British Museum. Selon M. Walker, qui a décrit le même exemplaire, elle se trouverait, au contraire, à Natal.

Très-rare. - British Museum.

### 44. C. ORIENTALIS.

Philampelus Orientalis, Feld. Novara, Exp. Zoolog. Theil. Bnd. II, abth. 2, pl. 77, f. 1.

M. Felder place ce grand Sphingide dans le genre *Philampelus*; mais, d'après la figure, qui est fort bien faite, nous croyons qu'il me peut pas être séparé des *Chærocampa*.

Il est de la taille des plus grands individus d'Equestris. Ses aizes supérieures, dont le sommet est un peu pointu et légèrement aqué, sont d'une teinte pâle un peu violacée, et offrent les caractères suivants: près de la base, une grosse tache noire arrondie; au-dessous de celle-ci, tout à fait à la naissance du bord interne, une touffe de poils noirs; sur le disque, un petit stigmate soir et des lignes transverses, ondulées, obsolètes, plus ou moins conctiformes, de couleur olivâtre; près du sommet, une bande courte d'un brun noir, commençant à la côte et finissant brusquement; en dedans de cette bande, trois taches blanchâtres, alimées transversalement et limitées en dedans par un espace olitaire; outre ces caractères, le milieu du bord interne est asses largement blanchâtre, et la frange est entrecoupée de blanc jaulière aux quatre ailes.

Les ailes inférieures sont d'un noir profond, avec une tache male blanche, un peu triangulaire, et l'extrémité de la gouttière abdominale d'un blanc jaunâtre.

 sâtre, marqué de chaque côté, à sa base, d'une tache noire, et su chaque anneau de deux points noirâtres, et enfin d'une tache dersale noire à son extrémité.

Nous n'avons jamais vu cette belle espèce que M. Felder a reçus de Java.

## 45. C. EQUESTRIS.

Fabric. Ent. Syst. III, 1, p. 365, 29. — Nessus, Cram. 226, D. — Drury, Ins. II, pl. 27, fig. 1. — Walker, Heterocera, p. 140, 22.

Ce beau Sphingide varie pour la taille, qui, chez le mâle, cordinairement de 9 à 10 centim. et de 13 à 14 dans la femelle. Les individus bien frais ont les ailes supérieures d'une couleux olive avec une large bande oblique plus ou moins blanche, us peu diffuse sur ses bords et s'étendant du tiers antérieur du bord interne au sommet, où elle se termine par une tache un peu plus blanche. Cette large bande blanchâtre est divisée, dans son milieu, par deux petites lignes noires, parallèles et bordées en arrière par une bande d'un olivâtre aussi foncé que la région cortale; outre cela, il y a à la base de l'aile une tache noire offrest une petite touffe de poils blancs.

Les ailes inférieures sont noires avec l'angle anal blanchêtes, précédé en dehors, d'une petite bande jaune composée de troi taches.

Le corselet est d'un vert olive foncé, bordé latéralement de blanc.

L'abdomen est d'un vert olive en dessus, marqué près de la hase, sur chacun de ses côtés, d'une tache noire suivie d'une large bande d'un jaune doré, divisée longitudinalement par une positione brune.

Le dessous des ailes est rougeâtre avec deux raies communes, noirâtres.

La chenille a été élevée aux îles Philippines par Lorquin. Ele varie un peu pour la couleur. Ordinairement elle est verte ou vineuse sur le dos, avec les côtés marbrés de blanc et de noirâte, et sept bandes obliques d'un blanc verdâtre; elle offre en oute, sur le quatrième segment, une tache oculaire pupillée de noir, et sur le cinquième une autre petite tache arrondie de la même couleur (Lorquin). Selon feu Horsfield, qui a élevé souvent ceme espèce à Java, elle vit sur le Dioscorsa oppositifolia.

Coll. Bd.

Nous avons adopté pour cette espèce le nom que lui a donné Fabricius, attendu que Cramer avait figuré précédemment, pl. 107, sous le nom de Nessus, un autre Sphingide de l'Amérique du Nord.

#### 46. C. LINBOBA.

Walker, Heterocera, p. 144, 28.

Il est de la taille du Ciotho et a, selon M. Walker, une certaine ressemblance avec le Crotonis.

Il est d'une teinte roussatre en dessus.

La tête est blanchâtre en avant, marquée de chaque côté d'une mie testacée.

Le corselet est légèrement purpurescent avec une raie médime testacée.

L'abdomen offre six raies parallèles, testacées.

Les ailes supérieures sont d'un vert olivâtre, traversées par des lignes parallèles un peu obliques, assez nombreuses, de couleur testacée; le stigmate est brun.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande transverse et le bord marginal testacés.

Le dessous des ailes est varié de jaunâtre et de blanchâtre.

Silbet. — British Museum. — Walker.

### 47. C. POLLUX. Boisd.

Cette grande et belle espèce est à peu près de la taille d'un Sph. convolvuli. Ses ailes supérieures, chez les individus bien frais, sont plutôt d'un vert pistache que d'un vert olive, avec trois raies abliques, transverses, d'un vert plus foncé, dont l'intermédiaire qui est la plus large et la plus prononcée est bordée de blanchêtre en avant; la première précède un petit stigmate noir et est également un peu bordée de blanchêtre; la troisième qui est la plus rapprochée du bord terminal est moins prononcée que les autres et quelquefois bordée aussi de blanchêtre; outre cela, d'y a une petite touffe de poils noirs à la base de l'aile.

Les ailes inférieures sont noires, un peu plus pâles à l'extrémité, avec une bande transversale d'un jaune orange, un peu nouée en avant.

Le corselet et l'abdomen sont du même vert que les premières illes avec les épaulettes bordées de blanc latéralement, et une raie médiane blanchâtre qui devient bifide en arrière pour se continuer de chaque côté de l'abdomen jusqu'à l'extrémité anale; il y a, en outre, sur le dos deux autres petites raies parallèles, peu prononcées, plus claires que la teinte générale; les côtés sont blanchâtres, marqués, près de la base, sur chacun de leurs côtés, d'une tache noire, au-dessous de laquelle règne longitudinalement une bande d'un jaune un peu doré.

Le dessous des ailes est jaunatre pointillé de noir.

Il se trouve à Java. Lorquin l'a élevé de chenille aux îles Philippines en même temps que l'*Equestris* sur une plante grimpante dont il ignore le nom.

Lorsque cette espèce a été ramollie ou qu'elle a vieilli longtemps en collection, elle perd sa belle couleur et devient d'un jaune olivâtre.

Coll. Bd.

# 48. C. LYCETUS.

Cramer, 61, D. — Charocampa Lycetus, Walker, List. Lep. Brit. Mus. Het. pt. VIII, p. 143. — Moore, Cat. of Lep. of ind. Comp. p. 277, 643.

Nous n'avons jamais vu cette espèce en nature. D'après le Catalogue de M. Moore, elle serait assez commune dans l'Inde, puisque le Muséum de la compagnie des Indes en possède trois exemplaires, et que M. Walker l'indique de son côté, comme faisant partie de la riche collection de Lépidoptères du British Museum.

D'après la figure de Cramer, il est de la taille d'un Celerio et il a le port de l'oldenlandiæ. Ses ailes supérieures sont d'un grisluisant, légèrement lavé d'olivâtre, avec la côte assez largement d'une couleur olive, et plusieurs raies ou lignes obliques, d'un brun olive, dont trois parallèles vers le milieu, commençant sur le bord interne, assez près de la base, allant finir sur le tiers postérieur de la côte; une autre commençant au milieu du bord interne, pour aboutir à la pointe apicale; cette dernière est suivie de plusieurs autres petites lignes très-fines, plus obscures que la teinte générale.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande d'un jaune orange, élargie vers le bord abdominal et se terminant en pointe vers le milieu de l'aile; la frange est orangée.

Le corselet est olive, bordé latéralement de blanc; les épaulettés sont bordées en dessus par une raie couleur d'or. L'abdomen est d'un brun olivâtre, avec deux lignes dorsales blanches; il offre, en outre, sur chacun de ses côtés deux lignes d'un jaune doré.

Cramer le dit de la côte de Coromandel et de Ceylan. Selon M. Walker et Moore, il se trouve au Bengale.

Nous soupçonnons que le Lycetus de MM. Walker et Moore n'est pas l'espèce figurée par Cramer, mais peut-être une vanété de notre Pollux.

## 49. C. DRANCUS.

Cramer, 132, F. — Walker, Heterocera, p. 133, 9.

Nous ne connaissons pas cette espèce que M. Moore considère avec un point de doute, comme une variété du Lycetus, dont il a tout à fait le port. Ses ailes supérieures sont d'un gris olivâtre, avec six raies ou lignes parallèles, obliques, brunâtres, dont les in is antérieures se réunissent vers la base pour former une espece de tache noirâtre alfongée.

Les ailes inférieures sont entièrement d'un brun noirâtre sans sucune tache.

Le corselet est olivâtre avec les épaulettes bordées de blanc luéralement et de jaune doré en dessus; outre cela, il est marque d'une raie médiane blanche qui s'étend jusqu'à l'extrémité le l'abdomen; celui-ci offre sur chacun de ses côtés une bande longitudinale jaune qui ne monte pas jusqu'à la base.

Cramer le dit des Indes orientales. — M. Walker ne l'a jamais

# 50. C. OCHRACEA.

Cellionma Ochracia, Walker, Heterocera, p. 112, 5.

Il est à peu près de la taille du Tersa. Il est d'une teinte ferragineuse en dessus, et d'un jaune doré en dessous. La tête et les côtés du corselet sont gris.

L'abdomen est marqué de chaque côté sur le bord des anneaux de bandes grisâtres avec les côtés dorés.

Les ailes supérieures sont d'un roux ferrugineux avec quelques iandes obliques blanchâtres et cinq lignes transverses plus obvures, dont deux sont droites et trois ondulées.

Les ailes inférieures sont jaunes avec la base noire et le bord marginal brun.

Sumatra. - Collection de M. Saunders. - Walker.

Nous ne connaissons pas cette espèce qui n'existait pas encore dans les collections anglaises, à l'époque où nous prenions nos notes pour notre travail sur les Sphingides.

# DIXIÈME GROUPE.

## 51. C, TYNDARUS. Boisd.

Il est d'un tiers plus grand que le Tersa. Ses ailes supérieures sont d'un joli vert gai, traversées au-delà du milieu, de la côte au bord interne, par une raie droite d'un vert plus foncé, ombrée en dehors par une teinte un peu plus obscure que le fond; le stigmate est peu indiqué; il est précédé, du côté de la base, par deux petites lignes courbes très-obsolètes, d'un vert légèrement obscur; outre cela, il y a, entre le sommet et la raie transversale, l'apparence d'une ou deux bandes d'un vert un peu brunâtre.

Les ailes inférieures sont d'un brun noir avec une bande transverse anté-marginale d'un blanc verdâtre.

Le corselet est vert bordé latéralement de blanc.

L'abdomen est entièrement vert en dessus avec le ventre blanc.

Le dessous des ailes est d'un gris verdâtre avec deux lignes transversales brunes.

Chez la femelle, la partie comprise entre la raie transversale et le sommet est plus largement obscurcie par du vert foncé.

Beske a élevé de chenilles cette espèce au Brésil.

Collect. Bd.

# 52. C. CERATOMIOIDES:

Grote and Robins. Ann. Lyc. nat. hist. vol. VIII, pl. 14, f. 3. — Boisd. Consid. sur les Lépid. du Guatemal. p. 70. — Minos, Boisd. M. — Ménétr. Enum. corp. anim. Mus. Petrop. I, p. 93, 4540.

Il est de la taille d'un Sph. convolvuli. Le fond des alles supérieures est d'une teinte jaunâtre couleur de bois avec une grande tache basilaire noire, sinuée en dehors et marquée, près de la base, d'une tache blanche; le stigmate est noir et petit, suivi d'une bande noire, commençant sur le tiers antérieur du bord interne

et allant expirer avant le sommet. Cette bande noire est accompagnée en dehors, d'une autre bande sinuée, irrégulière, de la même couleur, avec laquelle elle finit par se confondre; outre cela, on voit sur la côte, avant la pointe apicale, une tache noire bien marquée.

Les ailes inférieures sont noires avec deux grosses taches blanches vers leur base et une bande transversale de la même couleur.

Le corselet est de la couleur des premières ailes avec les épaulettes d'un brun olivâtre.

L'abdomen est brun avec trois lignes dorsales, longitudinales, poires; il est en outre marqué, près de la base, d'une tache noire, précédée d'une touffe de poils blancs.

Le dessous des ailes est panaché de jaunâtre et de brun ferrugineux.

Cette espèce ne nous paraît pas être fort rare. Nous l'avons reçue de Cayenne, du Brésil, de la Colombie, du Guatemala et da Mexique.

53. C. LEVIS.

Grote and Robins. Lepid. Contributions, pl. 14, f. 1. — Miradoris, Bd. M.

l'a peu plus petit qu'Anubus; il a tout à fait le port de notre Alcides, dont on le prendrait volontiers pour une variété. Ses si'es supérieures sont d'un gris lavé d'olivâtre, avec une tache noire à leur base et plusieurs stries transversales plus obscures, dont la plus marquée s'étend du tiers postérieur du bord interne à la pointe du sommet; celle-ci est précédée de trois petites lipues olivâtres très-peu indiquées; le stigmate est noir et trèspeut, précédé, du côté de la base, de quelques ombres olivâtres peu marquées, en forme de bandes transverses.

Les ailes inférieures sont comme dans Alcides.

Le corselet est grisâtre avec le dessus des épaulettes un peu-livâtre.

L'abdomen est grisatre sans lignes dorsales; il offre à sa base, ur chacun de ses côtés, une tache noire.

Le dessous des ailes est rougeâtre, pointillé de brun, avec le disque des supérieures noirâtre.

Décrit sur des exemplaires très-frais venant du Mexique.

Cette espèce, fort rapprochée de notre Alcides, en diffère prin-

cipalement par ses ailes supérieures falquées et par son ablemen dépourvu de lignes dorsales brunes.

Coll. Bd.

## 54. C. ALCIDES. Boisd.

Il est d'un tiers plus grand que le *D. lineata* et il a tout à fait le port de l'*Anubus*. Ses ailes supérieures sont d'un gris faiblement olivâtre avec une tache noire à leur base; elles sont traverées par cinq ou six raies parallèles d'une couleur plus foncée, dont la quatrième, qui est beaucoup plus large et plus obscure, t'étend du milieu du bord interne à la pointe apicale, et est séparée de celle qui la précède par une raie pâle; les deux dernières, près du bord terminal, sont ponctiformes et peu accusées; le stigmate est noir, placé au-dessus d'une éclaircie blanchâtre s'accompagné, en dehors, d'une espèce d'ombre peu tranchée.

Les ailes inférieures sont noires avec une rangée de tachs blanches cunéiformes, dont les deux anales sont réunies.

Le corselet est de la couleur, des ailes supérieures avec le épaulettes largement bordées d'olive en dessus.

L'abdomen est d'un gris-olivâtre en dessus avec trois lignes parallèles, noires, dont la médiane est la plus marquée; outre cela, il offre vers la base, sur chacun de ses côtés, deux taches noires séparées par un espace d'un gris blanchâtre.

Le dessous des ailes est ferrugineux, sablé de hann, avec le disque des supérieures noiratre.

Les individus que nous possédons nous ont été envoyés de Cayenne par feu le professeur Lacordaire.

## 85. C. ANUBUS.

Cram. 128, C. — Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 376, 62. — Walker, Edw rocera, p. 134, 13.

Il est de moitié plus grand que le Tersa avec les ailes falqués au sommet. Les supérieures sont d'un gris-vineux lavé d'olivière, traversées obliquement par sept ou huit petites lignes parallèles, qui s'étendent du bord interne vers l'extrémité de la côte près du sommet; le milieu de ces lignes parallèles est occupé par une large tache brune arrondie; la base est marquée d'une tache noire un peu oblongue; le stigmate est noir et très-petit.

Les ailes inférieures sont d'un noir profond avec une rangée

mté-marginale de sept petites taches blanches; la bordure est d'un gris-olivâtre.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures bordé de binc latéralement.

L'abdomen est de couleur olive, avec une ligne dorsale brune; il offre, en outre, de chaque côté, près de sa base, une tache rès-noire.

Le dessous des ailes est d'un jaunâtre terreux, pointillé de brun, avec le disque des supérieures noirâtre et leur extrémité grisâtre.

Il a été trouvé à Cayenne par MM. Leprieur et Lacordaire.

Coll. Bd. - Asses rare.

### 56. C. EPAPHUS. Boisd.

Il a le port et la taille du Chiron de Drury. Ses ailes supéreures sont d'un brun-roux un peu olivâtre, avec une raie blanchâtre oblique, commençant vers le tiers antérieur du bord name, pour aboutir sur la côte, un peu avant le sommet; le cismate est noir, suivi, en dehors, d'une tache obscure en forme s'ombre; en avant de cette raie blanche, on voit un petit point poirâtre sur les nervures supérieures; en arrière de cette même hande le fond est d'un brun-roux un peu plus intense, avec le bord terminal grisâtre et un petit point noir sur chaque nervures

Les ailes inférieures sont d'un noir obscur, traversées au-delà du milieu, par une bande d'un blanchâtre tirant sur le rouge, dentée antérieurement, comme si elle était formée de taches unéiformes réunies.

Le corselet est de la couleur des premières ailes avec les épauenes bordées de blanc latéralement.

L'abdomen est d'un gris brunâtre, marqué en dessus de deux seits points noirs sur le bord de chaque anneau.

Le dessous des ailes est rougeâtre, pointillé de noir, avec le taque des supérieures noirâtre.

Décrit sur un individu unique trouvé à Cayenne par feu Lacedaire.

### 57. C. DRURYI. Boisd.

Chiron, Drury, Ins. vol. I, pl. 26, f. 3. — Ch. Chiron, Walker, Hetemera, p. 132, 7.

ll a le port et la taille du Tersa de Linné. Ses ailes supérieures

sont d'un roux-olivâtre avec l'extrémité verdâtre marbrée à brun; la partie antérieure est marquée, sous la côte, de trois teches brunes alignées, dont l'antérieure très-petite; la coulen, d'un roux-olivâtre, est limitée par une petite ligne noirâtre adulée, suivie d'une autre ligne légèrement sinuée, de la même couleur.

Les ailes inférieures sont d'un noir foncé, comme chez Ters, avec six petites taches cunéiformes presque marginales, d'un jaune-soufre un peu blanchâtre.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, avec se épaulettes bordées de blanc latéralement.

L'abdomen est roussatre en dessus, plus pale sur les côtés. Le dessous des ailes est d'un jaunatre sale avec le disque és supérieures brunatre; leur extrémité est panachée de jaune és de roux. Le ventre est d'un jaune terreux.

Il y en avait un individu dans la collection d'Auguste, de Bedeaux, achetée par M. de l'Orza. Il était étiqueté comme vensé de Cuba.

Cramer ayant déjà figuré un autre Sphingide sous le nom de Chiron, nous avons été obligé, pour éviter toute confusion, de changer le même nom appliqué par Drury à une espèce américaine.

Nota. M. Walker rapporte à cette espèce le Nechus de Crams, opinion que nous ne pouvons pas admettre.

## 58. C. TERSA.

Linné, — Fabricius, — Drury, Ins. 1, 28, f. 3. — Cram. 397, C. - Smith-Abbot, Lepid. of Georg. I, tab. XXXVIII.

Cette espèce, très-commune dans les collections, est presque la taille d'un Celerio, avec les ailes plus étroites et plus pointuel les supérieures sont d'un gris-olivâtre luisant, avec une bandoblique d'une couleur foncée, plus ou moins fortement indique suivie en arrière de cinq à six petites lignes parallèles, obscure entre la bande brune et les lignes en question, le fond est orignairement un peu clair; le stigmate est noir et extrêmement put tit.

Les ailes inférieures sont d'un noir profond, avec six petites taches alignées, cunéiformes, et l'angle anal d'un jaune-soules pâle; la frange est aussi de cette couleur.

Le corselet est de couleur olive avec les épaulettes bordées laténiement de hlanc grisâtre.

L'abdomen est aussi de couleur olive sur le dos avec les côtés lagament d'un roux-doré clair.

Le dessous des ailes est rougeâtre avec le disque des supérieu-

Il se trouve dans toute l'Amérique, depuis la Georgie jusqu'au mi du Brésil.

La chenille, dont nous possédons plusieurs dessins exécutés par Abbot, est d'un vert plus ou moins foncé, avec quelques petites stries dorsales, noirâtres, obsolètes, formant quelquefois des puites lignes longitudinales; elle est marquée, sur le quatrième caneau, d'une tache oculaire noire, cerclée de blanc, suivie d'une largée de six taches semblables, mais plus petites. Ces taches calaires sont limitées par une bande longitudinale blanche qui l'itend jusqu'à l'origine de la corne; celle-ci est d'un brun violet; les stigmates sont d'un blanc jaunâtre, cerclés de noir.

Cette chenille est représentée sur une Rubiacée du genre

## 59. C. Robinsonii.

Grote, Proceedings of the Entom. soc. of Philadelph. p. 54, pl. I,

Il est d'un tiers plus petit que le *Tersa*, dont il est voisin. Ses ils supérieures out la même forme, le même dessin et la même storation, sauf que la bande oblique du milieu est largement rune et fortement indiquée.

Les ailes inférieures sont d'un noir un peu moins profond que les le Tersa, avec une bande anté-marginale d'un blanc un pou matre, coupée par les nervures, mais ne formant pas, comme le Tersa, des petites taches cunéiformes.

Le corselet est un peu grisâtre, avec les épaulettes olivâtres mées de blanc latéral-ment.

L'abdomen est d'un brun pâle en dessus, avec deux raies lonladinales plus obscures; les côtés sont d'une couleur testacée, langée de quelques atomes dorés.

Caba. — Mus. nat.

Nous en avons vu deux mauvais exemplaires dans la collece de feu M. Auguste, de Bordeaux, achetée par M. de l'Orza. Ils étaient étiquetés comme venant de la Havane, et confondus avec des Tersa.

## 60. C. ARISTOR.

Boisd. Considérat. sur les Lépid. du Guatemal. p. 69.

Il est d'un tiers plus grand que le Tersa. Ses ailes supérieures sont d'une teinte olivâtre assez pâle, avec le stigmate noir, traversées obliquement, entre le milieu et l'extrémité, par sept raies ou lignes parallèles plus obscures, dont la première et la quatrième sont plus larges et plus accusées.

Les ailes inférieures sont d'un noir profond, avec une série anté-marginale de sept taches cunéiformes, d'un jaune-soufre pâle; outre cela, elles ont vers la base un peu de jaune, surmonté d'une tache noire qui s'étend un peu sur les supérieures.

Le corselet est d'un vert olive, avec une raie médiane et le bord des épaulettes d'un jaune très-pâle.

L'abdomen est en dessus d'un vert olive avec une raie dorsale grise; les côtés sont d'un jaune un peu doré, avec une tache noire située vers la base, et précédée d'une tache jaune.

Le dessous des ailes est ferrugineux.

Il se trouve au Guatemala et en Colombie.

Coll. Bd.

## 61. C. CROTONIS.

Boisd. Considérat. sur les Lépid. du Guatemala, p. 70. — Walker, Heterocera, p. 133, 10.

Il est d'un tiers plus grand que le *Tersa*. Ses ailes supérieures sont d'un vert pistache, avec une petite touffe noire à leur base: elles sont traversées obliquement, du milieu du bord interne au sommet, par une raie d'un vert plus foncé, suivie d'une ou deux lignes à peine visibles, légèrement obscures; le stigmate est noir, précédé en dehors par l'apparence d'une raie très-obsolète, preque nulle.

Les ailes inférieures sont d'un noir profond, avec sept taches submarginales, cunéiformes, d'un jaune-soufre pâle.

Le corselet est d'un vert pistache, avec les épaulettes bordées latéralement de blanc grisâtre, et une petite raie dorsale de la même couleur.

L'abdomen est d'un vert pistache en dessus, avec une bando



latérale jaune, interrompue, près de la base, par une tache trèsnoire.

Dessous des ailes d'un rouge ferrugineux avec le disque des supérieures noirêtre.

Nicaragua, Colombie. — Coll. Bd. Rare.

## 62. C. NECHUS.

Cramer, 178, B. - Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 377, 63.

Cette charmante espèce est à peu près de la taille de Tersa. Si ailes supérieures sont d'un beau-vert pistache, avec une tache noirâtre à leur base et une petite tache allongée d'un blanc jaunâtre à la naissance du bord interne; outre cela, elles sont traversées obliquement, du sommet à l'angle interne, par une binde ferrugineuse, irrégulière, sinuée, élargie inférieurement de elle est bordée en dedans par une tache noire.

Les ailes inférieures sont d'un noir profond avec une série

Le corselet est d'un vert pistache, bordé de blanc latérale-ment.

L'abdomen est d'un beau vert sur le dos, avec les côtés d'un r.ux doré.

Le dessous des ailes est panaché de brun, de ferrugineux et le janne ochracé.

il se trouve aux Antilles, à St-Domingue, Cuba, St-Thomas, la Guadeloupe, etc.

Coll. Bd.

### 63. C. HYSTRIX.

Felder, Novara, Exp. Zoolog. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 76, fig. 5.

Ce singulier Chérocampe ne ressemble à aucune autre avec se ailes supérieures très-fortement dentées; mais par ses ailes inferieures, il appartient évidemment au groupe de Tersa et espées voisines.

Il est de la taille d'un grand exemplaire de Celerio. Ses ailes supérieures d'un roux oguleur de bois présentent les caractères sur ants : à partir de la base, elles ont des raies longitudinales brunes; elles ont, en outre, entre le milieu et l'extrémité deux raies transverses, sinuées, dentées d'un jaune pâle, bordées de

brun, dont l'antérieure se coude dans son milieu pour se prolonger en une raie droite, parallèlement au bord interne; le bord terminal est un peu grisatre avec les échancrures liserées de blanc.

Les ailes inférieures sont noires, marquées au-delà du milies d'une rangée de six taches cunéiformes, jaunes.

La tête, le prothorax et le corselet sont variés de roux et de brun noirâtre comme les premières ailes. L'abdomen offre une double ligne dorsale jaune en forme de chaînette et les côtés une rangée de taches brunes elliptiques.

Nous n'avons pas vu cette espèce que M. Felder a reçue de l'Amazone.

## 64. C. EUMEDON. Boisd.

Il a le port de Tersa, mais il est un peu plus grand. Ses ailes supérieures sont d'une teinte olivâtre obscure, avec quelques nervures un peu blanchâtres; elles sont traversées obliquement du milieu du bord interne au sommet, par une bande d'un blant sale; cette bande est divisée dans le sens de sa longueur par une ligne noirâtre, et bordée en avant, par une autre bande d'un brun un peu olivâtre; en arrière, cette même bande blanchâtre est limitée par une raie brunâtre, suivie de trois petites lignes parallèles de la même couleur; le stigmate est noir et très-petit.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande anté-marginale d'un jaune pâle du côté abdominal, et d'un jaune un peu roussâtre vers l'angle externe. Dans cette espèce, les taches cunéiformes sont presque réunies, celles qui se rapprochent de l'angle anal sont les seules nettes et bien détachées.

Le corselet est d'un brun olive avec les épaulettes bordées de blanc latéralement et divisées par une très-petite ligne jaune; le milieu est marqué d'une bande grisâtre.

L'abdomen est d'un brun olivâtre avec deux petites lignes dorsales blanches, parallèles; les côtés offrent une bande longitudinale jaune à reflet un peu doré.

Le dessous des ailes est varié de jaune et de ferrugineux. Nous avons reçu cette espèce du Mexique.

# 65. C. ISAON. Boisd.

i Ménétriés, Enum. corp. animal. Mus. Petrop. p. II, p. 92, 1531.

Il est de la taille d'un lineata. Ses ailes supérieures sont d'une

couleur clivâtre, avec des raies obliques, parallèles, les unes plus daires et les autres plus foncées; le stigmate est noir placé sur une bande pâle; il est suivi, en arrière de cette partie claire, d'une bande d'un brun clive, limitée en arrière par une bande blanchâtre divisée longitudinalement par une ligne de la couleur du fond; cette dernière est bordée par une bande clivâtre divisée dans le sens de sa longueur par une teinte pâle; le bord terminal est un peu grisâtre avec une petite ligne noirâtre, sinuée.

Les ailes inférieures sont noires, avec une bande transverse d'un jaune ochracé.

Le corselet est d'un brun olive, avec les épaulettes bordées de blanc latéralement, et une petite raie médiane de la même couleur.

L'abdomen est olivâtre sur le dos, avec une raie longitudinale brune; les côtés sont plus pâles avec une hande olivâtre près de leur base.

Le dessous des ailes est rougeâtre, sablé de noir, avec une bande transverse noirâtre.

Décrit sur deux individus que nous avons reçus du Brésil.

# 66. C. AMADIS.

Cramer, 394, C. — Walker, Heterocera, p. 134, 11.

I est un peu plus grand que le Tersa. Ses ailes supérieures sont d'un vert-olive luisant, avec le bord terminal d'un gris jau-aire; elles sont traversées obliquement par une bande blanche, croite, commençant sur le tiers du bord interne pour aller aboutr au sommet; le stigmate est noir, environné d'un peu de brun aivêtre; la côte est d'un blanc jaunêtre.

Les ailes inférieures sont noires avec l'angle anal et une bande transversale d'une couleur jaunâtre sale.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, avec les épauleus bordées latéralement de blanc rougeatre, et une raie médans peu prononcée, également d'un blanc rougeatre.

L'abdomen est noir à sa base avec le dos d'un vert olive et les côtés d'un gris jaunêtre sale.

Le dessous des ailes est d'un jaune terreux sablé de noirâtre net l'extrémité grisâtre.

Décrit sur un individu envoyé de Cayenne au général Feisthanel par le capitaine Catherneau.

### 67. C. MACULATOR. Boisd.

Il a le port et la taille de Tersa. Ses ailes supérieures sont d'un gris-sale un peu olivâtre, marquées sur la côte, en dehors du sigmate, d'une grosse tache d'un brun noirâtre. Cette tache est sivie en dehors de quatre lignes obliques, parallèles, brunes, des une plus large et plus marquée; le stigmate est noir; outre chi, il y a encore vers le bord terminal une ligne transverse, noistre, obsolète, et sur le tiers antérieur du bord interne une taite en losange d'un gris blanchâtre.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande transverse de jaune terreux.

Le corselet est grisâtre avec trois raies olivâtres, dont une sidiane et une sur chacune des épaulettes.

L'abdomen est grisâtre en dessus avec trois raies dorsales, per rallèles, noirâtres.

Le dessous des ailes est ferrugineux, sablé de noir avec les borbs grisatres et le disque des supérieures noiratre.

Décrit sur un individu unique que nous avons reçu de Verzuela.

68. C. FUGAX.

Boisd. Consid. sur les Lépid. du Guatemala, p. 70.

Il'est de la taille d'un grand Sph. liguetri. Ses ailes suprieures un peu falquées sont d'un gris-blanchêtre assez pâle au le stigmate noir; elles sont traversées obliquement, du sommé au milieu du bord interne, par une bande brune assez large suivie de cinq à six petites lignes parallèles de la même couleur il y a, en outre, près de la base, sur le bord interne, une bande courte d'un noir brun.

Les ailes inférieures sont d'un blanc grisâtre, plus pâle, ame rieurement, avec une bande médiane et la bordure d'un brancisatre.

Le corselet est olivâtre avec une petite raie dorée sur chapé épaulette.

L'abdomen est également d'une couleur olivâtre en dessus avidune hande latérale de poils dorés.

Le dessous des ailes est d'un gris un peu testacé, pointillé de hes-Il se trouve au Mexique et à Honduras.

Coll. Bd.

## 69. C. FALCO.

## Walker, Heterocera, p. 132, 8.

Il nous paraît très-rapproché du Fugax, auquel il ressemble par z port et par ses ailes supérieures, un peu falquées au sommet. Il est d'une teinte roussâtre en dessus, d'un blanchâtre testacé n dessous.

La tête et le corselet sont bordés latéralement de blanchâtre; celui-ci a le disque d'un brun grisâtre.

L'abdomen est brun, marqué de chaque côté d'une bande larale rousse, et sur le dos d'une ligne blanche géminée.

Les ailes supérieures ont un stigmate noir et plusieurs lignes postérieures obliques, ainsi que quelques mouchetures de couleur poirêtre.

Les ailes inférieures cont traversées par deux bandes noirâtres. British Museum. — Walker.

Comme on peut s'en rendre compte par cette description un peu concise, il est très-voisin de notre Fugax.

### 70. C. AGLAOR. Boisd.

Lest de la taille du Tersa, avec les ailes supérieures étroites et pointues au sommet; elles sont d'un gris un peu couleur de les, avec une bande brune, oblique, allant du sommet au miseu du bord interne, précédée de trois ou quatre petites lignes arallèles de la même couleur, et suivie de deux petites raies sematres; le stigmate est petit et noir; il y a en outre, comme caratère spécifique, un point très noir sur la côte, près du sommet. Les ailes inférieures sont noirâtres avec une bande transverse ochracée.

Le corsolet est grisâtre avec les épaulettes bordées en dessus

Labdomen est roussâtre sur le dos avec trois lignes longitufaues noirâtres, dont la médiane est assez accentuée et les deux aires obsolètes, interrompues; les côtés près du ventre sont d'un lace doré.

Le dessous des ailes est d'un jaune roussâtre, pointillé de noir. Lecrit sur deux exemplaires très-frais que nous avons reçus de Le.

## 71. C. NEOPTOLEMUS.

Cramer, 301, F. - Walker, Heterocera, p. 134, 12.

Il est à peu près de la taille d'un Celerio. Ses ailes supérisure, pointues au sommet, sont olivâtres, avec une bande blanchisticommençant au tiers antérieur du bord interne pour gagner le sommet; cette bande, divisée par deux lignes parallèles de li couleur du fond, est surmontée d'une ligne obscure et suits par trois autres lignes parallèles d'un brun-olivâtre, dont une est plus marquée que les autres; le stigmate est noir.

Les ailes inférieures sont noires dans leur moitié antérieure ensuite d'un rouge assez peu brillant, avec une petite borden brunâtre.

brunatre.

Le corselet est olive, faiblement bordé de blanc latéralment.

L'abdomen est olivâtre en dessus avec une ligne dorsale per obscure, très-peu indiquée, et les côtés d'un gris un peu me geâtre marqués chacun d'une série de cinq petits points noirs.

Le dessous des ailes est rougeatre.

Nous avons reçu cette espèce de Cayenne, où elle parait très-rare. Selon Ménétriés elle se trouverait aussi au Brésil.

La figure donnée par Cramer n'est pas des plus correcte. Il représenté un mâle avec les ailes trop pointues et le corps allongé.

Ce Chérocampe américain semble faire le passage au grouqui renferme Alecto, Eson, Thyelia, etc.

### 72. C. RHODOCERA.

Darapsa Rhodocera, Walker, Heterocera, p. 184, 4.

Il est à peu près de la taille de *Tersa*. Sa couleur est brunds avec la tête et les épaulettes blanchâtres. Les antennes sont ses en dessus.

L'abdomen est marqué de chaque côté d'une tache basilainoire.

Les ailes supérieures sont lavées de gris, traversées obligament par une ligne extérieure; le stigmate est brun; il y a su outre, sur ces mêmes ailes, deux taches diffuses ferrugineurs l'une en avant, l'autre en arrière.

Les ailes inférieures sont noirâtres avec l'angle anal blanchâtre.

Saint-Domingue. - British Museum. - Walker.

### ONZIÈME GROUPE.

# 73. C. GUNDLACHII.

Herrich-Schmffer, Corresp. Blatt. p. 149. — Grote, Proceedings of Hatom. Society of Philadelph. vol. V, no 1, p. 51.

Nous ne possédons point ce sphingide; mais nous l'avions remarqué à la grande exhibition de 1867, ainsi qu'une foule d'autres espèces d'un haut intérêt propres à l'île de Cuba, exposées par M. Gundlach, sur lesquelles nous aurions volontiers pris des notes si nous avions en l'autorisation du propriétaire, autorisation qu'il nous aurait sans doute accordée, si nous avions été assex heureux pour le rencontrer. La description que nous en donnons ici est extraite d'un mémoire de M. Grote sur les sphingides de la collection de M. Poey.

Il est plus petit que le Nechus, mais ses ailes ne sont nullement falquées; les supérieures sont d'un gris-olivâtre avec la lase ombrée d'un peu de noirâtre; le milieu, qui est d'une couleur uniforme, porte un petit stigmate blanchâtre ombré de noirêtre en dehors; on voit en outre, vers l'extrémité postérieure, une raie oblique noirâtre, régulière, allant du bord interne presque jusqu'à la côte où elle se termine d'une manière obsolète; cette raie est plus fortement indiquée vers le bord interne; le bord terminal est d'un vert-olivâtre avec la frange brunâtre.

Les ailes inférieures sont entièrement brunâtres avec la frange plus pâle.

Le corselet est d'un vert obscur avec les épaulettes bordées de blanc inférieurement.

L'abdomen est vert sur sa partie antérieure, ensuite d'une couleur plus claire, avec les 4° et 5° segments marqués d'une espèce de tache brunâtre.

Le dessous des ailes est d'un vert olivâtre avec une ligne terminale commune, de couleur brune; celui des supérieures est fortement nuagé de brunâtre vers la base avec une ombre obscure sur le disque.

Cuba. — Musée de Philadelphie.

### 74. C. IRRORATA.

Grote, Proced. of Entomol. Society of Philadelph. vol. V, nº 1, p. 52, pl. II, f. 2.

Il est un peu plus grand que le Gundlachii, dont il a tout à fait le port. Ses ailes supérieures sont d'un brun-fauve rougeâtre, très-finement sablées de noirâtre, avec la base, le disque et le bord costal plus ou moins rembrunis; le stigmate est petit et de couleur obscure et environné de brunâtre; outre cela, l'on remarque sur la partie postérieure, comme dans le Gundlachii, une raie oblique régulière d'un brun foncé, s'étendant du bord interne au bord costal où elle s'efface insensiblement; cette même raie oblique est bordée, en dedans, par une ombre plus pâle.

Les ailes inférieures sont d'un brun-roussâtre, plus pâle vers l'angle anal.

Le corselet est d'un beau brun-rougeâtre avec les épaulettes bordées de blanc inférieurement.

L'abdomen est moins foncé que le corselet.

Le dessous des ailes est rougeâtre avec la base des supérieures noirâtre.

Cuba. - Mus. de Philadelphie et Mus. nat. Par.

### 75. C. PORGUS.

Hubner, Exot. Saml. — Ménétriés, Enum. corp. animal. Mus. Petropol. I, p. 92, 4534.

Il est de la taille d'un Celerio. Ses ailes supérieures, beaucoup plus pointues, sont de couleur olive avec le bord marginal et le bord costal d'un blanc rosé; outre cela, elles offrent deux bandes transversales doubles, un peu plus foncées que la teinte générale; le stigmate est noir et petit; le bord terminal est un peu grisâtre.

Les ailes inférieures sont noirâtres avec une petite tache jaunâtre à leur base, et l'angle anal un peu grisâtre.

Le corselet est olive avec les épaulettes bordées de blanc latéralement. Les antennes sont roses.

L'abdomen est, en dessus, de la couleur du corselet, un peu plus pâle sur les côtés, sans aucune marque particulière.



Le dessous des ailes est grisâtre avec le disque des supérieures poirâtre.

Il se trouve à Halti, à Cuba et au Brésil. Beske nous a envoyé un exemplaire ex larva, sans nous dire sur quelle plante il avait trouvé la chemille.

La figure donnée par Hubner est très-exacte.

### DOUZIÈME GROUPE.

### 76. C. ELPENOR.

Liané, Syst. nat. 801, 17. — Esp. — Fab. — Hubn. — Ochs. — God. etc. — Le Sphinx de la vigne, Engr.

L'Elpenor est une espèce commune, bien connue des amateurs. Ses ailes supérieures sont d'un vert olive, avec la côte, la bordure et deux handes roses, dont la première plus large ne remonte guère au-delà du milieu, et la seconde, étroite, oblique, s'étend du tiers postérieur du bord interne à l'angle apical; le stigmate est blanc et très-petit; outre cela, il y a une petite tache noire à la base de l'aile, et une partie du bord interne est garnie d'une petite frange blanche.

Les ailes inférieures sont d'un rose foncé, avec la base largement noire.

Le corselet est rose avec des raies d'un vert olive et les épaulettes bordées latéralement de blanc.

L'abdomen est d'un vert olive en dessus, avec une bande dorsale rouge; ses côtés sont roses, marqués chacun d'une tache noire précédée d'une petite touffe de poils blancs. Les antennes sont d'un blanc rose.

Le dessous des ailes est rose avec le bord antérieur et le milieu d'un jaune olivâtre; le ventre est rose.

La chenille est verte lorsqu'elle est jeune; après sa seconde mue, elle est d'un brun plus ou moins obscur (couleur de radis wir), finement entrecoupée de noir, avec six raies obliques gristres. Elle a sur les quatrième et cinquième anneaux deux taches culaires, marquées chacune d'une lunule d'un blanc violâtre. La corne est arquée, noire, avec la pointe blanchâtre. Chez quelques-unes de ces chenilles, la couleur reste verte avec le même dessin que dans la variété brune.

Elle vit, en juillet, sur les Epilobium hirsutum, angustifolium

et reseum, sur les Galium, verum et palustre, et quelquesois sur la vigne. Nous l'avons trouvée plusieurs sois dans les jardins, sur des suchsias, et une sois très-communément dans les bois de Satory, près Versailles, sur la Circæa lutetiana.

La chrysalide passe l'hiver, et le papillon éclôt vers le milieu de juin de l'année suivante.

Il est commun dans une grande partie de l'Europe; on le trouve jusqu'en Chine.

## 77. C. RIVIILARIS. Boisd.

Quoique la chenille de cette espèce, d'aprèz un dessin du capitaine Shervill, soit marbrée de brun et de blanchâtre, ce n'est qu'avec doute que nous la séparons de l'*Elpenor*, dont elle n'est probablement qu'une variété indienne.

Au premier coup-d'œil, il diffère de l'Elpenor, en ce que toutes les parties roses sont d'un rose-violâtre obscur; en ce que la seconde bande oblique des ailes supérieures se termine, sur le bout de la côte, avant la pointe apicale; en ce que le stigmate est plus marqué; en ce que les ântennes n'ont rien de rose, et enfin en ce que le corselet est presque entièrement olivâtre, marqué de très-peu de rose. Pour tout le reste, il offre à peu près les mêmes caractères que l'Elpenor.

Nous en avons reçu un exemplaire venant de Simlah, et un second élevé de la chenille à Darjeeling par M. Shervill. Nous en avons vu aussi plusieurs dans la collection du British Museum.

#### 78. C. PORCELLUS.

Linné, Syst. nat. 801, 18. — Fab. — Esp. — Hubn. — Ochs. — God. etc. — Le petit Sphinx de la vigne, Engram. — Le Sphinx à bandes rouges dentelées, Geoffr.

Il est très-connu des entomologistes et fait partie des plus humbles collections. Le plus ordinairement ses ailes supérieures sont d'un jaune olivâtre, avec la côte, la bordure et une bande transversale plus ou moins complète, de couleur rose.

Les ailes inférieures sont dentelées, noirâtres antérieurement, d'un jaune olivâtre au milieu avec la bordure rose et la frange entrecoupée de blanc.

Le corselet est entièrement rose avec les épaulettes bordées de blanc latéralement. L'abdomen est rose avec le dos un peu verdâtre.

Le dessous des ailes est rose, avec une bande transversale junătre. Le ventre et la poitrine sont roses.

La chenille est verte dans sa jeunesse, couleur qu'elle conserve sument jusqu'à sa métamorphose. Le plus ordinairement, après sa seconde mue, elle devient brune, avec trois taches oculaires soires, pupillées de blanc et cerclées de roussatre, placées sur les quatrième, cinquième et sixième anneaux; la corne du ontième segment est à peine rudimentaire.

On la trouve, en juillet, sur le caille-lait jaune, Galium verum. La chrysalide passe l'hiver, et le papillon éclôt en juin de l'année suivante.

Il habite une grande partie de l'Europe.

### TREIZIÈME GROUPE.

### 79. D. SUCCINCTA.

Cornipalpus succinctus, Felder, Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd II, Abth. 2, pl. 82, fig. 6.

Cette charmante petite espèce a tout à fait le port et la taille du D. scapularis, sauf que ses ailes sont un tant soit peu plus dentelées; les supérieures sont d'un ton olivâtre, avec deux espaces noirs, dont l'un un peu triangulaire au bout de la cellule discoïdale, et l'autre sur l'angle interne; outre cela, elles ont sur le milieu une petite bande transverse, rose, droite et géminée, et, en dehors de la tache triangulaire, une autre bande courbe, géminée, du même rose; la tache triangulaire dont il vient d'être question est un peu liserée de blanc; la frange est aussi entrecoupée de blanc.

Les ailes inférieures sont d'un brun noir avec une liture rose avant de l'angle anal.

Le corselet est olivâtre, bordé latéralement par une ligne rose qui prend naissance sur le front; le bord interne des épaulettes est aussi liseré de rose. L'abdomen est d'un vert olive avec les estés roses; il offre à sa base une bande transversale noire, bordée de rose en avant et en arrière.

Décrit sur une très-belle figure donnée par M. Felder dans l'ouvrage précité.

### 80. C. IDRIEUS.

Drury, III, pl. 2, f. 2. — Boisd. Faun. de Madag. pl. 10, f. 5. — Sph. Clio, Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 377, 65.— Sph. Medea? Fab. op. cit. 23.

Quoique Fabricius ne cite pas la figure de Drury, il nous semble qu'il ne peut y avoir de doute sur l'identité de son Sphinz Clio avec l'Idrieus. Nous pessons même que le Medea du même auteur doit probablement aussi être rapporté à l'Idrieus.

Il est d'un tiers plus petit que notre Porcellus. Ses ailes supérieures sont vertes, avec un petit stigmate noir, surmonté d'un petit trait blanchâtre, plus ou moins marqué; entre le stigmate et le bord terminal, elles sont traversées par trois ou quatre petites lignes obsolètes d'un vert un peu plus obscur que le fond.

Les ailes inférieures sont denticulées, d'un fauve ferrugineux, avec une bordure noirâtre qui remonte un peu sur l'angle interne des supérieures.

La tête, le corselet et l'abdomen sont du même vert que les premières ailes. Ce dernier est marqué, sur les derniers anneaux, de deux rangées latérales de trois ou quatre points dorés.

Le dessous des ailes est verdâtre avec le disque des supérieures fauve ; le ventre est vert.

Cette petite espèce se trouve à Madagascar, Maurice, Bourbon, Natal, à la côte de Guinée et au Sénégal.

Coll. Bd.

## 81. C. SCAPULARIS. Horsfield.

Panacra scapularis, Walker, List. Lepid. Brith. Mus. Het. pt. VIII, p. 157. — Moore, Cat. of Lepid. of ind. Comp. p. 269, 621. — Jasion, Boisd. M. — Elegantulus, Herrich-Schæff. 479. — Var. Arachtus. — Var. Mydon, Boisd.

Il est de la taille d'un Porcellus avec les quatre ailes dentelées. Le fond des supérieures est grisatre dans le mâle, et d'un gris violâtre dans la femelle. Ces ailes sont traversées obliquement, du milieu du bord interne au tiers postérieur de la côte, par une bande brune; sur le bord terminal, on voit au milieu une tache triangulaire brune; près de l'angle anal, une tache semi-lunaire, et au sommet une autre petite tache également de couleur brune; le stigmate est noir et excessivement petit, précédé en dedans de quelques litures transverses brunatres.



Les ailes inférieures sont brunes, marquées, à partir de l'angle anal, d'une éclaircie ochracée en forme de bande transverse, obsolète.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures, avec les épaulettes d'un brun olive, marquées d'un trait oblique doré.

L'abdomen est un peu brunâtre, avec une très-petite ligne dorsale plus obscure; les côtés sont marqués, près du ventre, d'une raie dorée, avec un trait oblique de la même nuance sur chaque anneau. La poitrine et les palpes sont blancs.

Le dessous des ailes est varié de gris et de ferrugineux, avec un point blanc sur le disque des inférieures.

La chenille a été élevée à Java par Horsfield. Elle a une tache occlaire sur le quatrième anneau, avec la queue fortement arquée. Elle vit sur une plante de la famille des Aroides.

Cette charmante petite espèce se trouve à Java et dans le nord des Indes. Les individus de cette dernière provenance, vendus par Becker sous le nom d'Arachtus, sont d'une couleur noirâtre enfumée, beaucoup moins brillants que ceux de Java. Notre Mydon, décrit au British Museum, n'est lui-même qu'une variété indienne du Scapularis.

## 82. C.? IRREGULARIS.

## Pergesa irregularis, Walker, Heterocera, p. 152, 4.

Il est de la taille du *Tersa*. Il est d'un brun roussâtre en dessus, et d'un blanchâtre testacé en dessous. La tête et les côtés du corselet sont d'un blanc testacé.

L'abdomen est brun, avec une rangée latérale de taches brunes. Les ailes supérieures sont d'un brun roussâtre, avec le stigmate noir et une ligne transverse, postérieure d'un noir brun; elles ont en outre, près du bord terminal, des petites taches noires.

Les ailes inférieures sont brunes.

Le dessous des premières ailes est grisâtre, traversé par une bande oblique jaunâtre.

Le dessous des secondes ailes est en grande partie jaunâtre.

Côte occidentale d'Afrique. - British Museum. Walker.

Nous ne connaissons pas cette espèce que M. Walker place dans le même genre que notre Porcellus et le Crasus.

## 83. C.? VARIOLOSA.

Panacra variolosa, Walker, Heterocera, p. 156, 4.

Il est de la taille du Scapularis, roussâtre en dessus et testes en dessous.

L'abdomen est sablé de noir, avec trois raies d'un jaune tetacé, dont celle du milieu plus distincte et bordée de blanchire.

Les ailes supérieures sont sablées de noir, avec le stigmate de la même couleur; outre cela, elles ont à la base quelques marques noirâtres, et avant l'extrémité, une bande transverse d'un brun foncé, composée de quatre lignes parallèles, un peu arquées avant d'arriver au sommet.

Les ailes inférieures sont brunes, avec le bord internadin jaune testacé et une bande transversale incomplète de la parte couleur.

Silhet. - Collection de M. Saunders. - Walker.

### #

## 84. C.? VERSICOLOR.

Harris, Am. Journ. sc. XXXVI. — C.? Versicolor, Walker, Heterocera, p. 131, 6.

Nous n'avous jamais vu cette espèce, et M. Walker n'a pas été plus heureux que nous. La description que nous en donnons ici est extraite de l'ouvrage de Harris.

Il est d'une teinte légèrement olivâtre, panachée de blanc et de vert olive. Le dernier article des palpes est blanc, ainsi qu'une ligne qui passe sous les yeux; les bords du corselet sont blancs, de même qu'une ligne dorsale qui se prolonge jusqu'à l'extémité.

L'abdomen a, de chaque côté de la ligne dorsale, les anneux teintés de reux chamois.

Les ailes supérieures sont traversées par des raies arquées blanches et d'un vert olive; elles ont, en outre, vers le sommet, une ligne blanche en zigzag.

Les ailes inférieures sont ferrugineuses, avec la bordure d'un vert olive.

Amérique du Nord. — Harris.

Ce sphingide que nous avons mentionné, p. 210, nous paraît platét appartenir à notre genre Everyx qu'aux véritables Chérecempes.

### GENRE PANACRA. Walker.

Chenilles: Ocellées.

Insecte parfait: Antennes de longueur moyenne, plus grosses et un peu scabres en dessous dans les mâles, un peu moins fortes chez les femelles, terminées, dans l'un et l'autre sexe, par un petit crochet. Palpes obtus, ne s'appliquant pas exactement sur le chaperon, garnis de poils serrés. Trompe de la longueur du corps. Yeux de grosseur moyenne. Corselet médiocrement robuste. Abdomen conique, allongé, terminé dans les mâles par un très-petit pinceun de poils, presque nul. Ailes supérieures échancrées un sommet, sinuées, dentelées et un peu anguleuses.

Les Panacra sont très-voisins des Chærocampa, ils en diffèrent au premier coup-d'œil par leurs ailes supérieures échancrées au-dessous du sommet.

## 1. P. Businis. Boisd.

Amacra Busiris, Walker, List. Lepid. Brit. Mus. Het. pt. VIII, 188. — Moore, Catal. of Lepid. of ind. Comp. 270, 622.

Il est à peu près de la taille d'un Celerio, mais il a, comme es espèces du même groupe, les ailes supérieures fortement inhancrées au-dessous de leur pointe apicale. Toute leur partie mérieure, depuis la base jusque près de l'extrémité, est couverte par une large bande longitudinale d'un vert pistache, fortement sinuée et bordée de brun en arrière; cette même bande fre, vers sa base, une espèce de tache brunâtre, irrégulière, inuée, maillée d'un peu de grisâtre et appuyée inférieurement ur une tache blanche; l'autre portion de l'aile est grise, variée e brun vers le sommet, et marquée, près de l'échancrure, d'un stit zigzag blanc.

Les ailes inférieures sont noirâtres, avec le bord antérieur blanlâtre et une petite raie marginale grisâtre vers la région anale. Le corsolet est vert, avec les épaulettes brunâtres. L'abdomen est vert en dessus, avec une bande dorsale griss et les côtés jaunâtres.

Le dessous des ailes est brunâtre, avec l'angle anal des inférieures noir; celui des supérieures offre, au-dessous de l'écharcrure, un grand espace terminal d'un fauve testacé.

Il se trouve au nord des Indes.

Coll. Bd. - Rare.

## 2. P. AUTOMEDON. Boisd.

Panacra Automedon, Walker, List. Lepid. Brit. Mus. Heter. pt. VIII, p. 154. — Moore, Catal. of Lepid. of ind. Comp. p. 269, 620.

Il est un peu plus petit qu'un Porcellus. Ses ailes supérieures sont d'un gris faiblement roussatre, coupées en deux par une bande oblique brune, qui s'étend du milieu du bord interne au sommet; cette bande est divisée, dans le sens de sa longueur, par plusieurs petites lignes parallèles un peu plus claires, plus ou moins marquées; sous la côte on voit une quantité de petits traits brunatres, irréguliers, formant une sorte de pointillé; en arrière de cette même bande, il y a une petite tache brune sur l'angle anal, et une tache de la même couleur sur l'échancrure de l'extrémité, précédée d'une petite ligne blanche en zigsag; outre cela, il y a encore deux petits points noirs vers le bout de la côte.

Les ailes inférieures sont roussatres, avec une bordure brune et la trace d'une bande médiane un peu plus obscure que le fond.

Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est roussatre, avec des lignes dorsales brunes et les côtés dorés.

Le dessous des ailes est rougeatre pointillé de noir.

Décrit au British Museum sur des individus très-frais venant de Silhet.

Nous possédons un exemplaire femelle de la même localité.

### 3. P. TIRIDATES. Boisd.

Il est plus grand que l'Automedon, dont il a le port. Outre l'échaucrure du sommet, ses ailes sont dentelées. Les supérieures sont d'un gris très-faiblement lavé de verdatre, avec une bande

oblique brune, commençant au milieu du bord interne et allant, en s'atténuant insensiblement, expirer sur la côte, avant le sommet; cette bande est suivie, en arrière, de quatre à cinq petites lignes parallèles de la même couleur; près du bord terminal, on voit une autre petite ligne obscure, un peu sinuée, terminée sur l'angle anal par une raie blanche, flexueuse, et au sommet par une raie en zigzag du même blanc; le stigmate est noir, très-petit, précédé vers la base de l'aile, de quelques petites lignes transversales brunâtres, très-obsolètes; l'extrémité de la côte est marquée de deux taches noires, dont l'extérieure petite, ponctiforme.

Les ailes inférieures sont brunâtres avec le bord abdominal grisâtre.

Le corselet est de la couleur des premières ailes avec les épaulettes bordées en dessus de brun-roussatre, qui s'étend latiralement sur l'abdomen.

L'abdomen est gris avec une petite ligne dorsale brune, à peine visible; les côtés sont marqués de deux raies longitudisales couleur d'or.

Le dessous des ailes est gris avec une double raie noire, dentée en scie, et une petite tache blanche sur le disque des infénieures.

Cette jolie petite espèce, que nous décrivons d'après trois exemplaires ex larva, a été élevée de chenille aux iles Philippines par M. Lorquin. La chenille, nous a-t-il écrit, a des taches oculaires comme celle du Porcellus. Quant à la plante dont un lébris accompagnait une chrysalide éclose, elle nous semble appartenir au genre Hedyotis?

#### 4. P. ASSAMENSIS. Boisd.

Walker, Heterocera, p. 160, 9.

flest de la taille d'un Porcellus, mais plus grêle. Ses ailes supéneures, dentées et anguleuses, sont d'un cendré grisâtre traversées par des bandes brunâtres, obsolètes, interrompues; outre cla, la bordure de l'extrémité apicale est également brunâtre.

Les ailes inférieures sont d'un brun-rougeatre avec des atomes et la bardure plus obscurs.

Le corselet est d'un gris cendré avec les épaulettes olivatres. L'abdomen est d'un gris roussatre. Le dessous des ailes est d'un brun rougeatre avec la bordun brune.

Décrit au British Museum sur un individu unique, noté comme venant d'Assam.

## B. P. TRUNCATA. Boisd.

Walker, Heterocera, p. 160, 8.

Cette petite espèce a un singulier facies, on croirait, au premier coup-d'œil, que ses ailes supérieures ont été mutilés; elles sont dentées et tronquées à l'extrémité, ce qui les fait peraître relativement très-courtes. Leur couleur est d'un gricendré, saupoudré d'atomes brunâtres; elles sont, en outre, treversées obliquement par une bande brunâtre, constituée par la réunion de petites lignes parallèles.

Les ailes inférieures sont brunâtres avec une bande obsolés un peu plus pâle.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est roussatre avec les côtés d'un jaune doré.

Décrit au British Museum sur un individu venant de Sylhs. Nous n'en connaissons aucun autre exemplaire.

### 6. P. LIGNARIA.

Walker, Heterocera, p. 166, 3.

Nous ne connaissons pas cette espèce qui est à peu près de la taille du *Tersa*. Elle est brune en dessus et d'un testacé pâle es dessous. La tête et le corselet sont bordés de blanc rosé, celui-ci est marqué de trois raies de la même couleur, dont la médians est la plus longue.

L'abdomen est grisâtre avec une raie dorsale noire, interrompue, et des taches obliques, blanchâtres sur les côtés.

Les ailes supérieures sont pointues au sommet, roussaires le long de la côte, variées de blanchâtre sur le disque, avec le stigmate noir; outre cela, leur partie postérieure est blanchâte, traversée par des lignes brunes, avec une tache noirâtre sur l'angle interne, et une raie apicale de la même couleur.

Les ailes inférieures sont brunes avec le bord marginal rousaire.

Ceylan, Australie? - British Museum.

# TRIBU DES MACROGLOSSIDES.

Les chenilles des Macroglossides, au moins celles que nous connaissons, sont généralement de couleur verte, plus ou moins pointillées, paraissant même quelquefois comme un peu chagrinées. Elles sont atténuées antérieurement avec la tête globuleuse. Elles sont en général pourvues d'une corne plus ou moins développée, droite ou arquée, sur le onzième segment. Les unes ont des lignes longitudinales, les autres ont en outre des raies obliques; quelques-unes offrent des taches latérales ferrugineuses.

Les chrysalides sont coniques avec l'enveloppe de la tête saillante.

Insecte parfait: Taille petite ou au-dessous de la moyenne. Abdomen raccourci, très-souvent terminé, au moins dans l'un des sexes, par une brosse étalée. Antennes de forme et de longueur variables. Trompe aussi longue que le corps. Yeux de grandeur moyenne. Ailes entières ou anguleuses.

Cette nombreuse tribu est répartie sur une grande partie du globe.

# GENRE TEMNORA. Boisd. - Panacra. Walker.

Ce genre se compose d'un très-petit nombre de Sphingides propres à l'Afrique, dont les premiers états nous sont inconnus, sauf pour le *Rhadamistus* de Fabricius, dont la chenille, pourvue d'une petite corne sur le onzième anneau, a été élevée au Sénégal par Dumolin.

Les insectes à l'état parfait ont les ailes très-dentées et un peu sinuées, ce qui leur donne un peu le facies de petits Smérinthes; mais leurs antennes, qui rappellent celles des Cherocampa, et leur trompe aussi longue que le corps, les en éloignent complétement. Leur parure est assez modeste; leurs ailes supérieures, d'un cendré blanchâtre, sont variées de noirâtre, et leur abdomen est dépourvu de taches ou de bandes transversales, ainsi que de raies longitudinales; mais, dans les mâles, il se termine par un petit pinceau per indiqué.

1. T. RHADAMISTUS.

Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 359, 11.

Il est plus petit qu'un Smerinthus tiliæ. Ses ailes supérieures sont dentées, d'un blanc très-légèrement cendré; elles ont, près de la base, deux on trois petites lignes noirâtres, anguleures et très-fines, au milieu, un stigmate blanchâtre, cerclé de hrus; entre le stigmate et le bord terminal, il y a plusieurs lignes trasverses fines et noirâtres; outre cela, on voit sur l'angle interme une tache d'un brun noirâtre assez grande, bien marquée, un autre près de la frange au milieu du bord interne, et une troisième sur la pointe apicale.

Les ailes inférieures sont d'un gris blanchâtre avec une légère bordure brunâtre et une liture anale cendrée, coupée par deux petites lignes noires.

Le corselet est de la couleur des premières ailes avec le milieu brunâtre et une raie longitudinale, noire, sur le prothors.

L'abdomen est gris avec le premier anneau noir en dessur-Le dessous des ailes est d'un gris blanchâtre avec une petite ligne terminale noire en feston.

La chenille de cette rare espèce a été élevée au pays de Galas par Dumolin, qui n'a pu se rappeler s'il l'avait trouvée sur de jeunes pousses de Baobab (Adansonia digitata) ou sur une plant basse très-commune, le long du fleuve depuis Saint-Louis juqu'à Bakel.

Décrit sur deux individus. - Coll. Bd.

### 2. T. NATALII. Boisd.

Panacra Natalii, Walker, Heterocera, p. 104, 1.

Il a le port du Rhadamistus. Ses ailes supérieures sont dentées et échancrées au-dessous du sommet; le fond de leur couleur est d'un cendré blanchâtre avec des marques d'un brun noirâtre, savoir : trois taches assex grandes, mal définies le long de la côte, dont les deux postérieures plus marquées; deux ou trois raies vers la base, et une petite ligne en zigzag très-fine; le stigmate est blanchâtre; outre cela, toute la région de l'angle anal et la partie voisine de l'échancrure sont plus ou moins d'un brun-noir.

Les ailes inférieures sont noirâtres avec l'angle anal cendré et liseré de noir.

Le corselet participe de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est gris, marqué à sa base de deux taches noires; les derniers anneaux sont brunâtres.

Le dessous des ailes est d'un brun un peu grisâtre; celui des inférieures est traversé par trois raies parallèles, noirâtres, trèsanguleuses.

Delegorgue a pris un exemplaire de cette espèce à Port-Natal. Walhberg en a aussi rapporté un ou deux; mais depuis la mort de Delegorgue, on en a requ quelques individus en Angleterre.

Coll. Bd.

## 3. T. ANDOSA. Boisd.

Penacra Andosa, Walker, Heterocera, p. 159, 7.

Il a le port et la taille des deux précédents. Ses ailes supéneures sont d'un cendré grisatre, avec trois raies brunâtres obsolètes irrégulières; outre cela, la base offre deux ou trois points de la même couleur; le milieu du limbe est aussi plus ou moins hunâtre.

Les ailes inférieures sont ferrugineuses avec l'angle anal cenlré, tacheté de brun.

Le corselet est d'un gris cendré.

L'abdomen est d'un gris un tant soit peu roussâtre.

Le dessous des ailes est d'un gris cendré avec deux lignes rusversales, obscures; celui des supérieures a le disque ferruprenx.

Décrit sur un individu unique envoyé de Sierra-Leone au British Museum.

### GENRE LAPARA. Walker.

Nous ne connaissons pas ce genre que nous mentionnons come mémoire, d'après M. Walker. Insecte parfait: Corps assez grêle. Tête petite, raccourcie, Trompe de longueur moyenne. Palpes très-courts. Antennes grêles, un peu en massue, à peine plus longues que le corselet, atténuées au sommet et terminées par un crochet très-petit. Abdomen linéaire, moitié plus long que le corselet. Pattes minces avec les jambes postérieures munies de quatre éperons de longueur moyenne. Ailes assez étroites, peu allongées; les supérieures ayant la côte à peu près droite, ainsi que le bord interne. Ailes inférieures arrondies.

Ce genre semble faire le passage à certaines espèces de Bombycites. Walker.

### L. BOMBYCOIDES.

Walker, Heterocera, p. 233, 1.

Il est à peu près de la taille d'un Macroglossa. Il est de couleur cendrée. Ses ailes supérieures ont une ligne oblique noire en zigzag et plusieurs taches lancéolées de la même couleur.

Les ailes inférieures sont brunâtres, un peu plus pâles vers la base avec la frange blanche.

Décrit sur un insecte unique envoyé du Canada à M. Saunders. Walker.

Comme nous n'avons jamais vu ce sphingide, qui n'existe que dans la collection de M. Saunders, ce n'est que provisoirement et avec doute que nous le plaçons dans notre tribu des Macroglossides.

### GENRE ARCTONOTUS. Boisd.

Chenille: Inconnue.

Insecte parfait: Tête petite, retirée sous le corselet, trèsvelue. Palpes courts, peu ascendants. Trompe un peu plus courte que le corps. Antennes fortes, de longueur moyenne, dentées dans les mâles, terminées par un crochet très-prononcé. Yeux petits. Corselet très-velu à ptérigodes non indiqués. Abdomen court et très-velu. Ailes très-entières.



### A. Lucidus.

Boisd. Lépid. de la Calif. I, p. 47, 85. - Walker, Heterocera, p. 365, 1.

Il est à peu près de la taille de notre *Pt. ænotheræ*. Ses ailes supérieures sont d'un gris-jaunâtre à reflet brillant, marquées de deux ou trois bandes transverses, plus obscures, assez obsolètes, dont la plus tranchée est sinuée et placée près de l'extrémité.

Les ailes inférieures sont violettes, avec l'extrémité d'un pourpre obscur et la frange plus pâle.

Le corselet est très-velu, de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est également velu et très-court.

Le dessous des ailes est d'une teinte grisâtre, avec le disque des supérieures ferrugineux.

Nous possédons un individu de conservation très-médiocre qui nous a été donné par feu notre excellent ami Edward Doubleday, qui l'avait reçu de San-Francisco.

Notre description est faite sur un magnifique exemplaire de la même provenance appartenant à la riche collection du British Museum. — Très-rare.

# GENRE TYLOGNATHUS. Felder. - Euryops. Boisd. M.

Premiers états inconnus.

Insecte parfait: Palpes épais, très-velus et écailleux, dépassant le chaperon, fortement appliqués et comme collés sur le front. Trompe aussi longue que le corps. Yeux grands et saillants. Antennes longues, se terminant par une longue pointe recourbée. Corselet convexe, à épaulettes non indiquées. Addomen cylindrico-conique, terminé, dans les mâles, par un pinceau fortement comprimé latéralement, et non étalé comme dans les Perigonia. Ailes sinuées, anguleuses, arquées à leur bord interne.

Nous ne connaissons que quatre espèces appartenant à ce petit groupe.

# 1. T. JAPYX.

Cramer, 87, C. — Unsela? japyx, Walker, Heterocera, p. 162, 2. Il est de la taille de notre Porcellus. Ses ailes supérieures dentées et anguleuses sont d'un gris un peu rosé; elles sont traversées au milieu par une large bande brune, très-fortement sinuée extérieurement, très-droite sur son côté interne et liserée des deux côtés par une petite ligne blanche; outre cela, il y a sur l'angle interne, une grosse tache brune, marquée d'une petite tache pâle; le bord terminal offre aussi, au-dessous du sommet, un petit espace brun.

Les ailes inférieures sont noires, avec l'angle anal d'un rose cendré, coupé par une ligne noirêtre.

Le corselet est brun.

L'abdomen est d'un brun clair; il offre près de sa base une raie transversale blanche; la brosse anale n'existe que dans le mâle.

Le dessous des ailes supérieures est brun, avec l'extrémité et l'angle anal plus pâles; celui des intérieures est d'un gris jaunâtre avec trois raies transverses, noirâtres, ondulées, un peu interrompues. Le ventre, la poitrine et les palpes sont d'un blanc un peu grisâtre.

Il se trouve au Brésil et à Surinam. - Coll. Bd. - Rare.

#### 2. T. EMUS. Boisd.


Il est aussi de la taille d'un C. Porcellus. Ses ailes supérieures ont la moitié antérieure d'un vert olive. Cette couleur est séparée nettement de l'autre moitié, qui est plus pâle, principalement dans son milieu; leur bord terminal offre une espèce de bande marginale brunâtre, irrégulière; on voit en outre, sur cette portion de l'aile, sous la côte, une grosse tache olivâtre.

Les ailes inférieures sont brunes, traversées un peu au-delà du milieu par une bande testacée.

Le corselet est d'un vert olive.

L'abdomen est un peu roussâtre, principalement sur les côtés. Le dessous des ailes est d'un ferrugineux rougeâtre, avec un espace brunâtre sur le disque des supérieures.

Feu Becker nous a donné cette espèce comme venant de Sylhet; mais comme il lui arrivait souvent de mélanger des objets de différentes provenances, nous croyons qu'il l'a plutôt reçue de quelque point de l'Amérique méridionale.



## 3. T. IPHIB. Boisd.

Enge Iphis, Walker, Heterocera, p. 116, 8. — Tylognathus Scriptor. Feider, Royara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, tab. 82, f. 4.

Lest à peu près de la taille du C. Porcellus. Ses ailes supézieures sont d'un jaune roussatre, traversées obliquement, dans leur milieu, par une bande brune très-droite, un peu dilatée vers la côte. Cette bande est lisérée en dedans par deux petites lignes bienches, géminées, très-fines, et en dehors par des petites lignes maires qui se fondent avec elle; outre cela, il y a, en tirant vers le sommet, un espace obsolète un peu plus pâle que la teinte gémirale.

Les ailes inférieures sont d'un jaune roussâtre, traversées par une bande brunâtre; leur angle externe est marqué d'une large bande noire qui ne descend pas au-delà de l'échancrure, dont la frange est faiblement liserée de noir.

Le corselet et l'abdomen sont de la couleur des ailes supérieures; ce dernier offre vers sa base, une raie transverse d'un blanc pur.

Le dessous des ailes est roussâtre, avec le disque des supérieu-

Décrit sur un bel individu mâle pris à Cayenne par Lacordaire.

L'individu figuré par M. Felder est une femelle.

#### 4. T. YPANEMÆ. Boisd.

Il est un peu plus petit que l'Epistor Lugubris. Ses ailes supérieures, dentées et anguleuses, sont grises avec une raie oblique, brune, médiane, très-régulière, précédée, du côté de la base, d'une petite ligne anguleuse de la même couleur; outre cela, il y a vers le tiers postérieur de la côte, sur un fond rembrani, une tache triangulaire d'un blanc transparent, et au-desseus de celle-ci une autre très-petite tache oblongue de la même couleur; au-dessous de ces deux taches transparentes, on voit tre espèce de hande oblique, brunâtre, qui va se perdre, vers le milieu du bord extérieur, dans un large espace rembruni qui l'étend jusqu'à l'angle anal.

Les ailes inférieures sont brunes avec une espèce de bande

transversale ferrugineuse; l'angle anal et une partie de la goutière abdominale sont également de couleur ferrugineuse.

Le corselet est de la teinte des ailes supérieures. Les antennes sont fauves.

L'abdomen est d'un brun grisâtre, avec le pinceau anal de mâle un peu comprimé latéralement.

Le dessous des ailes est d'un brun clair, avec de petites ries transversales, ondulées, interrompues, plus obscures. Le vente est grisâtre.

Décrit sur individu mâle très-frais que nous avons reçu d'Tpnéma.

## GENRE EPISTOR. Boisd. — Sphinx autorum.

Enyo, Walker. — Triptogon, Ménétriés. — Thyreus, Boisd. olis.

Nous ne connaissons que la chenille du Lugubru. Elle ressemble à celles des Macroglosses. Elle a des raies latérales obliques, avec une corne sur le onzième anneau.

La chrysalide est atténuée antérieurement et comme comprimée.

Insecte parfait: Tête assez grosse. Antennes de longueur moyenne, se renflant insensiblement à partir de la base, et se terminant par un crochet très-recourbé. Yeux gros. Palpes fortement appliqués sur le front, avec le second article long, couvert de poils courts. Trompe un peu plus longue que le corps. Corselet robuste, relevé en carène sur la ligne médiane. Abdomen conique, terminé, dans les mâles, par une petite queue en éventail, avec une petite pointe au milieu. Abdomen des femelles obtus, sans brosse anale. Ailes dentées ou sinuées. Pattes assez grêles, terminées par une très-petite griffe.

Les *Epistor* sont peu nombreux. Ils habitent les régions chaudes de l'Amérique. Hubner a formé avec ce genre sont coitus *Enyo*, dans lequel il place en outre, les *Sphinx Japys*, *Pylas* et *Anceus* de Cramer, et même la variété noire du ficus, qui sont sans donte assez étonnés de se trouver réunis. Si quelqu'un voulait adopter le nom *Enyo*, à quelles espèces

devrait-il l'appliquer? Est-ce au Japyx, à l'Anceus, à la variété de ficus ou au Lugubris et espèces voisines? Il ne faut pas se dissimuler cependant que Hubner a dû passer beaucoup de temps et se donner de la peine pour grouper d'une manière plus ou moins naturelle des espèces dont, pour plus des quatre cinquièmes, il ne connaissait que les figures.

## 1. E. LUGUBRIS.

Sphinz Lugubris, Linn. Mantiss. 537. — Drury, Ins. I, tab. 28, f. 2. — Smith-Abbot, Lepid. of Georg. pl. 30. — Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 356, 5. etc.

Il est de la taille d'un C. Porcellus. Ses ailes sont dentées et anguleuses; les supérieures, d'un brun grisâtre ou d'un brun foncé, ont un stigmate noir à iris jaunâtre bien indiqué; en dedans de ce stigmate occlliforme, elles sont traversées, un peu obliquement, par une ligne d'un blanc jaunâtre doublée d'un peu de brun; en dehors de ce même stigmate, on voit un assez grand espace d'un brun plus ou moins foncé, limité, vers le sommet, par une petite ligne blanchâtre, arquée, plus ou moins bien écrite.

Les ailes inférieures sont brunes avec l'extrémité plus foncée, et offrent une petite tache noire sur la dent qui précède l'angle

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est d'un brun plus ou moins roussâtre, terminé par une petite brosse en éventail chez le mâle.

Le dessous des siles est d'un brun plus ou moins clair, avec un petit point blanc sur le disque de chacune d'elles, et une petite tache costale de la môme couleur sur les supérieures.

La chenille, dont nous possédons plusieurs dessins, est tantôt entièrement verte, et tantôt d'un vert blanchâtre; mais le plus ordinairement elle est verte avec tout le dos blanchâtre, marqué de trois lignes parallèles brunâtres; outre cela, elle a sur chacun de ses anneaux une bande oblique d'un jaune citron; les stigmates sont orangés.

Cette chenille vit sur les vignes sauvages et sur l'Ampelopsis heisraces.

Ce Sphingide est très-répandu : il se trouve depuis la Virginie paqu'au Brésil et dans la plupart des Antilles.

## 2. E. LUCTUOSUS. Boisd.

Il est voisin du Lugubris, mais ses ailes sont plus larges. La supérieures sont d'un gris obscur, marquées d'une tache pla, ronde, faiblement pupillée de brun, placée un peu plus les que le stigmate ocellé dans l'espèce précédente; en dedans de cette tache, il y a une petite ligne transversale brune; la moitil postérieure de l'aile, en tirant vers le sommet, est occupée par un large espace brun un peu triangulaire, limité en dedans par la petite ligne transversale et en dehors, au-dessous de la pointe apicale, par une tache semi-lunaire de la couleur du fond.

Les ailes inférieures sont d'un gris obscur, avec l'extrémité antérieure lavée de noir; elles offrent, comme chez l'espèce précédente, une petite tache noire sur la dent qui précède l'angle anal.

Le corselet et l'abdomen sont de la couleur des ailes.

Le dessous des ailes est d'un brun tanné, avec une petite tache blanche sur la côte des supérieures. Ches te mâle, la brosse asse est en éventail avec une petite pointe médiane, comme dans les espèces du même groupe.

Brésil. - Coll. Bd.

Cette espèce, dont les premiers états nous sont inconnus, se distingue du *lugubris* par ses ailes plus larges, par l'espace brun de l'extrémité des supérieures qui est plus étendu et marqué d'une tache lenticulaire blanchâtre pupillée de noir, et par son stigmate beaucoup plus gros, noir à iris jaune.

### 3. E. CAMERTUS.

Cramer, 225, A. - Enyo Camertus, Walker, Heterocera, p. 114, 2

Il a tout à fait le port du lugubris. Ses ailes présentent les mêmes dentelures. Les supérieures ont tout le milieu d'un bron noir avec une ou deux raies plus obscures, et un gros stigmate noir à iris jaunâtre; la base est de couleur grisâtre ainsi qu'une tache semi-lunaire située à l'extrémité.

Les ailes inférieures sont noirâtres avec le sommet plus pâle; elles ont aussi une petite tache noire sur la dent qui précède l'angle anal. Le corselet est d'un brun foncé avec le milieu largement d'un gris rougeâtre.

L'abdomen est noirâtre avec une raie dorsale grise; outre cela, y a sur le second anneau une bande transversale d'un noir profend.

Le dessous des ailes est brun, traversé par deux raies communes, noires, parallèles, dentées en scie.

Il habite la Guyane, la Colombie et les Antilles. — Coll. Bd.

On distinguera au premier coup-d'œil cette espèce du lugubris, la bande transversale noire du second anneau de l'abdomen, etc.

### 4. E. FEGEUS.

### Cramer, 225, E.

fia le port du lugubris, mais il est un peu plus grand, avec les alles proportionnellement plus larges et les dents moins promencées; les supérieures sont brunes, avec le milieu beaucoup
plus foncé et divisé par quatre à cinq lignes transversales plus
mecures; dans la portion basilaire il y a, comme dans les espème voisines, une ligne oblique de couleur pâle; le bord termimal est d'un brun clair, divisé par une petite raie noirâtre obmiète.

Les ailes inférieures sont brunes avec l'extrémité plus pâle, divisée par une raie noirâtre dans la femelle.

Le corselet est brun strié de noirâtre.

L'abdomen est d'un brun clair, marqué de chaque côté du dos deux raies longitudinales noires.

Le dessous est d'un brun clair avec deux raies communes dentelées, d'un brun noirâtre.

Brésil, Cayenne. — Coll. Bd.

M. Walker, qui probablement n'a pas vu cette espèce en nature, la rapporte à tort au lugubris.

#### 5. E. DANUM.

Cramer, 225, B. - Enyo Danum, Walker, Heterocera, p. 118, 12.

Il a tout à fait le port et la taille du lugubris. Ses ailes supérisures sont d'un noir brun, marquées, un peu au-delà de la

base, d'une ligne transverse, et à l'extrémité d'une tache senilunaire grisâtre.

Les ailes inférieures sont d'un noir brun avec la gouttière àdominale d'un blanc un peu jaunâtre ou quelquefois un per verdâtre.

Le corselet et l'abdomen sont d'un brun noiratre.

Le dessous est brun avec un petit point blanc sur le disque de chaque aile.

Guyane, Colombie, Cuba, Haïti. — Coll. Bd. — Beaucoup plus rare que le lugubris.

Cette espèce est suffisamment distincte par l'espace d'un blass verdatre qui couvre toute sa gouttière abdominale.

## 6. E. LYCTUS.

Cramer, 225, E. — Thyreus Lyctus, Boisd. in Herrich-Schaff.f.ic. — Enyo Lyctus, Walker, Heterocera, p. 115, 5.

Il est notablement plus grand que les autres espèces congenères. Ses ailes supérieures, arquées à la base comme chez plusieur Tortrix, sont sinuées, avec le sommet tronqué, au lieu d'être dentées; elles sont d'un brun-marron foucé, avec une large lunule terminale d'un blanc grisâtre; outre cela, toute la régim costale, depuis la base jusqu'au milieu, est d'un brun pâle.

Les ailes inférieures sont d'un brun marron avec l'extrémité un peu plus pâle.

Le corselet est brun avec les épaulettes et la carène médiane d'un brun-marron foncé.

L'abdomen est d'un brun marron avec la brosse anale « 'éventail, dans les mâles.

Le dessous des ailes est d'un brun clair, avec deux raies noires, parallèles, et un petit point blanc sur le disque des inférieures. Le dessous de l'abdomen est également d'un brun clair, avec une raie ventrale plus pâle.

Nous avons reçu cette espèce de Cayenne et de la Colombie. Nous croyons qu'elle se trouve aussi au Brésil.

## 7. E. GORGON.

Cramer, 142, E. — Enyo Gorgon, Walker, Heterocera, p. 114, 3.

Il est plus grand que le lugubris. Ses ailes supérieures sinuées

avec le sommet tronqué, sont d'un gris rosé, marquées, à partir du milieu, d'un large espace d'un brun noir, portant un gros stigmate lenticulaire blanc, ou blanchâtre, un peu pointillé de brun; la partie brune est séparée de la couleur grise de la base par une ligne tortueuse d'un blanc rosé; cette même partie brune offre, en outre, à l'extrémité, une lunule d'un gris rosé, et s'appuie, vers l'angle anal, sur une éclaircie d'un blanc grissère.

Les ailes inférieures sont grisâtres avec le disque rembruni. Le corselet et l'abdomen sont d'un gris brunâtre.

Le dessous des ailes est d'un brun tanné, avec une tache costale blanche, sur le tiers postérieur des supérieures. La brosse anale est étalée en éventail dans les mâles.

Cette espèce est assez rare. Elle habite la Guyane et le Brésil. Beake l'a élevée de chenille sur une espèce de vigne sauvage. Quid?

Coll. Bd.

### 8. E.? PROMINENS.

Engo prominens, Walker, Heterocera, p. 115, 4.

Nous n'avons jamais vu cette espèce. Nous la décrivons d'après M. Walker. Elle est d'un ferrugineux verdatre. Ses ailes supérieures sont traversées par plusieurs lignes obliques, brunes, ondulées et marquées d'un stigmate noir.

Les ailes inférieures sont d'un fauve sale, avec l'extrémité et l'angle apical d'un brun foncé.

Le dessous des ailes est d'un roux testacé.

Brésil. Collection de M. Saunders.

### GENRE TRICHOLON. Boisd.

Chemille. Elle nous est inconnue.

Insecte parfait: Tête assez petite, offrant une carène de poils serrés. Antennes longues, fortement dentées dans le mâle, se terminant insensiblement en une pointe recourbée en crochet. Palpes très-velus, un peu écartés, ne dépassant pas le front. Trompe de la longueur du corps. Yeux petits, arrondis. Corselet assez robuste, avec les ptérigodes distinctes. Abdomen conique, terminé, dans les mâles, pr une petite brosse offrant, dans son milieu, une petite prints bien indiquée. Ailes dentées, les supérieures anguleuss, avec l'angle interne un peu arqué.

Ce genre semble faire le passage aux Epistor.

Nous ne possédons qu'une seule espèce. La chenille, sur laquelle nous n'avons aucuns renseignements, doit être parfaitement connue des entomologistes des Etats-Unis.

### T. INSCRIPTUM.

Harris, Descript. Catal. — Thyrous? inscriptum, Walker, Heterocea, p. 104.

Il a le port et la taille du Nessus figuré par Cramer, pl. 167. Ses ailes fortement dentées et anguleuses sont grises, avec des bandes transversales brunes, dont une près de la base, une seconde bifide, ou même double, un peu avant le milieu, et enfin, la troisième située entre le stigmate et l'extrémité, est plus large et se prolonge extérieurement, en formant une espèce d'angle qui va presque jusqu'au bord terminal; ce dernier a les échancrures bordées de brun; près du sommet, il existe encore dans les deux sexes un zigzag blanc, qui dans la femelle se prolonge un peu le long de la bordure brune.

Les ailes inférieures sont d'un roux un peu ferrugineux, aves l'extrémité un peu brunâtre. Dans la femelle, on voit, en outre, au-delà du milieu, une bande transverse, étroite de couleur brune.

Le corselet est varié de gris et de brun.

L'abdomen est d'un gris brunâtre et offre sur chacun des côtés une rangée de petites taches noires.

Le dessous des ailes inférieures est d'un gris blanchâtre aves des raies transversales brunes; celui des supérieures est un pes brunâtre, avec l'extrémité bordée de ferrugineux et de brun.

Décrit sur deux individus mâle et femelle, élevés de chenilles, que nous devons à l'obligeance de feu Lederer, de Vienne.

Coll. Bd.

GENER OCYTON. Boisd. — Lophura. Boisd. olim. — Walker.

Premiers états : Inconnus.

Insecte parfait: Palpes velus, écailleux, avec le second article très-obtus. Trompe plus courte que le corps. Antennes un peu denticulées dans les mâles, de longueur moyenne, terminées par une petite pointe, plus grêles et presque cylindriques chez les femelles. Yeux relativement grands. Corselet sans épaulettes distinctes. Abdomen cylindrico-conique, terminé, chez les mâles, par un petit faisceau de poils. Ailes peu brillantes; les supérieures sans dentelures, seulement un peu sinuées au-dessous du sommet, avec l'angle anal un peu arqué; les inférieures un peu echancrées vers l'angle anal.

Nous avons établi ce petit genre sur une espèce unique de l'Afrique australe; elle se lie évidemment avec le genre Aspledon, dont elle diffère par ses ailes supérieures sans dentelures.

## 1. O. TYRRHUS. Boisd.

Lophura Tyrrhus, Boisd. in Delegorgue, Voy. dans l'Afriq. austral. p. 594, 103.

Dans l'appendice à l'ouvrage de Delegorgue, nous avions placé provisoirement cette espèce dans notre genre *Lophura*. Mais elle s'en éloigne suffisamment pour motiver la création d'un sous-genre propre.

Elle est un peu plus petite qu'un C. Porcellus. Ses ailes supérieures un peu sinuées au sommet sont d'un gris-cendré plus en moins clair, traversées par quelques lignes doubles, ondulées, très-peu distinctes, d'une couleur un peu plus obscure; outre cela, elles offrent à partir de la côte, au-delà de la cellule discoidale, une ombre brunâtre, courbe, transversale, et vers l'angle spical, un commencement de bordure de la même couleur.

Les ailes inférieures sont ferrugineuses avec une petite bordure brune.

Le corselet et l'abdomen sont de la couleur des premières alles.

Le dessous des ailes est d'un ferrugineux pâle, avec la bedure un peu brunâtre.

Port-Natal, Caffrerie. Nous avons vu, dans la collection recueillie par M. Drège dans l'Afrique australe, des individus tellement purs que nous avons pensé qu'ils avaient été élevés de chenilles.

Coll. Bd.

#### O. Murina.

Diodesma murina, Walker, Heterocera, p. 163, 1.

Il est de la taille du *Tyrrhus* dont il paraît être voisin. Il d'un cendré ferrugiquex. Le corselet est sans taches. L'abdomnoffre une ligne dorsale, noirâtre, interrompue, très-peu indepuée.

Les ailes supérieures sont cendrées, un peu luisantes, avideux taches noirâtres, dont l'une sous-costale et l'autre sous apicale; outre cela, il y a, en arrière de la tache sous-costale, une raie ferrugineuse, peu marquée, et les nervures du bord terminal sont un peu noirâtres.

Les ailes inférieures sont ferrugineuses avec la bordure brune.

Comme on le voit par cette description concise, il a de grant rapports avec notre Tyrrhus.

Port-Natal. - British Museum.

### 3. O. Confusum.

Panacra confusa, Walker, Heterocera, p. 161, 10.

Il a le port et la taille du Tyrrhus dont il nous paraît étse assez voisin.

Il est d'un brun cendré. La tête et le corselet sont marque d'une ligne plus obscure.

L'abdomen offre en dessous une double série de points note.

Les ailes supérieures ont des lignes ondulées, obliques, un plus obscures que le fond; le stigmate est brun ainsi qu'un pace assez grand situé sous la côte.

Les ailes inférieures sont ferrugineuses avec le bord termissi un peu plus obscur.

Port-Natal. British Museum. Walker.

Comme on le voit par cette courte description, il a un certain

support avec le Tyrrhus; mais chez ce dernier, il n'y a ni stigmais distinct, ni une double série de points noirs sur le ventre.

GENRE ASPLEDON. Boisd. — Lophura. Boisd. olim.

Chemilles: Inconnues.

Pales rapprochés, couverts de poils très-serrés, ne dépasment pas le chaperon. Yeux gros et arrondis. Antennes asme fortes, de longueur moyenne, terminées par un trèspatit crochet, un peu plus grosses et un peu scabres chez males. Trompe à peu près de la longueur du corps. Conselet convexe, assez robuste, à épaulettes indistinctes. Abdomen cylindrico-conique, terminé, dans les males, par petit pinceau de poils. Ailes dentées et anguleuses; les impérieures arquées vers l'angle anal.

Les Asplédons sont propres à l'Afrique australe. Ils ont certain air de parenté avec les Ptérogons et les Lophura. Ils on Delegorgue, ils viennent le soir butiner sur les fleurs. Ils certaines localités, ils sont communs et on pourrait en prendre une certaine quantité.

t

# 4. A. Dorus.

Boisd. in Delegorgue, Voy. en Afriq. austral. p. 594, 102.

Il est de la taille d'un Porcellus. Ses ailes supérieures, profonfinent dentées à l'extrémité et fortement sinuées le long du tra interne, sont d'une teinte olivâtre, avec l'extrémité apicale requée d'une tache triangulaire, d'un blanc grisâtre, coupée requelques petites lignes brunâtres, obsolètes; il y a aussi un tre de grisâtre sur l'angle anal.

Les ailes inférieures sont brunâtres avec l'angle anal gri-

Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est un peu plus clair avec les deux premiers seg-

Le dessous des ailes est d'un brun roussatre.

Lépidoptères. Tome 1.

Il se trouve en Caffrerie et à Natal. Les individus que l'on au ramollir pour les étaler perdent leur couleur verdâtre et devisnent brunâtres.

Coll. Bd.

### 2. A. ZANTHUS.

Boisd. in Herrich-Schæffer, 105.

Il est fort possible que notre Zanthus ne soit qu'une altération du Dorus dont la couleur verte a disparu par l'effet de l'husidité. Il a tout à fait le même port, la même taille et les même dentelures. Ses ailes supérieures sont brunes avec une grande tache triangulaire d'un gris cendré, vers l'extrémité apicals; cette grande tache, séparée nettement et obliquement de la corleur brune, est marquée sur la côte d'une petite tache brune; on voit encore près de l'angle anal une petite tache gristre.

Les ailes inférieures sont brunes, un peu plus claires antirieurement, avec l'angle anal cendré.

Le corselet et l'abdomen participent de la couleur des siles; la brosse anale est assez prononcée dans les mâles.

Le dessous des ailes est d'un brun-ferrugineux clair. Caffrerie.

Coll. Bd. — On voit par cette description que le Zanthus me diffère guère du Dorus que par la couleur du fond.

### 3. A. Briszeus.

Boisd. in Delegorg. Voy. dans l'Afrique austr. p. 394, 100. — Walker, Heterocera, p. 106, 2.

Il est un peu plus petit qu'un Porcellus, et ses ailes anguleuses lui donnent presque le facies d'un petit Smérinthe. Les supérieures sont grises ou d'un gris un peu violâtre; elles sont marquéel entre la base et l'extrémité de trois bandes courbes, transverses brunes, plus ou moins divisées dans le sens de leur longueur, par une petite ligne obsolète, de la couleur du fond; le stigmate est blanc, très-petit, cerclé de brun; l'extrémité, vers le sommet, est brune ainsi que l'angle anal; la partie brune apicale est précédée sur la côte, en dedans de la troisième bande, d'une tache de la même couleur, et suivie vers le milieu du bord terminal, d'une petite lunule également de couleur brune.

Les ailes inférieures sont d'un jaune-d'ocre un peu fauve avec une large bordure d'un brun roux.

Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est d'un brun teinté de ferrugineux.

Le dessous des ailes et du corps est entièrement ferrugineux.

il se trouve en Caffrerie où il a été élevé de chenille par M. Drège. Delegorgue a retrouvé abondamment cette espèce dans le pays des Amazoulous, voltigeant le soir au bord d'un lac fréquenté par des hippopotames.

Coll. Bd.

## 4. A. DICANUS.

Boisd. in Delegorg. Voy. dans l'Afriq. austr. p. 594, 101. — Tomora plagiata, Walker, Heterocera, p. 105, 2.

Il est de la taille d'un Porcellus. Ses ailes supérieures sont d'un gris un peu roussâtre, avec une grande tache brune presque triangulaire, située sur la côte, un peu en dehors du stigmate; celui-ci est noir pupillé de blanchâtre; au-dessous de la tache les premières nervures sont jaunâtres; outre cela, on voit sur les ailes l'apparence de quelques bandes obsolètes, et près du sommet, sur la côte, une tache brunâtre; le milieu du bord interne et l'angle anal offrent aussi des espaces d'un brun plus obscur que la teinte générale.

Les ailes inférieures sont d'un brun roussâtre, avec la bordure plus obscure; celle-ci est précédée chez la femelle d'une raie brune obsolète.

Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est d'un brun roussâtre.

Le dessous des ailes est d'un brun noirâtre.

Cette espèce, qui touche d'assez près aux Ptérogons, a été trouvée en Caffrerie par M. Drège, et dans le pays des Amazoulous par Delegorgue.

Coll. Bd.

### 5. A. MARGINATUM.

Dorapsa marginata, Walker, Heterocera, p. 185, 5.

Il est de la taille du *Dicanus*, dont il nous paraît se rapprocher beaucoup, autant qu'on en peut juger par la courte description de M. Walker. Il est de la taille du *Dicanus*. Sa couleur est ferrugineuse. L'abdomen est légèrement fascié de bandes un peu lilacées.

Les ailes supérieures sont légèrement lilacées, ou un peu blanchâtres avec une large tache brune, triangulaire vers le milieu, et une bande de la même couleur près du bord terminal.

Les ailes inférieures sont ombrées de brunâtre, ou quelquefois avec une bordure brune.

Natal. - British Museum. - Walker.

Si cette espèce n'est pas la même que notre *Dicanus*, elle en est très-voisine et doit, dans tous les cas, prendre place dans notre genre Aspledon.

++

## 6. A. PYLAS.

Cramer, 206, A. - Lophura Pylas, Walker, Heterocera, p. 106, 1.

Nous ne connaissons ce petit sphingide que par la figure qu'en a donné Cramer.

Selon cet iconographe, ses ailes supérieures sont d'une couleur violatre avec deux petites raies géminées, noires, placées entre la base et le milieu du disque. Outre cela, elles offrent, un peu audelà du milieu, une bande transversale, courbe, d'un jaune-doré pâle; au-dessous de l'échancrure du sommet il y a aussi une tache lunulaire rousse, précédée de deux points d'un gris bleuatre.

Les ailes inférieures sont échancrées comme dans *Brisœus* et espèces voisines; elles sont d'un jaune fauve vers la base, avec une large bordure d'un brun ferrugineux.

Le corselet et l'abdomen sont d'un brun roussâtre.

Le dessous des ailes, selon Cramer, est d'un rouge brun avec la base un peu jaune.

Cramer le dit de Surinam, mais nous sommes porté à croire qu'il y a là une erreur d'habitat. Son analogie avec les autres espèces d'Aspledon, semble indiquer que sa patrie serait plutôt le cap de Bonne-Espérance.

+++

# 7. A.? SARDANUS. Boisd.

Enyo Sardanus, Walker, Heterocera, p. 116, 7.

Un peu plus petit que l'Epistor lugubris, et d'un brun noir.

Ses ailes supérieures, très-aiguës au sommet, sont variées d'un peu de gris.

Les ailes inférieures sont à peine plus pâles que les supérieures.

Le dessous est d'un brun noirâtre.

L'abdomen est marqué de trois rangs de taches jaunâtres trèsabsolètes.

Nous ne savons trop où placer ce petit sphingide qui s'éloigne un peu des autres espèces par ses ailes supérieures aiguës au sommet et fortement arquées à l'angle interne. On devra peut-être en faire un sous-genre à part. M. Walker le met dans son genre Esso près de Lictus, lugubris, etc.; c'est ce que nous avions fait aussi autrefois, mais nous croyons aujourd'hui, qu'il appartient plutôt à notre genre Aspledon, qui se compose uniquement d'espèces africaines.

Nous avons décrit cette espèce au British Museum, sur un exemplaire unique envoyé de Sierra-Leone, par le révérend D. F. Morgan. — Très-rare.

### GENRE LOPHURA. Boisd. - Walker. - Moore.

La Chenille, selon M. Lorquin, qui l'a élevée à Manille, est très-petite, allongée, atténuée antérieurement, avec une petite tête globuleuse et une corne très-courte sur le onzième segment.

Chrysalide: Cylindrico-conique, non comprimée antérieurement.

Insecte parfait: Tête de grosseur moyenne. Antennes peu allongées, un peu dentées dans les mâles, assez raides, se terminant insensiblement en un crochet grêle. Palpes très-velus, rapprochés, ne dépassant pas le front. Trompe de la longueur du corps. Yeux petits, arrondis. Corselet bombé, assez robuste, avec les ptérigodes non indiquées. Abdomen relativement assez fort, conique dans les femelles, terminé chez le mâle, par un pinceau de poils étalés en queue d'oiseau. Ailes supérieures sinuées, avec l'angle interne arqué.

M. Herrich-Schæffer observe que le mot de Lophura a

déjà été employé pour un genre d'oiseaux et un genre de poissons; mais comme il ne l'a jamais été en entomologie, nous ne voyons pas le moindre inconvénient à ce qu'il soit appliqué à un genre de Sphingides.

Ce petit genre, composé jusqu'à présent de deux espècs propres à l'Asie, se lie intimement avec les Ptérogons.

## 1. L. HYAS. Boisd.

Walker, List. Lep. Brit. Mus. Het. pt. VIII, p. 107. — Moore, Cat. of Lep. of india Comp. p. 263, 607.

Il n'est guère plus grand qu'une Zygœna transalpina. Se ailes supérieures sont d'un brun-pâle un peu violacé, marqués au-dessous du milieu de la côte, d'une tache noire, coupée oblquement par un trait blanc; elles offrent, en outre, vers le bord interne et l'extrémité, des espaces noirâtres, sans compter queques petites lignes transverses ondulées, situées entre la tache costale et le bord terminal.

Les ailes inférieures sont un jaune orangé avec la bordure noire. Le corselet et l'abdomen sont relativement robustes, de colleur brune; ce dernier est terminé chez le mâle par une brossé étalée en queue d'oiseau.

Le dessous des ailes inférieures est jaune, avec la bordure se quelques petites lignes brunes; celui des supérieures est brus, marqué d'un peu de jaune. Le ventre est ferrugineux avec que tre points blancs placés sur les derniers anneaux.

La chenille de cette petite espèce a été élevée anx îles Philippines par M. Lorquin sur une plante qui nous semble appartent à la famille des Rubiacées, mais en trop mauvais état pour pouvoir être déterminée. Cette chenille, d'après une de ses notes, ressemble pour la forme à celle de notre stellatarum; elle et verte ou d'un vert roussatre, pointillée de noiratre, avec une rais latérale de la même couleur sur les premiers anneaux, surmostant une raie blanchâtre qui s'étend jusqu'à l'origine de la corne.

Horsfield a aussi élevé cette même chenille à Java sur us Pæderia.

Le Lophura Hyas se trouve à Sylhet, à Java et aux îles Philippines.

Coll. Bd.

### 2. L. Pumilio. Boisd.

Il s'est pas plus grand qu'une Zygæna trifolii. Ses alles suphieures sont brunâtres, avec quelques espaces plus obscurs, un pa ferrugineux, vers l'extrémité et sur le bord interne; ce dersier est marqué d'un petit arc blanc; on voit, en outre, sur le milieu, entre les deux principales nervures, une rangée longitutinale de trois ou quatre points noirâtres.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocre, avec une bordure des brun un peu ferrugineux.

Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est d'un brun un peu jaunatre.

Le dessous des ailes est un peu roussatre, pointillé de brun.

Ce petit Sphingide, le plus petit de toutes les espèces connues, se trouve à Sylhet. — Très-rare.

Coll. Bd.

### GENRE PTEROGON. Boisd.

Macroglossa, Ochs. — Sphinx auctorum. — Proserpinus et Lophura, Walker.

Chevilles: Lisses, avec une petite tête globuleuse; pourvues ordinairement d'une plaque lenticulaire sur le onzième segment, ou d'une petite corne peu saillante.

Chrysalides: Cylindrico-coniques.

Insecte parfait: Antennes raides, assez courtes, minces à leur base, presque claviformes, striées transversalement ou crénelées dans les mâles. Palpes velus, séparés du front et dépassant le chaperon. Trompe de la longueur du corps. Yeux ronds, couverts en partie par des cils. Corselet large evec le collier et les ptérigodes bien marqués. Abdomen court, sub-conique, terminé en brosse à l'extrémité, principalement dans les mâles. Ailes dentées plus ou moins anguleuses avec le bord interne arqué.

Les Ptérogons volent le soir après le coucher du soleil et restent cachés pendant le jour. Leurs chenilles, au moins elles que l'on connaît, vivent de plantes basses : Onagraires n Rubiacées.

## 1. P. ŒNOTHERÆ.

Rsper, Schm. II, Th. tab. XX, Suppl. II, S. 167, tab. XXVI. — II. Sphing. tab. 9, f. 58. — Ochs. — Borkh. Fabr. God. etc. — Le Sphing de l'Epilobe, Engr. pl. 121, fig. 166.

Cette espèce, bien connue des entomologistes, existe dans tous les collections.

Ses ailes supérieures sont d'un blanc grisatre avec l'extrémité olivatre et le milieu traversé par une large bande courbe, d'un vert olive; cette bande s'élargit vers la côte où elle est marqués d'un stigmate noir, cerclé de blanchâtre.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocre avec une bordure noire et la frange blanche.

Le corselet est d'un gris verdâtre avec les épaulettes d'un verolive foncé.

L'abdomen est d'un gris verdâtre avec les incisions plus pales. Le dessous des ailes est d'un vert-olivâtre avec une bande transversale blanchâtre.

La chenille est verte, mouchetée de noirâtre dans son premier âge. Après la seconde mue, elle devient brune avec le ventre si les côtés blanchâtres; ces derniers offrent sur chacun des anneaux un trait noir oblique; ses stigmates sont ferrugineux, cerclés de noir; le onzième anneau présente au lieu de comme un écusson lenticulaire qui en tient lieu.

Cette chenille que nous avons fait figurer dans notre longraphie, Sphingides, pl. 18, fig. 1, vit sur l'épilobe à feuilles de romarin, Epilobium angustifolium, dans les lieux rocailleux exposés au soleil. Nous l'avons trouvée communément aux environs de Grenoble, vivant de compagnie avec celle du Vesperille. Pendant le jour, elle se cache et ne se montre que le soir. On l'a trouvée quelquefois aussi, mais rarement, aux environs de Paris, au bord des étangs sur l'Epilobium hirsutum. Le plus généralement la chrysalide passe l'hiver et éclôt en mai.

### P. Pumilum.

Boisd. in Delegorg. Voy. dans l'Afriq. aust. II, p. 394, 99.

Il est à peu près de la taille du Gorgoniades, peut-être même un peu plus petit. Ses ailes supérieures sont d'un gris blanchâte, marquées vers le milieu de la côte, d'une tache triangulaire brune, liserée de blanc sur son côlé interne; elles ont, en outre, vus la base une petite raie longitudinale, et sur le bord interne une tache de la même couleur; le bord terminal près de la frange est aussi un peu entrecoupé de brun.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocre avec la bordure

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est brunâtre avec une rangée de petits points Mancs sur chacun de ses côtés.

Le dessous des ailes inférieures est d'un jaune sale, avec la herdure plus obscure; celui des supérieures est brunâtre avec un petit arc blanc au-dessous du milieu de la côte.

ll a été trouvé en Caffrerie par M. Drège et au pays des Amasselous par Delegorgue.

Coll. Bd. - Très-rare.

### 3. P. GORGONIADES.

Hubn. Verz. — Boisd. Laft. fasth. — Boisd. Icones, pl. 48, fig. 6. — Bepoach. Suppl. pl. 3, f. 2. — Bphinæ Gorgon, Esp. II, Th. tab. 47. — Bebs. Sphing. f. 102.

Il est d'un tiers plus petit que l'ænotheræ. Ses ailes supérieures sent d'un gris blanc, avec deux bandes obliques brunes, dont une vers la base, un peu interrompue, et l'autre vers le milieu, un peu sinuée, formant en dehors un angle aigu; près de la côte, le côté interne de cette bande est précédé d'une petite tache noire excadrée de blanc; l'extrémité est variée de blanc grisatre et de brun; on remarque, en outre, sur la côte, avant le sommet, une petite tache noirâtre.

Les ailes inférieures sont brunâtres, avec l'empreinte d'une lette raie transversale, un peu plus pâle.

Le corselet est d'un gris blanchâtre varié de brun.

L'abdomen est gris, marqué de trois points blancs sur chacun de ses côtés.

Le dessous des ailes inférieures est blanchâtre, avec deux raies transverses et la bordure brunes; celui des supérieures est brun avec quelques taches blanchâtres.

La femelle ressemble au mâle, sauf qu'elle est dépourvue d'un pinceau anal.

Il habite les bords du Volga.

La chenille vit au bord du Volga sur plusieurs espèces de Celium. Dans sa jeunesse elle est verte, avec des raies blanches longitudinales. Lorsqu'elle est adulte, elle devient d'un gris henatre avec des raies parallèles noirâtres, dont une dorsale et den latérales. L'avant-dernier anneau est muni d'une petits come d'un gris noirâtre.

Décrit sur deux individus ex larva que nous avons reçus dans le temps de Kindermann père. — Toujours très-rare dans le collections.

A l'exemple de Hubner, nous avons changé le nom de Gergen en celui de Gorgoniades, attendu que Cramer a déjà figuré, pl. 142, un Sphinx sous le nom de Gorgon.

## 4. P. NANUM.

Boisd. in Delegorg. Voy. dans l'Afriq. austr. II, p. 394, 98. — Lephura nana, Walker, Heterocera, p. 107, 4.

Il est de la taille d'une Zygæna filipendulæ, mais son corps et relativement fort gros. Ses ailes supérieures sont d'un brun clair, marquées au-dessous du milieu de la côte d'une tache triangulaire d'un brun foncé, coupée par un petit trait blanchâtre suivie en dehors d'un petit point costal brun; on voit, en oute, vers le milieu du bord interne, une petite tache carrée de la même couleur, suivie en dehors d'un petit point brun non lois de l'angle anal; à la base sur le bord costal, il y a aussi une petite tache oblongue brune; le bord terminal près de la frange offre également quelques espaces bruns.

Les ailes inférieures sont d'un brun roussatre.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est roussâtre.

Le dessous des ailes est d'un brun ferrugineux.

Décrit sur deux individus pris par Delegorque dans le par des Amazoulous. — Coll. Bd.

GENRE POGOCOLON. Boisd. — Sphinx auctorum. —
Pterogon. Boisd. olim. — Thyreus. Walker.

Chenilles: Amincies antérieurement avec la tête petits, globuleuse, et le onzième segment pourvu d'une petits corne semblable à celle des Macroglosses.

# Chrysalides: Cylindrico-coniques.

Insecte parfait: Tête assez grosse; antennes assez longues, légèrement dentelées dans les mâles, terminées par un crochet très-prononcé. Palpes très-velus, très-rapprochés, ne dépassant pas le front. Trompe de la longueur du corps. Yeux ronds de grosseur moyenne, Corselet robuste, très-velu, avec les ptérigodes peu distinctes. Abdomen déprimé en dessus et terminé en brosse comme dans les Macroglosses. Ailes dentées, anguleuses, avec l'angle interne arqué.

Les Pogocolons volent en plein jour sur les fleurs sans s'arrêter, comme notre stellatarum. Les deux espèces que nous connaissons sont propres aux Etats-Unis. Leurs chenilles vivent sur les Onagraires et sur les Rubiscées.

Ce genre diffère essentiellement des Ptérogons par la forme des antennes.

# 1. P. GAURÆ.

Smith-Abbot, Lepid. of Georg. vol. I, tab. 31. — Thyreus Gaura, Walker, Heterocera, p. 100, 3.

Il est plus petit qu'un Ch. Porcellus. Ses ailes supérieures sont d'un gris-blanchâtre un peu rosé, traversées au milieu par une large bande d'un vert olive, marquée près de la côte d'un stigmate noir encadré de blanchâtre; outre cela, on voit, près de l'origine de l'aile, une tache olivâtre, et à l'extrémité une bordure de la même couleur.

Les ailes inférieures sont d'un roux-ferrugineux vif, avec une petite bordure brune et une bande transversale un peu plus obsrure que le fond, principalement dans la femelle.

Le corselet est de couleur olive.

L'abdomen est d'un gris brunâtre, avec la brosse anale étalée, d'un brun roussâtre.

Le dessous des ailes est ferrugineux, sablé de brun.

La chenille, dont nous possédons deux dessins exécutés par Abbot en Georgie, varie un peu pour le fond de la couleur qui est tantôt d'un vert clair et tantôt d'un vert obscur. Elle est marquée sur le dos d'une bande noire, interrompue sur chaque anneau, où elle forme une tache oblongue liserée de blane; de offre en outre, le long des côtés, une rangée de taches oblique, ferrugineuses, bordées de blanc, et séparées de la bande domb par une rangée de points noirs; la corne est courte et droite; le ventre et les pattes membraneuses sont d'un roux ferrugineux.

Elle vit sur plusieurs espèces de plantes de la famille des engraires et sur quelques Rubiacées.

Abbot en a donné un dessin sur le Gaura biennis. Georgie d'Amérique.

Coll. Bd. - Rare.

# 2. P. CLARKLE.

Boisd. Lep. de la Calif. 1r part. p. 40, 84.

Il a tout-à-fait le port et la taille du Gauræ de la Georgie. Se ailes supérieures sont d'un vert olive, avec l'extrémité lavée à blanc verdâtre, et une bande transverse, blanchâtre, assez étoits.

Les ailes inférieures sont du même jaune que dans le Pterogen œnotheræ, avec une petite bordure d'un brun noirâtre.

Le corselet et l'abdomen sont d'un vert olivâtre.

Le dessous des ailes est d'un vert olivâtre, avec une bande blanchâtre sur les inférieures.

Californie. — Coll. Bd. — Très-rare.

Nous avions donné à cette jolie petite espèce le nom de Clarkiæ, à cause de son analogie avec le Gauræ, supposant que se chenille devait vivre sur quelques Onagraires Californiennes; cette supposition a été confirmée par Lorquin, qui l'a découver sur le Clarkia pulchella, au bord de la rivière de la Plume.

#### 3. P. Nessus.

Cramer, 107, D. — Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 355, 2. — Thyreus No. 5us, Walker, Heterocera, p. 99, 2.

Il est presque de la taille d'un Ch. Porcellus. Ses ailes suprieures, dentées et très-anguleuses, sont d'un brun un peu gisatre, traversées, un peu obliquement au milieu, par une bande d'un brun-noir, un peu bifide sur la côte; outre cela, elles offrent, avant le bord terminal, une bande un peu sinuée de la même couleur.

Les ailes inférieures sont d'un roux ferrugineux, avec une bordure d'un brun noirâtre.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est noirâtre, avec un anneau d'un jaune soufre sur le dos. La brosse anale est noire. Chez la femelle, il y a souvent deux anneaux d'un jaune soufre.

Le dessous des ailes est ferrugineux avec la bordure brune.

La chenille, d'après un beau dessin d'Abbot, a la même forme que celle de notre M. stellatarum. Elle est d'un vert un peu jaunaire, avec une bande longitudinale allant de chaque côté se terminer à la base de la corne; celle-ci est d'un rouge un peu rose; les stigmates sont blancs cerclés de noir. Elle vit sur les Rubiacées et quelquefois sur les vignes.

Il habite les Etats-Unis. Rare.

Le British Museum en possède deux très-beaux exemplaires élevés de chenilles.

Coll. Bd.

### GENRE ANGONYX.

Premiers états: Entièrement inconnus.

Insecte parfait: Antennes longues, terminées par une pointe amincie. Palpes très-épais, larges, très-obtus, un peu écartés, recouverts de petits poils très-serrés. Trompe de la longueur du corps. Yeux grands. Corselet cylindroïde, convexe; épaulettes confondues avec les poils du thorax. Abdomen cylindroïde, peu conique, terminé par une petite brosse, offrant dans le mâle vers la région anale des pinces génitales extrêmement saillantes. Ailes supérieures larges, relativament assez courtes, fortement sinuées, avec le bord interne saillant. Ailes inférieures un peu échancrées vers l'angle anal.

L'insecte unique, sur lequel nous établissons ce sousgenre, appartient évidemment à la tribu des Macroglossides. Selon M. Lorquin, il butine en plein jour sur les fleurs et va de temps en temps se reposer sur un tronc d'arbre. Son vol est rapide, ce qui fait qu'on le perd de vue et que c'est à force de patience et après une peine infinie qu'il a pu saisir un individu.

### A. EMILIA. Boisd.

Ce singulier Sphingide est à peu près de la taille d'un Ch. Percellus. Ses ailes supérieures sont d'un vert-pistache foncé, treversées au milieu par une bande blanche, droite, limitée, près de la côte, par une tache d'un vert plus obscur, un peu sinuée me dedans; toute la région apicale est d'un vert un peu plus clar que le fond, et coupée obliquement, de dehors en dedans, pur une petite raie noire, un peu anguleuse.

Les ailes inférieures sont brunes, avec le bord costal blanchtre et une bande transversale, mal écrite, d'un roux testaci; l'angle anal est un peu grisâtre.

Le corselet est vert comme les premières ailes.

L'abdomen est roussâtre.

Le dessous des ailes est d'un jaune ochracé, avec le disque de supérieures un peu brun. Le ventre, la poitrine et les palpes sont blancs.

Décrit sur un individu unique que nous devons à la muniscence de Lorquin.

Cette rare et nouvelle espèce, que nous avons dédiée à Mª Emilie Lorquin, a été prise par son mari sur le tronc d'un arbre das l'île de Ternate.

## GENRE CENOSANDA. Walker. — Bræssia. Boisd. M.

Nous ne savons trop où placer ce genre, dont les premiers états nous sont complétement inconnus. Nous le rapprochons provisoirement des *Perigonia* avec lesquelles il a un peu d'analogie par la couleur de ses ailes inférieures.

Insecte parfait: Palpes très-velus, un peu écartés, asset développés, ne dépassant pas le front. Yeux gros, arrondis. Antennes grêles, relativement longues, à peu près d'égale grosseur dans toute leur longueur, terminées par un long crochet. Trompe aussi longue que le corps. Corselet convexe à épaulettes non distinctes. Abdomen court, obtus dans les mâles, cylindroïde et un peu pointu chez les femelles. Ailes entières; les inférieures jaunes avec une large

bordure noire, comme dans les Noctuélides du genre Tri-

Nous ne connaissons que deux espèces.

## 1. Œ. Noctulformis.

Walker, Cat. Brit. Mus. part. VIII, p. 322. — Grote, Proced. of the Enternol. Society of Philadelphia, vol. V, nº 1, p. 79. — Brassia Triphensides Bolsd. M.

Ce petit Sphingide est d'un grand tiers moins grand que le M. stellatsrams; il a 3 centim. 1/2 d'envergure. Ses ailes supérieures sunt d'un gris cendré, avec quelques ondes transverses plus obscures et une très-petite ligne noirâtre ondulée, un peu interrompe, près du bord terminal; outre cela, il y a une petite éclaircie lianche à la place du stigmate, et la frange est entrecoupée de seix.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocre, avec une large bedure noire comme dans notre Triphæna Janthina.

Le corselet est entièrement d'un gris cendré,

L'abdomen est aussi d'un gris cendré, avec l'apparence de deux

Le dessous des ailes est brun, avec la base des inférieures jaune. Le ventre, la poitrine et les palpes sont d'un blanc un peu lavé de jaunâtre.

I se trouve aux Antilles. — Coll. Bd.

### 2. Œ. SPURIA. Boiad.

Il est notablement plus grand que le précédent. Ses ailes supérieures sont noirâtres, variées de blanc dans leur miffeu et à l'entrémité. Sur la partie blanchâtre du milieu, on aperçoit deux lignes noires, oudulées, et sur celle de l'extrémité, une ligne onluiée noirâtre; le stigmate est blanc; la frange est noire entrebunée de blanc.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'oore, avec une large virdure noire.

Le corselet est brun avec le collier blanchâtre mélangé de quelmes écailles brunes.

L'abdomen est brun avec les anneaux du milieu d'un brun plus

Le dessous des ailes est d'un noir brunâtre, avec la hass des inférieures jaune. Le ventre est d'un gris blanchâtre dans sa moitié antérieure. La poitrine et les palpes sont d'un blanc contr.

Décrit sur un individu très-pur que nous avons reçu du Mesque.

# GENRE PERIGONIA. Boisd.

Premiers états: Inconnus.

Insecte parfait: Palpes épais, très-courts, ne dépassant pas le chaperon, couverts de poils serrés. Trompe un pes moins longue que le corps. Antennes allongées, assez grêss dans les femelles, plus grosses et dentées chez les mâles, terminées par un petit crochet bien indiqué. Corselet asses robuste. Abdomen cylindroïde, obtus, terminé dans les mâles par une brosse de médiocre longueur, étalée en queue d'oiseau, et dans les femelles par un élargissement tronqué, cilié. Ailes supérieures un peu sinuées, ou anguleuses, toujours arquées à leur angle interne.

Les Périgonies sont toutes propres aux contrées intertropicales de l'Amérique; elles semblent faire le passes des *Epistor* aux Macroglosses. Elles se rapprochent surtout de ces derniers, par leurs ailes inférieures ordinairement marquées de jaune. Nous ne savons pas si elles volat en plein jour ou bien si elles ne se montrent que le soir comme les *Epistor* et les *Pterogon*.

Ailes dentées et anguleuses.

# 1. P. MAGNA.

Felder, Novara, Exped. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 75, f. 12.

C'est la plus grande des *Perigonia* connues. Elle a 7 centis. d'envergure.

Ses ailes supérieures sont d'une teinte brunâtre violacée, lavée de blanchâtre. Entre la base et le milieu, elles sont traversées per quatre raies brunes. Le stigmate est blanc, très-petit, et limite une sorte de grande tache presque triangulaire d'un brun noirètre, marquée, au-dessous du sommet, d'une lunule marginale assez grande d'un blanc grisâtre.

Les ailes inférieures ont la partie antérieure d'un fauve vif, avec une petite lunule discoïdale noire; la bordure est noire, très-large et occupe plus de la moitié de la surface; elle est marquée, vers l'angle anal, de trois traits superposés d'un gris blanchitre.

Le corselet est de la couleur des premières ailes, avec les épaulettes bordées inférieurement d'un peu de fauve.

L'abdomen est brun en dessus, avec les côtes un peu grisâtres et la base marquée d'un anneau fauve à son insertion au corselet; outre cela, il existe, sur le premier et le deuxième segment, une tache dorsale fauve, et tout à fait à l'extrémité, trois taches semblables, dont une de chaque côté du dernier segment, et la troisième à la base de la brosse anale.

Elle se trouve au Para.

# 2. P. STULTA. Boisd.

Perigonia Stutta, Boisd. in Herrich-Schaff. 106.

Cette belle espèce est un peu plus grande que l'Epistor Lugabris. Ses ailes supérieures, très-anguleuses, sont d'un brun divâtre, avec des bandes transversales grisâtres, mal définies; l'augle apical, qui est aigu et un peu falqué, est marqué d'une lunule brune. On pourrait également dire que ces mêmes ailes sont d'un gris un peu violâtre, avec des bandes ou ondes brunes mal définies.

Les ailes inférieures sont jaunes dans leur moitié antérieure, avec une large bordure noire, sinuée en dedans; outre cela, la partie jaune est marquée, au-dessous de la côte, d'une petite lunule noire; l'angle anal offre une petite tache jaune, précédée en dehors, d'un espace grisâtre.

Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est un peu plus pâle avec la brosse anale brune.

Le dessous des ailes est ferrugineux, avec des bandes noires transversales; celui des supérieures offre à l'extrémité, une bande sinuée d'un blanc-ferrugineux luisant. La poitrine et les palpes sont de couleur brune.

Nous avoins reçu cette jolie périgonie de Beske, qui de temps en temps l'élevait de chenille à la Nouvelle-Fribourg.

La figure de cette espèce est assez exacte dans l'ouvrage de M. Herrich-Schæffer, mais elle est faite d'après un exemplaire très-petit. Ceux que nous possédons sont de beaucoup plus grands.

L'honorable M. Walker, ne l'ayant jamais vue, l'a considérée à tort comme identique avec la P. Lusca, dont cependant elle est fort différente, car elle n'appartient pas au même groupe.

## 3. P. COFFEE. Boisd.

Walker, Heterocera, p. 101, 2.

Elle est à peu près de la taille de la Stulta. Ses ailes supérieures, anguleuses, sont panachées et fasciées de brun olivâtre, et de gris un peu incarnat.

Les ailes inférieures ont le disque d'un jaune d'ocre coupé, du milieu de la côte à l'angle interne, par une bande noire; la bordure est également noire, assez large, sinuée en dedans, et marquée, vers l'angle anal qui forme une petite saillie anguleuse, d'un espace d'un gris incarnat, rayé transversalement de noirâtre.

Le corselet est nuancé comme les premières ailes.

L'abdomen est gris. La brosse anale est grisâtre et assez courte. Le dessous des ailes est ferrugineux, sablé de brun, avec une bordure irrégulière, d'un gris-violâtre luisant. Le ventre et la poitrine sont également ferrugineux.

Décrit sur un individu femelle unique, envoyé à Becker par Beske, qui avait élevé la chenille, à la Nouvelle-Fribourg, sur un arbuste du genre *Coffea*, dont, à la vérité, plusieurs espèces sont indigènes du Brésil.

Coll. Bd.

#### 4. P. NICTITANS, Boisd.

Elle a le port et la taille de la Lusca. Ses ailes supérieures, fortement anguleuses, sont d'un brun un peu grisâtre, avec un grand espace triangulaire d'un brun ferrugineux, situé entre le sommet et le milieu; vers le bord terminal, il y a une bordure irrégulière d'un gris-brun-violâtre, séparée de l'espace ferrugineux par une raie noire, sinueuse.

Les ailes inférieures sont d'un fauve testacé, avec deux ou trois petites lignes transversales, noirâtres, plus ou moins bien indiquées, et une bordure d'un brun noirâtre, un peu sinuée intérieurement, surmontée, du côté de la gouttière abdominale, d'un empâtement de sa couleur.



Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est brun, marqué sur le dos de deux ou trois points acirètres alignés, et latéralement sur chacun des deux derniers segments, d'une petite tache ferrugineuse. La brosse anale est brune.

Le dessous des ailes est ferrugineux, fascié de brun. Le ventre est ferrugineux avec deux petites lignes noirâtres parallèles.

Il se trouve au Brésil, dans la province de Minas. — Rare. — Cell. Bd. .

# 5. P. NEPHUS. Boisd.

## Variété Perigonia Alophus, Boisd. M.

Elle est aussi grande que la Stulta, mais ses ailes sont plus étroites et paraissent un peu plus allongées; les supérieures sont anguleuses, d'un gris légèrement roussatre, fasciées de brun, avec un stigmate noir, surmonté d'un point de sa couleur; le tiers posvrieur est fortement rembruni et traversé par quelques petites lignes ondulées blanchâtres. Cette couleur est limitée en dedans, rers l'angle interne, par une ligne blanchâtre courbe plus ou moins bien indiquée; l'angle apical, qui est un peu tronqué, est marqué d'une lunule brune.

Les ailes inférieures sont d'un jaune un peu fauve, avec une large bordure d'un brun noir, marquée, vers l'angle anal, d'une petite raie sinueuse, d'un gris cendré. Sur la partie jaune, audessous de la côte, il y a, comme chez les P. Stulta et Magna, une petite lunule noire.

Le corselet est panaché comme les premières ailes.

L'abdomen est brun avec la brosse anale courte.

Le dessous des ailes est brun, panaché de ferrugineux, avec quelques taches ochracées au sommet des supérieures.

Brésil. — La chenille, selon Beske, est presque semblable à celle de l'Epistor Lugubris. — Coll. Bd.

Nous avons reçu de Bahia des individus plus petits, dont les siles supérieures sont moins panachées de brun et qui différent du type, en ce que la bordure des ailes inférieures est interrompue, à l'angle anal, de manière à former une tache noire isolée. Nous en avions fait une espèce sous le nom d'Alophus; mais ayant en l'occasion de pouvoir comparer plusieurs exemplaires des deux provenances, nous sommes convaincu aujourd'hui que notre Alophus n'est qu'une modification locale du Nephus.

### 6. P. CONTINUA.

Lophura continua, Walker, Heterocera, p. 108. — Perigonis disima Boisd. M.

Nous avions eu cette espèce de Becker; malheureusement el a été détruite dans notre cabinet par le bombardement, en més temps que d'autres Hétérocères, que nous ne remplacerons par bablement jamais.

Elle est de la taille de coffeæ, ferrugineuse en dessus et rom sâtre en dessous.

Le corselet est marqué de deux raies d'un noir brun, liserée de blanchâtre en dedans.

Les ailes supérieures sont traversées par des raies bruntires et marquées d'un double stigmate noir comme dans Nephes outre cela, elles ont le long du bord terminal, une large band noirâtre irrégulière, interrompue, et un espace triangulaire à la même couleur sur le bord interne.

Les ailes inférieures sont jaunes avec une large bordure ne râtre, divisée vers l'angle anal, par une bande ferrugineuse.

Brésil. - British Museum.

Comme nous ne possédons plus cette Périgonie, dont Bedis avait envoyé plusieurs exemplaires en Angleterre, nous reproduisons ici la description qu'en a donné M. Walker.

Ailes un peu sinuées non anguleuses.

## 7. P. CALIGINOSA.

Pachygonia id. Felder, Novara, pl. 75, 10. — Perigonia Nimrol, M. — Grandis, Lucas, M. — Perigonia subhamata? Walker, Heteroof p. 102, 4.

Cette espèce est très-grande et a presque le port d'un Smirinthe. Ses ailes supérieures, aiguës au sommet et un prinches, sont d'un brun-terreux plus ou moins clair avec d'bandes et des raies transversales irrégulières, d'un brun obscioutre cela, le stigmate est d'un gris blanchâtre, et l'on remarq vers l'angle apical une petite tache lenticulaire bien indiquiplus pâle que le fond.

Les ailes inférieures sont brunes avec l'extrémité noirâtre, visée par deux raies parallèles d'un brun-grisâtre pâle. Le corselet et l'abdomen sont de la couleur des ailes ; la brosse anale est brune, large et très-courte chez la femelle.

Le dessous des ailes et du corps est d'un brun-roussatre pâle.

La femelle de cette Périgonie est d'un tiers plus grande que le

måle.

Nous avons recu cette espèce du Mexique et de Honduras.

M. Felder en a fait un genre particulier sous le nom de Pachy-

Nous croyons que la Perigonia subhamata de M. Walker n'est qu'une légère variété de la Caliginosa.

#### 8. P. TENEBROSA.

Simelophia tenebrosa, Feld. Novara, Exped. Zoolog. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 82, f. 3.

Nous ne connaissons pas cette espece, que nous décrivons sur la figure qu'en a donné M. Felder; aussi, ce n'est qu'avec doute que nous la plaçons dans notre genre *Perigonia*.

Elle est un peu plus grande que le M. Tantalus. Ses ailes sup<sup>é</sup>rieures sont brunes avec la base d'un gris violâtre; elles sont traversées, entre la base et le milieu, par deux raies noires, dont la seconde forme une large bande, suivie de deux raies noirâtres, undulées, courbes; outre cela, il y a sur le bord terminal une bande marginale, noirâtre, elliptique.

Les ailes inférieures sont entièrement noires avec un espace lanulé d'an blanc grisatre en dehors de l'angle anal.

Le corselet est un peu olivâtre.

L'abdomen est d'un noir olivâtre avec des anneaux blanchâtres mal définis, sauf celui qui avoisine la base qui est mieux indiqué. La brosse anale paraît être très-peu développée, ce qui semble éloigner un peu cette espèce des *Perigonia*.

Nous ne connaissons pas sa patrie.

### 9. P. LUSCA.

Walker, Cat. B. Mus. part. VIII, p. 101. — Grote, Proced. of the Latom. Society of Philadelph. p. 47. — Boisd. Consid. sur les Lépid. du Guatemala, p. 67. — Sphinx Lusca, Pab. Ent. Syst. III, 1, p. 356, 6.

Elle est un peu plus grande que le M. stellatarum. Ses ailes supérieures, un peu sinuées, sont d'un gris brunâtre, marquées

au milieu d'une bande transversale, assez large, d'un brun divâtre, ordinairement précédée, en dehors, d'un petit stigment de sa couleur; l'extrémité de l'aile est plus ou moins bruns avec une raie courbe d'un brun-noir, suivie en dehors d'un grande lunule grisâtre, divisée par une ligne plus obscure.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande médiane d'an jaune d'ocre, commençant à la côte et finissant brusquement avant le bord abdominal; l'angle anal offre une petite tache jume précédée extérieurement d'un espace cendré.

Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est d'un brun pâle avec une espèce de bané transversale grise sur le milieu du corps. La brosse anale est brune.

Le dessous des ailes inférieures est roussâtre avez deux petites lignes noirâtres, obsolètes. La poitrine, les palpes et les paties sont d'une couleur roussâtre.

Elle se trouve communément à Cuba, à Halti, et probablement dans d'autres Antilles. Nous l'avons reçue aussi de Cayenne et du Guatemala.

## 10. P. ILUS.

Boisd. Consid. sur les Lép. du Guatemala, p. 66.

Elle a le port et la taille de la Perigonia Lusca, mais ses ails supérieures sont notablement plus sinuées. Elles sont d'un bran un peu grisâtre, avec quatre à cinq petites bandes transverse brunes; la dernière de ces bandes limite, près de l'extrémité, une espèce de lunule de la couleur du fond.

Les ailes inférieures sont d'un brun noir avec une bande médiane jaune, assez large, commençant sur le hord costal et se terminant brusquement bien avant le bord abdominal; l'angle anal est marqué d'une tache jaune bien nette, précédée en dehors d'un espace grisâtre un peu obsolète.

Le corselet et l'abdomen sont de la couleur des ailes supérieures.

Le dessous des ailes inférieures est d'un ferrugineux trèclair, avec trois petites lignes transversales, parallèles, noiratres, dentées en scie; la gouttière abdominale est jaune. L'extrémité des ailes supérieures est variée de ferrugineux sur un font production de les palpes sont grisâtres.

Elle se trouve au Mexique, au Guatemala et aux Antilles. — Coll. Bd.

On distinguera facilement cette espèce de la Lusca, par ses ailes périeures beaucoup plus sinuées, marquées de quatre à cinq tites bandes transverses, par la tache anale d'un jaune d'ocre ancoup plus indiquée, par l'absence de bandes grisâtres sur bédomen, par le dessous des ailes, etc.

### 11. P. ILOIDES. Boisd.

Macroglossa Lefeborii, Lucas, Lépid. et Hyménopt. de l'île de Cuba 1 R. de la Sagra. — Perigonia Lefeborii, H.-Schæff. Corresp. Blatt. 47. — Grote, Proced. of Entomol. Societ. of Philadelph. p. 48.

Elle a tout à fait le port de Lusca et d'Ilus, mais elle est un seu plus petite. Ses alles supérieures sont d'un brun grisatre avec tois bandes brunes, dont la basilaire peu indiquée, la médiane étaite, suivie d'un petit stigmate noir et dont la postérieure est imitée, en dehors, par une espèce de lunule de la couleur du fad.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande médiane june, se terminant brusquement bien avant d'atteindre le bord ubdominal. L'angle anal est assez largement grisâtre et n'offre sucune apparence de tache jaune.

Le corselet et l'abdomen sont de la couleur des ailes supéneures. La petite brosse anale est comme chez Lusca et Ilus.

Le dessous des ailes est d'un brun un peu roussatre avec deux petites lignes transverses plus obscures.

I se trouve dans l'île de Cuba, d'où il a été rapporté par le lecteur Gundlach.

Nous n'avons pas cru devoir conserver à cette espèce le nom le Lejeburei, attendu que M. Guérin a décrit antérieurement ens le même nom un Sphingide de la Bolivie.

#### 12. P. PASSERINA. Boisd.

Elle a le port et la taille de la P. Lusca. Ses ailes supérieures et d'un gris un peu violâtre avec trois bandes transversales unes, dont celle du milieu est plus large et plus prononcée, adis que la suivante est presque rudimentaire; l'extrémité de ile est rembrunie, coupée, avant le bord terminal, par une e courbe qui limite une tache lunulaire de la couleur du d.

Les ailes supérieures sont noires, avec une large bande d'un jaune orangé qui n'arrive pas tout à fait jusqu'au bord abdominal; l'angle anal est également d'un jaune orangé à l'extrémité de la gouttière abdominale, précédé en dehors d'un espace gristire.

Le corselet et l'abdomen sont entièrement brunâtres; la brosse anale est d'un brun noir.

Le dessous des ailes est d'un rouge ferrugineux, traversé per deux lignes noires un peu sinueuses. La poitrine et les palps sont grisâtres.

Nous possédons deux exemplaires de cette espèce que nous avons acquis de Becker. Malheureusement, il ne se rappelait plus d'où ils provenaient, de sorte que nous ignorons s'ils ont été pris sur le continent ou aux Antilles.

## 13. P. UNDATA. Boisd.

Walker, Heterocera, p. 103, 6. — Macroglossa undata, Boisd. M.

Nous avons ébauché chez M. Saunders la description de cette espèce sur un individu incomplet. Nous ne la mentionnous que comme mémoire.

Elle est de la taille de la Lusca. Ses ailes supérieures sont d'un gris-cendré luisant, avec une raie noire et une tache blanche à la base; outre cela, elles ont sur le disque une tache noire coupée par une raie transverse blanche, et vers l'extrémité deux bandes ferrugineuses assez larges, irrégulières, bordées de noir.

Les ailes inférieures et l'abdomen ayant été détruits, nous me pouvons rien en dire.

La tête et la poitrine sont blanchâtres. Le corselet est brunâte marqué de deux raies parallèles noires.

M. Saunders l'a reçue de la Jamaïque.

Les ailes supérieures de cette Périgonie sont tellement caractérisées que, malgré notre description fort imparfaite, on pours facilement reconnaître l'espèce.

#### 14. P. GLAUCESCENS.

Walker, Heterocera, p. 103, 5.

Cette Périgonie n'existait pas au British Museum, lorsque nous avons étudié la collection des Sphingides de cet établissement, qui depuis notre voyage s'est enrichi de plusieurs espèces que was n'avons pas vues, mais qui ont été décrites par M. Walker. stre description est une simple traduction extraite de l'ouvrage act auteur.

Elle est un peu moins grande que la Caliginosa. Ses ailes sufesteures sont d'un brun un peu glauque avec deux bandes masversales, dont la plus interne est d'un brun foncé, et l'exfrisure ferrugineuse et bordée extérieurement de brun obscur. Les ailes inférieures sont d'un brun foncé avec une tache jaune l'angle anal et un peu de blanc le long de la côte près de

Le dessous des ailes est d'un roux testacé.

La tête est marquée de deux stries blanches. Le corselet est bran à reflet verdâtre. L'abdomen est d'un ferrugineux uu peu fanque avec le cinquième segment blanc, et les sixième et septème marqués chacun d'un petit faisceau latéral de poils blantètres. Le pinceau anul est noirâtre.

Décrit sur un individu unique envoyé de St-Domingue au Mitish Museum par M. Tweedie. — Walker.

## 45. P.? TESTACEA.

Walker, Heterocera, p. 102, 3.

Nous n'avons pas vu cette espèce que M. Walker met dans le lare Perigonia. Si elle est véritablement de Ceylan comme il ladique, nous croyons difficilement qu'elle soit bien à sa place la un genre essentiellement américain.

Elle est plus petite que la Lusca. Elle est de couleur fauve; les supérieures sont ferrugineuses le long du bord extérieur, ent au milieu, une bande oblique, testacée, mal arrêtée; le red terminal est un peu ondulé, avec l'angle anal arqué; les inférieures sont ferrugineuses, traverséez par une bande stacée, très-effacée; le bord marginal est un peu échancré.

Envergure 24 lignes anglaises. — Walker. — Ceylan.

D'après cette description, il nous semble que ce petit Sphingide l'fort rapproché des Lophura.

## GENRE MICROLOPHIA. Felder.

N'ayant jamais vu en nature ce rare Sphingide, nous ne urions dire au juste, quels sont les caractères que M. Fel-

der assigne à son genre Microlophia. Autant que l'on peut en juger par une excellente figure, que nous avons à notre disposition, il appartient évidemment à nos Macroglossides. Par ses ailes supérieures anguleuses, il se rapprocharit beaucoup de nos Perigonia de la première section, si leur angle interne était arqué; mais par ses antennes un peu plus courtes et par son abdomen tacheté de jaune latéralement et terminé par une petite brosse, il semble former que trait d'union entre les Périgonies et les Macroglosses proprement dits.

M. SCULPTA.

Felder, Novara, Exp. Zoolog. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 75, f. 9.

Il est de la taille d'un petit Smerinthus tiliæ. Ses ailes suprieures un peu arquées au sommet et anguleuses sont d'un vert olive jusqu'au-delà du milieu, et ensuite d'un gris violètre jusqu'à la frange. Sur la partie olive, il y a au lieu de stigmate, une petite tache blanche, réniforme, placée immédiatement audessus d'une raie droite, bien nette, du même blanc, descendant jusqu'au bord interne; outre cela, cette même partie olivêtre est très-anguleuse à son extrémité et liserée de blanc.

Les ailes inférieures sont d'un jaune-d'ocre vif, avec une grande tache noire marginale, formant comme une large hordure, finissant bien avant l'angle anal; on voit sur cette même tache noire, du côté du bord abdominal, un ou deux petits croissants grisâtres.

Le corselet est d'un vert olivâtre, bordé latéralement par une petite ligne blanche qui s'étend du bout des palpes à la base de l'abdomen; celui-ci est d'un gris violâtre avec une grande tache dorsale, d'un vert olive, bordée de jaune d'ocre de chaque côté; la brosse anale est brunâtre, peu étalée.

Ce joli Sphingide a été rapporté de Siam et fait partie de la collection de M. Felder.

GENRE THYREUS. Swains. - Brachynota. Boisd. M.

Chenille: Très-lisse, un peu atténuée antérieurement, dépourvue de corne sur le onzième anneau, comme celle de notre Œnotheræ.

Chrysalide: Comprimée antérieurement.

Insecte parfait: Tête assez grosse, un peu relevée en came-sur la ligne médiane. Antennes longues, dentées dans male, terminées par une pointe recourbée dans les deux mes. Yeux ronds, un peu cachés par des cils. Palpes ontigus, obtus, très-velus, remontant très-peu sur le front. rompe aussi longue que le corps. Corselet convexe, rouste. Abdomen très-court fan peu aplati en dessous, garni atéralement de petits faiscesuïx de poils et terminé par une brosse anale, étalée en queue d'oiseau. Ailes supérieures allongées, très-anguleuses. Ailes inférieures sinuées. Pattes sez grêles, terminées par une petite griffe.

Ce genre, dont nous ne connaissons qu'une seule espèce, le rapproche par la chenille des *Pterogon* et par la forme la corps chez l'insecte parfait, des Macroglosses.

#### T. ABBOTTI.

There abbotii, Swains. Zool. illustr. part. III, pl. 56. — Harris, berip. Catal. p. 27, 2.
Walker, Heterocera, p. 99. 1.

lest à peu près d'un tiers plus grand que notre Porcellus. Ses supérieures, fortement anguleuses, sont d'un brun-violâtre tie, avec des raies transverses courbes, ondulées, d'un noirms; outre cela, le stigmate est noir et petit, et le bord tertinal est longé par une large bande brune sinuée en dedans.

Les ailes inférieures ont la base et le bord externe jaune et extrémité noire, avec un ou deux traits plus clairs vers l'angle tal.

Le corselet est varié comme les premières ailes.

L'abdomen, qui est très-court, est d'un brun violâtre avec un anneaux d'un gris blanchâtre sur le milieu.

Le dessous des ailes est brun avec une raie transverse noirâen zigzag; le disque des supérieures est un peu varié de mâtre, et la base des inférieures offre, près du bord abdomiune tache d'un jaune soufre.

a chenille, dont nous possédons plusieurs dessins, est verte s sa jeunesse; lorsqu'elle est adulte, elle est d'un brun plus moins pâle, avec trois raies longitudinales, brunes, dont une

dorsale. Elle n'a pas de corne; celle-ci est remplacée sur le onzième segment, de chaque côté, par une tache oculaire noire, cerelée de jaune. Les stigmates sont blanchâtres, bordés de noir, appuyés sur une petite raie oblique, hrune.

Catte chenille vit en Georgie et en Virginie aur plusieurs espèces de vignes sauvages.

Coll. Bd. — Toujours assez rare dans les collections.

# GENRE MACROGLOSSA. Ochs., etc.

Chenilles: Pointillées, presque finement chagrinées, avec la tête globuleuse et une corne sur le onzième anneau.

Chrysalides: Allongées avec la partie antérieure un peu comprimée.

Insecte parfait: Têle peu saillante. Antennes droites, roides, minces à leur base, se renflant ensuite insensiblement et se terminant par un crochet peu prononcé. Yeux un peu ovales, de grandeur médiocre. Palpes se terminant en pointe obtuse, rapprochés à leur sommet et dépassant de beaucoup le chaperon. Trompe de la longueur du corps. Corselet robuste, ovoïde, peu bombé, très-velu, avec les épaulettes peu indiquées. Abdomen court, aplati en dessous, à peu près de largeur égale dans toute sa longueur, muni de petites brosses latérales et terminé dans les deux sexes par un faisceau de poils étalés en queue d'oiseau. Ailes courtes, bien entières, le plus souvent opaques ou quelque-fois vitrées.

Les Macroglosses sont répandues dans toutes les parties du monde. Ils volent en plein jour avec une grande vélocité à l'ardeur du soleil. Quelques espèces cependant semblent préférer un ciel un peu couvert et les allées des bois. On en connaît un certain nombre dont les ailes sont transparentes; toutéfois ces organes ne deviennent ainsi qu'après que ces Lépidoptères en ont fait usage. Au moment de l'éclosion, toutes les ailes sont opaques, mais au moindre frémissement les écailles du disque s'envolent comme de



la poussière, et il ne reste que la bordure dont les écailles sont au contraire très-adhérentes.

Fabricius, qui ne connaissait pas cette particularité, a fait le genre Sesia avec les espèces dont les ailes sont vitrées.

Les Anglais et les Américains continuent toujours d'appliquer le nom de Sesia aux Macroglosses à ailes transparentes.

ŧ

## 1. M.? CAUDATA.

Sph. caudata, Breim. zur Schmett. Fauna des Nördl. China's, p. 13, p. 36. — Thyrous caudata, Ménétr. Catal. de la Coff. Ent. de l'Academie, tab. 12, f. 4.

Nous n'avons jamais vu cet insecte, qu'au premier coupd'œil on prendrait volontiers pour une seconde espèce de *Thy*reus; mais, par ses ailes entières, il se rapproche bien plus des Macroglosses que de tout autre genre.

Ses ailes supérieures sont allongées, d'un brun-violâtre pâle, avec des bandes transverses, ondulées, noirâtres; l'extrémité ofire en outre, vers le sommet, un espace longitudinal de la même couleur.

Les ailes inférieures sont jaunes avec une bordure noire assez étroite, marquée vers l'angle anal d'un ou deux traits grisàtres.

Le corselet participe de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est gros, aplati, de couleur brune avec de petits faisceaux latéraux de poils bruns; la brosse anale est jaune, divisée en deux faisceaux.

Le dessous des ailes inférieures est à peu près semblable audessus; celui des supérieures est d'un brun un peu vineux, principalement du côté de la base.

Il habite les environs de Pékin. - Breimer.

Décrit d'après la figure donnée par Ménétries, sur un individu unique appartenant au musée de Saint-Pétersbourg.

Nous croyons que ce Sphingide vole en plein jour sur les fleurs, comme les véritables Macroglosses.

٠.

#### Ħ

#### 2. M. BOMBYLANS. Boisd.

fi est de la taille du stellatarum. Ses ailes supérisens met brunes avec deux bandes transversales, noires, asses larges, proque doubles.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande médiane, transversale, d'un jaune fauve.

Le corselet et la moitié antérieure de l'abdomen sont d'un jaune verdâtre. L'autre moitié de l'abdomen est noire, ainsi que la brosse anale; outre cela, il y a sur les côtes, vers la base, très taches d'un jaune fauve.

En dessous, les palpes, la poitrine et la base des ailes sont blancs et les bords de l'abdomen sont entrecoupés par des petits faisceaux de poils blancs.

Asie centrale. — Coll. Bd. — British Museum.

Cette espèce varie un peu pour la bande des ailes inférieurs. Nous avons vu au British Museum des individus chez qui elle était presque nulle.

#### 3. M. AVICULA. Boisd.

Il est de la taille du *Trochilus*. Ses ailes supérieures sont d'un très-obscur avec des bandes transverses noires, asses larges, mais un peu fondues avec la teinte générale.

Les ailes inférieures sont entièrement noires.

Le corselet est d'un vert jaunâtre, et cette couleur s'étend juqu'au-delà du milieu de l'abdomen; ce dernier est marqué sur les premiers anneaux de trois taches d'un jaune fauve; l'extémité du corps est noire avec l'articulation de l'avant-dernier anneau bordée de jaune; la brosse anale est brune avec l'artémité un peu roussâtre.

Le dessous est noir avec la base des quatre ailes, la poitrine et les palpes blancs.

Ce Macroglosse se trouve dans plusieurs contrées de l'Indecentrale. — British Museum et Coll. Bd.

Nous en avons reçu aussi un petit individu dans un envoi de Java.

## 4. M. TROCHILUS.

Hubser, Exot. Saml. — Walker, Heterocera, p. 90, 8. — M. Lysithous, Klug, M. S.

Il est notablement plus petit que le stellatarum. Ses ailes supérieures sont d'un gris roussâtre, avec la base, l'extrémité et une bande médiane ondulée, transverse, d'un brun olivâtre.

Les ailes inférieures sont fauves avec la base rembrunie et l'entrémité assez largement d'un brun ferrugineux.

Le corselet est d'un jaune olivatre.

L'abdomen est d'un gris jaunâtre sur le dos avec les côtés largement fauves. La brosse anale est d'un brun noir.

Le dessous des ailes est ferrugineux avec la base jaunâtre. Les palpes et la poitrine sont blancs. Le ventre est noir avec de petits faisceaux latéraux de poils blancs.

Cette espèce est très-commune à Natal. Delegorgue l'a trouvée jusque dans le pays de Mazilicatzy. Elle paraît pendant une grande partie de l'année. Elle se trouve aussi au cap de Bonne-Espérance.

La figure de ce Macroglosse est très-exacte dans l'ouvrage de Hubner. Les premiers individus que nous avons possédés nous ent été envoyés sous le nom de *Lysithous*, par le docteur Klug qui les avait reçus du Cap.

## 5. M. REGULUS. Boisd.

il est d'un tiers plus petit que le *Trochilus* dont il est asses voisin. Ses ailes supérieures sont d'un gris roussatre, fasciées de trun comme chez le *Trochilus*.

Les ailes inférieures sont entièrement d'un roux ferrugineux et n'ont rien de fauve.

Le corselet est d'un jaune olivâtre.

L'abdomen est d'un gris jaunâtre sur le dos avec les côtés fauves depuis la base jusqu'au-delà du milieu. Les derniers anceux sont noirs ainsi que la brosse anale.

Le dessous des ailes est ferrugineux avec la base des inférieures d'un jaune pâle. Le ventre est noir avec quelques petits aisceaux latéraux de poils blanchâtres. La poitrine et les palpes sont blancs.

Décrit sur un individu unique pris par Pérotet sur la côte de Coromandel.

Coll. Bd.

#### 6. M. GYRANS. Boisd.

Walker. List. Lepid. Brit. Mus. Heter. pt. VIII, p. 92,—Moore, Catal. of Lep. of ind. Comp. p. 262, 601.

Un peu plus petit que le stellatarum. Ses ailes supérieures sont d'un gris obscur, avec des bandes transversales, brunâtres.

Les ailes inférieures sont entièrement d'un roux ferrugineux, avec l'extrémité un peu plus foncée.

Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est brun en dessus, avec les côtés largement ferrugineux depuis la base jusqu'au-delà du milieu; l'avant-dernier anneau est noir et le dernier est traversé par une bande d'un blanc pur, interrompue sur le dos par une petite tache noire. La brosse anale est noire.

En dessous, les palpes et la poitrine sont blancs et les ailes d'un brun un peu ferrugineux.

Il se trouve aux Indes orientales, où il ne paraît pas être trèsrare.

Coll. Bd. — Le British Museum en possède une belle série.

#### 7. M. MILVUS.

Boisd. Faun. de Madag. pl. 10, f. 3. — Walker, Heterocera, p. 90, 10.

Il a le port et la taille du *stellatarum*. Ses ailes supérieures sont fasciées irrégulièrement de grisâtre et de brun-olivâtre foncé, avec un petit stigmate noirâtre.

Les ailes inférieures sont ferrugineuses, sans bordure; leur base est d'une couleur un peu fauve qui se fond insensiblement avec la couleur ferrugineuse.

Le corselet est d'un brun olivatre.

L'abdomen est d'un brun olivâtre sur le dos, avec les côtés fasciés de jaune-fauve assez vif; la brosse anale est noire et éta-lée.

Le dessous des ailes est ferrugineux, avec des lignes transverses plus obscures; le ventre est aussi d'une couleur ferrugineuse et offre, chez les individus très-frais, sur les côtés, une rangée de trois ou quatre points blancs.



Il se trouve dans les îles Bourbon et Maurice; mais, selon Marchal, il est fort rare dans cette dernière île, tandis qu'il est commun dans la première. Il butine sur les fleurs des Balsamines, pendant le jour par un temps couvert, et surtout après le coucher du soleil, dans les mois d'avril, de mai, d'août, de décembre et de février.

Coll. Bd.

# 8. M. STELLATARUM.

Linné, — Fab. — Esp. — Hubn. — Ochs. — God. — etc., etc. Le Moro-Sphina, Geoff.

Il a environ 5 centim. d'envergure. Ses ailes supérieures sont d'un brun-cendré luisant, traversées par trois raies noires ondulées, dont les deux antérieures plus marquées; le stigmate est noir ponctiforme.

Les ailes inférieures sont d'un fauve ferrugineux, avec l'extrémité plus obscure.

Le corselet et l'abdomen sont d'un brun cendré. Ce dernier ofre latéralement, vers le milieu, une tache jaunâtre, suivie d'une tache noire. La brosse anale est étalée, d'un brun noir.

En dessous, les quatre ailes sont jaunâtres à la base et ferrugineuses an milieu; la poitrine et les palpes sont blancs; les côtés du ventre sont noirâtres, entrecoupés par des petits faisceaux de poils blancs.

La chenille est verte, pointillée de blanc, avec quatre lignes longitudinales, dont les deux supérieures blanchâtres et les deux m'érieures jaunes ou d'un jaune blanchâtre; la corne est peu aquée de couleur verdâtre; les stigmates sont noirs. Lorsqu'elle est prête à se métamorphoser, elle devient souvent d'un gris bruntire.

On trouve cette chenille assez communément sur le Galium melluge, mais plus souvent, cependant, sur le Galium verum.

Ce macroglosse est très-commun en Europe, depuis le printemps jusqu'au milieu de l'automne. Il se trouve aussi sur toute la côte de Barbarie, en Egypte, aux sles Canaries et même en Chine.

#### 9. M. ZENA. Boisd.

Il a tout à fait le port du stellatarum. Ses ailes supérieures sont f'un gris-cendré obscur, avec deux bandes transversales doubles,

Lipidopières. Tome I.

brunes, dont une courbe, un peu sinuée non loin de la base, et dont l'autre, située un peu au-delà du milieu, est profondément sinuée; outre cela, on voit, vers le sommet, une liture de la même couleur.

Les ailes inférieures sont d'un roux ferrugineux avec l'extrémité plus foncée.

Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est d'un brun noirâtre en dessus, avec les trois premiers anneaux d'un jaune fauve latéralement; la partie postérieure du dos est un peu plus obscure, avec les articulations presque noires. La brosse anale est noire.

En dessous, les palpes et la poitrine sont blancs, avec les ailes d'un brun un peu ferrugineux, plus claires à la base des premières et sur le bord abdominal des secondes.

Cette espèce a été élevée de la chenille sur une espèce de Galium, à Simlah, par le capitaine Sherwill.

Coll. Bd.

#### 111

## M. Pyrrhula. Boisd.

Peut-être est-il le même que le Belis de Cramer, auquel il ressemble parfaitement par ses ailes inférieures.

Il a le port et la taille du stellatarum. Ses ailes supérieures sont grisâtres, avec des bandes transverses d'un brun un peu olivâtre, dont les deux du milieu sont sinueuses, et renferment, audessous de la côte, dans leur intervalle, un espace rembruni; outre cela, on voit, près du sommet, trois traits bruns parallèles, séparés par les nervures.

Les ailes inférieures sont d'un fauve un peu ferrugineux, avec une large bordure d'un brun noir, se rétrécissant insensiblement vers l'angle aual.

Le corselet est grisâtre.

L'abdomen est d'un gris brunâtre, marqué latéralement, depuis la base jusqu'au milieu, d'une bande fauve, formée de taches confluentes; outre cela, le dos offre six petites taches noires. La brosse anale est d'un brun grisâtre, avec quelques poils blancs dans l'articulation du dernier segment.

Le dessous des ailes est d'un brun roussatre, avec des raies transverses, communes, plus obscures; celui des inférieures est



asses largement fauve vers la région anale. La poitrine et les palpes sont d'un blanc grisâtre.

M. E. Deyrolle nous a communiqué cette espèce comme venant des indes orientales sans désignation de localité.

Coll. Bd.

## 11. M. CORYTHUS. Boisd.

Walker, List. Lep. Brit. Mus. Het. pt. VIII, p. 92. — Moore, Catal. of Lepid. of ind. Comp. p. 262, 599.

Il est de la taille du stellatarum, avec les ailes supérieures moins arrondies au sommet, comme cela a lieu, du reste, dans presque toutes les espèces de l'Inde.

Les ailes supérieures sont d'un gris-brun un peu violâtre; elles ont, près de la base, une bande courte d'un brûn olivâtre, suivie d'une bande transversale de la même couleur, plus large et beaucop plus marquée; au-delà du milieu, il y a plusieurs lignes sinueuses également d'un brun olivâtre, un peu empâtées près de la côte; outre cela, on voit au sommet, près de la frange, une petite tache cunéiforme noire, et au-dessous de celle-ci une tache noire en forme de carré très-allongé.

Les ailes inférieures sont noires, avec une bande transversale d'un jaune fauve, de largeur moyenne.

Le corselet est d'un brun un peu olivâtre.

L'abdomen est brun en dessus, mélangé de quelques poils rous; sur les côtés, il est marqué de deux taches d'un jaune save; la brosse anale est noire, et l'avant-dernier anneau, chez les individus bien frais, est un peu liseré de blanc.

Le dessous des ailes est d'un ferrugineux clair, avec des raies transverses plus obscures; la base des quatre ailes et le bord ab-1 minal des inférieures sont jaunes. Le ventre est ferrugineux succ des petits points blancs latéraux, peu marqués.

li se trouve à Java, aux îles Philippines et au nord des Indes. L'n'est pas très-rare.

La chenille, selon M. Lorquin, qui l'a trouvée plusieurs fois aux environs de Manille, et, selon Horsfield, qui l'a élevée à Java, est d'un vert plus ou moins foncé, pointillée de vert noirâtre; ses côtés sont plus pâles, et séparés de la couleur dorsale, qui est il a obscure, par une raie blanchâtre; outre cela, elle est marjuée de bandes obliques blanchâtres.

Ce macrogiosse vole pendant une grande partie de la journée.

et surtout le soir, un peu avant le coucher du soleil, sans jamés s'arrêter. (Lorquin.)

### 12. M. SINICA. Boisd.

Il est à peu près de la taille du stellatarum. Ses ailes suprieures sont d'un brun grisâtre avec trois bandes noirâtres, dont l'une entre la base et le milieu, est élargie vers le bord inteme, dont la seconde placée un peu au-delà du milieu, est fortenses sinuée, et dont la troisième située avant le bord terminal, est limitée près du sommet, par deux taches noires parallèles est forme de parallélogramme.

Les ailes inférieures sont d'un jaune fauve avec une lasse bordure et une petite partie de la base de couleur noire.

Le corselet est d'un brun noirâtre.

L'abdomen est en dessus d'un brun noirâtre avec les artislations un peu roussâtres, la brosse anale est d'un brun-noir.

Le dessous des ailes est d'un brun ferrugineux, avec la les et le bord abdominal des inférieures largement lavés de jeune d'ocre. Le ventre est noirâtre. La poitrine et les palpes sont d'un blanc grisâtre.

Décrit sur un individu pris à Hong-Kong par Lorquin. — Cd. Bd.

# 13. M. AQUILA. Boisd.

Il est de la taille du stellatarum. Ses ailes supérieures d'un brun grisâtre, avec une bande brune à la base et des mintransversales, ondulées de la même couleur; elles ont, en outre, sur le bord terminal, près du sommet, deux taches noires, del l'antérieure plus petite, un peu cunéiforme, et la seconde plus grande en forme de parallélogramme.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande médiane, d'un jaune fauve, étranglée dans son milieu.

Le corselet est d'un brun olivâtre.

L'abdomen est d'un brun grisâtre en dessus, avec trois tachs latérales d'un jaune fauve, séparées par des articulations noire qui se continuent un peu sur le dos. La brosse anale est d'ul brun noirâtre.

Le dessous est un peu ferrugineux avec une tache noire se le bord interne des ailes supérieures; le bord abdominal des se férioures est lavé de jame fauve. La poitrine est d'un gris blanchâtre avec les palpes blancs. Le veutre est d'un roux ferrugineux avec les trois premiers anneaux marqués d'une large tache blanche et les côtés d'une série de trois ou quatre points blancs.

Il se trouve en Cochinchine et à Sylhet.

Coll. Bd. - Rare.

## 14. M. BENGALENSIS. Boild.

Il a le port du Güia, mais il est d'un tiers plus grand. Le fond de ses ailes supérieures est d'un brun olive, avec trois bandes d'un gris blanchâtre, dont une peu indiquée du côté de la base; une seconde à peu près droite, vers le milieu, et une troisième, un peu sinuée, avant le bord terminal; cette dernière est précédée en dedans, près de la côte, de deux traits noirs, réunis, dont l'antérieur beaucoup plus gros.

Les ailes inférieures sont d'un jaune fauve, avec une large bordure d'un brun noirâtre et quelques traits basilaires de la même couleur.

Le corselet est d'un brun olivatre.

L'abdomen est d'un brun roussaire sur le dos, marqué de chaque côté, à partir de la base, de trois ou quatre taches d'un jame fauve. La brosse anale est brune, précédée, à sa base, d'un petit faisceau de poils très-noirs.

Le dessous des ailes est de couleur cannelle, avec la base des supérieures et tout le bord abdominal des inférieures d'un jaune fauve; la poitrine et les palpes sont d'un blanc grisâtre; le dessous de l'abdomen est un peu ferrugineux avec une série latérale de trois points blancs.

Décrit sur un individu très-frais, reçu de Pondichéry par le baron Feisthamel.

Coll. Bd.

### 15. M. GILIA. Boisd.

Walker, Heterocera, p. 93, 15. — Herrich-Schmff. Lep. exot. f. 107.

Il est un peu plus grand que le *Trochiles*, dont il a le port. Ses ailes supérieures sont d'une teinte grisâtre, avec des bandes d'un brun olivâtre, dont une à la base, une seconde plus étroite, un peu avant le milieu, et une troisième, sinuée en dehors et trèsélargie vers la côte; outre cela, il y a sur la côte tout près às sommet une tache brune bien indiquée.

Les ailes inférieures sont d'un brun noirâtre, avec une buis médiane d'un jaune fauve.

Le corselet est olivatre.

L'abdomen est en dessus d'un gris-olivâtre obscur, marqué à chaque côté vers sa base, de trois taches un peu confluentes, d'un jaune fauve; la brosse anale est noire.

Le dessous est brun avec la poitrine et les palpes d'un blans grisatre.

Il se trouve à Java et aux îles Philippines. Selon Lorqui, il n'est pas très-rare, mais comme il vole sans jamais s'arrète, il est fort difficile à prendre. Quand la pluie est abondante, et le rencontre quelquefois appliqué sur le tronc d'un arbre et abrité sous les feuilles.

La chenille, d'après Horsfield qui l'a élevée à Java, sur un Rubiacée, Morinda citrifolia, ressemble pour la forme à celle à notre stellatarum. Ordinairement, elle est de couleur verte trèfortement pointillée de noir verdâtre, avec une bande latéral blanche qui va se perdre à l'origine de la corne. Les stigmans sont noirs précédés d'une tache brune.

Coll. Bd. — British Museum. — Nous en avons vu une asses belle série au Museum de la compagnie des Indes, que fet le D' Horsfield a mis à notre disposition avec une obligeans parfaite, ainsi que les nombreux dessins de chenilles qu'il avait exécutés pendant son séjour à Java.

## 16. M. NYCTERIS.

Kollar, in Hugel's Kaschmir, IV, pt. II, pl. 19, fig. 5. — Volueris, Boisd. — Walker, List. Lepid. Mus. Het. pt. VIII, p. 94.

Il est tout à fait de la taille du *Trochilus*, c'est-à-dire d'un ties plus petit que notre stellatarum. Ses ailes supérieures sont d'us gris obscur, fasciées de noirâtre.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande médiame d'un jaune-d'ocré pâle.

Le corselet participe de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est brun en dessus avec deux taches latérales d'us jaune d'ocre, suivies de deux faisceaux de poils très-noirs. La brosse anale est noire; avec la dernière articulation bordée par en petit annesu blanc, interrompu, au milleu, par du noir profond.

Le dessous des ailes est d'un brun ferrugineux, avec le bord abdominal des inférieures d'un jaune-d'oore pâle. Le ventre est d'un brun noir avec une série latérale de petits points blancs. La poitrine et les palpes sont gris.

Sylbet, Kaschmir, Darjeeling. - Coll. Bd.

### 17. M. BELIS.

Linn. Syst. nat. II, p. 803, 27. — Cramer? 94, C.

Nous ne connaissons ni le Belis de Linné, ni celui de Cramer. Ces deux auteurs ont-ils vu la même espèce? c'est ce que nous ignorons. Linné regarde son Belis comme une variété chinoise du stellatarum. Quant à celui de Cramer, il nous paraît, d'après la figure qu'il en donne, n'appartenir à aucune des espèces que nous connaissons. M. Moore le rapporte au Passalus de Drury avec lequel il n'a pas la moindre ressemblance.

Voici sa description, d'après la figure précitée. Les ailes supérieures sont brunes fasciées de cendré obscur.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande médiane d'un jame fauve.

Le corselet et l'abdomen sont d'un jaune-verdâtre foncé; ce dernier offre sur les anneaux les plus rapprochés de la base, de chaque côté, trois taches jaunes; outre cela, les anneaux suivants sont marqués d'une série latérale de petits faisceaux de poils jaunes. La brosse anale est brune.

Cramer le dit de la Chine.

#### 18. M. SITIENS. Boisd.

M. Sittene, Walk. List, Lepid. Brit. Mus. Het. VIII, 92. — Moore, Catal. of Lepid. of ind. Comp. p. 262, 602.

Il est probable que sur l'étiquette écrite de notre main au British Museum, les lettres n'étaient pas parfaitement bien formées, puisque MM. Walker et Moore ont lu Sitiene, qui ne signifie rien, au lieu de Sitiens!

il est de la taille du stsliatarum. Ses ailes supérieures sont d'un brun-olivâtre pâle avec des bandes transverses et deux tathes anicales d'un brun obscur. Les ailes inférieures sont noires, traversées par une bende midiane d'un jaune d'ocre.

Le corselet est olivatre.

L'abdomen est plus pâle en dessus, marqué près de la bes, sur les côtés, de deux et quelquefois presque de trois tadas jaunes.

La brosse anale est brune, précédée d'une tache médiane noin.

En dessous, le bord abdominal des ailes inférieures est jaum; le ventre est d'un ferrugineux sale, avec deux ou trois pets points latéraux blancs, plus ou moins indiqués; la poitrine et les palpes sont de couleur grisatre.

Cochinchine. — Coll. Bd. — Bengale, Assam, Sylhet. — Bitish Museum.

#### 49. M. TROGLODYTUS. Boisd

Il a le port du Corythus, mais il est d'un tiers plus petit. Se ailes supérieures, dont le fond est un peu grisâtre, sont trave-sées par des bandes géminées d'un brun olivâtre, dont l'antirieure convexe en dehors, et la suivante sinuée en S; outre cel, il y a sur le bord terminal, près du sommet, quelques trabonirs, dont l'un, beaucoup plus prononcé, forme un carré trèvallongé.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande transvers assez large, d'un jaune fauve.

Le corselet est mélangé de gris olivâtre.

L'abdomen est brun en dessus, mélangé de quelques pois roux; il offre en outre, de chaque côté, à partir de la base, trois taches fauves, dont l'antérieure peu marquée. La bross anale est étalée, d'un brun noir.

Le dessous des ailes est d'un roux ferrugineux, avec des ligns transversales brunes, ondulées; celui des inférieures est jame dans toute la partie voisine du bord abdominal. Le ventre est brun avec une série latérale de points blancs. La poitrine et les palpes sont d'un gris blanchâtre.

Assam, Darjeeling. - Rare. - Coll. Bd. - British Museum.

### 20. M. TINNUNCULUS. Boisd.

Il a le port et la taille du stellatarum. Le fond des ailes supé-

rieures est d'un grisâtre obscur, avec des lignes transversales, brunes, et une bande médiane, oblique de dedans en dehors, bien indiquée, de la même couleur; la ligne qui précède l'extrémité est dentée régulièrement; le bord terminal est brun et précédé sur la côte, un peu avant le sommet, d'une tache triangulaire également brune.

Les ailes inférieures sont noires, traversées par une bande asses large, d'un jaune fauve.

Le corselet est d'un gris olivâtre.

L'abdomen est d'un gris brunâtre sur le dos, avec les articulations bordées de noir et trois taches latérales jaunes. La brosse anale est d'un brun noirâtre.

Le dessous des ailes est ferrugineux avec le bord abdominal des inférieures d'un jaune fauve.

Le ventre est ferrugineux avec deux ou trois petits points blancs sur les côtés. La poitrine et les palpes sont d'un blanc légèrement grisatre.

Décrit sur un individu pris par Lorquin aux environs de Saigon.

Nous croyons nous rappeler en avoir vu un second exemplaire entre les mains de Becker.

Ce Macroglosse est bien distinct des autres par la bande ou raie oblique qui traverse ses ailes supérieures.

## 21. M. Opis. Boisd.

Il est d'un quart plus grand que le stellatarum. Ses ailes supérieures sont d'un gris sombre, avec une bande extra-basilaire et des raies ondulées doubles, d'un brun-noir.

Les ailes inférieures sont noires à la base, traversées au milieu par une bande d'un fauve vif, terminées par une large bordure brune à reflet roux.

Le cornelet est d'un brun olivêtre.

L'abdomen est brun avec les second et troisième anneaux marqués chacun, latéralement, d'une tache fauve; les deux anneaux suivants offrent, sur chaque côté, une tache noire, dont la dernière, beaucoup plus transverse, tend à former une ceinture interrompue sur le dos; la brosse anale est noire et étalée.

Le dessous des ailes est d'un roux-ferrugineux clair avec des

rieures d'un jaune fauve. Le ventre est roussatre, fassié de gis transversalement, avec deux petits faisceaux latéraux de petiblancs; le dessous de la brosse anale est ferrugineux. La poitise et les palpes sont d'un blanc grisatre.

Cette espèce nous paraît être assez commune dans l'Inda (a la reçoit fréquemment de Sylhet, de Darjeeling, etc., mais mement en bon état.

Coll. Bd. — Le British Museum en possède une nombreus série.

## 22. M. PHLEGETON. Boisd.

Il a de grands rapports avec Opis. Ses ailes supérieures sont brunes avec des raies transverses, sinuées, plus obscures.

Les ailes inférieures sont brunes avec une bande médiam fauve.

Le corselet est brun ainsi que l'abdomen; ce dernier est pourvu de taches jaunes sur les côtés, mais il offre sur l'apénultième anneau deux points noirs, et à la base de la propanale une petite tache de la même couleur; celle-ci est noire st étalée, marquée de chaque côté d'une petite tache blanche postiforme.

Le dessous du corps est ferrugineux aiusi que les ailes, avec le palpes, la poitrine et des points latéraux sur le ventre, de couler blanche; outre cela, la base des quatre ailes et le bord abdominal des inférieures est d'un jaune fauve.

Nouvelle-Guinée. - Coll. Bd.

#### 23. M. HIRUNDO.

Boisd. Voy. de l'Astrolabe, p. 188, 1.

Il est un peu plus grand que notre stellatarum. Ses ailes suprieures sont brunes, avec une bande médiane, blanche, transverse, droite, assez étroite, un peu coupée par les nervures, touchant le bord interne, mais n'atteignant pas tout à fait le bord costal; outre cela, il y a, avant le bord terminal, dans les exemplaires bien frais, une ligne transversale, courbe, obsolète, de couleur pâle.

Les ailes inférieures sont noires, avec une bande transversale d'un jaune fauve, élargie et s'arrondissant vers l'angle anal.

Le corselet est brun.

L'abdamen est brunâtre sur le dos, avec trois bandes latérales fauves sur les premiers anneaux; l'extrémité du corps est plus noire, avec les deux derniers anneaux bordès de poils fauves. La brosse anale est brune, bordés de poils roux.

Le dessous des ailes est ferrugineux, avec deux bandes transverses plus obscures, et le bord abdominal des inférieures d'un jaune fauve; la poitrine et les palpes sont d'un gris blanchâtre.

ll se trouve à Otahiti. - Coll. Bd. - Mus. nat.

Nous possédons un individu un peu plus petit qui nous a été rapporté de Tonga-Tabou par l'amiral d'Urville.

#### 24. M. ALCEDO.

Boisd. Faun. de l'Océanie, p. 188, 2.

Il est de la taille de notre stellatarum. Ses ailes supérieures sont d'un brun pâle, avec des raies transversales ondulées, plus cheures.

Les ailes inférieures sont d'un brun noir, avec une bande transverse d'un jaune fauve.

Le corselet est brun.

L'abdomen est brunâtre sur le dos, avec les premiers segments marqués de taches latérales fauves, et les suivants de petits faisceaux latéraux, mélangés de noir et de fauve. La brosse anale est noire.

Le dessous du corps est ferrugineux ainsi que les ailes, avec la poitrine et les palpes de couleur grisâtre.

Pris à Dorei, dans la Nouvelle-Guinée, par l'amiral d'Urville, pendant le voyage de la Coquille.

Notre description n'est peut-être pas fort exacte, attendu que l'unique exemplaire que nous possédons laisse beaucoup à désirer sous le rapport de la fraicheur.

Coll. Bd.

#### 25. M. MOTACILLA. Boisd.

Il a tout à fait le port et la taille d'Opis. Ses ailes supérisures sont d'un brun obscur, avec des bandes transverses plus foncées, très-peu distinctes et presque nulles.

Les ailes inférieures sont fauves, avec une large bordure, la base et trois nervures noires. Le corselet est de la couleur des premières ailes.

L'abdomen est brunâtre sur le dos, avec le bord des articulations fauve et des petits faisceaux de poils latéraux de la même couleur. La brosse anale est brune, mélangée de quelques poils fauves.

Le dessous du corps est ferrugineux, avec la poitrine et les palpes d'un gris cendré.

Le dessous des ailes est plus obscur, avec un peu de fauve à la base des supérieures, et un espace plus grand, de la même couleur fauve à la base des inférieures.

Ce macroglosse a été pris aux environs de Dorei, dans la Nouvelle-Guinée, par feu l'amiral d'Urville.

Coll. Bd.

1111

# 26. M. FARO.

Moore, Catal. of Lepid. of ind. Comp. p. 263, 606. — Sphinz idem, Cr. 285, C. — M. Passalus, Walker, Heterocera, 92, 12.

Ce Macroglosse est l'un des plus grands du genre. Ses ailes supérieures sont d'un brun olivâtre, traversées, un peu avant le milieu, par une bande d'un gris violâtre, divisée par une petite raie brune; outre cela, il y a, avant le bord terminal, deux autres raies brunes, un peu ondulées, dont la postérieures est beaucoup plus large et eu forme d'ombre.

Les ailes inférieures sont noires, avec une bande médiane, régulière, d'un jaune orange.


Le corselet est olivatre.

L'abdomen est d'un brun olivâtre tirant un peu sur le roussâtre, avec les articulations bordées de noir, et trois taches latérales d'un jaune orange; la brosse anale est noire, mélangée de poils fauves, surtout à l'extrémité.

Le dessous des ailes est d'un brun ferrugineux, avec le bord abdominal des inférieures jaune d'ocre. Le ventre est ferrugineux, avec la poitrine et les palpes d'un gris blanchâtre.

Décrit sur un individu élevé de chenilles à Java, par Westermann.

Selon Cramer, il se trouverait aussi à la côte de Coromandel. Coll. Bd. — Rare.



### 27. M. PASSALUS.

Drury, Ins. II, pl. 29, f. 2. — Moore, Catal. of Lep. of ind. Comp. p. 202, 603. — Walker, Heterocera, p. 92, 12.

Il est assez grand et à peu près de la taille du Farq. Ses ailes supérieures sont d'un gris-rougeâtre obscur, avec une large bande basilaire d'un brun olive et quelques raies transversales obsolètes de la même couleur; outre cela, la région terminale est plus ou moins rembrunie.

Les ailes inférieures sont d'un brun noir, avec une large bands d'un jaune fauve qui s'étend presque jusqu'à la base qu'elle envahit quelquesois entièrement.

Le corselet est olivâtre, tirant un peu sur le rouge, avec une raie longitudinale noirâtre, seulement sur sa partie antérieure.

L'abdomen est d'un brun rougeâtre en dessus, avec trois taches latérales d'un jaune fauve, la brosse anale est étalée, de couleur brune.

Le dessous des ailes est ferrugineux, avec la base des supérieures et le bord abdominal des inférieures d'un jaune d'ocre. Le ventre est roussatre. La poitrine est d'un gris sale, avec les palpes blancs.

indes orientales. - Coll. Bd.

Nous res pouvons adopter l'opinion de M. Moore, qui le consitère comme la même espèce que le Belis figuré par Cramer.

#### 28. M. STURNUS. Boisd.

Il a le port et la taille du *Passalus* de Drury, dont il se rapproche beaucoup. Ses ailes supérieures sont d'un gris rougeâtre avec une large bande basilaire, d'un brun foncé, et deux autres bandes transversales un peu en forme d'ombre, dont l'une vers le milieu et l'autre un peu avant l'extrémité.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande médiane, asses étroite, d'un jaune fauve.

Le corselet est d'un brun un peu rougeâtre avec une raie longitudinale noirâtre, seulement sur sa partie antérieure.

L'abdomen est brunâtre en dessus, avec trois taches latérales d'un jaune fauve. La brosse anale est noirâtre.

Le dessous des ailes est d'un brun ferrugineux, avec le bord

abdominal des inférieures d'un jauné d'ocre. Le ventre est ressetre, varié de blanc sur les premièrs anneaux. La poitrine est grisâtre avec les palpes blancs.

Décrit sur un individu unique pris en Cochinchine. -

Coll. Bd.

Comme on le voit par notre description, il est fort voisin à Passalus, dont il ne diffère guère que par ses ailes inférieurs, et dont peut-être il n'est qu'une variété locale.

#### 29. M. SYLVIA. Boisd.

Il est au moins aussi grand que le Faro figuré par Cramer. Se ailes supérieures sont d'un gris obscur avec la base, une la bande médiane en forme d'ombre transverse et l'extrémité adessous du sommet, d'un brun obscur un peu olivâtre.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande transversile, assez large, d'un jaune fauve.

Le corselet est d'un brun-olivâtre obscur.

L'abdomen est olivâtre en dessus, mélangé de quelques pois roux, avec les côtés marqués de trois taches fauves; outre cels, l'anté-pénultième et l'avant-dernier segment sont d'un noir foncs, largement interrompus sur le dos. La brosse anale est brune mélaugée de quelques poils grisâtres.

Le dessous des ailes est brun avec la base des supérieures et le bord abdommal des inférieures d'un jaune fauve. Le ventre et noir avec des grosses taches d'un gris jaunâtre sur le milieu des premiers anneaux. La poitrine est grise; les palpes sont blance.

Célèbes, Ternate. — Coll. Bd.

Selon M. Lorquin, il n'est pas très-rare dans le voisinage da lac de Tondano, mais il vole avec tant de vitesse, qu'il disparat tout à coup et que ce n'est pas sans peine qu'il a pu en saisir mindividu. Il en a pris un second exemplaire un peu plus pets dans l'île de Ternate.

#### 30. M. CYNIRIS. Boisd.

Il a le port du Sylvia, dont il se rapproche beaucoup. Ses ailes supérieures sont d'un brun noirâtre, avec trois bandes transverses un peu grisâtres, dont une non loin de la base, une autre vers le milieu et la troisième avant le bord terminal.

Les siles inférieures sont noires, avec une bande médiane d'un jaune sauve, élargie vers le bord abdominal.

Le corselet est d'un brun noirâtre.

L'apdomen est, en dessus, de couleur noirâtre, mélangée de quelques poils roussâtres, avec trois taches latérales d'un jaune fauve, suivies jusqu'à l'extrémité d'une série de petits faisceaux de poils d'un fauve un reu roux. La brosse anale est un peu poire à sa base et ensuite d'un fauve roussâtre.

Le dessous des ailes est noirâtre avec la base et le bord abdominal des inférieures d'un jaune d'ocre. Le ventre est noir avec des plaques jaunâtres sur les premiers anneaux. La poitrine est d'un blanc jaunâtre avec les palpes blancs.

Balmeira. - Lorquin. - Coll. Bd.

### ####

#### 31. M. MITCHELLII. Boisd.

Il est de la taille du Passalus. Ses ailes supérieures sont d'un brun olive depuis la base presque jusqu'au milieu; ensuite elles sont coupées par une bande transversale bien nette, droite, d'un blanc violàtre; entre cette bande et l'extrémité il y a une autre bande d'un brun olive, dont le côté externe se prolonge en un angle aigu jusqu'au sommet; le bord terminal est d'un gris violètre, divisé par une petite ligne courbe, très-peu marquée, et d'une couleur un peu plus claire.

Les ailes inférieures sont noires, traversées au milieu par une bande assez étroite, d'un jaune fauve.

Le corselet est d'un gris violatre, avec une bande longitudinale et le bord inférieur des épaulettes d'un brun-olive.

L'abdomen a les deux premiers anneaux d'un brun olivâtre; les deux suivants sont d'un gris violâtre, marqués chacun d'une tache latérale jaune et de deux taches dorsales noires; les autres anneaux sont bruns, interrompus sur le milieu du dos par du naître; l'avant-dernier semble être tronqué carrément; il est suivi d'une brosse anale brune, étalée, précédée à sa base d'une tache noire; outre cela, les articulations sont un peu liserées de blanchâtre.

Le dessous des ailes est ferrugineux avec le bord abdominal des inférieures d'un jaune d'ocre. Le ventre est également ferrugineux, bordé par des faisceaux de poils noirs étalés latinament et terminés par du blanc. Les palpes sont blancs.

Décrit sur un individu très-pur, que nous avons requiences venant de Java.

Nous avons dédié ce remarquable Macroglosse à la minent de feu notre excellent ami W. Mitchell, mort à Paris, après avir résilié ses fonctions de directeur du Zoological garden, de la dres.

#### 32. M. ERRANS. Boisd.

Walker, Heterocera, p. 96, 20.

ll est à peu près de la taille du stellatarum. Ses siles impirieures sont d'un brun grisâtre avec des bandes transversales d'une tache apicale d'un brun olivâtre; elles sont marquées, soutre, dans leur milieu, d'une bande transverse, droite, d'une blanc un peu luisant.

Les ailes inférieures sont jaunes avec la base et la bordan noires.

Le corselet et la tête sont un peu olivâtres avec les épauleus liserées de blanchâtre près de la base de l'aile.

L'abdomen est un peu grisâtre sur le dos, marqué de six petites taches noires carrées, disposées sur deux rangs; sur se côtés on remarque vers la base deux taches jaunes, et ensuis des taches noires, séparées par des incisions blanches.

En dessous il est d'une couleur obscure avec le bord abdomnal des inférieures de couleur jaune d'ocre.

Décrit au British Museum sur un individu venant de la Nosvelle-Hollande.

#### 33. M. FRINGILLA. Boisd.

Il a tout-à-fait le port de l'errans, dont il est très-rapproché. Ses ailes supérieures sont brunes, fasciées de noir, avec un bande médiane transverse, droite, de couleur blanche.

Les ailes inférieures sont noires, traversées au milieu par un bande d'un jaune d'ocre.

La tête et le corselet sont d'un brun olivâtre avec une liger frontale plus obscure.

L'abdomen est brun en dessus, marqué de chaque côté de tres taches jaunes; il y a sur le milieu du dos une incision transver-

sale noire, se liant à deux points d'un brun obscur; la brosse anale est noire, précédée d'un point de la même couleur, situé sur le milieu de l'avant-dernier segment.

En dessous, le bord abdominal des ailes inférieures est jaune; le ventre est ferrugineux, marqué de points blancs sur les côtés.

Décrit sur un individu recueilli dans l'Inde, par feu Duvancel, voyageur du Gouvernement.

M. N.

#### 34. M. RECTIFASCIA.

Rhemphoschisma rectifascia, Feld. Novara, Exped. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 75, fig. 7.

Il a le port et la taille du Faro et du Passalus. Ses ailes supérieures sont d'un brun olivâtre, traversées, dans leur milieu, par une bande droite, très-nette, d'un blanc violacé, un peu élargie dans sa partie inférieure.

Les ailes inférieures sont noires, traversées par une bande médiane, d'un fauve vif, mais un peu plus pâle vers l'angle anal.

La tête et le prothorax sont d'un brun grisâtre.

Le corselet a les épaulettes de la couleur des premières ailes. L'abdomen est brun, fasciculé sur les côtés de petites touffes de poils d'un brun noirâtre, entrecoupées, sur chacun des anneaux, par un point blanchâtre. Les articulations sont un peu plus claires que la teinte générale; la brosse anale est brune; outre cela, il y a sur le dos une double rangée de petites taches noires dispoées deux par deux sur chaque anneau.

Nous ne connaissons pas cette belle espèce qui exceptionnellement est dépourvue de taches latérales jaunes.

Elle se trouve à Ceylan et fait partie de la collection de M. Felder (1).

(i) Le docteur Cajetan Felder, à Vienne, en Autriche, est possesseur d'une très-riche collection de Lépidoptères de tous les pays, pour laquelle il a fait de très-grands sacrifices. Les travaux qu'il a publiés sur cet ordre d'insectes, sont nombreux et très-estimés. Les planches qui accompagnent le texte sont d'une exécution parfaite. Le plus remarquable de ces ouvrages est sans contredit, la publication des espèces recueillies ou censées recueillies pendant l'expédition zoologique de la Novara. Il a été aidé dans ses travaux par son fils Rudolf que sous avons eu la douleur de voir enlever à la fieur de l'âge, à sa famille, à la science et à ses nombreux amis.

#### 35. M. SCOTTIARUM.

Phamphoschisma Scottiarum, Feld. Novara, Exped. Zoolog. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 75, 8.

Cette charmante espèce a le port et la taille du Bombylans. Ses ailes supérieures sont d'un cendré obscur, traversées, su milieu, par une bande blanche, droite, très-nette et très-régulière; on voit en outre, vers la base, deux petites lignes sinuées, blanches, et avant l'extrémité, dont le fond est plus pâle, une autre petite ligne dentelée, transversale, blanchâtre, un peu obsolète.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocre, avec un peu de noir à la base, et une large bordure de la même couleur, s'atténuant pour arriver à l'angle anal.

Le corselet est d'un gris obsour avec les épaulettes légèrement liserées de blanc en dedans.

L'abdomen est gris, avec une double rangée dorsale de petites taches noires, disposées deux par deux, sur chacun des anneaux; outre cela, il y a un point latéral jaune sur le second segment. La brosse anale est noire.

Ce joli macroglosse habite l'Australie.

Nous ne l'avons jamais vu. Notre description est faite sur la figure qu'en a donnée M. Felder.

#### 36. M. HELIOPHILA. Boisd.

Il est à peu près de la taille du Corythus, mais ses ailes supérieures sont un peu plus pointues au sommet et très-légèrement sinuées. Le fond de leur couleur est le brun olivâtre, avec une bande médiane, droite, transversale, d'un blanc-grisâtre un peu violacé; la partie brune qui suit cette bande est fortement siauée en dehors, et précédée, vers le sommet, de deux traits longitudinaux noirs, dont l'inférieur beaucoup plus grand. Entre ces deux traits et la partie olivâtre, on voit, sur la côte, une éclaircée arrondie d'un gris blanchâtre.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande transversale d'un jaune d'ocre.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures.

L'abdomen est d'un fauve roussâtre en dessus, marqué, sur le milieu du dos, de deux taches noires parallèles. La brosse anale est brune, précédée d'une tache noire allongée. Le dessous des ailes est d'un roux cannelle, avec le bord abdominal des inférieures largement fauve. La poitrine et les palpes sont blancs. Le ventre est ferrugineux, avec une série latérale de deux ou trois petits points blancs; on voit encore sur les côtés, vers la base, des taches jaunes qui se fondent en dessus avec la couleur du dos.

Selon M. Lorquin, ce macroglosse vole au milieu du jour, à l'ardeur du soleil, avec une rapidité telle que l'œil ne peut le suivre.

Halmeira. - Coll. Bd.

#### 37. M. DIVERGENS.

Walker, Heterocera, p. 94, 17. — Moore, Catal. of ind. Company, p. 286, 694. — M. Prometheus, Boisd. M.

Il est un peu plus grand que le stellatarum. Ses ailes supérieures, un peu pointues, sont fasciées d'olivâtre sur un fond grisâtre; elles ont en outre, vers le sommet, une tache d'un brun olivâtre.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande médiane d'un june d'ocre.

Le corselet est olivâtre avec une raie médiane plus obscure commençant sur le front; les épaulettes sont distinctes, légèrement liserées de blanc en dessus.

L'abdomen est d'un brun un peu violâtre, marqué, sur le mileu du dos, de quatre taches noires disposées en carré; la brosse mile est large, étalée, de couleur noire; outre cela, on voit sur les côtés, près de la base, deux taches jaunes et le commencement d'une troisième.

En dessous, la poitrine et les palpes sont blancs; les ailes sont d'un brun cannelle, avec le bord abdominal des inférieures jaune. Cette belle espèce, que nous décrivons sur un individu trèspur, a été élevée de chenille à Java par M. Westermann. Nous l'aviens décrit dans nos notes sous le nom de Prometheus.

Call. Bd.

Il n'existait pas encore au British Museum à l'époque où nous fasions notre travail.

11111

#### 38. M. WESTERMANNII. Boisd.

Il est presque de la taitle du Faro et du Passatus, mais il ne resemble à aucune des espèces connues. Ses ailes supérieures

sont d'un gris violatre, avec la base d'un vert légèrement jaunatre; elles sont marquées, un peu au-delà de la base, d'une bande transverse assez large, d'un brun olivâtre, et un peu avant l'extrémité, d'une raie de la même couleur, fortement ombrée de brun intérieurement, en remontant vers la côte. Entre ces deux bandes, on voit une double ligne noirâtre ondulée.

Les ailes inférieures sont d'une couleur d'olive, avec une bordure brune et le bord de l'angle anal d'un jaune-ochracé grisatre.

Le corselet est d'un vert olive.

L'abdomen est noir en dessus, avec les deux premiers anneaux d'un jaune ochracé, interrompus sur le dos; les anneaux suivans sont marqués de jaune fauve; la brosse suale est peu étalée, de couleur jaunâtre.

Le dessous des ailes est ferrugineux, avec le bord abdomical des inférieures d'un jaune d'ocre. Le ventre est lavé de jaunêtre. La poitrine est d'un jaune pêle avec les palpes blancs.

Il a été élevé de chenille à la côte de Guinée, dans la colonie danoise, par les frères moraves, et envoyé à M. Westermann, à Copenhague.

Coll. Bd.

#### <del>1111111</del>

#### 39. M. MICACEA.

Walker, Heterocera, p. 96, 21. - M. Ethus, Boisd. M.

Il est de la taille du stellatarum. Ses ailes supérieures sont brunes fasciées de noirâtre, à reflet un peu verdâtre ou bleuâtre.

Les ailes inférieures sont d'un noir foncé, avec le bord costal et l'angle anal de couleur blanche ou un peu testacée.

Le corselet est brun.

L'abdomen est brunâtre, avec les articulations plus obscures deux ou trois petites taches latérales blanches; les trois dernie anneaux sont roussâtres latéralement, et le dernier se termit par une brosse noire étalée.

Le dessous est noirâtre avec l'angle anal des ailes inférieus blanc. Le ventre est nuancé de ferrugineux sur le milieu d premiers anneaux, et bordé sur les côtés, de petits faisceaux poils blancs. La partie antérieure de la poitrine et les palpes si d'un blanc un peu grisâtre.

Nouvelle-Hollande. — Coll. Bd. — Il est assez répandu du les collections.

#### \*\*\*\*\*\*\*

## 40. M. ÆDON. Boisd.

Il est à peu près de la taille du Ceculus. Ses ailes supérieures est d'un brun-noir olivâtre, traversées par trois raies hjanches, lest une, entre la base et le milieu très-droite, une seconde, également droite, un peu au-delà du milieu, et la troisième flexueuse, m peu maculaire, entre celle-ci et l'extrémité.

Les ailes inférieures sont entièrement noires.

Le corselet est d'un noir olivâtre, avec une raie longitudinale

Labdomen est d'un gris jaunâtre, avec deux anneaux du miles coupés transversalement par une bande noire, interrompue, meulaire. La brosse anale est d'un brun noir. Les antennes sont musitres, avec la massue blanche.

Le dessous des ailes supérieures est plus pâle que la face oplesée; celui des inférieures est un peu jaunâtre, avec une petite la blanchâtre vers leur angle externe. Le ventre est brulètre, avec une série latérale de petits points blancs. La poitrine s les palpes sont blancs.

Décrit sur un individu unique, reçu de l'île de Cuba par M. Em.

Coll. Bd.

#### 41. M. COMMASLE. Boisd.

Walker, Heterocera, p. 90, 9.

Il est à peu près de la taille du *Trochilus*. Ses ailes supérieures mt fasciées de brun un peu olivâtre, et offrent, vers le sommet, sex taches noires assez mal indiquées.

Les ailes inférieures sont entièrement noires.

Le corselet est d'un brun noir.

L'abdomen est d'un noir obscur sur le dos, avec deux anneaux m blanc de neige, tiraut légèrement sur le bleu; le premier de s deux anneaux est un peu interrompu, et le second est suivi anne tache de sa couleur.

Le dessous du corps est brun, avec la poitrine, les palpes, les nes et deux petits faisceaux latéraux, blancs; la base des ailes d'un blanc légèrement bleuâtre. Ce rare et joli Macroglosse se trouve à Commasia, près de Sierra-Leone.

Nous l'avons décrit au British Museum sur un individu mique.

#### 42. M. TANTALUS.

Cramer, 68, K, F. — Walker, Heterocers, p. 88, 4. — Zonata, Bruy, Ins. I, 26, 5. — Izolon? Fab. Mantiss. 2, 96, 2. — Tantalus? Linn. Re. Lud. ulr. 21.

Linné, dans son Systema naturæ et dans son Museum Lal. ulricæ, p. 361, décrit sous le nom de Tantalus, un Macrogion qui n'est probablement qu'une variété de celui dont il est quetion ici. Selon ce célèbre savant, ses ailes sont brunes sans accunes taches, son corps est également noirâtre, avec une cinture d'un blanc pur sur le troisième segment abdominal.

Le Tantalus figuré par Cramer est de la taille du stellatare.

Ses ailes supérieures sont d'un brun-olivatre obscur avec un bande transverse, obsolète, plus pâle; outre cela, elles sont marquées un peu avant l'extrémité d'une série transversale de très petites taches blanches.

Les ailes inférieures sont noires avec le bord antérieur un peuplus clair.

Le corselet est d'un noir olivâtre,

L'abdomen est noir antérieurement, marqué ensuite d'un bande transversale d'un blanc de neige; les anneaux suivant sont un peu grisâtres ou ferruginoux, plus ou moins tachetés de brun ou de roussâtre. La brosse analo est noire.

Les ailes sont noirâtres en dessous avec le bord abdominal des inférieures blanc. Le ventre est d'un brun un peu ferruginaux, avec une série latérale de petits points blanchâtres. La poitrime est d'un blanc grisâtre avec les palpes blancs.

Il se trouve communément aux Antilles et sur plusieurs points du continent américain.

Nous avons vu des variétés de la Guadeloupe chez lesquelles les ailes supérieures sont d'une teinte un peu ferrugineuse.

#### 43. M. TITAN.

Cram. 142, F.

Il est près de moitié plus grand que le Tantalus, dont il strès-voisin. Il s'en distingué au premier coup-d'œil par ses ails

mérieure, traversées par deux bandes blanches étroites, un macutaires, formées par de petites lunules et divisées par se petite ligne obsolète de la couleur du fond. Son corselet est lus pâle, plus olivâtre. L'abdomen est également traversé par se bande d'un blanc de neige, mais sa partie postérieure est lus noire. La brosse anale est noire et très-étalée avec le derier anneau d'un gris olivâtre.

Le dessous des ailes est un peu plus pâle que la face opposée, vee le bord abdominal des inférieures blanc; le ventre est brun vee quelques points latéraux blancs. La poitrine et les palpes est d'un blanc grisâtre.

Il se trouve assez communément au Brésil et à la Guyane.

#### .44. M. FADUS.

Cramer, 61, C. — Fab. Eat. S. III, 1, p. 879, 4.

Nous ne connaissons pas ce Macroglosse. Nous supposons même per Fabricius ne l'a jamais vu non plus. La phrase diagnostique qu'il donne est évidemment faite sur la figure de Cramer.

le ressemble complétement au Titan, dont il ne diffère que par

Note. Nous pensons que les Macroglossa Tantalus, Titan et Fadus ne sont que des variétés d'une même espèce. Nous avons m sous les yeux un grand nombre d'individus de différentes lo-lambés. Nous avons vu des Tantalus qui n'avaient plus qu'un ou leux points blancs. Nous avons également vu des Titan qui laient dépourvus de la raie blanche médiane. Quant au Fadus, l'est un Titan sans anneau blanc. Cette dernière variété, si ce l'est pas un individu tourné au gras, se trouve à Surinam.

#### <del>11111111</del>

#### 45. M. CECULUS.

8ph. idem, Cramer, 148, G. — M. Ceculus, Walker, Heterocera, p. 88, — M. annulosum, Swains. Illustrat. III, pl. 132, f. ≥.

Il a le port du stellatarum, mais il est un peu plus petit que i individus ordinaires. Ses ailes supérieures sont d'un brun-latre clair, avec des bandes transversales un peu ondulées d'un moir.

Les ailes inférieures sont noires, traversées par une bande médiane étroite, d'un jaune d'oore, qui s'élargit un peu pour arriver au bord abdominal.

Le corselet est brunâtre.

L'abdomen est également brunâtre sur le dos; il offre latéralement vers la base deux taches fauves, dont la première moins indiquée et quelquefois nulle; l'avant-dernier anneau est quelquefois marqué d'un peu de blanc jaunâtre sur les côtés. La brosse anale est noire.

Le dessous des ailes est noir avec la base, la poitrine et les palpes d'un blanc tirant un peu sur le vert. Le ventrè est noir avec quelques petits points latéraux, blancs.

Il se trouve à Cayenne, au Brésil et en Colombie.

Coll. Bd.

#### 46. M. SAGRA.

Poey, Centurie de l'île de Cuba. — Walker, Heterocera, p. 89, 6.— Eupyrrhoglossum sagra, Grote, Proced. of Ent. Soc. of Philad.

Il est un peu plus grand que le stellatarum. Il se distingue de tous les autres par ses ailes légèrement sinuées. Les supérieures sont d'un brun-grisâtre luisant avec des bandes et des raies transversales irrégulières, brunes; outre cela elles offrent, non loin de la base, une petite ligne transversale blanchâtre, un stigmate noir sous la côte, et au milieu de la bande postérieure brune une petite lunule blanche.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande médiane linéaire, très-étroite, d'un jaune d'ocre, ainsi que la frange.

Le corselet est d'un gris un peu violatre avec une raie médiane plus obscure et les épaulettes brunes.

L'abdomen est antérieurement d'un brun grisâtre, rayé longitudinalement de noirâtre, marqué latéralement dans son milieu d'une tache jaune, suivie de trois ou quatre petites taches de la même couleur, plus ou moins accusées; outre cela, les articulations du quatrième et du cinquième segment sont ferrugineuses, et celle du sixième est marquée de deux points jaunes. La brosse anale est brune.

Le dessous des ailes est brun avec la base des inférieures largement d'un blanc jaunâtre; l'extrémité des supérieures est panachée de jaune testacé. La poitrine et les palpes sont d'un blanc



joundtre. Le ventre est ferrugineux avec de petits points laté-

Il se trouve dans l'île de Cuba. Nous en avons reçu aussi deux exemplaires de Rio-Grande.

Coll. Bd.

M. Poey, qui a dédié cette espèce au savant Ramon de la Sagra, en a donné, en 1833, une excellente figure dans ses Centuries de l'île de Cuba.

#### 47. M. Corvus.

Boisd. Consid. sur les Lépid. du Guatemala, p. 66.

Il est un peu plus grand que le *Titan*, avec les ailes supérieures plus aiguës au sommet et très légèrement sinuées; ces dermères sont d'un brun-luisant un peu violacé avec trois bandes transversales d'un brun plus obscur.

Les ailes inférieures sont noires avec une bande médiane june, de médiocre largeur, qui se prolonge largement le long de la côte et qui se dilate un peu pour gagner l'angle anal, près daquel elle est coupée par une veine noire.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures avec les faulettes et une raie médiane brune.

L'abdomen est court, noir sur le dos, marqué antérieurement taches latérales jaunes. La brosse anale est noire.

Le dessous des ailes est brun avec l'origine des supérieures et toute la partie interne des inférieures d'un jaune d'ocre. La poitine, les palpes et une grande partie du ventre sont de cette dessière couleur.

Nous en avons reçu un très-bel exemplaire pris par Goudot sur les bords de la Magdalena, en Colombie. M. de l'Orza en a également reçu un individu dans un envoi de Nicaragua.

#### ++++++++

#### 48. M. TRIOPUS.

Westwood, Orient. Cabin. pl. 6, fig. 4. — Walker, Heterocera, p. 68, 18.

Il est un peu plus grand que le *Titan* avec les ailes plus larges.

supérjeures sont d'un brun-jaunâtre assez clair, avec des

sundes tréfisversales d'un brun noirâtre, ainsi que la bordure;

elles offrent, en outre, sur le milieu, une tache un peu quadrangulaire, d'un blanc légèrement nacré.

Les ailes inférieures sont brunes avec une tache d'un blanc nacré sur leur bord externe, et une ou deux raies obsolètes, d'un brun pàle, vers le bord terminal; outre cela, le bord abdominal est liseré de rouge-carmin.

Le corselet est d'un brun pâle.

L'abdomen plus obscur avec les articulations neirâtres, est marqué, sur le milieu, d'un large anneau d'un beau rouge carmin, interrompu sur le dos; la brosse anale est noirâtre.

En dessous les ailes inférieures sont d'un rouge un peu rose, traversées par deux raies noires.

La figure que M. Westwood a donnée de ce Macroglosse dans son Oriental Cabinet est fort exacte, sauf que la couleur est moins brillante que chez deux individus que nous avons décrits sur nature au British Museum. Ils sont tellement purs et intacts qu'on pourrait croire qu'ils ont été élevés de la chenille.

Cette rare espèce habite Assam. - British Museum.

## 

#### 49. M. PHARTON.

Euproserpinus Phaeton, Grot. et R. Cat. of american Sph. Proceed. of Ent. S. of Phil. p. 30.

M. Erato, Boisd. Lépid. de la Californ. part. II, p. 63, 67.

Cette charmante petite espèce ne ressemble à aucune autre. Elle est un peu plus petite que notre Bombyliformis. Ses ailes supérieures sont d'un gris cendré, avec une large bordure noirâtre, précédée d'une petite ligne obsolète de la même couleur; on voit en outre à leur base quelques petits traits et sous la côte un stigmate oblique noir.

Les ailes inférieures sont blanches avec une bordure noire assez large; la frange est également blanche.

Le corselet est d'un noir grisâtre ainsi que l'abdomen. La brosse anale est noirâtre.

Le, dessous ressemble au dessus, sauf que les ailes supérieures, au lieu d'être grises, sont presque blanches avec la bordure noirâtre. La poitrine est d'un blanc grisâtre avec les palpes blancs.

La découverte de ce rare et curieux macroglosse appartient à

Lorquin, qui en a pris deux individus dans la Sonora, aux environs de Los Angelos.

Nous avons prêté cette rareté à MM. Grote et Robinson, ainsi que plusieurs autres Lépidoptères hétérocères pour qu'ils puissent, selon leur désir, les faire figurer dans un ouvrage qu'ils ont entrepris sur les Lépidoptères Hétérocères des Etats-Unis d'Amérique.

Nous ne savons pas par quel hasard ces messieurs ont changé notre nom d'Erato pour lui substituer celui de Phaeton.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### 50. M. CROATICA.

Ochs. Schmett. von Europ. III, p. 191, 3. — Boisd. Ind. meth. p. 32. — Icones, Sphing. pl. 48, f. 5, p. 13. — Duponch. Suppl. pl. III, f. 3. — Sphinx idem, Esp. Schm. tab. 45, Cont. 20, fig. 2. — Sphinx Sesia, Habn. Sphing. fig. 89.

Il est à peine plus grand que le Bombyliformis. Chez les individus bien frais, élevés de chenilles, les ailes supérieures sont d'un beau vert olive, avec une large bordure brune, divisée par des nervures un peu plus claires. Dans les individus qui ont volé, le vert olive est moins brillant.

Les ailes inférieures sont entièrement d'un roux ferrugineux. Le dessous des quatre ailes est roux avec la base un peu plus pâle.

La tête, le corselet et les premiers anneaux de l'abdomen sont du même vert que les alles supérieures; les deux anneaux du milieu sont d'un brun marron; les deux suivants sont jaunes et l'antérieur est coupé par une tache d'un brun marron; la brosse ansie est aussi d'un brun marron avec l'extrémité noirâtre.

En dessous, la tête, la poitrine et les premiers anneaux de l'abdomen sont blance; le reste du corps est d'un brun marron.

Ce macroglusse, toujours assez rare dans les collections, habite la Dalmatie, l'Illyrie, la Croatie et la Morée.

Parreys et Dahl ont découvert et élevé la chenille sur l'Asperula Calabrica. Kindermann l'a trouvée sur une espèce de scabieuse et l'a envoyée à M. Freyer, qui en a donné la figure sur une Centaurea! T. II, pl. 188. Elle est d'un beau vert, finement pointillée de vert obscur, avec une raie latérale blanche; la tête est d'un bran verdâtre; la corne et les pattes antérieures sont

rougeâtres. Les stigmates sont orangés, placés entre deux point blancs. Aux environs de Salzbourg, elle donne deux générations par an.

Coll. Bd.

#### 1111111111111111

#### 51. M. FLAVOFASCIATA. Barnston.

Walker, Heterocera, p. 87, 3.—Clemens, Synop. N. am. Sphing. 131. Lepisesia flavofasciata, Grote, Proc. of the Ent. Soc. of Philad. V, p. 39.

Cette jolie petite espèce est à peu près de la taille du Diffinis. Ses ailes supérieures sont d'un brun noirâtre, avec l'extrémité plus pâle; elles sont en outre traversées obliquement par une bande un peu transparente.

Les ailes inférieures sont noires, avec une bande jaune, transversale, rétrécie vers le bord abdominal.

Le corselet est d'un jaune verdâtre.

L'abdomen est de cette dernière couleur avec le dos noirâtre; la brosse anale est jaune et offre dans son milieu un faisceau de poils noirs.

Le dessous du corps est noir avec les palpes jaunes.

Ce rare macroglosse habite le voisinage de la baie d'Hudson. Nous l'avons décrit sur deux individus appartenant au British 'Museum: les seuls probablement qui existent dans les collections européennes.

## 

#### 52. M. SIEBOLDI.

Boisd. in L'Orza, les Lepid. japonais à l'exp. de 1867, p. 35, 76.

Il a tout à fait le port de notre fuciformis, dont il se rapproche beaucoup. Ses ailes supérieures sont transparentes avec une bordure noirâtre régulière, assez large, et un petit trait de la même couleur sur la cessule discosdale; la base est aussi d'une teinte noirâtre.

Les ailes inférieures sont également transparentes avec une très-petite bordure brune; leur bord abdomina! est d'un jaune ochracé.

Le corselet est d'un vert olive.

L'abdomen est noir avec quelques poils jaunes clair-semés sur

les côtés; les deux derniers anneaux sont d'un jaune pâle, interrompus sur le dos et sous le ventre, qui est entièrement noir.

Cette espèce, prise au Japon par Siebold, nous a été envoyée de Leyde par Dehaan.

Coll. Bd.

#### 53. M. Fuciformis.

Linné, S. nat. 2, 803, 28. — Fauna suecica, p. 289, 1092. — Ochs. Schmett. von Europ. III, p. 185, 1. — Boisd. Ind. meth. — Duponch. Catal. — Bombyliformis, Fab. — Hubner, — Borkh. — Esp. — God. — etc.

La plupart des entomologistes ont rapporté l'espèce n° 55 au véritable fuciformis de Linné. C'est le D' Illiger qui a tiré cette question au clair. Nous avouons en toute humilité que sans l'autorité de cet auteur et sans celle de Laspeyres, nous eussions agi de même, d'autant plus que, dans sa phrase diagnostique, Linné dit, en parlant des ailes supérieures: « Margine nigro atro-purpurascente, » ce qui s'applique mieux au Bombyliformis de Hubner qu'à notre fuciformis, dont l'extrémité des ailes en question est plutôt noire que tirant sur le pourpre. Peut-être Linné, de même que les auteurs du Catalogue systématique de Vienne, a-t-il confondu ensemble les deux espèces.

Ses quatre ailes sont transparentes avec les nervures, une bande terminale, la base et un petit trait oblique sous la côte des supérieures d'un brun noir.

Le corselet est plutôt jaunâtre qu'olive, surtout sur les épaulettes et à sa partie postérieure.

L'abdomen est d'un jaune un peu verdâtre à sa base, noir sur les anneaux suivants, ensuite d'un jaune orange, avec les côtés garnis de petits faisceaux de poils d'un jaune pâle; la brosse anale est d'un jaune pâle dans son milieu et noire sur les côtés.

En dessous, la base des quatre ailes est d'un jaune un peu orangé.

La chenille, que nous avons figurée dans notre Iconographie, Sphingides, pl. 10, fig. 3—4, est d'un vert foncé plus ou moins pointillé de vert obscur; elle a de chaque côté une raie blanche commençant sur le premier anneau et expirant à la base de la corne. Dans la plupart des individus, cette raie est bordée en dessus, à partir du second anueau, par une rangée de traits d'un rouge ferrugineux ou d'un violet pourpre. Plus bas, sur les côtés,

on voit huit traits obliques, ferrugineux, portant chacun un stigmate blanc. La corne est ferrugineuse sur les côtés. Lorsque cette chenille est jeune, elle a simplement une raie blauche, et ressemble beaucoup à celle du stellatarum. Elle vit généralement dans les allées herbeuses des bois, sur la Scabiosa succisa, à la fin de juin et en septembre. Lorsque l'on veut se donner la peine de la chercher, on la trouve assez communément, plus facilement même que celle du Bombyliformis.

L'insecte parfait paraît, pour la première époque, dans la pemière quinzaine de mai, et, pour la seconde fois, à la fin de pulet. Lorsqu'il vient d'éclore, il est entièrement noiratre, mais de qu'il a agité ses ailes, les écailles s'envolent comme de la pousière et il devient transparent. Il est probable que les espèces du même groupe sont dans le même cas.

Il se trouve dans toute l'Europe, dans les mêmes lie fuciformis, dont il a toutes les habitudes.

#### 54. M. DIFFINIS.

Boisd. Sp. pl. 15, II, B, fig. 2. — Walker, Heterocera, p. 81, 3. – Sphinæ fuciformis, Smith-Abbot, Ins. Lepid. of Georgia, tab. 43.

Il a le port et la taille du Fuciformis. Ses quatre ailes sont transparentes avec les nervures noirâtres; les supérieures ont la base et la bordure brunes, et en outre un petit trait oblique de la même couleur à l'extrémité de la cellule discoïdale.

Les ailes inférieures offrent sur le bord abdominal quelque poils jaunes clair-semés.

Le corselet est d'un jaune à peine olivâtre avec le milieu me peu plus foncé.

L'abdomen est jaunâtre à sa base, marqué ensuite, dans son milieu, d'une large bande transverse, noire, interrompue plus on moins, sur le des, par des poils jaunâtres; celle-ci est suivie d'une ceinture jaune, plus claire sur les côtés et presque roussâtre en dessus; outre cela, on remarque de chaque côté sur la bande noire et même quelquefois sur le dos, un ou deux points bleutres. La brosse anale est roussâtre avec le dessous et les côtés noirs.

En dessous, la poitrine et les palpes sont d'un jaune pâle; l'abdomen est noir avec deux petits faisceaux latéraux de poils jaunes. Il n'est probablement pes plus rare dans certains districts des Euss-Unis d'Amérique que notre Faciformis ne l'est en Europe.

La chenille, qui vit sur les Amsonia angustifotia et latifolia, et peut-être sur d'autres Apocynées, est d'un vert blanchâtre, pointillée de vert obscur avec une raie dorsale brunâtre et une raie latérale blanche placée au-dessus des stigmates; ces derniers sont blancs, cerclés de noir; le premier anneau est liseré d'un peu de rouge briqueté; la corne est brune, un peu arquée d'arrière en avant. Dans une variété, dont Abbot nous a envoyé un autre dessin, il règne entre les pattes et les stigmates une bande longitudinale d'un jaune soufre. Dans l'une comme dans l'autre, le dessous du ventre est ferrugineux.

Nous ne sommes pas très-surpris que Smith, qui n'y regardait pas de très-près pour la détermination des espèces dessinées par Abbot, ait rapporté ce Macroglosse au Fuciformis de Linné; mais ce qui nous étonne, c'est qu'un Lépidoptérologue de la valeur d'Ochsenheimer soit tombé dans la même erreur. Evidemment, il n'avait jamais vu la chenille de notre Fuciformis.

#### 55. M. Bombyliformis.

Ochs. Schm. von Europ. III, p. 189, 2. — Boisd. Ind. meth. — Duponchel, Catal. p. — Sphine faciformie, Fab. — Esp. — Huba. — God. etc.

Ses quatre ailes sont transparentes dans l'état ordinaire, avec les nervures noires et une bande marginale d'un noir un peu ferngineux; outre cela, les supérieures ont près du milieu de la cote, une tache de la même couleur; leur base est olivâtre.

Le corselet est d'un beau vert-olive.

L'abdomen est de la même couleur, avec les derniers anneaux un peu plus clairs, bordés, sur chacun de leurs côtés, de petits faisceaux de poils jaunes; il est, en outre, traversé au milieu, par une large ceinture d'un brun ferrugineux; la brosse anale est jaune avec les côtés noirs et le dessous ferrugineux.

Le dessous des ailes supérieures est jaune à la base.

La chenille vit exclusivement sur le chèvreseuille et non sur les Galium, comme l'ont dit quelques auteurs.

Nous l'avons trouvée de temps en temps; nous en avons même élevé d'œufs une poute entière. Lorsque cette chemille est toute petite, elle est d'un vert jouratre; plus tard, elle devient d'un vert plus ou moins clair, chagrinée, ordinairement sans aucun dessin; cependant chez quelques individus, on aperçoit l'apparence d'une raie pale. Dans toutes les variétés, le dessous du corps et les pattes membraneuses sont d'un brun ferrugineur ainsi que la corne. Les stigmates sont noirs, pupillés de blanc et cerclés de roux.

Ce Macroglosse paraît deux fois par an : 1º dans la première quinzaine de mai; 2º dans le courant de juillet. Il butine en plein jour dans les allées des bois sur les fleurs de la Bugle, ajuga reptans; dans les prairies, sur celles de la sauge des prés, Salvia pratensis, quelquefois dans les jardins de campagne sur celles du lilas.

Lorsqu'il zient d'éclore, s'il n'a point agité ses ailes, il est entièrement noir.

Il se trouve dans une grande partie de l'Europe.

#### 56. M. AFFINIS.

Bremer, Neue Lepid. aus ost-siberien und dem Amur Lande, p. 539. 27.

Ses ailes supérieures sont transparentes comme chez les espèces du même groupe. Elles ont la base et une large bordure noire; la côte est aussi bordée étroitement 🖮 noirâtre.

Les ailes inférieures sont transparentes avec la gouttière abdominale largement noire et une légère bordure de la même couleur.

Le corselet est d'un vert olivatre avec des raies latérales jaunes. L'abdomen est d'un vert olive avec le troisième et le quatrième

segment de couleur noire; les derniers anneaux sont garnis latéralement de petits faisceaux de poils jaunes; la brosse anale est noire mélangée de quelques poils jaunâtres.

Cette espèce, que nous n'avons jamais vue et que nous décrivons d'après l'ouvrage de M. Otto Bremer, a été découverte par M. Maack, entre Noor et l'embouchure de l'Ussuri.

#### 57. M. THETIS. Boisd.

Boisd. Lepid. de la Calif. pt. II, p. 64, 66.

Il a le port et la taille de notre Bombyliformis. Ses ailes sont transparentes avec les nervures noirâtres, comme dans les espèces du même groupe ; les sur érieures ont une petite bordure noire qui s'élargit insensiblement en arrivant au sommet.

Les inférieures ont la base et le bord interne noirs.

La tête et le corselet sont olivâtres.

L'abdomen est noir avec une ceinture jaune sur les deux derniers anneaux, mais seulement en dessus.

En dessous le corps est noir avec la poitrine jaune.

Lorquin a découvert cette espèce en Californie, butinant en plein jour sur les fleurs dans les clairières des bois.

Nous avons prêté ce Macroglosse à MM. Grote et Robinson, ainsi que plusieurs autres espèces rares ou uniques de la Californie, afin qu'ils puissent, selon leur désir, les faire figurer dans un ouvrage qu'ils ont entrepris sur les Lépidoptères des Etats-Unis d'Amérique.

Ces deux savants entomologistes n'ayant point encore pu, jusqu'à ce jour, trouver une occasion favorable pour nous retourner ces divers objets, il en résulte que la description du *Thetis*, que nous n'avons plus sous les yeux, est peut-être un peu trop succincte.

#### 58. M. THYSBE.

Sesia Thysbs, Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 351, 10.—Walker, Heterocera, p. 82, 5.— Sesia Pelasgus, Harris, Am. Journ. XXXVI.— Sph. Pelasgus, Cram. 248, B.— Sph. Cimbiciformis, Steph. Ill. Brit. Haustell. 1, p. 135, 3.

Il est de moitié plus grand que notre Bombyliformis. Ses quatre ailes sont transparentes; les supérieures ont la base assex largement ferrugineuse; cette couleur longe la côte presque jusqu'au milieu, en absorbant le petit trait oblique que l'on voit dans les espèces voisines; la bordure de l'extrémité est brune, assez large et un peu denticulée en dedans; outre cela, la base est garnie de poils olivâtres.

Les ailes inférieures sont largement ferrugineuses à leur base et le long du bord abdominal; leur bordure est brune et étroite.

Le corselet est d'un jaune olive ainsi que la base de l'abdomen; le reste du corps est brunâtre, avec des éclaircies jaunâtres sur le dos; le bord des anneaux est noirâtre dans les incisions, principalement sur les côtés; la brosse anale est entièrement noirâtre en dessus et ferrugineuse en dessous. En dessous, le contour des ailes est d'un brun ferrugineux aimi que l'abdomen, avec la poitrine et les palpes jaunes.

Cette grande espèce habite la Georgie d'Amérique et la Jamaique.

La chenille, d'après un beau dessin d'Abbot, est d'un vert preque jaune, pointillée de vert foncé avec une raie dorsale, interrompue, d'un rouge vineux, et des lignes latérales, obsolètes, un peu verdâtres; les stigmates sont blancs et placés chacun sur une tache d'un rouge vineux, renfermant un autre point blanc; à corne est droite, ferrugineuse et assez courte; les pattes et le cotour de la tête sont de cette dernière couleur.

Cette chenille vit en juin et en août sur plusieurs espèces de Cratægus.

#### 59. M. ETOLUS. J. LECONTE. M.

Nous n'avons jamais vu cette espèce; notre description est sim d'après un beau dessin que nous avons reçu de feu John leconte.

Ce Macroglosse est presque de la taille du Thysbe, mais il a peu le port d'un Bombyliformis. Ses ailes supérieures sont bruss avec une bande transverse, oblique, transparente, coupée par se nervures, sinuée sur son côté antérieur et dentée sur le côté qui regarde la base de l'aile.

Les ailes inférieures sont largement ferrugineuses à la bus, marquées, un peu au-delà du milieu, d'une tache transparent oblongo-arrondie, coupée par les nervures; la bordure est bruse.

La tête, le corselet et l'abdomen sont d'un vert olive; ce denier est marqué, un peu au-delà du milieu, de deux annessi bruns, dont le dernier est accolé à une tache de la même coules qui se prolonge jusqu'à la naissance de la brosse anale; celles est roussâtre, coupée par deux faisceaux de poils noirs.

Nous ne pouvons rien dire du dessous.

La chenille, d'après le dessin que nous avons sous les yeu, est verte, pointillée de vert plus obscur, avec une raie latérie couleur lie de vin, qui se prolonge de chaque côté, depuis le deuxième anneau jusqu'à la base de la corne; celle-ci est verte et peu arquée; les stigmates sont ferrugineux ainsi que le milies du ventre et les pattes membraneuses.

Selon John Leconte, elle vit sur plusieurs espèces de Viber-

sum, arbustes de la famille des Caprifoliacées. Nous ignorons si elle se trouve dans les Etats du nord ou dans cenx du sud.

Cette espèce forme un trait d'union entre Thysbe et Pyramus.

#### 60. M. GRACILIS.

Homorrhagia gracilis, Grote, Proceedings of the Ent. Soc. of Philad. vol. V, p. 174, pl. 3, fig. 1-2. — Macrogi. Ruficaudis, Walker, Heterocera.

Selon M. Grote, cette espèce n'est pas le véritable Ruficaudis de Kirby et c'est à tort que M. Walker l'a considérée comme telle.

Il a le port de Thysbe et la taille de notre Bombyli/ormis. Ses ailes sont vitrées, avec une bordure d'un roux foncé; outre cela, la base des ailes supérieures et le bord abdominal des inférieures sont d'un brun-obscur légèrement olivâtre; les premières sont marquées à l'extrémité de la cellule discoïdale d'un trait oblique poir.

Le corselet est olivâtre; l'abdomen est également olivâtre dans sa moitié antérieure; il est ensuite brun, mélangé de quelques poils olivâtres.

Le dessous des ailes est plus pâle que la face opposée. La poitine est blanche; le dessous de l'abdomen est marqué de chaque côté d'une rangée de petits points d'un blanc jaunâtre.

il se trouve dans les états du Nord de l'Amérique septentrionale.

#### 61. M. RUFICAUDIS.

Kirby, Faun. boreal. americ. IV, p. 303. — Homorrhagia Ruficaudis, Grote, op. cit. p. 475.

Nous ne connaissons pas ee Macroglosse. Est-ce une espèce particulière et hien caractérisée? nous n'en savons rien. M. Grote se la connaît pas plus que nous.

Voici sa description d'après Kirby: Corps d'un jaune olive en dessus, d'un jaune pâle en dessous. Antennes noires. Ailes supéneures d'un brun rougeâtre, avec le disque vitré, divisé par un trait oblique sous-costal; la base couverte d'écailles d'un jaune olive. Dessous de ces mêmes ailes avec la côte, le bord postérieur et les nervures d'un ferrugineux obscur.

Ailes inférieures vitrées sur le disque, avec la partie extérieure le la base et la côte de couleur jaune; la portion interne de cette même base ferrugineuse. En dessous, les parties foncées de la surface opposée sont la ferrugineuses avec la base d'un jaune pâle.

L'abdomen a les deux premiers anneaux d'un jaune clive, si deux suivants noirs et les autres ferrugineux, avec des tachs térales d'un jaune pâle.

Canada. — Selon Kirby, ce Macroglosse représenterait en Ambrique le Fuciformis de l'Europe (notre Bombyliformis).

#### 62. M. PYRAMUS. Boisd.

Il est un peu plus grand que notre Bombyliformis, dont il a tout à fait le port. Ses quatre ailes sont transparentes, comés, comme dans les espèces du même groupe, par des nervurs mirâtres; les supérieures ont la base noire, garnie de quelque poils olivâtres; la bordure est assez large, et d'un brun fessioneux; il y a en outre un petit trait oblique de la même codes à l'extrémité de la cellule discoïdale.

Les ailes inférieures sont largement ferrugineuses du côté de bord abdominal; leur bordure est étroite, d'un brun noirâte.

Le corselet est d'un vert olivâtre ainsi que l'abdomen; celtiest traversé au milieu par deux anneaux noirs, dont le denies est accolé, en arrière, à une tache dorsale de la même coules; la brosse anale, d'un vert olivâtre en dessus, est bordée de nie latéralement.

En dessous, tout le contour des ailes est d'un rouge ferregneux, avec la poitrine et les palpes blancs; le ventre est ferregneux avec de très-petits faisceaux de poils jaunâtres dans les incisions.

Il habite le nord des Etats-Unis d'Amérique.

La chenille, selon John Leconte, se trouve à deux époques, si juin et en septembre, sur les *Viburnum* et plusieurs autres abustes de la famille des Caprifoliacées. Nous n'en possédons pu le dessin.

Il nous paraît être bien voisin du Rusicaudis de Kirby.

#### 63. M. FUSCICAUDIS. Boisd.

Walker, Heterocera, p. 83, 7.

Au premier coup-d'œil, on le prendrait pour un Pyramus, mi il en est bien distinct par les caractères suivants : 1º les cinq der niers anneaux de l'abdomen et la brosse anale sont d'un brun roux; 2º la couleur brune est séparée, sur le dos, de la couleur clivâtre, par une ligne transversale d'un blanc pur; 3º la base des ailes supérieures est, comme dans Thysbe, plus largement noire, de sorte que cette couleur absorbe la petite raie transversale qui existe chez Pyramus.

Décrit au British Museum sur un exemplaire unique venant de Georgie.

#### 64. M. VENATA.

Ego venata, Feld. Novara, Exped. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 75, f. 6.

Il est à peu près de la taille d'Hylas, et il a tout à fait le port du Curtisii. Sez ailes sont transparentes avec les nervures noires; les supérieures ont la base, et la bordure d'un brun noir comme dans Curtisii.

Les ailes inférieures ont aussi la base d'un brun noir, ainsi que la bordure et le bord abdominal.

Les antennes sont noires. Les palpes sont d'un noir verdâtre en dessus et un peu roussâtre en dessous. Le corselet et l'abdomen sont entièrement d'un vert foncé. La brosse anale est noire, et offre dans son milieu, un pinceau d'une belle couleur fauve.

Le dessous du corps et les pattes sont d'un brun roussatré.

Nous en avons reçu un exemplaire de M. Lorquin, mais il ne se rappelait pas s'il l'avait pris à Ternate, à Célèbes ou aux îles Philippines.

L'individu figuré par M. Felder vient d'Amboine.

#### 65. M. RADIANS.

Sesia Radians, Walker, Heterocera, p. 84, 8.

Il a le port de notre Bombyliformis.

Les quatre ailes sont transparentes, avec la base d'un brun' roussatre; les supérieures ont la bordure large, d'un brun roux, ainsi que les nervures qui vont de la base à travers le disque.

Le corselet est un peu roussatre en dessus. L'abdomen est noiratre, avec le milieu ferrugineux; il est en outre marqué, près de l'extrémité, de deux bandes jaunes, un peu testacées sur les côtés. Le pinceau anal est noir, avec le milieu roux en dessus. Le dessous du corps est de couleur testacée.

Il a été rapporté de Shangai par M. Fortune. — British Museum.

#### 66. M. Baundersh. Boisd.

Walker, Heterocera, p. 63, f. 7.

Il est un peu plus grand que le Bombyliformis, dont il a le port. Ses quatre ailes sont transparentes. Les supérieures ont la base roussâtre, couverte de poils olivâtres; la côte est de cette dernière couleur; la bordure du limbe est de largeur moyanne, et d'un noir un peu roux.

La tête est noirâtre. L'abdomen est d'un brun verdâtre, avec une ceinture d'un rouge ferrugineux; son extrémité est jaune, et les côtés sont marqués de taches latérales d'un roux testacé. Le pinceau anal est roussâtre, mélangé de poils noirs et de poils jaunes.

Le dessous du corps est d'un blanc roussâtre.

Il se trouve au nord des Indes. — British Museum.

Nous avons dédié ce joli Macroglosse à l'aimable M. William Wilson Saunders, auteur de plusieurs Mémoires sur les insectes des Indes et de l'Australie, et d'une Monographie du genre Erycina, comme un faible témoignage de reconnaissance pour l'accueil bienveillant qu'il nous a fait en Angleterre.

#### 67. M. CURTISH, Boisd.

Il a le port des espèces précédentes. Ses quatre ailes sont diaphanes, avec la côte et le sommet assez largement noirs.

Le corselet est d'un jaune verdâtre, avec l'abdomen un peu plus obscur en avant, et d'un jaune gai en arrière, où il est marqué de deux anneaux noirs, dont le dernier est accolé à une tache carrée de la même couleur. La brosse anale est entièrement noire.

Le dessous du corps est d'un jaune bianchâtre, avec le ventre d'un brun ferrugineux.

Cette espèce, avec la bordure noire de ses ailes plus large que dans les espèces précédentes, rappelle un peu notre Bombyliformés.



Nous avons dédié ce Macroglosse à feu notre excellent ami John Curtis.

Cochinchine. — Coll. Bd. — Sylhet. — British Museum.

68. M. Apus.

Boisd. Faune de Madagascar, pl. 10, f. 4.

Il a le port et la taille d'Hylas. Ses quatre ailes sont vitrées de même, avec la côte et le bout du sommet des supérieures d'un brun noir; leur bord interne est noirâtre, couvert de poils ver- dâtres. La tête et le corselet sont verts, avec un reflet bleuâtre. les antennes sont noires.

L'abdomen est jaunâtre en dessus, avec deux anneaux du milieu, d'une belle couleur ferrugineuse, dont le postérieur est quelquefois incomplet. La brosse anale est également ferrugineuse.

Le dessous du corps est d'un jaune roussâtre.

Il habite les îles Maurice et Bourbon.

La chenille, selon Marchal, est verte, avec des taches ferrugineuses. Elle vit sur le lilas.

L'insecte parfait butine en plein jour sur les fleurs, en janvier, mars et août.

Coll. Bd. - Assez rare.

69. M. CUNNINGHAMI. Boisd.

Walker? Heterocera, p. 85, 10.

Il a le port et la taille d'Hylas. Ses ailes sont transparentes; les supérieures ont le sommet beaucoup plus largement noir que dans Hylas; la côte de ces mêmes ailes est également noire. Le corselet et la base de l'abdomen sont d'un vert-olive un peu jaunêtre; le dos est d'un beau jaune, principalement en arrière; il est en outre marqué, au milieu, de deux anneaux d'un noir profond, dont le dernier est accolé à une petite tache carrée de la même couleur. La brosse anale est noire.

En dessous, le corps est d'un beau jaune, avec les palpes blanchâtres, la poitrine plus pâle et le ventre marqué d'une ceinture noire.

Décrit sur un individu unique, pris sur la côte occidentale de

la Nouvelle-Hollande, par feu l'amiral d'Urville, qui nous a m nifesté le désir qu'il portât le nom de son ami Cunningham.

Coll. Bd. - Très-rare.

Nota. Tous les individus qui nous ont été communiqués su le nom de Cunninghami, étaient des M. Yunz, qui ne sont pastètre qu'une modification locale d'Hylas.

#### 70. M. CONFINIS. Boisd.

Il est très-voisin d'Hylas, dont il n'est peut-être qu'une medification locale. Il est plus petit, de la même couleur, ou pet tôt un peu plus jaunâtre; les deux anneaux de l'abdomen sent plus étroits, la brosse anale est beaucoup moins étalée, mélangie, en dessus, de quelques poils verdâtres; les côtés de l'abdomes offrent une rangée de petites taches blanches.

Il se trouve au Sénégal, à la Cazamance et à Natal. Le British Museum en possède plusieurs exemplaires venant de Sierra Leone et d'Ashantee.

Coll. Bd.

#### 71. M. YUNX. Boisd.

Il est aussi très-voisin d'Hylas, mais il est encore plus pelle Confinis. Il est d'un jaune à peine verdâtre. L'abdomna un seul anneau ferrugineux, lequel est accolé en arrière à un petite tache obsolète de la même couleur; la brosse anale et jaune en dessus avec les côtés et le dessous noirs.

Le ventre est d'un ferrugineux vif, avec trois séries de petite taches blanches.

Australie. — Coll. Bd. — British Museum.

C'est cette espèce que nous avons vue au British Museum son le faux nom de Cunninghami. Le vrai Cunninghami n'axisti pas alors dans ce riche musée.

#### 72. M. HYLAS.

Linn. Mant. I, p. 539.—S. Picus, Cram. 148, B. — M. Picus, Kohsin Hugel's Kaschmir. IV, 11, p. 458. — Sesia Hylas, Fab. Ent. S. III, p. 379, 3. — Walker, — Meore, etc.

Il est un peu plus grand que notre Bombyliformis. Ses quatrailes sont transparentes avec la côte et l'extrémité des supéries res d'un brun noirâtre.

Le corselet est d'un vert jaunâtre.

L'abdomen est également d'un vert jaunâtre, marqué sur le silien du dos de deux anneaux ferrugineux, dont le second est secié à une petite tache carrée de la même couleur.

En dessous, les palpes et la poitrine sont de couleur blanche insi que deux taches interrompues, sur chaque côté de l'abdonen. La brosse anale est noire.

La chenille de cette espèce, selon le capitaine Shervill, vit less l'Inde sur un arbuste qui ressemble un peu à un chevre-faulle. Elle est d'un vert clair, ayec trois raies plus obscures, dent une dorsale.

Ce Macroglosse est commun aux Indes orientales. Le British Baseum en possède une belle série provenant de différentes lomilés. Lorquin ne l'a pas trouvé aux îles Philippines ni dans les Molugues.

## Genne SATASPES. Moore. — Myodezia. Boisd, M. olim. Macroglossa. Walker.

Nous ne savons rien des premiers états des deux espèces constituent ce genre que nous avions établi sous le nom Myodezia, mais que M. Moore a publié depuis sous celui Sataspes que nous nous empressons d'adopter.

L'insecte parfait rappelle tout à fait, par son facies, cerbins grands Hyménoptères des mêmes contrées, voisins les Xylocopes.

Tête courte, un peu retirée sous le corselet. Palpes raplechés, non velus, rugueux, collés sur le front. Trompe le la longueur du corps. Yeux ronds, de grosseur moyenne. Antennes courtes, raides, droites, dentées en scie dans les leux sexes, mais plus fortement dans les mâles, terminées ler un très-petit crochet. Corselet bombé, à épaulettes non baiquées. Abdomen large, très-court, très-déprimé et preslus concave en dessous, muni de petits faisceaux latéraux le poils et d'une brosse anale courte, étalée. Ailes entières; supérieures longues et très-étroites.

Selon Lorquin, les Sataspes sont très-difficiles à prendre; volent en plein jour d'une fleur à l'autre saté s'arrêter.

#### 4. S. INFERNALIS.

Moore, Catal. of Lepidopt. of ind. Comp. I, p. 261, 397. — Sais Infornalis, Westwood, Cabin. orient. Ent. p. 61, pl. 30, fig. 3. — Mecroglossa Infornalis, Walker, List. Lepid. Brit. Mus. Heter. pt. VIII, p. 95.

Ce curieux Sphingide, quoique appartenant évidemment à la tribu des Macroglossides, n'a aucun rapport avec les autres es pèces connues. On le prendrait plutôt pour un grand Hyménetère que pour un Lépidoptère.

Ses ailes supérieures, longues et très étroites, sont bruns, marquées près de la base de traits transverses, noirs; elles cat, a outre, au-delà du milieu, une espèce de bande mai artés, d'un vert bronzé se fondant avec la teinte générale.

Les ailes inférieures sont noires avec le bord costal blanc.

Le collier et le dessus du corselet sont d'un jaune d'or.

L'abdomen est d'un brun luisant, avec les incisions noires.

Le dessous des ailes est noir avec le milieu bronzé et la bes un peu blanche.

Le ventre ainsi que la brosse anale sont entièrement noir. Nous possédons une femelle venant de Java et un mâle à Sylhet.

Coll. Bd. - British Museum. - Rare.

#### 2. S. TAGALICA. Boisd.

La nature a rarement produit une seule espèce dans un gene. Nous avons observé que, quelle que soit la forme plus ou moins estraordinaire de cette espèce, on en rencontrait toujours une seconde, sinon un plus grand nombre. C'est ce qui est arrivé pour l'Infernalis. Lorquin a découvert aux iles Philippines une espèce voisine.

Elle a le port de la précédente. Ses ailes supérieures offrent à peu près le même dessin.

Les inférieures, qui n'ent pas le bord costal blanc, sont d'un vert bronzé sur la majeure partie de leur bord extérieur. Le collier et le corselet sont d'un jaune d'or tirant un peu sur le vert; mais le dessus des quatre derniers anneaux de l'abdomes est d'un jaune d'or.

En dessous il n'y a pas de blanc à la base des ailes et les quatre derniers anneaux de l'abdomen sont entièrement d'un jame-soufre pâle.

Décrit sur un individu unique très-pur, pris par M. Lorquin dans l'ile de Bouriss.

Coll. Bd.

#### GENRE DASYSPHINX. Felder.

Ce genre, établi par M. Felder sur un insecte dont il a simplement donné une excellente figure, mais dont il n'a pas encore publié les caractères, nous paratt, d'après un très-bel exemplaire que nous avons sous les yeux, se rattacher plutôt à la tribu des Macroglossides, surtout aux espèces du dernier groupe, dont les ailes sont diaphanes, qu'à celle des Glaucopides.

Premiers états: Inconnus.

Tête petite, retirée sous le corselet. Palpes assez longs, grêles, cylindriques, pointus au sommet. Trompe aussi longue que le corps. Yeux assez gros. Antennes fusiformes, assez longues, un peu renflées à leur sommet. Pattes postérieures munies de deux ergots. Corselet globuleux, trèsvelu. Abdomen court, très-velu, à anneaux peu distincts sur le dos. Ailes transparentes.

#### D. MUCESCENS.

Felder, Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 102, f. 25.

Envergure 6 1/2 centimètres. Ce singulier Lépidoptère a les siles plus arrondies et proportionnellement plus larges que chez les Macroglosses à ailes transparentes.

La tâte est petite, un peu retirée sous le corselet, couverte d'un duvet d'un vert bleuâtre. Les antennes sont brunes, assez longues, un peu claviformes. Le corselet est convexe, recouvert d'un duvet épais, d'un vert bleuâtre. L'abdomen est obtus, gami en dessus d'un semblable duvet, ce qui rend les anneaux peu distincts. Le dessous du corps est noir avec les pattes un peu trunâtres.

Les quatre ailes sont transparentes avec la base animal ment noire, mélangée d'un léger duvet verdâtre, printiment sur les supérieures. La côte, le liseré marginal et us stigmate à l'extrémité de la cellule discoïdale des premites sont également de couleur noire. Outre cela, il existe à l'anal des ailes inférieures une tache marginale noire sum d'un espace blanc.

Décrit sur un individu femelle, que nous devons à l'able de M. de l'Orza, qui s'en est dessaisi en notre faveur, que fût unique dans sa collection. L'exemplaire figuré par M. I est aussi une femelle, de sorte que nous ne pouvons rien di mâle.

# **ENDOPHYTIDES**

Cette division, que nous plaçons à la suite des Sphingides pour compléter notre volume, se compose de Lépidoptères, dont les chenilles, à peu près glabres, vivent, ainsi que le nore l'indique, dans l'intérieur des végétaux. Les anciens auteurs ont mis les uns à la suite des Macroglosses, et les autres parmi les papillons de jour, à cause de leurs antennes en massue; mais nous les regardons comme des créations à part qui n'ont avec les Sphingides que des rapports assez éloignés. Quant aux Zygénides appelés jadis Sphina Béliers, aux Glaucopides, aux Agaristides, etc., etc., elles en sont encore plus loin. Leurs chenilles velues indiquent suffisamment qu'elles rentrent dans l'immense série des Trichophorides en faisant le passage aux Bombycidées.

# FAMILLE DES SÉSIIDES

---00**⊅€**00•--

Herrich-Schaffer.

Sésiades, Latreille. — Sésiaires, Boisd. — Latr. — Séséides, Duponchel. — Sésioides, Ledorer. — Sphinges, Linné. — Trochilium, Scopoli. — Sesia et Bgeria, Fab.

Cette famille, que les anciens auteurs, en ne considérant que la forme des antennes, avaient réunie aux Sphinx, en diffère complétement par ses métamorphoses qui ont les plus grands rapports avec celles des Castnides, des Zeuzérides et des Hépialides. Leurs chenilles sont de même endophytes, c'est-à-dire qu'elles vivent de la même manière dans l'intérieur des végétaux. Elles sont pales, étiolées, presque glabres, sans la moindre apparence de cornes sur la maième anneau.

Les insectes parfaits ont des antennes fusiformes le plus souvent simples, terminées par une petite houppe soyeuse. Leurs palpes inférieurs sont gréletétroits, composés de trois articles distincts, dont le dernier finit en pointe. Leurs pattes postérieures ont, à l'extrémité, des ergots très-forts, ou ont quelque fois les pattes postérieures garnies dans leurs longueur de faisceaux de poils très-prononcés. Leur ailes sont en toit et le plus ordinairement vitrées. Leur abdomen est terminé, au moins dans la plupar des espèces, par une petite brosse.

Nous partageons cette famille en trois Tribus.

## TRIBU DES SÉSIAIRES.

Mêmes caractères que ceux de la famille.

## GENRE BEMBECIA.

Herrich-Schæffer, Staudinger. — Sesia, Laspeyres, — Ochsenheimer, — Boisd. etc.

Le nom de Bembecia a été emprunté à un coitus de Hubner, dans lequel cet habile et scrupuleux iconographe réunit la majeure partie de nos sésies européennes, telles que Tipuliformis, Spheciformis, Chrysidiformis, Philantiformis, Tenthrediniformis, etc., etc. Il n'y avait donc pas de

raison pour l'appliquer plutôt à l'Hylæiformis qu'à toute sure espèce. On connaît notre manière de voir, relativement aux coitus de cet auteur, où l'on trouve souvent groupées les espèces les plus disparates, comme, par exemple, la Rhingiæformis et l'Asiliformis avec la Tineiformis. C'est pour ce motif que nous n'en faisons jamais usage pour nos noms de genre. Si cela nous est arrivé quelquefois, c'est qu'ils avaient été employés par de véritables entomologistes dont le nom fait autorité et leur donne une sorte de consécration.

Chenilles semblables en tout à celles des Sésies proprement dites.

Insecte parfait: Palpes velus, peu ascendants, à articles indistincts. Trompe assez courte. Antennes non rensiées à l'extrémité, ciliées dans les mâles, fortement arquées dans les deux sexes, de dedans en dehors. Corselet ordinaire. Abdomen allongé, cylindrique, d'égale grosseur dans toute sa longueur. Brosse anale large, étalée. Ailes étroites, allongées.

Les Bembecia ont tout à fait les mœurs des Sésies.

## 1. B. HYLÆIFORMIS.

Laspeyres, S. Europ. p. 14. — Ochs. Schm. von. Europ. II, p. 138. — Standinger, Beitrag. p. 333, 54. — Sph. Apiformis, Hubn. Sphing. f. 108.

Elle est presque aussi grande qu'une S. Apijormis, mais un peu plus grêle.

Elle a la tête noire avec les yeux bordés d'un peu de blanc. Le collier est jaune. Les palpes sont noirs avec le sommet d'un jaune fauve. Les antennes sont noires. Le corselet est d'un noir brillant, marqué à la base de chaque aile d'une tache jaunâtre. La poitrine est d'un noir brun et immaculée. L'abdomen est d'un noir luisant, avec tous les anneaux bordés de jaune. Le pinceau anal est étalé, d'un jaune un peu plus terne. Les cuisses sont noires avec les jambes et les tarses d'un jaune un peu fauve.

Les ailes supérieures sont brunâtres ainsi que les nervures et la petite bande transverse, avec deux taches vitrées, dont l'antérieure cunéiforme très-étroite, et la postérieure arrondie, divisée en trois rayons; outre cela, le bord interne est un peu fauve àsa base.

Les alles inférieures sont transparentes avec les nervures brunes et la bordure noire.

Elle habite le nord de la France et de l'Allemagne. Elle n'est pas très-rare.

Sa chenille, figurée par Hubner, vit dans les tiges du framboisier, Rubus idœus, et dans celle de la ronce, Rubus fruicosus.

### 2. B. EUCHERIPENNIS.

Envergure 30 millimètres. Cette espèce est un peu plus grande que l'Hylæi/ormis. La tête est d'un brun ferrugineux ainsi que les antennes. Les palpes? Le corselet est entièrement ferrugineux. L'abdomen est cylindrique, d'un noir violet, avec tous les anneaux cerclés de ferrugineux, sauf les deux premiers, qui sont bordés de jaune postérieurement; outre cela, il existe à la base de l'abdomen un arc d'un jaune un peu ferrugineux. Le pinceau anal? Les pattes sont d'un fauve vif avec la partie supérieure des jambes noires.

Les ailes supérieures sont transparentes avec le sommet largement brun; la bordure est étroite et aussi de couleur brune; la petite bande transverse est brune, bordée de roux-ferrugineux en dehors; l'espace transparent de la base est très-allongé et divisé en deux par une nervure ferrugineuse; le bord interne est aussi lavé d'un peu de ferrugineux.

Les ailes inférieures sont transparentes avec une bordure asser étroite et de fines nervures de couleur noire.

Nous avons reçu cette espèce du Mexique.

Notre exemplaire est incomplet, mais en raison de ses antennes fortement arquées de dedans en dehors et de son abdomen cylindrique, nous croyons devoir le placer dans le même genre que notre Hylæiformis.

GENRE SESIA. Fab. — Latr. — Laspeyres. — Ochsenheimer. —
Treitschke. — God. — Boisd. — Duponch., etc. — Ægeria. Fab.
Syst. Glossat. — Trochilium. Scopoli. — Sph. Legitim.
Linné.

Le genre Sesia a été établi par Fabricius qui lui associa dans le principe les Macroglosses de Scopoli, qui sont de véritables Sphingides par leurs caractères essentiels et par leurs métamorphoses. Plus tard, dans son Systema Glossatorum, ouvrage qui n'a jamais été imprimé et que nous ne connaissons que par l'extrait que nous en a donné Illiger, en 1807, il adopta cette nouvelle coupe, lui conserva la dénomination de Sesia et créa celle d'Ægeria pour le genre auquel on avait appliqué la précédente, si bien circonscrite et si bien définie par Laspeyres, Latreille, Ochsenheimer et la plupart des auteurs. On a senti les inconvénients résultant de ce renversement de noms génériques, et c'est pour cette raison que les entomologistes ont continué de donner celui de Sesia aux Lépidoptères appelés ainsi dans l'excellente monographie de Laspeyres.

Chemilles: Décolorées, d'un blanc livide ou d'un blanc un peu rougeatre, vermiformes, munies de deux fortes machoires et de deux plaques écailleuses, l'une sur le premier segment, l'autre sur le dernier. Elles ont en outre quelques petits poils très-clair-semés, implantés chacun sur un très-petit tubercule. Elles vivent et se transforment dans l'intérieur des végétaux.

Les chrysalides ont, sur le bord des segments abdominaux, des petites dents à l'aide desquelles elles accomplissent une sorte de progression lorsque le moment de l'éclosion est arrivé.

lasette parfait: Antennes fusiformes, toujours simples dans les femelles. Quelquefois ciliées, dentées ou même un peu pectinées dans les mâles, terminées chez l'un et l'autre sexe par une très-petite houppe soyeuse, bien visible à la loupe. Palpes de trois articles, comprimés, velus à leur base, presque nus dans le reste de leur longueur; le dernier article aigu à son extrémité. Trompe de longueur moyenne. Corselet ovoïde, convexe, plus large que l'abdomen. Abdomen cylindrique, allongé, le plus ordinairement terminé par une petite brosse. Ailes étroites, allongées en toit dans le repos; les inférieures généralement vitrées. Pattes longues avec les crochets des tarses très-aigus et très-petits.

Les Sésies volent en plein jour à l'ardeur du soleil; elles aiment à se reposer sur les fleurs, sur les feuilles ou sur le tronc des arbres. Elles sont de petite taille et ressemblent plus ou moins à certains Hyménoptères ou Diptères, ce qui leur a fait donner les noms d'Apiformis, Mutillæformis, Ichneumoniformis, Anthraciformis, etc.

La plupart des espèces connues habitent l'Europe, l'Asie-Mineure, le nord de l'Afrique et l'Amérique du Nord. Nous n'en connaissons que peu des régions équatoriales, non pas qu'elles y soient plus rares, mais parce que leur exiguité les dérobe aux yeux des entomologistes voyageurs qui les confondent peut-être avec de petits Hyménoptères.

Outre les figures publiées par Esper, Hubner, Godart, Freyer, Herrich-Schæffer, etc., quelques entomologistes ont étudié les Sésies d'une manière toute spéciale, et nous ont doté de très-bonnes monographies, entre autres Laspeyres et plus récemment M. Staudinger. Ce dernier en décrit, pour l'Europe et l'Asie-Mineure, 56 espèces, et ce n'est pas tout, il en reste encore un certain nombre à découvrir. Nous suivrons la classification de ce dernier auteur que nous trouvons très-naturelle, quoiqu'il ait fait un certain bouleversement dans les noms employés par Laspevres. Ochsenheimer, Hubner, Godart, Herrich-Schæffer et par nous-même. On verra que, dans plus d'un cas, il en a exhumé d'autres, donnés antérieurement par des auteurs oubliés ou peu connus en France, tels que Assmann, Rottenburg, etc. Il a voulu en cela rétablir le droit de priorité qui, suivant une règle presque généralement admise, ne doit jamais être prescrit.

### PREMIER GROUPE.

TROCHILIUM. Scopoli. - Herrich-Schaft. - Staudinger.

On pourrait, à la rigueur, à l'exemple de M. H.-Schæffer, adopter ce genre pour les espèces à antennes et trompe plus courtes, dont l'abdomen ne se termine pas par une brosse et dont les ailes supérieures n'ont qu'un petit arc discoldal.

Le nom de Trochilium a été donné par Scopoli (Introd. ad hist. natur. sistens genera Lepid. plant. et animalium) pour tout le geure Sesia. Pour conserver quelque chose à ce savant professeur, les auteurs précités l'ont appliqué à quelques grandes espèces dont l'abdomen est dépourvu de brosse anale.

### 1. S. APIFORMIS.

Linné, Faun. succica, p. 289. — Clerck, Icon. tab. IX, f. 2. — Laspeyres, Ses. Europ. p. 7. — Ochs. Schm. t. II, p. 121. — God. Pap. de France, t. III, pl. 21, fig. 1. — Sp. Crabroniformis, W. verz. p. 44, 2. — Irochilium Apiforme, Stauding. Beitrag. p. 194, 1. — Variété Sph. Sireciformis, Esp. t. II, tab. 29, f. 4, 5. — S. Sireciformis, Lasp. Ses. Europ. p. 7.

Cette espèce est la plus grande, la plus grosse et la plus comnune de toutes celles que l'on connaît. Elle est d'un noir un peu brun, avec le collier et deux grandes taches jaunes sur le corselet; l'abdomen est jaune avec le premier et le quatrième anneau z-irs. Les ailes ont les nervures et le croissant discoldal des supérieures d'une teinte un peu ferrugineuse.

Elle habite le nord et le centre de l'Europe. On la trouve presque toujours sur le tronc des arbres; elle vole peu. Sa chenille vit dans le tronc du *Populus nigra* et espèces voisines. Le nom de *Crabroniformis*, qui lui a été donné par les auteurs du Catalogue de Vienne, lui conviendrait mieux que celui d'Apiformis, car elle ressemble beaucoup plus à un frelon qu'à une abeille.

La Sireciformis d'Esper et de Laspeyres est une variété trèsrare. Nous ne l'avons rencontrée qu'une seule fois. Son corps est cutièrement d'un brun noir, avec deux grandes taches jaunes sur le corselet. C'est à tort que Godart a cru que c'était une Apiforsus dont l'abdomen avait tourné au gras.

## 2. S. Bembeciformis.

Ochsenh. Schmett. t. II, p. 126. — Sph. Bembeciformis, Hubn. Sph. tab. 20, f. 98. — Sph. Crabroniformis, Lewin, Trans. of the Lin. S. v.d. III, tab. 1, fig. 6-10. — Trochilium Bembeciforme, Herrich-Schmff. t. II, p. 61, f. 1. — Stäudinger, Beitrag. p. 194, 2.

Elle est un peu plus petite que l'Apijormis; elle n'a que 30 à 40 millimètres d'envergure. Elle est d'un noir brunâtre avec le sullier jaune. Le corselet est sans teche. L'abdomen est jaune,

avec le quatrième anneau brun et le premier noir, bordé antérieurement d'un peu de jaune. Les ailes sont vitrées avec les nervures et l'arc discoïdal des supérieures ferrugineux. Les palpes sont jaunes. Les pattes sont d'un roux vif ; les postérieures ont les cuisses fortement garnies de poils d'un fauve roux.

Cette belle espèce a été longtemps fort rare dans les collections. Sa véritable patrie est l'Angleterre. Ochsenheimer dit qu'elle a été trouvée en Belgique et en Hollande.

La chenille vit dans le Salix capræa.

Coll. Bd.

### 3. S. PIMPLÆFORMIS. Boisd.

Elle a le port et la taille de l'Apijormis, mais son corps est un peu moins gros et paraît un peu plus allongé. Elle est noire avec le collier jaune; le prothorax est marqué de deux taches jaunes; le corselet en offre quatre de la même couleur, une sur chaque épaulette et deux en arrière; les deux premiers anneaux de l'abdomen sont d'un noir bleu, fasciés de jaune seulement sur les côtés; les anneaux suivants sont jaunes, marqués chacun, sur le dos, d'une tache transversale noire; l'extrémité anale est un peu fauve. Les ailes sont vitrées, avec les nervures et l'arc discoidal des supérieures d'une teinte légèrement ferrugineuse. Elles ont en outre un point jaune sur la côte, à leur point d'insertion au corselet. Les palpes sont jaunes. Les pattes sont d'un roux ferrugineux avec les genoux noirs; les pattes postérieures sont garnies de poils d'un fauve roux.

Cette belle et nouvelle espèce a été prise par M. Th. Deyrolle, à Thartoum, dans le Caucase. Il n'en a trouvé qu'un seul exemplaire.

Nous ne connaissons aucune des trois espèces que M. Walker rapporte à ce groupe.

### 4. S. REPANDA.

Sphecia repanda, Walker, Heterocera, p. 11, 3.

Elle est d'un noir-bleu. La tête est variée de blanc avec les palpes jaunes. Les antennes, beaucoup plus longues que le corselet, sont d'un jaune fauve avec le sommet d'un noir bleu.

Le corselet est marqué, de chaque côté, de deux taches jaunes. L'abdomen a les segments bordés de jaune avec le sommet de la même couleur. Les pattes sont jaunes, avec les jambes en partie brunâtres ; les jambes postérieures sont garnies de poils asses épais.

Les ailes sont diaphanes avec la frange un peu ferrugineuse; les supérieures ont la base d'un noir purpurescent.

Nord des Indes. — British Museum. — Walker. — La femelle seulement.

# 5. S. Contracta.

Sphecia contracta, Walker, p. 11, 4.

Elle est un peu plus petite que la précédente et de couleur noire. La tête a les yeux entourés de jaune, et est bordée, en arnère, de fauve testacé. Les antennes ne sont guère plus longues que le corselet, de couleur roussêtre, plus pectinées que dans les espèces européennes.

Le corselet est marqué, de chaque côté, de deux taches jaunes et de deux raies de la même couleur.

L'abdomen, un peu plus long que dans nos espèces européennes, a chaque segment bordé de jaune; il a en outre, près de l'extrémité, une tache dorsale jaune, et sur les côtés, des poils de la même couleur.

Les pattes sont jaunes, striées de neir, avec les jambes moins velues que dans l'espèce précédente.

Les ailes sont diaphanes, plus étroites que dans l'espèce précédente, avec la frange et les nervures ferrugineuses; les supérieuses ent la côte. d'un noir purpurescent et le sommet ferrugineux.

Hindostan. — Coll. de M. Saunders. — Walker. — Le mâle seulement.

Cette espèce que nous n'avons jamais vue serait peut-être mieux placée dans le deuxième groupe.

### 6. S. DASYPODIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 11, 6.

Elle est encore un peu plus petite que la précédente et de couleur noire.

Les palpes sont jaunes en dessous, avec le sommet ferrugineux. Le collier est bordé de jaunâtre.

L'abdomen a les segments bordés de jaune. Les pattes sont jaunes, avec les cuisses noires et les jambes postérieures garnies de poils serrés. Les ailes sont diaphanes, avec les nervures ferrugineuses; les supérieures ont la côte d'un noir pourpré.

British Museum. — Patrie inconnue. — Walker. Le male serlement.

Harris a décrit une Sésie que nous n'avons jamais vue, qui appartient peut-être au même groupe.

### 7. S. MARGINATA.

Trochilium marginatum, Harris, Cat. north. am. Sph. 29, 1.

Elle est noire, avec les palpes jaunes. Les yeux sont bordés à jaune.

L'abdomen a les anneaux bordés de jaune.

Les ailes sont diaphanes; les supérieures ont les bords, lessurmet et une bande d'un brun pâle; les inférieures ont une lorgue frange noire.

Les pattes sont jaunes, avec la base noire.

New-Hampshire. - Harris.

### DEUXIÈME GROUPE.

Antennes pectinées dans les mâles ou fortement dentés.

### 8. S. LAPHRIÆFORMIS. Wimmer.

Treitschke, Schm. t. X, Abth. 1, p. 118. — Boisd. Icones, pl. 48,1.34 — Trochilium Laphriæforme, Herrich-Schæff. t. II, p. 62. — Standinger, Beitrag. p. 195, 3. — Sphinx Laphriæformis, Hubn. Sphing. tab. 5, 156-159.

MM. Herrich-Schæsser et Staudinger mettent cette espèce des leur genre *Trochilium*, dont elle s'éloigne notablement par se antennes. Elle se rapproche davantage de l'Asilipennis des Etablunis, qui cependant a les antennes encore plus pectinées.

Elle a de 30 à 40 millimètres. La tête est noire avec les pales et les orbites d'un jaune citron. Les antennes sont d'un jaune fauve ainsi que les palpes. Le corselet est noir avec les épaulettes liserées de jaune. L'abdomen est noir avec le bord postérieur des anneaux bordé de jaune citron, à l'exception du quatrième qui est le plus souvent dépourvu de cercle jaune. La petite brom anale est noire, mélangée de quelques poils jaunâtres. Les pattes

et les antennes sont d'un jaune fauve. Les ailes sont transparentes avec les contours noirâtres et les nervures d'un brun un pen ferrugineux, ainsi que le bord interne et le petit arc discoidal.

Cette espèce encore peu répandue, se trouve aux environs de Berlin et en Poméranie.

La chenille vit dans le tremble, Populus tremula.

### 9. S. ASILIPENNIS.

Boisd. in Guérin, Règne animal, pl. 84, f. 3.

Cotte belle espèce, d'un tiers plus grande que Scoliæformis, est surtout remarquable par les antennes des mâles qui sont trèsfortement pectinées.

Elle est noire avec le collier ferrugineux. Les antennes sont rouses. Le corselet est noir avec les épaulettes d'un fauve briqueté. L'abdomen est luisant, d'un brun noirâtre, avec tous les anneaux cerclés de jaune dans les articulations. Outre cela, le second segment de l'anneau jaune est bordé de fauve antérieurement, et celui qui touche à la base est interrompu sur le dos. Les ailes supérieures sont transparentes avec les nervures et une petite bordure noires. La nervure médiane est lavée de rouge fauve dans ses deux tiers antérieurs. La tache discoïdale transverse est d'un rouge un peu brun. Les ailes inférieures sont transparentes avec un petit arc discoïdal rouge.

En dessous les palpez sont blanchâtres; les pattes sont ferrugineuses; la paire antérieure a les cuisses garnies de poils fauves; le ventre offre des anneaux jaunes comme en dessus; les ailes supérieures ont les nervures et la bordure de couleur ferrurineuse.

La femelle ressemble au mâle, sauf que ses antennes sont à peine dentelées.

Nous avons reçu cette Sésie de feu John Leconte, en même temps que le dessin de la chenille, fait en Géorgie par Ahbot; telle-ci vit dans le tronc du *Populus monilifera*.

Coll. Bd.

### TROISIÈME GROUPE.

Ailes supérieures opaques. Genre Sciapteron, Staudinger.

### S. ASILIFORMIS.

Fab. Ent. S. III, p. 383, 16.— Wien, verz. p. 305, 11.— Ochs. Schmett. t. II, p. 123, 3.— Laspeyres, Ses. Europ. p. 10, n° III.— Hubn. Sphing. tab. 7, f. 44. — Esp. Schm. tab. 29, Cont. IV, f. 1. — God. Pap. de France, t. III, pl. 21, f. 2. — L'Asiliforme, Engr. Pap. d'Europe, t. III, pl. 90, f. 119 a-b. — Tabaniformis, Rottenb. Naturforsch. VII, p. 110, 4. — Sciapteron Asiliformia, Staudinger, Diss. de S. a B. p. 43. — Sciapteron Tabaniforme, Stauding. Beitrag. p. 195, 4.

M. Staudinger, qui avait adopté primitivement pour cette espèce le nom d'Asiliformis, sous lequel elle est connue de tous les Entomologistes, lui a substitué dans son Beitrag. celui de Tabaniformis, de Rottenburg. Ne voulant pas trop bouleverser la synonymie déjà trop embrouillée dans le genre Sesia, nous lui conservons le nom d'Asiliformis, d'autant plus qu'elle ressemble plutôt à un Asilus qu'à un taon (Tabanus).

La tête est d'un noir bleu avec le collier jaune. Les yeux sont cuivreux, précédés d'une tache blanche. Les antennes sont d'un noir bleu en dessus. Les palpes sont noirs avec le dernier article jaune. Le corselet est d'un noir bleu avec un petit arc jaune sur chaque côté, et un point de cette couleur à l'insertion des ailes supérieures. L'abdomen est d'un noir bleu avec trois anneaux jaunes. La petite brosse anale est d'un noir obscur, marquée de deux petites lignes jaunes. Les cuisses sont d'un noir bleu; les postérieures ont la base d'un jaune testacé. Les ailes supérieures sont opaques, d'un noir brunâtre. Les inférieures sont transparentes.

Cette Sésie éclôt dans la première quinzaine de juin; elle n'est pas très-rare dans le nord et le centre de l'Europe.

Sa chenille, que nous avons élevée plusieurs fois, vit à la base des jeunes peupliers (*Populus fastigiala* et *nigra*), à 15 ou 20 centimètres au-dessus de la racine.

Cette chenille était, il y a quelques années, si commune dans la forêt de Bondy, au bord du canal de l'Ourcq, qu'elle fit périr une partie des petits peupliers d'Italie qu'on y avait plantés.

## 11. S. ANTHRACIPENNIS. Boisd.

Elle est de la taille d'un très-petit individu d'Asiliformis. La tête et les antennes sont noires. Les palpes sont jaunes en

393

dessous avec le dernier article noir au sommet. Le corselet est d'un noir brunâtre. Les pattes sont d'un brun noir. L'abdomen est d'un noir foncé, avec quatre anneaux jaunes. Le petit pinceau anal est noir, mélangé à peine de quelques poils jaunes sur les côtés.

Les ailes supérieures sont brunes, marquées d'un petit point save sur l'endroit où se trouve la seconde tache, transparente dans la plupart des espèces.

Les ailes inférieures sont transparentes avec une large bordure, les nervures et la lunule sous-costale d'un noir foncé.

Elle se trouve en Géorgie où, selon Abbot, elle vit dans une espèce de Salix. Nous l'avons reçue de John Leconte.

## 12. S. PANORPÆFORMIS. Boisd.

Elle est de la taille de l'Astliformis, mais ses ailes supérieures sont notablement plus étroites. La tête est noirâtre avec le collier d'un fauve ferrugineux. Le corselet est noirâtre avec une bande longitudinale d'un fauve ferrugineux sur les épaulettes. Les pattes et les antennes sont également d'un fauve ferrugineux. L'abdomen est noir, fascié de fauve ferrugineux sur les côtés des premiers segments; il est marqué, en outre, de trois anneaux de la même couleur; le pinceau anal est fauve. Les ailes supérieures sont d'un noir fuligineux avec un point d'un fauve vif près de leur insertion au corselet. Les ailes inférieures sont transparentes avec la frange et une petite bordure noires. L'abdomen est entièrement d'un fauve ferrugineux en dessous.

Décrite sur deux individus parfaitement frais, pris par M. Lorquin dans les forêts de l'île de Lucon.

Coll. Bd.

### 13. S. Vespipennis.

Boisd. in Herrich-Schaff. Sammi. Aussereurop. Schm. 217.

Envergure, 40 à 45 millimètres. Cette belle espèce est presque de moitié plus grande que notre Asiliformis. La tête est brune avec le collier fauve. Les antennes sont roussâtres. Les palpes sont jaunes. Le corselet est brun avec les épaulettes bordées de fauve, et une petite tache de cette couleur à l'insertion des ailes supérieures. L'abdomen est brun avec deux petites lignes jaunes, transversales, sur le premier segment, surmontées d'un arc de

la même couleur à la base du corselet. Le deuxième et le troisième anneau sont bordés de jaune; les suivants sont bordés de ferrugineux vif. Le petit pinceau anal est brun, mélangé de quelques poils fauves. Les ailes supérieures sont opaques, d'un brun noirâtre, avec une petite tache cunéiforme transparente, située vers leur angle anal; elles ont, en outre, une petite tache discoïdale d'un rouge ferrugineux. Les ailes inférieures sont transparentes avec l'arc cellulaire noir, et un trait fauve à la base de la gouttière abdominale. Les pattes sont d'un jaune fauve avec les jambes jaunes.

Cette belle Sésie se trouve en Chine, où elle remplace probablement notre Asiliformis.

Coll. Bd.

## 14. S. RHINGLEFORMIS.

Laspeyres, S. Europ. p. 11, nº IV. — Ochsenh. Schm. t. II, p. 130, 4. — Hubner, Sphing. tab. 7, fig. 41. — Rossi, Faun. etrusc. Mantiss. t. II, p. 141. — Boisd. Ind. meth.

M. Staudinger confond cette espèce avec l'Asiliformis, dont elle diffère cependant énormément. Quant à nous, nous la cousidérons avec Laspeyres, Ochsenheimer et Hubner comme une espèce parfaitement caractérisée.

Elle est un peu plus petite que la précédente; elle a environ de 20 à 28 millimètres. La tête est noire avec le collier jaune. Les yeux sont bruns, bordés inférieurement d'un peu de blanc. Les antennes sont d'un roux ferrugineux dans les deux sexes. Les palpes sont noirs avec le dernier article jaune. Le corselet est noir, avec un petit arc jaune et un point de cette couleur à l'insertion des ailes supérieures. L'abdomen est noir avec six anneaux jaunes, dont l'antérieur est interrompu et le dernier moitié plus large que les autres. La petite brosse anale est noire mélangée de poils jaunes. Les pattes sont ferrugineuses. Les ailes supérieures sont opaques, d'un gris-ferrugineux luisant. Les ailes inférieures sont transparentes.

Elle habite le midi de la France et l'Italie. Elle n'est pas trèsrare aux environs de Montpellier, d'où nous en avons reçu un certain nombre d'exemplaires. Rambur l'a aussi prise en Andalousie. M. Daube croit que sa chenille vit dans le saule ou dans le Fraxinus ornus.

Coll. Bd.



### OUATRIÈME GROUPE.

M. Standinger réunit ce groupe au précédent, quoique les ailes supérieures ne solent pas entièrement opaques. Nous n'avons jamais vu les quatre espèces suivantes, qui sont toutes de l'Asie-Mineure.

## 45. S. STIZIFORMIS.

Herrich-Schmffer, fig. 58, t. VI, p. 47. — Sciapteron stiziforme, Beitrig. p. 197, 5. — Lederer, Ann. de la S. Ent. de Belg. pl. 6.

Elle est d'un noir verdatre. L'abdomen a le 4°, le 5° et le 6° anneau d'un jaune citron. Les ailes supérieures ont la base, le bord postérieur et la côte de couleur briquetée.

Elle a été rapportée d'Amasia par Kindermann.

M. Standinger ne l'a jamais vue en nature.

Lederer (Ann. de la Société Entom. de Belgique, 1870, pl. 1, fig. 6) donne la figure d'un mâle ou d'une variété mâle qui n'a que 22 millimètres. Ses ailes supérieures, presque entièrement opaques, ont à la base un trait longitudinal rouge et une petite lunule discoïdale de la même couleur. Ses ailes inférieures sont noiratres avec la base transparente. L'abdomen est représenté d'un noir-bleu unicolore.

Cet individu a été pris à Hankynda, dans l'Asie-Mineure, par Haberhauer. Est-ce bien véritablement le mâle de la Stizijormis figurée par Herrich-Schæffer, laquelle a trois anneaux d'un jaune citron.

Nous croyons que cette espèce serait mieux placée à côté de Chalcidiformis.

16. S. GRUNERI.

Sciepteron Gruneri, Staudinger, Beitrag. p. 197, 6.

M. Staudinger a vu un exemplaire femelle que lui a commuaiqué M. Gruner. Il a 34 millimètres. Il est d'un bleu noir. Ses ailes supérieures sont saupoudrées de noirâtre, avec l'arc transversal plus obscur et marqué d'un point orangé. Les ailes inférieures sont transparentes. L'abdomen est d'un noir bleu, avec une bande jaune, interrompue sur le second anneau; le quatrième est, au contraire, presque entièrement jaune. La tête et la poitrine sont d'un noir bleu.

. Lizenvirons

w.3" "

্লালাক্ষ্যালা লাক্ষ্যাল ১৮ নাম ১০ শক্ষ্যালাক্ষ্যালাক্ষ্যালাক্ষ্যালাক্ষ্যালাক্ষ্যালাক্ষ্যালাক্ষ্যালাক্ষ্যালাক্ষ্যালাক্ষ্যালাক্ষ্যালাক্ষ্যালাক্ষ

The state of the s

- ------

# 

Andrew Commencer Commencer

The second secon

- Li TIII.

# 

The second of th

and the second of the second course of the second of the second course o

SESIA. 397

Cette Sésie a de 28 à 36 millimètres. La tête est d'un noir bleu, avec une ligne très-blanche en avant des yeux et un collier jaunitre. Les palpes sont noirs, avec les deux premiers articles d'un jame foncé en dessous. Les antennes sont d'un noir bleu jusqu'au-delà du milieu, ensuite blanches. Le corselet est d'un noir bleu, marqué de deux lignes jaunes. L'abdomen est d'un noir bleu, avec le bord postérieur du second et du quatrième anneau jaune en dessus; la brosse anale est d'un rouge fauve dans le mâle, mélangé de quelques poils noirâtres dans la femelle. Les ailes supérieures sont transparentes, avec les nervures, la bordure et une grande tache discoïdale d'un noir bleu. Les ailes inférieures sont transparentes, avec une petite lunule noire sur le milieu du bord antérieur.

Cette Sésie habite le nord et le centre de l'Europe, mais elle n'est nulle part très-commune. Nous avons plusieurs fois trouvé sa chenille aux environs de Paris, dans de jeunes bouleaux, qui en éprouvaient un certain dommage par suite de la déperdition de la sève.

# 20. S. SPHECIFORMIS.

Laspeyres, Ses. Europ. p. 12, n° V.— Ochs. Schmett. t. III, p. 134, 6. — God. Pap. de France, t. III, pl. 21, f. 3. — Hubn. Sphing. tab. 116, fg. 77-78. — S. Sphegiformis, Staud. Beitrag. p. 200, 10. — Fab. Ent. S. III, 1, 383, 15.

Elle a de 24 à 30 millimètres. La tête est d'un noir bleu, avec les palpes jaunes en dessous. Les antennes sont d'un noir bleu. Le corselet est d'un noir-bleu luisant, avec une ligne jaune sur chaque épaulette. L'abdomen est également d'un noir-bleu luisant, avec un point basilaire et le bord du troisième anneau jaunes. Le petit pinceau anal est d'un noir bleu, trilobé.

Les ailes supérieures sont transparentes, avec les bords, les nervures et la tache discoïdale d'un noir bleu; les inférieures sont transparentes, avec les nervures, le bord postérieur et l'arc de la cellule d'un noir bleu.

En dessous, les pattes sont d'un noir bleu, avec la base des cuisses antérieures un peu jaune en dehors. La poitrine est marquée d'une tache jaune sur chacun de ses côtés.

On trouve cette Sésie dans le nord et le centre de l'Europe, principalement dans les bois plantés d'aunes (Alnus viscosa) et de bouleaux. Nous avons quelquesois trouvé sa chenille dans de

jeunes aunes. Elle ressemble complétement à celle de l'Asilifermis.

Coll. Bd.

## 21. S. Meslæformis.

Herrich-Schæffer, t. II, fig. 17-18. — Stauding. Beitrag. p. 500, if.

Nous ne connaissons pas cette Sésie qui paraît être voisine de la Spheciformis, mais elle est moins grande. Elle est d'un neir bleu, avec deux litures d'un blanc d'argent en avant des yest; outre cela, le second et le quatrième anneau sont bordés de jaune.

Selon MM. Herrich-Schæffer et Staudinger, elle n'a encore de trouvée que dans la Russie méridionale.

## 22. S. Anthraciformis.

Esper, Sch. II, Th. tab. 44, fig. 42. — Stauding. Beitrag. p. 201, th. — Sesia Andrenæformis, Lasp. S. Europ. f. 7-8, p. 20, no 12.— Och. Schm. von Eur. t. II, p. 156, 15. — Boisd. Ind. meth. p. 43. — Va. S. Monedulæformis, Boisd. Ind. meth. p. 43.

M. Staudinger a restitué à cette Sésie le nom qu'Esper lui avai imposé, quoiqu'elle soit généralement connue sous celui d'Andre næformis.

Envergure 18 à 22 millimètres. La tête, le corselet et l'abdomen sont d'un noir bleu; celui-ci a le second et le quatrième anneau bordés de jaune en dessus et de blanc en dessous; le petit pinceau anal est d'un noir bleu avec le milieu jaune. Les antennes sont d'un noir bleu. Les palpes sont noirs en dessus et blanc en dessous. La poitrine est marquée, de chaque côté, d'une tache jaune, assez grande. Les pattes sont d'un noir bleu. Les ailes apérieures sont transparentes, avec la bordure et la petite bande discoïdale d'un brun-noirâtre à reflet légèrement violâtre. Les ailes inférieures sont diaphanes, avec la bordure d'un noir brunâtre et les nervures lavées d'un peu de roussâtre.

Elle se trouve en Hongrie et dans la Russie méridionale.

La variété Monedulæsormis, qui a les deux anneaux moins jaunes et le pinceau anal d'un blanc jaunâtre, a été prise en Andelousie par Rambur.

Coll. Bd.

SESIA. 399

### 23. S. CONOPIFORMIS.

Staudinger, Beitrag. p. 202, 15. — Sph. Conopiformis, Esp. Schm. II, Th. tab. 31, f. 1, 2. — Sesia Nomadoformis, Laspeyres, S. Europ. p. 27, no 18. — Ochs. Schm. von Europ. t. II, p. 167, no 21. — God. Pap. de France, t. III, pl. 21, f. 14. — Boisd. Ind. meth. p. 43. — Sph. Syrphiformis, Hubn. Sph. tab. 8, f. 50.

Cette Sécie, bien connue de la plupart des entomologistes sous le nom de Nomadæformis, reprend le nom qu'Esper lui avait donné.

Elle est d'un tiers plus grande que la *Tipuliformis*. Son envergure varie de 18 à 25 millimètres. La tête est noire, avec une liture blanche devant les yeux et un collier jaune. Les palpes sont noirs en dessus, jaunes en dessous. Les antennes sont d'un noir bleu. Le corselet est d'un noir bleu, avec une ligne longitudinale jaune sur chaque épaulette. La poitrine est d'un noir bleu, marquée, de chaque côté, d'une tache jaune allongée. L'abdomen est d'un noir-bleu luisant, avec le bord du troisième, du cinquième et du septième anneau jaune. Au-dessus du premier anneau, on voit en outre une ligne transversale jaune. Le petit pincau anal est noir. Les cuisses sont noires, les jambes sont de la même couleur, avec les épines de la paire postérieure d'un jaune sale.

Les ailes supérieures sont transparentes, avec le sommet d'un fauve doré, coupé par de fines nervures. Les nervures, la bordure et la petite bande transverse sont d'un noir violâtre.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures, les bords et une toute petite lunule d'un noir violet.

Chez le mâle, il y a un quatrième anneau sur le septième segment.

Cette Sésie est assez commune dans une grande partie de l'Europe. Aux environs de Paris, on la trouve assez fréquemment, en juin, sur le bois-mort et sur l'écorce des vieux chênes.

Sa chenille vit sous les écorces des chênes.

# 24. S. NOMADÆPENNIS.

Boisd. Lepid. de la Californ. Part. II, p. 63, 63.

Elle est de la taille de la Conopiformis (Nomadæformis, Laspeyres). La tête est noire avec le collier jaune. Les palpes sont jaunes. Le corselet est d'un noir bleu sans taches. L'abdomen est également d'un noir bleu avec trois anneaux jaunes.

Les ailes supérieures sont transparentes avec des nervures fortement, la bordure, l'extrémité et la petite bande transverse d'un noir profond; outre cela le bord interne est lavé de ferrugineux et l'extrémité apicalé rayonnée d'un peu de fauve; la petite bande transverse est aussi bordée d'un peu de ferrugineux sur son côté externe.

Les ailes inférieures sont transparentes avec les nervures, la bordure et la petite lunule sous-costale noires.

Cette Sésie a été trouvée sur les fleurs en Californie, par Lorquin.

25. S. CEPHIFORMIS.

Ochs. Smett. von Europ. t. II, p. 169, 22. — Herrich-Schæff. t. II, fig. 32. — Stauding. Beitrag. 201, 13.

Elle est un peu plus petite que la précédente, et elle a tout-àfait le port de la Conopijormis. La tête est noire avec deux petites lignes blanches en avant des yeux. Le collier est jaune. Les palpes et les antennes sont d'un noir bleu. La poitrine est marquée de chaque côté d'une tache jaune. Le corseiet est noir avec une ligne jaune sur les épaulettes et un petit croissant postirieur de la même couleur. L'abdomen est d'un noir bleu avec le deuxième, le quatrième et le sixième anneau jaunes. Le petit pinceau anal est jaune avec le milieu noir. Les ailes supérieures sont transparentes, avec la bordure, l'extrémité et la petite bande transversale, noires. Les ailes inférieures sont transparentes, avec la bordure et un petit point cellulaire noirs. Les cuisses sont noires entrecoupées de jaune.

Nous ne possédons que des femelles. Il paraît que chez le mâle le septième anneau est jaune.

Elle habite l'Autriche et plusieurs parties de l'Allemagne. Selon Ochsenheimer, la chenille vit dans le sapin, *Pinus abies*.

## 26. S. TIPULIFORMIS.

Sph. Tipuliformis, Linn. Faun. S. p. 289, 1096. — Clerck, Icon. tab. IX, f. 1. — Sesia id. Lasp. S. Europ. p. 28, nº 19. — Ochs. Schm. von Eur. t. II, p. 172, 23. — Hubner, Sphing. tab. 8, f. 49. — God. Pap. de France, III, pl. 21, f. 15. — Staudinger, Beitrag. 202, 14, — etc.

Cette Sésie est beaucoup plus petite que la Conopiformis, dont

elle est fort voisine. La tête est noire avec deux petites litures blanches en avant des yeux, et un petit collier jaune. Les palpes sont noirs en dessus et jaunes en dessous. Le corselet est d'un noir bleu, avec une petite ligne jaune sur les épaulettes. La poltrine est aussi d'un noir bleu, avec une tache jaune, allongée de chaque côté. L'abdomen est d'un noir bleu avec le deuxième, le quatrième et le sixième anneau jaunes; ce dernier est double dans le mâle. Le petit pinceau aual est noir. Les pattes sont d'un brun noirâtre avec les jambes plus pâles.

Les ailes supérieures sont vitrées, avec le sommet strié de fauve doré de part et d'autre; la bordure et la petite bande transverse sont noires. Les ailes inférieures sont transparentes avec la bordure noire.

Cette Sésie est l'une des plus communes; elle se trouve presque dans toute l'Europe. Sa chenille n'est pas rare dans les tiges du groseiller rouge, Ribes rubrum; on la rencontre aussi dans le moisetier, Corylus avellans.

### 27. S. CYNIPIFORMIS.

Ochs. Schmett. von Eur. t. II, p. 151, 13. — Sph. Vespiformis, Esp. Schm. II, Th. tab. 31, f. 3-4. — Hubn. Sphing. tab. 19, f. 95. — La Semelle Sph. (Estriformis, Hub. Sph. f. 43.— Sesia Vespiformis, Lasp. Ses. Europ. p. 17, n° 10. — God. Pap. de France, t. III, pl. 21, f. 8. — Sph. Vespiformis? Linn. Faun. suecica, n° 1095. — Sph. Asiliformis et Œstriformis, Rottenb. in Natūrforsch. VII, S. 108, 2, S. 109, 3. — Sesia Asiliformis, Stauding. Beitrag. 203, 16.

Beaucoup d'auteurs, y compris le savant Laspeyres, ont rapporté cette espèce au Sphinx Vespiformis de Linné, dont il est impossible aujourd'hui de constater l'identité, la phrase de l'auteur suédois pouvant s'appliquer à plusieurs espèces voisines.

M. Staudinger lui a restitué le nom d'Asiliformis donné au mâlo par M. Rottenburg, dans le Naturforscher, nous avons préféré lui laisser celui qui lui a été imposé par Esper et Ochsenheimer, et sous lequel elle est généralement connue.

Envergure, 16 à 24 millimètres. La tête est noire, avec un collier jaune, et une double liture blanche, en avant des yeux. Les palpes sont jaunes. Les antennes sont d'un noir bleu. Le corsejet est d'un noir bleu, avec deux lignes longitudinales jaunes. La poitrine est d'un noir bleu, marquée de chaque côté d'une tache jaune. L'abdomen est d'un noir bleu, avec une petite ligne trans-

versale à la base, et les deuxième, quatrième et sixième anneau jaunes. Le petit pinceau anal est jaune avec le milieu très-noir dans le mâle, et jaune chez la femelle (Œstriformis). Les cuises sont noires. Les jambes sont jaunes avec un anneau d'un noir bleu. Les tarses sont entièrement jaunes.

Les ailes supérieures sont transparentes avec les nervures si l'extrémité brunes, et une lunule transversale d'un rouge minium, bordée en dedans par une ligne noire.

Les ailes inférieures sont transparentes avec les nervures, le bord postérieur et un petit arc sous-costal d'un brun-noir.

Ches le mâle, le septième anneau est jaune.

On trouve cette Sésie en juin et juillet dans une grande partie de l'Europe. Elle est assez commune aux environs de Paris, dans les bois, sur les fieurs du cornouiller sanguin, Cornus sanguinea et du Rhamnus frangula.

## 28. S. MELLINIPENNIS. Leconte.

Boisd. Spec. General. pl. 14, 10 B, fig. 12.

Eile est d'un tiers plus grande que la Cynipiformis d'Ochsenheimer. La tête est noire avec les antennes d'un noir bleu. Les palpes sont jaunes. La poitrine est marquée de chaque côté d'une tache jaune. Les pattes postérieures sont jaunes entrecoupées de noir. Le corselet est noir avec le collier et une raie sur chaque épaulette, jaunes. L'abdomen est d'un noir bleu avec cinq anneaux jaunes, dont deux sur le premier et le deuxième segment sont interrompus, et dont les trois derniers sont situés à l'extrémité. Le pinceau anal est jaune avec le milieu noir.

Les ailes supérieures sont transparentes avec le sommet, les bords et la petite bande transverse d'un noir-brunâtre pâle; outre cela, la petite bande transverse est marquée d'un peu de rouge dans son milieu.

Les ailes inférieures sont transparentes avec les nervures et une petite bordure d'un brun pâle. Cette Sésie habite l'Amérique septentrionale.

Nous n'avons vu que deux mâles, lesquels out été anéanis avec plusieurs autres espèces américaines, par l'explosion de la poudrière du Luxembourg. Sauf quelques Sésiaires, notre collection n'a pas éprouvé de très-grands dégâts.

## 29. S. MELLINIFORMIS.

yres, Ses. Europ. p. 49, f. 5, 6. — Ochs. Schm. von Europ. 134, 14. — Stauding. Beitrag. 203, 17.

rgure, 16 à 25 millimètres. Elle est très-vaisine de la Cymis. La tête est d'un noir bleu avec les yeux bordés par
ne d'un blanc pur. Les palpes sont jaunes, avec le dessus
ux premiers articles noir. Les antennes sont noires. Le
est d'un noir-bleu luisant, sans taches. La poitrine est
pir bleu, marquée sur chaque côté, d'une tache jaune.
uen est noir avec le bord des premier, quatrième, cin(et du sixième dans le mâle) anneaux jaune. Les cuisses
un noir bleu ainsi que les jambes. Les tarses sont jaunes
utrémité noirâtre.

iles supérieures sont transparentes, avec les nervures et ls d'un noir bleu; la lunule transversale est noire en derouge en dehors; le sommet est d'une teinte dorée pâle, siles inférieures sont transparentes avec les nervures, la set un petit arc sous-costal noirs.

ouve cette Sésie à la fin du printemps dans le midi de la Rambur l'a aussi rencontrée en Espagne.

### 30. S. CHRYSIDIPENNIS.

Lep. de la Californ. Part. II, p. 64, 64.

le port et la taille de l'Uroceriformis. La tête et les anont noires. Les palpes sont d'un blanc jaunâtre en desbruns en dessus. Le collier est d'un jaune paille avec le noir. L'abdomen est d'un noir fonce, avec six anneaux le part et d'autre. Le petit pinceau anal est noir, avec le jaune. La poitrine est marquée de chaque côté d'une tare. Les pattes sont jaunes avec les genoux noirs.

iles supérieures sont transparentes avec le bord interne rugineux fauve, amsi que les nervures apicales; la côte e; la petite bande transversale est d'un fauve rougeâtre ôtés et brune au milieu.

les inférieures sont transparentes avec le bord antérieur ferrugineux; la bordure, les nervures et le petit are tal sont d'un brun noirâtre.

par Lorquin à Los Angelos.

# SIXIEME GROUPE.

Un anneau rouge sur l'abdomen.

# 31. S. MYOPÆFORMIS.

Stauding. Beitrag. p. 204, 18. — Herrich-Sch. t. II, p. 80. — Sph. Myopæformis, Borkh. Schm. t. II, p. 169. — Sph. Culiciformis, Huba. Sphing. f. 45. — Sesia Mutillæformis, Laspeyres, Ses. Europ. p. 26, fig. 15-17. — Ochs. Schm. von Europ. p. 162, 18. — God. Pap. de France, t. III, pl. 21, f. 13.

Envergure, 15 à 22 millimètres. La tête est d'un noir bleu, avec une petite liture blanche au bord interne des yeux. Les palpes sont d'un noir bleu ainsi que les antennes. Le corselet est entièrement d'un noir-bleu luisant. La poitrine est d'un noir bleu, avec une tache dorée sur chacun de ses côtés. L'abdomen est d'un noir bleu, avec le quatrième anneau rouge en dessus, noir et bordé de blanc en dessous. Le pinceau anal est entièrement d'un noir bleu. Les pattes sont noires.

Les ailes supérieures sont transparentes, avec les nervures, la bordure et une bande transverse assez large, d'un noir bleu en dessus et d'un fauve doré en dessous.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures, les bords et une petite lunule sous-costale noirs en dessus et d'un fauve doré en dessous.

Le mâle diffère de la femelle, en ce que tout le dessous du quatrième anneau et le pourtour de l'anus sont blancs ainsi que le dessous des palpes.

Elle se trouve dans une grande partie de l'Europe centrale. Elle n'est pas très-rare aux environs de Paris.

Cette espèce porte, dans la plupart des collections, le nom de Mutilleformis.

## 32. S. Typhiæformis.

Laspeyres, Ses. Europ. p. 25, fig. 13-14. — Ochs. Schm. von Europt. II, p. 163, 19. — Stauding. Beitrag. p. 205, 19. — God. Pap. de France, t. III, pl. 21, f. 12. — Sph. Typhiaformis, Bork. Schm. t. II, S. 174, no 13, fig. 4, 5. — Hubn. Sphing. fig. 42. — Sph. Culiciformis, Pab. E. S. III, 1, p. 384, 19. — Sph. Tipuliformis, Var. Esp. tab. 31, f. 7.

Elle a le port et la taille de la Myopæformis. La tête est d'un

bieu d'acier, avec une petite liture blanche au bord interne des yeux. Les palpes sont noirs, avec le dessous roussâtre. Les antennes sont d'un noir bleu, marquées d'une tache blanche en dessus avant leur sommet. Le corselet est d'un bleu d'acier. La petrine est de cette dernière couleur, marquée, de chaque côté, d'une tache d'un rouge fauve. L'abdomen est d'un noir bleu, avec le bord du second et du quatrième anneau d'un rouge fauve en dessus; celui du quatrième et celui du cinquième sont blancs en dessous chez les individus frais. Le petit pinceau anal est d'un moir bleu, avec le milieu un peu blanchâtre en dessous. Les pattes sont d'un noir bleu.

Les ailes supérieures sont transparentes, avec les nervures, la bordure ainsi que la bande transversale d'un noir violet, et le sommet d'un fauve doré en dessous. Les nervures et la bordure sont anssi d'un fauve doré.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures, les bordure et une petite lunule sous-costale d'un noir violet en dessus et d'un fauve un peu doré en dessous.

Cette Sésie est beaucoup plus rare que la précédente aux environs de Paris, où elle n'a été trouvée qu'une fois ou deux. Elle habite de préférence le midi de la France et l'Italie.

## 33. S. Pipiziformis.

Lederer, Verh. d. z.-bot. ver. Quartal II, p. 195, pl. II, f. 2. — Stauding. Beitrag. p. 206, 20.

Envergue, 17 millimètres. Elle est d'un noir bronzé, avec le dessous des palpes, le sommet des antennes blancs. Le quatrième segment est seulement d'un rouge orange en dessuit. Les suivants sont de cette couleur en dessus et en dessous.

Ni M. Staudinger, ni moi n'avons vu cette espèce. La diagnose qu'il en donne est faite d'après Lederer.

Cette Sésie a été prise à Beirouth, en Syrie.

#### 34. S. Culicipormis.

Laspeyres, Ses. Europ. p. 33, f. 9, 10. — Ochs. Schmet. von Europ. p. 139, 17. — God. Pap. de France, t. III, pl. 21, f. 10. — Stauding. Beitrag. p. 206, 21. — Sph. Culiciformis, Linn. Faun. suecica, p. 239, ao 1094, — etc.

Cette Sésie est une de celles dont la synonymie n'a jamais été

embrouillée. Tous les auteurs, à l'exemple de Linné, l'ont sprelée Culiciformis.

Envergure de 22 à 26 millimètres. La tête est d'un noir bleu, avec une liture blanche au bord des yeux. Les palpes sont noirs en dessus et fauves en dessous. Les antennes sont d'un noir bleu. Le corselet est d'un bleu noir. La poitrine est d'un bleu-noir lissant, marquée, de chaque côté, d'une grande tache d'un fauve minium. L'abdomen est d'un noir-bleu brillant, avec le quatrième anneau entièrement d'un fauve minium en dessus, et d'une couleur plus pâle en dessous. Le pinceau anal est entièrement d'un noir bleu. Les cuisses sont d'un bleu noir, avec les épines des jambes un peu testacées.

Les ailes supérieures sont transparentes avec la base miniacée; les nervures, les bords et la petite bande transverse sont d'un bleu noir en dessous. Ces mêmes ailes ont le sommet violaire, avec les bords lavés de fauve et un point miniacé sur le côté externe de la bande transverse.

Les ailes inférieures sont transparentes avec la base miniacée; les nervures, les bords et le petit arc sous-costal sont noirs.

On rencontre souvent une variété chez laquelle le cinquième segment de l'abdomen est bordé d'un peu de rouge fauve.

Cette espèce est l'une des plus communes dans les bois des environs de Paris. Elle se trouve dans presque toute l'Europe tempérée. Sa chenille vit probablement sous les écorces du bouleau, Betula alba, car on ne rencontre guère l'insecte parfait que dans les bois où cet arbre est abondant.

### 35. S. THYNNIFORMIS.

Laspeyres, p. 21. — Stauding. Beitrag. p. 206, 23. — Zeller, Isis, 1840, p. 142. — Herrich-Schæf. t. VI, p. 50.

Nous n'avons jamais vu cette Sésie. La description que nous en donnons ici est la traduction littérale de celle donnée par Laspeyres dans sa remarquable monographie.

Envergure, 26 millimètres. La tête est noire avec une littre blanche en avant des yeux. Les yeux sont noirâtres. Les palpes sont jaunes, marqués, en dehors, d'une ligne noirâtre. Les antennes sont d'un brun noir, saupoudrées de blanc en dessus et de ferrugineux en dessous. Le corselet est d'un noir bleu. La potrine est également d'un noir bleu mavec des irrorations jauni-

÷

tres et une grande tache latérale joune. L'abdomes est d'un hieunoir saupoudré de jaune, cilié de jaune sur les côtés; il est en outre marqué, vers la base, d'un point et de deux litures jaunes. Le quatrième anneau est entièrement jaune (orangé, selon Staudinger), tandis que les suivants n'ont que les bords jaunes. Le pinceau anal est allongé, jaune sur les côtés et noir dans son milieu. Les cuisses antérieures sont d'un bleu noir, avec le côté extérieur jaune; les jambes sont brunâtres avec les tarses jaunâtres.

Les ailes supérieures sont transparentes, avec les nervures, la bordure et une bande transverse assez large, noires; le bord de la côte et celui du bord interne sont un peu jaunes, avec le sommet saupoudré d'un peu de jaune.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures, la bordure et une petite lunule sous-costale noires.

Laspeyres a décrit cette espèce d'après un mâle unique pris par Hess aux environs de Darmstadt. Il suppose que la coulegr avait été altérée, et que l'anneau du milieu du corps pouvait être d'une couleur safranée lorsque l'insécte était frais.

M. Staudinger pense que cette Sésie pourrait blen être une simple variété de la Culiciformis.

# 36. S. STOMOXYPORMIS.

Ochsenh. Schm. von Europ. t. II, p. 157, 16. — Schrank, Faun. Bolc. 2, B. 1, Abth. p. 234, 1399. — Stauding. Beitrag. p. 208, 23. — Sph. Stomozyformis, Hub. Sphing. f. 47.

Envergure, 28 à 33 millimètres. Elle est de la taille de la Spheciformis et elle a tout à fait le port de la Culiciformis. La tête, les antennes, les palpes et la poitrine sont d'un bleu noir. Le corselet est également d'un bleu noir, avec les épaulettes bordées de rouge miniacé. L'abdomen est d'un noir-bleu luisant, avec le quatrième anneau d'un rouge minium, et deux ou trois petites taches latérales de la même couleur sur les anneaux suivants. Le pinceau anal est noir. Le ventre est marqué sur le quatrième et le sixième segment d'un anneau rouge.

Les ailes supérieures sont transparentes, avec les nervures, la bordure et la bande transversale d'un bleu noir ou d'un noir bronsé.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec la bordure, les nervures et la petite lunule sous-costale noires de part et d'autre.



Elle se trouve en Allemagne et dans presque tout le midi de la France et en Espagne.

M. Staudinger mentionne, sous le nom d'Amasina, une variété qui, selon lui, a l'anneau du quatrième segment d'un jaune orangé en dessus, et d'un jaune sale en dessous.

Cette variété a été prise dans l'Asie-Mineure par Kindermam.

## 37. S. FORMICÆFORMIS.

Laspeyres, S. Europ. f. 11, 12, p. 24. — Ochsenh. Schm. von Europ. II, p. 165, 20. — God. Pap. de France, t. III, pl. 21, f. 11. — Standing. Beitrag. p. 209, 24. — Sphinx Formicxformis, Esper, Schm. tah. 33. Cont. VII, fig. 3, 4, et Sphinx Tenthrediniformis, Esp. tah. 30, Cont. V. f. 3. — Sphinx Nomadæformis, Hubner, Sphing. fig. 90.

Enverg. de 15 à 25 millimètres. La tête est d'un noir-bleu lusant, avec une liture blanche en avant des yeux. Les antennes sont noires en dessus et fauves en dessous. Le corselet est d'un noir bleu. La poitring est également d'un noir bleu sans aucune tache. L'abdomen est d'un bleu-noir luisant, avec tout le quatrième segment d'un rouge minium et quelques écailles de la même couleur sur le cinquième. Le pinceau anal est noir, avec des polls blancs ou jaunes en dessous et sur les côtés.

Les cuisses et les jambes sont noires.

Les ailes supérieures sont transparentes, avec le sommet d'un fauve doré; les nervures, les bords et la bande transverse sont noirs; le bord costal est fauve vers la base. Ces mêmes ailes ont, en dessous, le bord costal et le bord interne fauves.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures, le bordure et une très-petite lunule sous-costale, noires de part s' d'autre.

Le mâle est un peu plus petit que la femelle. Il s'en distingue, en ce que le cinquième segment est d'un fauve minium comme le quatrième.

Cette Sésie se trouve dans une partie de l'Europe tempérée et méridonale. Elle est beaucoup plus rare aux environs de Parique la Culiciformis.

La chenille, dont Hubner donne une figure, vivrait, d'après ce iconographe, dans les tiges du saule, Salix alba.

### SEPTIÈME GROUPE.

Ailes supérieures opaques. Corps annelé de rouge fauve.

## 38. S. XIPHLEFORMIS. Boisd.

Envergure de 35 à 38 millimètres. Cette grande et belle Sésie s'éloigne un peu de nos espèces européennes. Elle est le type d'un petit groupe à côté des Myopæjormis, Culicijormis, etc.

La tête et les antennes sont d'un noir bleu. Les yeux sont d'un brun roussatre. Les palpes sont noirs ainsi que toutes les pattes. L'abdomen est d'un noir bleu, marqué dans son milieu d'un large anneau, ou plutôt de deux anneaux réunis, d'un rouge fauve. Le pinceau anal est noir, précédé, dans le mâle, d'un trait longitudinal, fauve, qui n'arrive pas jusqu'à l'extrémité de la brosse.

Les ailes supérieures sont entièrement d'un brun noir avec la frange d'un brun clair.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec la bordure et les nervures noires; outre cela, le bord antérieur est largement d'un noir profond.

Nous avons reçu cette remarquable Sésie de feu John Leconte, sans aucune indication gur la localité qu'elle habite aux Etatslinis.

## HUITIÈME GROUPE.

Abdomen annelé de jaune ou de blanchâtre.

# 39. S. Lomatiæformis.

Lederer, Verh. d. z.-b. Ver. 1832, p. 89. — Staudinger, Beitrag. p. 210, 25.

Nous ne connaissons pas cette Sésie asiatique. Elle a 31 millimètres. Elle est d'un bleu noir, avec le dessus de la tête et du corselet couverts d'un duvet blanchâtre. Les ailes supérieures sont dépourvues de bande terminale, mais la petite bande transverse est bordée de jaune en dehors; le hord interne de l'aile est également jaune. L'abdomen est d'un noir bleu avec le second, le quatrième et le sixième anneau jaunes. Les autres anneaux sont aussi bordés d'un peu de jaune.

Cette espèce a été prise aux environs d'Amasia et dans le Diarbekir, par Kindermann, qui n'a trouvé que deux ou trois individus mâles.

# 40. S. ICHNEUMONIFORMIS.

Laspeyres, f. 3, 4, p. 16. — Ochs. Schm. von Europ. t. II, p. 148, 12. — God. Pap. de France, t. III, pl. 21, f. 7. — Standinger, Beitrag. pl. 210, 26. — Sph. Ichnoumoniformie, Fab. Ent. S. III, 1, p. 385, 21. — Sph. Vespiformis, Esp. Schm. t. II, tab. 15, f. 3. — Hubner, Sphing. f. 39, 40. — Statuiformis, Freyer, tab. 182, f. 4. — Var.? S. Ophionis/Pormis? Boisd. Ind. meth. p. 43, 351. — Duponchel, Pap. de France, Suppl. t. II, pl. 9, f. 1. — Varlété Megillaformis? Herrich-Sch. — Hubner, Sphing. 114.

Plusieurs auteurs ont rapporté cette espèce à la Vespiformis, décrite par Linné dans sa Fauna suecica, mais, comme l'a dit Laspeyres, cela est d'autant moins certain que notre Ichneumoniformis ne se trouve pas en Suède.

Envergure de 15 à 25 millimètres. La tête est noire avec le front blanc et le collier jaune. Les palpes sont d'un jaune foncé, avec le sommet brunâtre, et une ligne noire sur leur côté interne. Les antennes sont noires à la base et à l'extrémité, un peu jaunâtres dans leur partie moyenne, et ferrugineuses en dessous. Le corselet est d'un noir luisant, marqué d'une liture et de deux traits longitudinaux jaunes. La poitrine est sans taches. L'abdomenest d'un noir brun, avec deux traits obliques jaunes, près de sa base, st six anneaux également de couleur jaune, visibles de part et d'autre. Le pinceau anal est noir avec des poils jaunes au milieu et sur les côtés. Les cuisses sont d'un noir brun avec une ligne jaunâtre sur le côté extérieur des deux premières paires. Les jambes sont d'un jaune roussâtre.

Les ailes supérieures sont transparentes avec les nervures, la bordure et une petite bande transverse d'un noir brun. Le sommet est d'un jaune un peu roussâtre; il existe en outre un point jaune à la base, et une petite tache fauve sur le bord externe de la petite bande transverse.

Les ailes inférieures sont transparentes avec les nervures, la bordure et une petite lunule sous-costale d'un noir brun.

Dans le mâle, on voit ordinairement un petit anneau jaune de plus.

Nous ne sommes pas bien convaincu, malgré l'opinion de M. Staudinger, que notre Ophioniformis, qui est bien la même que celle de Hubner, ne soit qu'un Ichneumoniformis. Nous n'admettons pas non plus, contrairement à l'opinion du savant

que nous venons de citer, que la Megillæformis de Hubner, qui n'a que quatre anneaux jaunes, soit une simple variété de l'Ich-seumoniformis.

Cette Sésie habite une grande partie de l'Europe ; elle est assez rare aux environs de Paris, mais elle est très-commune dans le Midi de la France.

# 41. S. UROCERIFORMIS.

Treits. Schm. von Europ. X, Abth. 1, p. 121. — Herrich-Schmift. t. II, fig. 20, 21. — Stauding. Beitrag. p. 212, 27. — Sph. Crabroniformis, Fab. Ent. S. t. III, p. 383, nº 17. — Var.? S. Doryceriformis, Leder. Verh. d. z.-b. ver. 1832, p. 87, var.? Athaliaformis.

Elle a le port de l'Ichneumoniformis, mais elle est un peu plus petite. Elle est d'un noir bleu. La tête est jaune ainsi que le collier. Les palpes sont jaunes, garnis de poils noirs. Les antennes sont noires. Le corselet est d'un noir bleu, avec les épaulettes marquées de jaune. L'abdomen est d'un noir bleu, avec six anneaux jaunes, dont le premier, le second et le quatrième étroits et quelquefois un peu obsolètes; le stroisième, le cinquième et le sixième plus larges et bien marqués. Le petit pinceau anal est noir mélangé de quelques poils fauves. Les pattes sont d'un jaune pâle avec la base et l'extrémité des cuisses noires.

Les ailes supérieures sont transparentes, avec les nervures et le bord costal noirs, ainsi que la petite bande transverse qui est accolée en dehors à une petite tache fauve; le bord interne est fauve et le sommet est lui-même plus ou moins lavé de fauve. En dessous toutes les nervures sont fauves.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec une petite bordure et les nervures noires.

Nous avons reçu de Kindermann ou de Frivaldsky, sous le nom d'Athaliæformis, un individu mâle beaucoup plus petit, dont les ailes supérieures, presque opaques, sont presque entièrement d'un fauve doré, avec la côte, la bordure et la petite bande transverse noires.

M. Staudinger, qui a été à même de voir un grand nombre d'individus de diverses provenances, rapporte, à la vérité avec un point de doute, à l'*Urocoriformis*, comme variété, la *Doryco-riformis* de Lederer, qui a trois lignes jaunes sur le corselet, et le bord costal des ailes supérieures jaune.

Cette espèce n'a pas encore été trouvée aux environs de Paris, mais elle n'est pas très-rare dans le midi de la France et dans la région méridionale de l'Europe.

## . 42. S. PARTHICA.

Lederer, Ann. de la Société Entom. de Belg. t. XIII, — 1869-1870, pl. 1, f. 4-5.

Nous n'avons jamais vu cette espèce en nature. Notre description est faite d'après la figure qu'en a donnée Lederer. Elle a le port et la taille de la Cynipiformis, et surtout de l'Uroccriformis. La tête est brune avec le collier grisâtre. Les palpes sont d'un blanc grisâtre. Les antennes sont noires. Le corselet est d'un noir bleu, sans taches. L'abdomen est d'un noir bleu, avec le quatrième et le sixième anneau d'un jaune citron. Le pincem anal est d'un jaune citron dans son milieu, et noir sur les côtés.

Les ailes supérieures sont transparentes, avec une bordure brune, très-étroite; la petite lunule discoïdale ne dépasse pas la nervure médiane, elle est brune et accolée en dehors à une petite tache ferrugineuse. Le bord interne, le bord costal et l'extrémité de l'aile sont lavés de jaune citron.

Les ailes inférieures sont transparentes avec les nervures, la bordure et le petit arc sous-costal de couleur brune.

La femelle a presque le port d'une Culiciformis: elle diffère du mâle en ce que l'abdomen n'a que le quatrième anneau jaune, avec le pinceau anal entièrement noir, en ce que les ailes supérieures sont presque entièrement d'un brun noir, avec deur taches transparentes, assez petites, l'une cunéiforme et l'autre arrondie; le bord costal est un peu lavé de jaune, comme dans le mâle.

Cette Sésie a été trouvée par Aberhauer aux environs de Hankinda dans la Transcaucasie.

## 43. S. Hymenopteriformis.

Bellier, Ann. de la Soc. Ent. de France, 1860, pl. 12, f. 3-4.

Elle a le port et la taille de l'Uroceriformis; comme dans l'espèce précédente, les deux sexes différent notablement l'un de l'autre.

Le mâle est d'un brun noirâtre. Les palpes sont noirs en de-

tres et d'un blanc gristre en dedans. Les antennes sont noires tres plusieurs articles fauves dans leur milieu. Le corselet est brun noir, sans taches. L'abdomen est d'un brun roussâtre, les deuxième, quatrième et sixième anneaux cerclés de blanc dessus. Le pinceau anal est noirâtre, blanc en dessous et sur côtés. Les cuisses et les jambes sont brunes annelées de blanc satérieurement.

Les ailes supérieures sont d'un brun fauve, plus clair vers le semmet, avec la petite bande transverse précédée et suivie de deux espaces vitrés, dont le premier est cunéiforme et l'extérieur airondi.

Les ailes inférieures sont transparentes avec les nervures, la Bardure et la petite lunule sous-costale d'un brun noirâtre.

La semelle dissere du mâle par ses ailes entièrement d'un brun sincé avec la cellule légèrement éclairée en dehors, par son abdemen d'un noir luisant, cerclé de blanc vis, par son pinceau smal d'un noir bleuâtre, ainsi que les deux dernières paires de pattes, et ensin par ses palpes d'un jaune ochracé, bordés de mair sur les côtés.

Cette Sésie a été prise accouplée, en Sicile, sur des tiges de graminées, par notre collègue, M. Bellier.

# 44. S. MASARIFORMIS.

Ochs. Schm. von Europ. t. II, p. 173, 24. — Staudinger, Beitrag. p. 214, 28. — Allantiformis, Eversm. Faun. volg.-ural. p. 104. — Var.? Empiformis, Dup. Suppl. t. II, pl. 9, f. 7.

Var. måle Sphinx Banchiformis, Hubn. Sphing. fig. 126. — Var.?

Envergure de 16 à 28 millimètres. La tête est d'un noir bleu, avec le collier jaune. Les palpes sont jaunâtres en dessus et d'un beau blanc de neige en dessous. Les autennes sont d'un noir bleu. Le corselet est d'un noir-bleu luisant, avec les épaulettes rayées de jaune. La poitrine est marquée, de chaque côté, d'une tache jaune. L'abdomen est d'un noir-bleu luisant, avec cinquanneaux jaunes assez larges, et les troisième et cinquième plus stroits. Ces anneaux existent de part et d'autre. Le petit pinceau anal est jaune, avec les côtés et le dessous mélangés de poils noire. Les cuisses sont jaunes, avec l'extrémité noire. Les jambes sont entrecoupées de jaune et de noir.

Les ailes supérieures sont transparentes, avec un point jaune à la base et un encadrement noirâtre; le sommet offre un espace semi-lunaire plus ou moins bien marqué d'un rouz doré. En dessous ces mêmes ailes sont ochracées.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures, les bords et une petite lunule sous-costale noirs.

Nous avons reçu d'Italie un très-bel exemplaire semblable en tout au Banchiformis figuré par Hubner. Chez cet individu, toutes les parties jaunes sont d'un fauve-orangé vif; l'abdomen n'a que trois anneaux orangés et le rudiment d'un quatrième à son point d'insertion avec le corselet. M. Staudinger, qui l'a vu dans notre collection, l'a considéré comme une variété de la Masariformis. Nous pensons que l'Empiformis, figuré par Duponchel, doît être rapporté aussi au Banchiformis de Hubner.

Enfin M. Staudinger, qui a eu à sa disposition un grand nombre d'individus de diverses contrées, rapporte à la Masariformis, avec doute, à la vérité, l'Odyneriformis de M. H.-Schæffer, dont la couleur jaune est plus foncée, dont les ailes supérieures ont les taches transparentes plus petites et les franges jaunes. Nous ne l'avons jamais vue.

La Masariformis habite le midi de la France, l'Italie, l'Espagne, la Turquia et la Hongrie.

# 45. S. ANNELLATA.

Zeller, Isis, 1847, p. 415. — Stauding. Beitrag. 219, 29. — S. Muscoformis, H.-Schæff. t. II, fig. 12-14. — Var.? Oxybeliformis, H.-Schæff. fig. 36. — Var.? Masariformis, H.-Schæff. t. II, p. 70, f. 6. — Var. a. Certoformis, Led. d. z.-b. ver. 1852, p. 85. — Ortalidiformis, Led. Verh. d. z.-b. ver. 1852, p. 85.

Elle a tout à fait le port de la Tenthredinisormis, avec laquelle on pourrait facilement la confondre au premier coup-d'œil. La tête est noire, avec les palpes jaunes ainsi que le collier. Les antennes sont brunes, avec le dessous roussâtre. La poitrine est brunâtre, avec des poils jaunâtres. Le corselet est d'un noir bleuâtre marqué de trois lignes jaunes. L'abdomen est d'un noir bleu, avec tous les anneaux jaunes, sauf les articulations, qui sont noires. Le petit pinceau anal est noir avec le milieu jaune.

Les ailes supérieures, qui ont un point blanchâtre à la base, sont transparentes, avec la bordure et la petite bande transversale d'un brun noirâtre; à un certain jour, la partie transparente paraît couverte d'écailles argentées. La frange est luisante et mèlangée de gris blanchâtre.

Les ailes inférieures sont transparentes, légèrement pulvérulentes, avec la bordure et la petite lunule sous-costale d'un brun noirêtre.

Elle se trouve en Hongrie, en Turquie, dans la Russie méria dionale et dans l'Asie-Mineure. Les quatre exemplaires que nous possédons nous ont été envoyés par Kindermann.

Nous ne connaissons pas l'Oxybeliformis ni la Masariformis de M. H.-Schæffer.

Nous ne connaissons pas davantage la Ceriæformis de Lederer, qui est plus obscure avec les anneaux de l'abdomen blancs, ni l'Ortalidiformis du même auteur, plus grande que les individus ordinaires et entièrement saupoudrée de jaune.

### 46. S. TENTHREDINIFORMIS.

Laspeyres, S. Eur. fig. 18, 19, 20 et 21.—God. Pap. de France, t. III, pl. 21, f. 16.— H.—Schæff. t. II, fig. 7-9.— Stauding. Dissert. de S. a. 3. p. 55.— Sph. idem, Hubn. Sphing. fig. 52.— Sph. Empiformis, Esp. Schm. t. II, tab. 32, f. 1, 2.— S. Empiformis, Stauding. Beitrag. p. 222, 30.

Dans sa dissertation sur les Sésies des environs de Berlin, M. Staudinger avait, avec tous les Lépidoptéristes, donné à cette espèce le nom de *Tenthrediniformis*, mais dans son Beitrag. publié deux ans plus tard, poursuivi par l'amour de l'exhumation des noms oubliés (1) il lui a substitué celui d'*Empiformis*. Pour

(1) M. Standinger pousse peut-être un peu trop loin son amour pour la résurrection des noms anciens. L'excès en tout devient un abus. D'ailleurs, nous ne sommes pas parfaitement certain que l'Emplormis d'Esper soit bien la même que la Tenthrediniformis, qui varie teaucoup et dont on connaît aujourd'hui plusieurs espèces très-voisnes. D'un autre côté, quel est l'entomologiste qui, à l'exemple de M. Standinger, supprimera le nom de Podalirius donné par Linné à un de nos plus beaux papillons européens pour lui substituer celui de Simon? Quel est celui qui changera le nom de Ligniperda donné par l'abricius à notre Cossus pour le remplacer par celui de Cossus cessus? Nous respectons autant la propriété d'autrui que M. Staudinger, mais s'il fallait remonter jusqu'aux temps les plus reculés, combien d'individus et de localités perdraient leur nom à l'exemple

ne pas occasionner inutilement de perturbation dans la synonymie, nous lui laissons, avec la plupart des auteurs et le savant Laspeyres, le nom qu'elle porte dans les collections.

Envergure, 12 à 21 millimètres. La tête est noire, avec le front et le collier jaunes. Les palpes sont jaunes de part et d'autre. Les antennes sont noires, avec la base jaune et le côté externe ferrugineux. La poitrine est noire, luisante, avec une tache latérale jaunêtre. Le corselet est d'un noir luisant, marqué de trois lignes jaunes, dont une médiane. L'abdomen est noir, garni à sa base de quelques poils jaunêtres et sablé d'atomes de la même couleur; le troisième, le cinquième et le septième segment sout en outre bordés de blanc ou de blanc un peu jaunêtre. Le pincean anal est noir en dessus, avec deux raies latérales jaunes; en dessous, il est jaune au milieu. Les cuisses antérieures sont jaunes; les postérieures sont d'un noir bleu.

Les ailes supérieures sont transparentes, avec les nervures, la bordure et deux bandes transverses noires, saupoudrées de jaune; en dehors de la seconde bande, le sommet est strié de fauve-jaunâtre doré. Ces mêmes ailes ont en dessous tous les bords d'un jaune roussâtre.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures, la bordure et la petite lunule sous-costale noires.

Le mâle est un peu plus petit que la femelle que nous venons de décrire; son corselet est dépourvu de la ligne médiane, jaune, et le dernier anneau de l'abdomen est double; le milieu du pinceau anal est jaune en dessus et en dessous. On rencontre quelquefois une variété chez laquelle le cinquième et le septième anneau sont seuls bordés de blanc.

Nous avons pris aux environs de Nimes, sur l'euphorbia characias, une variété plus grande et plus obscure que les individus ordinaires.

de nos villes de la Lorraine qui vont reprendre leur nom le plus ancien. M. Staudinger ne viendra plus à Paris, il viendra à Lutées et se logera quai des Morfondus ou de la Feraille: « Rien n'est éternel ici bas. »

Heureusement que M. Staudinger ne s'occupe pas de botanique, il aurait bouleversé toute la nomenclature admise aujourd'hui; mais il aurait vu que très-souvent des noms spécifiques de Linné étaient devenus des noms génériques, comme c'est le cas pour le mot Cossus.

Cette Sésie, assez rare aux environs de Paris, est commune dans le midi de la France et dans le sud de l'Allemagne.

### 47. S. ASTATIFORMIS.

Standinger, Beitrag. p. 258, 31. — H.-Schæff. t. II, fig. 5, 6. — La temelle S. Thyreiformis, H.-Schæff. t. II, fig. 15, 16. — S. Tenthrediniformis, var. Tengyraformis, Boisd. Ind. meth. p. 42, 330.

Nous possédons cinq exemplaires de cette Sésie; ils sont tous d'un tiers plus grands que la *Tenthrediniformis*. M. Staudinger réunit sous le même nom, comme mâle et femelle, l'Astatiformis et la Thyreiformis de M. Herrich-Schmffer. Il considère en outre, comme variété, avec un point de doute, notre Tengyraformis de l'Andalousie, laquelle nous serions plutôt disposé à regarder comme une variété de la Tenthrediniformis.

Cette Sésie se distingue facilement de toutes les espèces voisines par le reflet jaunâtre luisant de ses ailes supérieures. La tête est jaune, ainsi que les palpes et le collier. Les antennes sont noires. Le corselet est noir, avec une raie d'un jaune-paille sur les épaulettes. La poitrine est garnie de poils jaunes. L'abdomen est noir, grêle, allongé, saupoudré de jaunâtre, avec le deuxième, le quatrième, le sixième et le septième segment annelés de blanc ou de blanc jaunâtre; outre cela, le troisième et le cinquième anneau sont sablés de jaunâtre, chez deux de nos exemplaires. Le petit pinceau anal est d'un noir brunâtre, avec le milieu et les côtés d'un jaune pâle.

Les ailes supérieures sont transparentes, avec la bordure et deux bandes transverses noires, saupoudrées de jaune; l'espace situé en dehors de la sesonde bande, près du sommet, est jaunitre, coupé par les nervures. Les franges sont d'un gris luisant.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures, la bordure et la petite lunule sous-costale noires.

Elle se trouve en Hongrie, dans la Russie méridionale, en Espagne et en Portugal. Elle n'a pas encore été prise en France.

### 48. S. Braconiformis.

H.-Schzeff. t. II, fig. 33. — Staudinger, Beitrag. p. 261, 32. — S. Triannuliformis, Freyer, tab. 404, f. 2. — Philanthiformis, Lederer, Verh. d. z.-b. ver. 1832, p. 69.

Elle est de la taille de la *Tenthredini/ormis*, dont elle est très-Lépidoptères. Tome I. 27 voisine, et avec laquelle Ochsenhelmer semble l'avoir confondes. La tête est d'un brun noirâtre, avec les palpes blanchâtres et le collier fauve. Les antennes sont noires, le corselet est noir, marqué de trois lignes d'un jaune fauve, dont une médiane. L'abdomen est d'un brun noir, avec une ligne dorsale blanche et d'un jaune blanchâtre, interrompue; les deuxième, quatrième et sixième anneaux sont blancs. Le petit pinceau anal est brun, avec le milieu d'un blanc roussâtre.

Les ailes supérieures sont transparentes, avec les bords et bande transverse noirs; le sommet est marqué de quelque rayons d'un jaune-roussâtre luisant.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures, le bordure et la petite lunule sous-costale noires.

Elle se trouve dans le midi de la France et dans presque tot le sud de l'Europe. Kindermann nous a envoyé un individu pris par lui à Amasia, dans l'Asie-Mineure.

## 49. S. EUCERÆFORMIS.

Ochs. Schm. von Europ. p. 171, 22. — Sesia Icteropus, H.-Schml. t. VI, p. 56. — S. Herrichii, Staudinger, Beitrag. p. 284, 34.

M. Staudinger a changé le nom d'Icteropus, donné à cette pèce par M. Herrich-Schæffer, parce qu'il avait été appliqué pécédemment à la Doryliformis, par Zeller.

Nous avons acheté cette espèce de Becker, qui l'avait reçue de Kindermann.

Envergure, 24 millimètres. La tête est noire, avec le collier jaune. Les palpes sont noirs en dessous et jaunêtres en desses. Les antennes sont d'un noir bleu en dessus, et jaunes en desses vers leur sommet. Le corselet est noir, marqué de deux lignes jarnes. L'abdomen est allongé, d'un noir bleu, légèrement saupoudit de jaune, avec une ligne dorsale interrompue, d'un jaune pals; il est, en outre, marqué de chaque côté, de deux taches jaunes, d'un anneau blanchâtre, obsolète, sur le quatrième segment. Le pinceau anal est noir, mélangé de quelques poils d'un jame paille, bordé latéralement de jaune; en dessous, il est complètement jaune dans son milieu. Les hanches sont d'un noir bleu. Les jambes sont noires, annelées de jaune. Les tarses sont jaunes.

Les ailes supérieures sont transparentes, avec les bords & la

bande transversale d'un noir brillant; le sommet est marqué d'un petit espace d'un fauve doré coupé par les nervures.

Les alles inférieures sont transparentes, avec les nervures, la bordure et la petite lunule sous-costale noires.

Becker nous a dit qu'elle venait de la Turquie.

## 50. S. MANNII.

Lederer, Verh. d. z.-b. ver. 1852, p. 88. — Staudinger, Beitrag. 263, 23.

Nous ne connaissons pas cette Sésie que M. Staudinger place à côté de la précédente. Elle est plus petite que la Tenthrediniformis; elle est d'un noir bleu, avec l'abdomen marqué d'une ligne dorsale jaune, interrompue, et les deuxième, quatrième et sixièmes anneaux bordés de blanc; le sommet des ailes supérieures est en outre strié de jaune doré.

Elle a été découverte aux environs de Brousse, dans l'Asie-Mineure, par Mann. Elle paraît être voisine de la *Braconiformis*. M. Staudinger en a vu un exemplaire pris par Kindermann aux environs de Constantinople.

# 51. S. COLPIFORMIS.

Staudinger, Beitrag. 267, 35. — S. Doleriformis, Led. Verh. d. z.-b. ver. 1832, 86. — S. Polistiformis, Boisd. Ind. meth. p. 41, 324.

Elle a le port et la taille de la Tenthrediniformis, dont elle se ripproche un peu. Elle est d'un brun noir, comme l'Agriliformis. L'abdomen est marqué de taches latérales d'un jaune sale. Chez les individus frais, le quatrième et le sixième anneau sont berlés de blanc. Le pinceau anal est noir, bordé de poils jaunâtres. Les ailes supérieures sont transparentes, avec les nervures, une bordure assez large et la bande transversale noires. En debirs de la seconde tache diaphane, le sommet est strié de fauve doré.

Nous avons reçu du midi de la France, des individus chez lesquels les taches latérales existaient à peine et chez qui les laneaux blancs étaient très-peu indiqués.

Nous avions réuni à tort à notre Polistiformis, comme variété, com autre espèce que M. Staudinger a examinée dans notre colk:twn; cette dernière, selon cet auteur, qui a eu entre les mains presque toutes les Sésies qui existent dans les collections européennes, est sa Chalcocnemis.

Elle habite les environs de Montpellier.

### 52. S. BIBIONIFORMIS.

Staudinger, Beitrag. p. 270, 36.— S. Philanthiformis, H.-Schaft. II, f. 25-27.— Sph. Bibioniformis, Esp. Schm. t. II, tab. 44, f. 3, 4.— Ver. S. Mysiniformis, Boisd. Ind. meth. p. 42, 327.

Elle a le port et la taille de la Tenthrediniformis. Elle et d'un brun noirâtre avec le collier et les palpes blancs. Les attennes sont noires. Le corselet est noir avec une raie blance sur chaque épaulette. L'abdomen est d'un brun noir, un per pointillé de blanc, avec un anneau blanc, de part et d'autre se les deuxième, quatrième et sixième segments. Le pinceau and est brun, mélangé de quelques poils d'un blanc grisâtre. Les cuisses de la première paire sont blanches comme les palpes. Les autres sont brunes avec les jambes entrecoupées de blanc.

Les ailes supérieures, qui ont un point blanc à la base, sont assez largement bordées de noir, avec une grande tache cunéiforme transparente, allant de la base au-delà du milies, coupée par une nervure, puis, vers l'extrémité, une autre ma peu ovalaire, divisée par quatre nervures noires; elles ont, ca outre au sommet, une troisième petite tache transparente piss obscure, rayonnée par les nervures.

Les ailes inférieures sont transparentes avec de fines nervures, la bordure et la lunule sous-costale noires.

Dans notre Mysiniformis, que M. Staudinger considère commune variéte, les ailes supérieures sont plus largement bordée de noir, avec les cuisses de la première paire bordées de noires dehors.

Hongrie, Andalousie.

Ochsenheimer, selon M. Staudinger, paraît avoir conforme cette Sésie avec sa Tenthredinijormis. Nous le croyons sans peins, car toutes les espèces dont nous venons de parler ont entre elles une si grande ressemblance, qu'il faut y regarder de très-pres pour bien les distinguer les unes des autres. Pour peu que l'abdomen ait un peu tourné au gras, on ne peut plus les déterminer d'une manière bien positive.

# 53. S. BIBIONIPENNIS.

Boisd. Lépid. de la Californ. Part. II, p. 64, 65.

Elle a le port et la taille de la Tenthrediniformis. La tête et les antennes sont noires. Les palpes sont d'un gris blanchâtre en dessous et noirs en dessus. Le corselet est noir. Les pattes sont brunâtres avec les jambes un peu roussâtres. L'abdomen est noir avec deux anneaux d'un blanc légèrement jaunâtre. Le pinceau anal est noir, mélangé de quelques poils jaunâtres, précédé dans le mâle d'un petit anneau blanc.

Les ailes supérieures sont noires avec deux taches transparentes, dont l'antérieure cunéiforme, entière et la postérieure arrondie, divisée en cinq rayons par les nervures.

Les ailes inférieures sont transparentes avec les nervures, la bordure et une petite lunule sous-costale noires.

Lorquin a trouvé cette Sésie assez voisine de notre Bibionilormis, dans les allées des bois en Californie.

### 54. S. PHILANTIFORMIS.

Laspeyres, Ses. Europ. fig. 23-28. — Ochs. Schm. von Europ. t. II, p. 180. — Godart, — Stauding. Beitrag. p. 273, 37. — S. Muscaformis, Hafnag. tab. Verz. Heft. I, p. 18. — Sph. Muscaformis, Esp. Schm. t. II, tab. 32, f. 5. — Var. Meriaformis, Boisd. Ind. meth. p. 42.—Var. Leucomstana, Zeiler, Isis, 1847. — Var. Therevaformis, Led. 1852, p. 83.

Elle a le port et la taille de la Tenthrediniformis, c'est-à-dire de 15 à 24 millimètres. La tête est noire avec le front et le collier jaunes. Les yeux sont noirâtres, précédés d'une liture blanche. Les palpes sont blancs avec la pointe et une ligne extérieure noires. Les antennes sont noires avec une petite tache blanche vers leur sommet. Le corselet est noir avec trois lignes jaunes, dont une médiane. La poitrine est d'un brun noir, avec une tache latérale jaunâtre. L'abdomen est d'un noir luisant, sablé d'un peu de jaunâtre, avec les troisième, cinquième et septième anneaux bordés de blanc; les autres sont plus ou moins bordés de jaune. Le pinceau anal est noirâtre avec les côtés jaunâtres. Les cuisses antérieures sont blanches; les postérieures sont noires, variées de jaune. Les jambes sont noirâtres, garnies de quelques poils blanchâtres.

Les ailes supérieures sont transparentes, avec les nervures,

deux petites bandes transverses et la bordure d'un brun noir; le sommet est grisâtre et la côte est blanchâtre vers le sommet.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures, la bordure et une petite lunule sous-costale noires.

Cette Sésie varie un peu; on rencontre des individus dont les antennes des mâles sont dépourvues de tache blanche au sommet; on en rencontre d'autres qui sont sablés de blanc et non de jaune.

Nous avons reçu sous le nom de Corsica, de petits individus beaucoup plus noirs, avec la tache blanche du sommet des autennes plus accusée. Ces petits exemplaires nous paraissent identiques, à la taille près, avec la Meriæformis d'Andalousie.

La Sesia Philanthiformis habite l'Europe méridionale et tenpérée, et l'Asie-Mineure. Elle n'est pas très-rare en France.

M. Bellier a pris en Sicile la Therevæjormis de Lederer que M. Staudinger considère comme une variété de la Philanthijermis. Elle différe du type en ce que le quatrième et surtout le sixième segment ont chacun un anneau d'un blanc pur. Cette soi-disant variété est exactement la même que la Meriæjormis de Rambur. Nous sommes porté à la regarder comme une espèce propre.

## 55. S. AFFINIS.

Stauding. Beitrag. p. 278, 38. — S. Meriæformis, Rambur, Boisd. Ind. meth. p. 42. — S. Leucospidiformis, Led. Verh. d. z.-b. ver. 1832, p. 84.

M. Staudinger a vu dans notre collection cette Sésie que nou confondions avec notre Meriæformis. Il en a fait une espèce particulière sous le nom d'Affinis.

Elle a tout à fait le port, la taille et le lacies de la Philanthiformis. Elle est de même d'un brun noir avec une liture blanche en avant des yeux. Le corselet est marqué de deux lignes
jaunâtres. Les antennes sont noires. L'abdomen est d'un noir
luisant avec les quatrième, sixième et septième anneaux blanc
de part et d'autre. Le pinceau anal est noirâtre, mélangé sur les
côtés et dans son milieu de poils blanchâtres.

Nous en avons reçu deux exemplaires, l'un d'Andalousie et l'autre des environs de Montpellier; chez ce dernier, on aperçui la trace d'une ligne dorsale jaune.

## 56. S. ALBIVENTRIS.

Lederer, Verh. d. z. ver. 1832, p. 82. — Staudinger, Beitrag. p. 279, 39.

Nous ne connaissons pas cette Sésie décrite par Lederer, elle nous paraît très-voisine des espèces précédentes.

Elle est d'un noir bleu avec le front bronzé et le collier mélangé de quelques poils fauves. L'abdomen est noir, saupoudré de quelques atomes jaunes, comprimé postérieurement et marqué de deux anneaux blancs, l'un plus large sur le quatrième segment et l'autre plus étroit sur le sixième.

Elle a été trouvée aux environs de Brousse, dans l'Asie-Mineure.

## 57. S. AERIFRONS.

Zeller, Isis, 1847, p. 415. — Staudinger, Beitrag. p. 281, 40. — S. Meriaformis, Boisd. Ind. meth. p. 42.

Encore une espèce que, selon M. Staudinger, Rambur et moi avons eu le tort de réunir à notre Meriæformis.

Elle a de 15 à 18 millimètres au maximum. Elle est très-voisine de la *Philanthiformis*. La tête est d'un brun noir avec le front bronzé. Les antennes sont noires. Le corselet est d'un noir brunâtre avec deux raies jaunes, bien indiquées. L'abdomen est noir avec les deuxième, quatrième et sixième segments bordés de blanc. Le pinceau anal est noirâtre, mélangé de quelques poils jaunes. Les palpes et les cuisses de la première paire sont blancs chez les individus bien frais.

Les ailes supérieures ont les taches transparentes, assez petites, et celle du sommet est divisée seulement en trois rayons par les nervures.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures, la bordure et la petite lunule sous-costale noires.

Cette Sésie n'est pas très-rare aux environs de Montpellier sur les fieurs du thym. Rambur l'a prise aussi en Corse et en Andalousie.

## 58. S. LEUCOSPIDIFORMIS.

Stauding, Dess. d. S. a. B. p. 57. — Beitrag. p. 282, 41. — H.-Schæff. t. VI, fig. 53. — Sph. Leucopsiformis, Esp. Schm. tab. 42, fig. 6.

Elle est plus grande que la précédente; elle a de 18 à 23 mil-

limètres. Elle a la tête noire avec le front bronzé. Les palpes sont blancs en dessous, noirs en dessus. Les antennes sont noires en dessus et d'une teinte ferrugineuse en dessous. Le corselet est d'un brun noir, avec trois raies blanchâtres, dont une médiane qui se prolonge sur tout le corps. L'abdomen est d'un brun nois, avec une raie ventrale et une autre, sur chacun des côtés, d'un blanc pulvérulent; outre cela, le quatrième segment est bordé de blanc. Le pinceau anal est noirâtre. Les pattes sont noirâtres avec les cuisses de la première paire garnies de poils blanchâtres.

Les ailes supérieures sont noires avec deux taches vitrées, dont la cunéiforme assez étroite et l'externe petite, divisée en trois rayons.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures, à bordure et la lunule sous-costale d'un noir profond.

'Cette Sésie se trouve en Hongrie et en Prusse. Nous en avoss reçu une paire de Kindermann et une seconde que nous devoss à l'obligeance de M. de L'Orza.

Nota. La couleur blanche est très-caduque; elle s'enlève ave la plus grande facilité.

## 59. S. ALYSONIFORMIS.

Herrich-Schæff. t. II, fig. 46. — Led. Verh. d. z.-b. ver. 1852, p. 6. — Staudinger, Beitrag. p. 282, 42. — S. 1rivittata, Zeller, Isis, 186, p. 13.

Nous n'avons jamais vu cette petite Sésie qui a de 13 à 15 millimètres.

Selon M. Staudinger, elle est d'un noir violet avec le corsett marqué de trois lignes longitudinales jaunes. Les deuxième, qui trième et sixième anneaux sont bordés de jaune. Les ailes suprieures ont les taches vitrées très-petites.

Cette petite Sésie n'a encore été trouvée que dans l'Asie-Lineure.

## 60. S. FENUSIFORMIS.

Staudinger, Beitrag. p. 283, 43. — Lederer, Verh. d. z.-b. ver. 182, p. 54. — S. Leucopsiformis, Herrich-Schæff. t. II, fig. 4.

Elle est, selon M. Staudinger, au moins aussi petite que la précédente. Nous ne la connaissons pas.

425

Elle est d'un noir verdâtre ou bleuâtre. Ses ailes supérieures sent un peu brunâtres, très-étroites, avec des taches vitrées trèspetites, dont la postérieure est formée seulement de deux rayons. Les ailes inférieures ont la petite lunule sous-costale très-étroite. L'abdomen a les deuxième, quatrième et sixième anneaux bordés de jaune soufre.

Cette petite Sésie a été trouvée dans l'Asie-Mineure et dans l'Ile de Candie.

Selon M. Staudinger, M. Herrich-Schæffer a représenté cette espèce sous le nom de Leucopsiformis.

## 61. S. STELIDIFORMIS.

Freyer, N. B. pl. 182, f. 2. — Staudinger, Beitrag. p. 284, 44.— Unicincts, Herrich-Schmff. t. VI, fig. 57.

Elle a environ de 18 à 28 millimètres. Elle est d'un brun noir. Les antennes sont noires en dessus et un peu ferrugineuses en dessous. Les palpes sont un peu blanchâtres en dessous, principalement chez la femelle. Le corselet, dans les exemplaires bien frais, est marqué de trois lignes jaunâtres. La poitrine est d'un brun noir avec des taches latérales jaunes. L'abdomen a le quatrième segment marqué d'un anneau blanc, élargi sur les côtés. Le pinceau anal est brun en dessus; en dessous, il est jaunâtre au milieu et sur les côtés. Dans la femelle, ou voit, en outre, quelques points latéraux blancs.

Les ailes supérieures sont transparentes, avec la bordure et la bande transverse noires; la tache transparente cunéiforme de la base est coupée par une nervure pour former une tache radiale; la tache transparente externe est arrondie et divisée en cinq rayous par les nervures; le sommet offre, en outre, quelques petits rayons jaunâtres un peu obsolètes.

Les ailes inférieures sont transparentes avec la bordure et la lunule sous-costale noires.

Nous avons reçu d'Italie un mâle et une femelle en bonne condition. Elle se trouve aussi en Hongrie, en Dalmatie et dans l'Asie-Mineure.

Dans la figure qu'a donnée M. Freyer de cette Sésie, la tache transparente externe n'est pas très-correcte.

## 62. S. OSMIIFORMIS.

Herrich-Schmff. fig. 52. — Staudinger, Beitrag. p. 267, 45. — Seis Stetidiformis, Zeller, Isis, 1847, p. 406. — S. Zelleri, Led. Verh. d. 1-h. ver. 1852, p. 87.

Nous avons eu de feu Becker un exemplaire très-médiocre de cette petite Sésie; elle est presque d'un tiers moins grande que l'espèce précédente, dont elle nous semble si voisine qu'il est difficile de l'en distinguer. Elle est de même d'un brun noirtre avec trois lignes jaunâtres, obsolètes, sur le corselet, et un anneau blanc sur le quatrième segment, dilaté sur les côtés, comme dans la Stelidiformis; mais les ailes supérieures ont la tache transparente externe notablement plus étroite; elles sont marquées, en outre, à la base de la côte, d'un point jaunâtre.

Nous ignorons de quelle localité Becker l'avait reçue. Selon M. Staudinger sa patrie serait l'Italie et la Sicile.

## 63. S. CHALCOCNEMIS.

Staudinger, Beitrag. p. 289, 46. — Sesia Polistiformis, Boind. Ind. meth. p. 41, 324. — Duponch. Catal. 46.

M. Staudinger a changé le nom de Polistiformis que nous avos donné à cette Sésie, parce qu'il a cru que nous y avions rapporté, Rambur et moi, comme variété, l'espèce qu'il appelle Colpiformis.

Elle est de la taille d'une Tenthrediniformis. Elle est d'un noir bronzé un peu verdâtre. Les yeux sont bruns. Les antennes sont d'un noir bronzé. Les palpes sont noirs. Le corselet a un reflet un peu bleuâtre. Les pattes sont noires avec les éperons des jambes et le côté interne des tarses de couleur jaunâtre. L'abdomen est d'un noir un peu verdâtre, avec le quatrième segment bordé de blanc; on voit en outre, chez les individus bien frais, deux ou trois petites taches dorsales, obsolètes, un peu fauves.

Les ailes supérieures sont transparentes avec la bande transverse, la bordure et l'extrémité noires; la tache transparente esterne est divisée en cinq rayons par les nervures; la petite bande transverse est accolée, en dehors, à une tache d'un fauve orange; en dehors de la tache transparente externe, le sommet offre un petit espace rayonné de fauve luisant. Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures, la bordure et la petite lunule sous-costale noires.

Nous avons reçu plusieurs fois cette Sésie de M. Gustave Daube, de Montpellier, Rambur l'avait trouvée aussi en Espagne.

Cette espèce est bien véritablement celle que nous avions désignée, Rambur et moi, sous le nom de Polistiformis.

## NEUVIÈME GROUPE.

## 64. S. Azonos.

Loderer, Verh. d. z.-b. ver. 1833, Quart. II, pl. 2, f. 1.— Staudinger, Beitrag. p. 324, 47.

Nous ne connaissons pas cette espèce qui a 21 millimètres, selon M. Staudinger, qui a eu sous les yeux l'individu unique décrit par Lederer.

Cette Sésie est d'un bleu noir avec la partie postérieure de la tête jaune. Le corselet est d'un noir à refiet verdâtre. L'abdomen est immaculé, d'un bleu noir. Le pinceau anal est noir en dessus et jaune en dessous; le milieu des jambes est pareillement jaune. Les ailes supérieures sont transparentes, avec les nervures, la bordure et la petite bande transverse noires. Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures et la bordure noires.

Elle a été trouvée en Syrie aux environs de Beyrouth.

## 65. S. AGRILIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 16, 7.— S. Joppiformis, Staudinger, Beitrag. p. 335, 48. — Sesia Anthraciformis, Rambur, Ann. de la Soc. Ent. de France, t. I, pl. VII, fig. 7. — Boisd. Icones, pl. 48, f. 4. — Duponch. Suppl. t. II, pl. 9, fig. 4. — Ægeria Agriliformis, Walker, Heterocera, p. 16, 7.

MM. Walker et Staudinger ayant rétabli le nom d'Anthraci-/ormis donné par Esper à l'Andrenæformis des auteurs modernes, ils ont été obligés de changer celui que Rambur et moi avions donné à cette Sésie.

Elle est grande de 20 millimètres, c'est-à-dire de la taille de la Formicæformis. Elle est d'un noir bleu ou d'un noir un peu verdâtre. La tête, le corselet, les antennes, les pattes et l'abdomen sont entièrement d'un noir à resset bleuâtre.

Les ailes supérieures sont d'un noir bleuâtre, marquées de deux taches vitrées, dont l'extérieure presque carrée est coupée par deux, et souvent par trois nervures, et la seconde, allongée, conique, divisée par une seule nervure.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec la frange et les nervures noires.

Elle a été découverte en Corse, par Rambur, sur les feuilles de l'Euphorbia myrsinites, dans des lieux où cette plante croît à peu près seule; ce qui lui a fait supposer que sa chenille devait vivre dans les tiges de cette plante. Quelques années plus tard Ghiliani l'a retrouvée en Sardaigne sur la même Euphorbiacée.

#### DIXIÈME GROUPE.

## 66. S. DORYLIFORMIS.

Ochs. Schm. von Europ. t. II, p. 141. — Herrich-Schmffer, t. II, fig. 44. — Stauding. Beitrag. p. 325, 49. — Måle Euceraformis, H.-Schmff. t. II, f. 28. — Måle Icteropus, Zeller, Isis, 1847, p. 403. — La femelle Schmidtii, Zeller, 408. — Braconiformis, Ghiliani, Elenco, 1852, p. 85.

Cette espèce varie beaucoup du mâle à la femelle. C'est au point que si M. Staudinger n'eût déterminé lui-même cette Sésie dans notre collection, nous ne l'aurions pas reconnue dans l'ouvrage d'Ochsenheimer. Il est vrai que nous ne possédons que deux femelles prises en Sicile par Langelent.

Elle est à peu près de la taille d'une Culiciformis, c'est-à-dire qu'elle a de 20 à 22 millimètres. Elle est d'un noir un peu bronzé. La tête est noire avec une ligne jaune ou orangée en arrière des yeux. Les palpes sont jaunes ou d'un jaune orange. Le corselet est d'un noir luisant, avec deux lignes jaunes, ou d'un jaune safrané. Les antennes sont noires. L'abdomen est d'un noir bronzé avec les deuxième, quatrième et sixième segments fauves, bordés d'un peu de blanc, ou simplement liserés de blanc. Le pinceau anal est brun de part et d'autre avec les côtés bordés de poils jaunes ou orangés. Les pattes antérieures sont noires avec les jambes bordées de jaune, ou d'orangé, sur leur partie antérieure. Les pattes postérieures sont jaunes ou d'un jaune safrané avec les taches noires.

Les ailes supérieures sont brunes avec deux taches vitrées, dont celle de la base est allongée, cunéiforme, sans nervure, et SESIA. 429

celle de l'extrémité un peu transversale, divisée en cinq rayons; la petite bande transverse est accolée, en dehors, à une tache orangée, et l'extrémité apicale est un peu rayonnée de fauve; outre cela, tout le bord interne de ces mêmes ailes est longé par une raie jaune ou orangée.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures et le petit arc sous-costal noirs; la frange est brune, sauf du côté du bord abdominal où elle est orangée.

Cette belle Sésie n'a encore été trouvée qu'en Portugal, en Sicile, en Sardaigne et en Corse. Selon M. Bellier elle est trèscommune en Sicile aux environs de Palerme.

## 67. S. Chrysidiformis.

Laspeyres, Ses. Eur. p. 15. — Ochs. Schm. von Eur. t. II, p. 143. — Berrich-Schæff. fig. 47. — God. Pap. de France, t. III, pl. 21, f. 5. — Staudinger, Beitrag. p. 329, 50. — Sph. Chrysidiformis, Esp. Schm. t. II, tab. 30, f. 2. — Hubner, Sphing. fig. 53. — Var.? S. Miniacea, Led. Verh. d. z.-b. ver. 1852, p. 80. — S. Minianiformis, Freyer, N. B. tab. 404, f. 3.

Elle a de 16 à 26 millimètres. La tête est noire avec le front blanc et le collier jaunâtre. Les palpes sont noirs avec le sommet légèrement fauve. Les antennes sont d'un brun noir avec la base blanche. Le corselet est d'un noir-bleu luisant avec quelques poils jaunes clair-semés, et un point blanc à la base des ailes. La poitrine n'offre aucune tache. L'abdomen est d'un noir bleu avec le cinquième et le dernier segment bordés de blanc en dessus seulement. Le pinceau anal est noir sur les côtés et fauve dans son milieu. Les pattes sont noires avec les cuisses antérieures bordées de blanchâtre, et les jambes d'un rouge fauve.

Les ailes supérieures sont d'un rouge miniacé avec les bords et la tache transversale noirs; la tache transverse, dont la largeur varie, est comprise entre deux taches vitrées, dont l'antérieure allongée et cunéiforme, et la postérieure arrondie.

Les alles inférieures sont transparentes avec les nervures, la **bordure** et une petite lunule noires; cette petite lunule est **bord**ée de rouge minium.

Cette Sésie habite une grande partie de l'Europe. Il y a des années où elle est commune aux environs de Paris sur les fleurs de la carotte sauvage, Daucus carota, et autres fleurs des prairies.

Nous avons trouvé sa chenille plusieurs fois dans les raches de différentes espèces de Rumex au bord de la Seine.

Elle varie beaucoup : quelquefois le quatrième anneau est bordé de blanc. Chez d'autres individus, les parties fauves passent au jaune ou au blanchâtre; sauf la couleur des ailes qui reste la même.

Nous avons reçu de Kindermann, sous le nom de Miniaces et de Minianiformis, des individus pris à Amasia, chez lesquel les deuxième, quatrième et sixième anneaux sont bordés de jaune soufre.

Ces mêmes individus constituent peut-être une espèce distincte propre à l'Asie-Mineure.

## 68. S. CHALCIDIFORMIS.

God. Pap. de France, pl. 21, f. 6. — Staudinger, Beitrag. p. 330, 34. — Sph. Chalciformis, Esp. Schm. t. II, tab. 47, fig. 1-2. — Huba. Sphing. f. 93. — S. Prosopiformis, Ochs. Schm. von. Europ. t. II, p. 148. — S. Schmidtiiformis, Freyer, N. B. t. II, tab. 182, f. 1. — Prosopiformis, Herrich-Schæff. f. 33.

Elle est généralement d'un tiers plus petite que la précédente avec laquelle on pourrait la confondre au premier coup-d'œil. Elle en diffère par sa couleur bronzée, par ses palpes, dont le sommet n'est pas fauve, par l'absence du point blanc à la bass des premières ailes, par son abdomen dépourvu d'anneaux blans et tout à fait unicolore, par ses cuisses antérieures, qui sont entièrement d'un noir bleu, par ses ailes supérieures, dont la tache transparente extérieure est presque nulle, etc.

Cette petite Sésie est très-rare en France; sa véritable patrie paraît être la Hongrie, d'où nous l'avons reçue plusieurs fois de Kindermann.

M. Staudinger rapporte à cette espèce, comme variété, celle que M. Freyer a figurée, tab. 182, sous le nom de Schmidtiformis.

Nous ne l'avons pas vue en nature, mais d'après la figure précitée, elle diffère du type ordinaire en ce qu'elle a le quatrième anneau de l'abdomen blanc. M. Herrich-Schaffer en fait une espèce particulière sous le nom de *Prosopijormis*.

## 69. S. ELAMPIFORMIS.

Herrich-Scheeff. t. VI, fig. 54. - Staudinger, Beitrag. p. 332, 52.

Nous ne connaissons pas cette Sésie qui vient d'Amasia. M. Staudinger, qui ne l'a pas vue en nature, est très-porté à la regarder comme une variété de l'espèce précédente.

Elle est plus petite que la *Chalcidiformis*; elle n'a que 15 millimètres. Elle est de même d'un bleu bronzé. Les palpes sont d'un rouge fauve. L'abdomen est immaculé. Le pinceau anal est d'un rouge fauve.

Les ailes supérieures sont en grande partie d'un rouge fauve, sauf le bord costal.

Elle n'a pas encore été prise en Europe.

#### 70. S. FOENIFORMIS.

Herrich-Schmff. t. II, fig. 11. — Staudinger, Beitrag. p. 333, 53.

Même observation que pour la précédente. M. Staudinger, qui ne la connaît pas, se demande si cette Sésie ne serait pas une variété de la *Doryliformis*. D'après la figure qu'en a donnée M. H.-Schæffer, elle a 24 millimètres.

Elle est d'un noir un peu bronzé. L'abdomen est d'un bronzé luisant, avec le quatrième et le sixième segment d'un fauve orangé. Le pinceau anal est de cette dernière couleur.

Les ailes supérieures, sauf le bord costal, sont d'un fauve orangé.

Selon M. Herrich-Schæffer, elle se trouve dans le midi de l'Europe et fait partie de la collection de M. Kaden.

# GENRE PARANTHRENA. Staudinger. — Herrich-Schoffer. — Sesia auctorum.

Nous conservons ce genre, adopté par MM. Herrich-Schæffer et Staudinger, quoique ces messieurs l'aient emprunté à un coitus de Hubner, dans lequel il place en tête la Sesia Rhingiæformis!

Antennes très-grêles, presque filiformes. Palpes velus, écartés; le dernier article obtus. Trompe courte. Pattes

munies de forts ergots. Ailes supérieures opaques. Ailes inférieures transparentes. Abdomen des femelles très-ren-flé au milieu.

Les Paranthrènes sont de très-petits Lépidoptères qui ressemblent au premier coup-d'œil à des Tinéides. On ne sait rien de leurs métamorphoses, quoique feu Adrien de Villiers nous ait dit que les chenilles vivaient très-probablement dans les tiges de l'Echium violaceum.

## 1. P. TINEIFORMIS.

Staudinger, Beitrag. p. 334, 55. — Herrich-Schseff. t. II, p. 38. — S. Tineiformis, Ochs. Schm. von Europ. t. II, p. 132. — S. Tineiformis, Esp. Schm. tab. 38, fig. 4. — Hubner, Sphing. 46. — S. Brosiformis, Duponch. Pap. de France, Suppl. t. II, pl. 9, fig. 6.

Elle est très-petite, elle a de 12 à 16 millimètres. La tête est jaunâtre avec les palpes brunâtres. Le corselet est brun. L'abdomen est également brun, avec les articulations bordées latéralement d'un peu de blanc ou de blanc un peu jaunâtre. Le pinceau anal est d'un brun roussâtre. Les pattes postérieures sont brunes, garnies de poils d'un blanc jaunâtre dans leur milieu.

Les ailes supérieures sont brunes, avec le sommet strié d'un peu de fauve.

Les ailes inférieures sont transparentes avec une bordure brune assez large.

Cette petite espèce dont la chenille, selon Adrien de Villiers, vivrait dans les tiges de la vipérine, est assez commune aux environs de Montpellier. On la rencontre souvent le matin sur les fleurs des Composées, où elle se tient immobile.

## 2. P. Brosiformis.

Ochs. Schm. von Europ. IV, p. 175, 28. — Sph. Brosiformis, Hubn. Sphing. f. 116. — Paranthrena Brosiformis, Led. Verh. d. 2001.-bot. vereins 1852, p. 81. — Herrich-Schaeff. t. II, p. 58.

Cette Sésie est encore plus petite que la précédente; elle n'a guère que 10 millimètres.

La tête est noire avec une liture jaune en avant des yeux. Les palpes sont jaunes. Les antennes sont également jaunes en avant et un peu plus obscures en arrière. Le corselet est brun et sans tache, de même que la poitrine. Les cuisses sont noires, avec les jambes, et les tarses postérieurs jaunes. L'abdomen est brun, marqué à sa base de deux litures blanches; les articulations des premiers anneaux sont aussi bordées de blanc. Le pinceau anal est d'un jaune d'ocre dans le mâle, et mélangé de noir et de jaune chez la femelle.

Les ailes supérieures sont d'un noir brun avec le sommet rayonné de fauve ferrugineux.

Les ailes inférieures sont transparentes avec la bordure assez large.

Cette petite Sésie a été trouvée dans le midi de la France et en Espague par Rambur. Elle est beaucoup plus rare que la précédente.

Les Sesia Tineiformis et Brosiformis, souvent confondues ensemble, sont assez difficiles à bien distinguer lorsqu'elles ne sont pas très-fraiches, parce qu'elles tournent facilement au gras et qu'elles perdent alors leurs caractères.

## GENRE MYRSILA. Boisd.

Nous établissons ce genre sur une charmante espèce de l'Amazone qui a le corps d'un Pompile et les ailes d'une grande Tinéide.

Premier état : Inconnu.

Insecte parfait: Antennes presque filiformes, sans le moindre renfiement à l'extrémité. Palpes nus, longs, écartés, très-pointus; le dernier article aciculaire. Trompe peu développée. Pattes très-longues, pourvues d'éperons longa et assez forts. Abdomen pointu comme dans un Pompile. Ailes allongées, étroites, à nervures très-saillantes; frange bien développée.

#### M. AURIPENNIS. Boisd.

Envergure 24 millimètres. La tête, les palpes et les antennes sont d'un noir luisant. Le corselet est d'un fauve ferrugineux avec le milieu noir. L'abdomen a toute la moitié antérieure fauve et la moitié terminale noire.

Les ailes sont noires, luisantes comme si elles étaient vernies,
Lésidoptères. Tome I. 28

avec un resset doré, et la base d'un fauve ferrugineux; outre cela, elles sont marquées de quelques points blancs, clair-semés.

Les ailes supérieures ont les principales nervures très-saillantes; leur frange est noire sans refiet.

Les ailes inférieures sont seulement pointillées de blanc sur la france.

En dessous, la poitrine, la base des quatre ailes et les deur tiers antérieurs du ventre, sont d'un fauve ferrugineux. Les pattes sont noires.

Elle se trouve au Para.

## SÉSIES SUPPLÉMENTAIRES.

Nous n'avons, à notre disposition, aucune des espèces suivantes.

Nous possédions une certaine partie de celles des États-Unis d'Amérique, et quelques autres du Sénégal et de Natal, mais, ainsi que nous l'avons déjà dit, elles ont été détruites pendant le régime de la Commune. Nous nous trouvons très-heureux, à la suite des désastres de Paris, que notre collection et notre bibliothèque aient été presque entièrement sauvées.

Dans ces circonstances, les descriptions que nous donnons ici sont extraites des ouvrages de Harris, de M. Walker et de M. Felder.

## 1. S. Bassiformis.

Walker, Heterocera, p. 39, 64.

Elle est noire. La tête est couverte d'un duvet roussêtre. Les paipes sont roux avec quelques poils noirs. Les antennes sont rousses, un peu pectinées. Le corselet semble être marqué de deux lignes testacées. L'abdomen offre des taches dorsales tes-

tacées. Les pattes antérieures sont rousses ainsi que les tarses. Les pattes postérieures sont coupées par une bande testacée.

Les ailes supérieures sont purpurescentes, marquées vers la base d'une bandelette longitudinale transparente, et en avant d'une raie roussatre.

Les ailes inférieures sont d'une transparence un peu sombre. Le mâle seulement.

Etats-Unis. - British Museum.

## 2. S. DENUDATA.

Trockilium? Denudatum, Harris, Am. Journ. Sc. 36.

Elle est d'un brun châtain, avec le contour des yeux, le bord du collier, les incisions de l'abdomen, les jambes et les tarses d'un jaune foncé. Les antennes sont brunâtres en dessus avec le sommet et leur dessous ferrugineux.

Les ailes supérieures sont opaques avec une large tache transparente triangulaire, touchant l'angle externe de l'aile; outre cela, elles ont une tache ferrugineuse à la base et une tache de la même couleur près du milieu.

Les ailes inférieures sont transparentes avec la bordure et la frange brunes; l'arc costal est ferrugineux.

Amérique du nord. - Harris.

## 3. S. PYRAMIDALIS. Barnston.

Walker, Heterocera, p. 40, 63.

Elle est noire. La tête est garnie d'un duvet jaune autour des yeur. Les antennes sont ferrugineuses en dessous. Les palpes sont jaunes en dessous. Le corselet est marqué de quatre taches jaunes de chaque côté, dont l'une en avant et l'autre à la base des ailes. L'abdomen a les anneaux marqués d'une bande jaune plus distincte et plus large en dessous. Pattes rayées de blanchâtre.

Ailes transparentes avec la frange d'un noirâtre cuivreux; les supérieures avec les bords d'un noirâtre cuivreux ainsi que la petite bande transverse, laquelle est légèrement bordée de ferrugmeux.

Elle se trouve à St.-Martin's Falls, Hudson's Bay, d'où elle a eté envoyée au British Museum par M. Barnston.

## 4. S. Plecleformis.

Walker, Heterocera, p. 40, 66.

Elle est de la taille de la précédente et d'un noir foncé. La tête est garnie en arrière d'un petit duvet blanchâtre. Le corselet est marqué de chaque côté d'une ligne jaune. Les palpes sont jaunes. Les antennes sont d'un bleu noir, légèrement pectinées dans le mâle. L'abdomen a les segments bordés de jaune en arrière. Les pattes sont jaunes avec les cuisses noires. Les jambes sont rayées de noir.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont la côte, l'extrémité marginale et la petite bande transverse d'un noir un peu cuivreux.

Nouvelle-Ecosse. — British Museum. — On ne connaît que le mâle.

## 5. S. TRICINCTA.

Harris, Amer. Journ. Sc. 37.

Elle est d'un bleu noir avec les palpes jaunes à leur sommet. Les antennes sont noires et courtes. Le corselet est marqué en avant, d'une bande jaune et de deux taches humérales de la même couleur. L'abdomen a trois anneaux jaunes. Le petit pinceau anal offre deux lignes jaunes. Les jambes postérieures sont fasciées de jaunâtre; les tarses sont jaunes.

Les ailes supérieures sont opaques.

Les ailes inférieures sont transpérentes, avec la bordure et le petit trait transversal de couleur noire.

Massachusetts. — Harris.

#### 6. S. Syringæ.

Harris, Am. Journ. Sc. 36.

Elle est brune avec les palpes, les antennes, le prothorax, le milieu des jambes intermédiaires et les tarses antérieurs, ferrugineux. Les pattes postérieures ont le milieu des jambes et les tarses jaunes.

Les ailes supérieures ont une raie basilaire transparente.

Les ailes inférieures sont transparentes avec la bordure et le petit arc sous-costal d'un brun noirâtre.

Massachusetts. - Harris.

## 7. S. EXITIOSA.

Harris, New Engl. Farmer vol. 33. — Am. Journ. Sc. 36. — *Ageria* id. Say, Entomol. 11.

Elle est d'un bleu d'acter avec les palpes, le prothorax et le bord des épaulettes d'un jaune pâle. Le bord des segments abdominaux, et deux bandes sur les jambes sont du même jaune, ainsi que les tarses antérieurs. Le petit pinceau anal est noir avec les cêtés jaunâtres.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont la bordure et la petite bande transverse d'un bleu d'acier.

La femelle diffère du mâle en ce que l'abdomen est fascié de jaune orangé.

Elle se trouve aux Etats-Unis. - Harris.

## · 8. S. CAUDATA.

Harris, Americ. Journ. Scient. 35. — Egeria Fulvicornis, Harris, Cat. ins. Massach.

Elle est brune avec les palpes, les antennes, le prothorax et les tarses d'un jaune fauve. L'abdomen se termine, dans le mâle, par une queue très-longue d'un jaune fauve. Les pattes postérieures sont jaunes, avec l'extrémité des jambes et le métatarse d'un jaune fauve.

Les ailes supérieures sont transparentes jusqu'au milieu, et ensuite opaques jusqu'à l'extrémité.

La femelle a la queue très-courte et les ailes supérieures entèrement opaques.

Massachusetts.

#### 9. S. ODYNERIPENNIS.

Bembecia id. Walker, Heterocera, p. 42, 47.

Elle est d'un brun foncé à resset cuivreux, avec le tour des yeux blanchâtre. Les palpes sont jaunes et les antennes d'un noir bleu. Le corselet est marqué de chaque côté, de trois taches panes. L'abdomen a les anneaux bordés de jaune en arrière. Les pattes sont jaunes avec les cuisses rayées de brun.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont la côte, la

bordure terminale et la petite bande transverse d'un brun suvreux.

Nouvelle-Ecosse. - British Museum.

Feu Ed. Doubleday nous avait donné cette espèce.

## 10. S. EMPHYTIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 43, 72.

Elle est d'un noir pourpré. La tête est garnie en avant de pois blancs. Les palpes sont garnis en dessous de poils serrés, les un bruns, les autres fauves. Les antennes sont ferrugineuses et marquées antérieurement d'une bande jaune et de trois taches de la même couleur. L'abdomen a les anneaux bordés de jaune, avec le pinceau anal mélangé de quelques poils jaunes. Les pattes sont d'un jaune roux, avec les cuisses noires et les jambes rayés de jaune.

Les ailes sont d'une couleur cuivreuse; les supérieures sont d'un jaune roux sur le disque; les inférieures sont striées de roux avec la base transparente.

La femelle diffère du mâle en ce que la tête est bordée de jaune, en ce que les pattes sont jaunes, garnies de poils rous, en ce que les antennes sont rousses avec le sommet noirâtre, en ce que le pinceau anal est jaune, avec les côtés noirs, en ce que les pattes sont entièrement rousses et, enfin, en ce que les ailes supérieures ont le disque roux, ainsi que la bordure des ailes inférieures.

Elle habite les Etats-Unis d'Amérique. - British Museum.

Cette espèce, que nous avions reçue de feu E. Doubleday, & dont il ne nous reste rien, que la poussière, doit être placée dans le groupe des Sésies à ailes supérieures opaques.

## 44. S. Hylotomiformis.

Walker, Heterocera, p. 43, 73.

Elle est d'un ferrugineux obscur. La tête est garnie de pols d'un jaune blanchâtre. Les palpes sont jaunes. Les antenes sont noires à l'extrémité. Le corselet est garni de chaque côté, à la base des ailes, d'une petite touffe de poils d'un jaune pale. L'abdoinen offre sur chaque segment une bande testacée. Les pattes sont brunes.

Les ailes sont transparentes avec la frange un peu cuivreuse; les supérieures ont la bérdure et la petite bande transverse d'un pourpre cuivreux; les inférieures ont le petit arc sous-costal de la même couleur.

Nouvelle-Ecosse. - British · Museum.

## 42. S. PYRALIDIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 44, 74.

Elle est d'un tiers plus petite que la précédente, et d'un brun cuivreux. La tête est garnie de poils jaunes autour des yeux. Les palpes sont grêles et jaunes. Les antennes sont minces et un peu en massue. La poitrine a une raie jaune de chaque côté. L'abdomen a un seul anneau jaune, placé sur le milieu du dos. Les pattes postérieures sont en grande partie jaunes avec les tarses blanchâtres.

Les ailes supérieures sont d'un brun cuivreux, marques en dessous d'une raie basilaire jaunâtre.

Les siles inférieures sont transparentes avec la frange d'un brun enivreux.

Etats-Unis. - British Museum.

Cette espèce appartient au même groupe que l'Emphytisormis.

#### 43. S. FULVIPES.

Harris, Cat. ins. Massach. Am. Journ. Sc. 36.

Elle est d'un bleu noir. Les palpes sont d'une couleur ochracée en dessous. Les antennes sont jaunâtres à l'extrémité. Le corselet est marqué de chaque côté, à la base des ailes, d'une tache ochracée. L'abdomen a sa moitié antérieure d'un jaune ochracé en dessous. Les jambes postérieures et les tarses sont de cette dernière couleur.

Les ailes sont transparentes avec les bords, et la petite bande transverse des supérieures, d'un bleu noir.

Massachusetts. - Harris.

## 14. S. SCITULA.

Harris, Am. Journ. Sc. 36.

Elle est d'un noir pourpré. La tête est garnie d'un duvet ar-

gentin. Les palpes, le collier, le bord des épaulettes et les côtés de la poitrine sont d'un jaune d'or. L'abdomen est marqué à sa base d'une bande étroite, d'une tache dorsale et au milieu d'un large anneau d'un jaune brillant. Le pinceau anal est de la même couleur. Les cuisses antérieures, les jambes et les tans sont d'un jaune d'or.

Les ailes sont transparentes avec la bordure d'un jaune doi; les supérieures ont la petite bande transverse d'un pourpre nes ainsi que le sommet qui est, en outre, strié de jaune d'or.

Cette jolie Sésie habite l'état de Massachusetts. - Harris.

## 15. S. Pyri.

Harris, New Engl. Farmer, IX, 2. — Amer. Journ. Sc. 36.

Elle est d'un pourpre noir, avec le dessous des palpes, le cellier, le bord des épaulettes et les côtés de la poitrine d'un jame d'or. L'abdomen est marqué à sa base d'une raie transverse st de deux anneaux, dont le postérieur plus large, d'un jaune brillant. Les pattes et la moitié postérieure du dessous de l'abdomes sont également d'un jaune brillant.

Les ailes sont transparentes avec la bordure d'un pourpes noir; les supérieures ont, en outre, la petite bande transvesse striée de jaune bronzé.

Etats-Unis. - Harris.

## 16. S. SAPYGÆFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 45, 78.

Elle est d'un noir bleu. La tête est garnie de poils roux les palpes sont roux avec la base noire en dessus. Les antennes dentelées en scie sont un peu pubescentes. L'abdomen est marqui de deux anneaux ferrugineux, dont le postérieur très-large. Les jambes antérieures sont fauves, les postérieures sont rouses avec les tarses testacés.

Les ailes supérieures sont d'un bleu pourpré, avec deux raiss sur le disque, dont l'une est ferrugineuse et l'autre transparente.

Les ailes inférieures sont entièrement diaphanes.

Etats-Unis. - British Museum.

## 17. S. GELIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 47, 79.

Elle est noire avec les côtés de la tête blancs. Les antennes sont ferrugineuses en dessous. L'abdomen est ferrugineux avec la base noire. Le pincoau anal est d'un bleu noir un peu ferrugineux à sa base.

Les ailes supérieures sont d'un noir bleu.

Les ailes inférieures sont diaphanes avec le sommet et la bordure noirâtres.

Rtats-Unis. - British Museum.

Les Sésies que nous venons de décrire ne sont pas les seules qui habitent l'Amérique septentrionale, il en reste certainement un bien plus grand nombre à découvrir. Nous sommes même persuadé que ce vaste territoire fournira un jour beaucoup plus d'espèces que toute l'Europe.

Le British Museum est très-riche en Sésies exotiques, et il est bien regrettable pour l'étude, que notre Museum national en soit presque totalement dépourvu.

Nous n'avons vu aucune des espèces suivantes recueillies dans l'Amérique centrale par le savant M. Bates. Ces espèces, trèsrares pour la plupart, font aujourd'hui partie du British Museum.

#### 18. S. MYRMOSÆPENNIS.

Walker, Heterocera, p. 46, 80.

Elle est d'un noir bleu. La tête est garnie d'un duvet argentin autour des yeux. Les palpes sont blancs, rayés de noir. Les antennes sont pubescentes en dessous. Le corselet est marqué de chaque côté de deux raies jaunes. Le métathorax est jaune. Les segments de l'abdomen sont également bordés de jaune en arrière. Les jambes et les tarses sont fasciés de blanchâtre. Le pinceau anal est asses long.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont la bordure et la petite bande transverse d'un noir bleu.

Trouvée au Para, par M. Bates. - British Museum.

## 19. S. Buprestiformis.

Walker, Heterocera, p. 47, 81.

Elle est bleue et assez grande. La tête est bordée de blanc de chaque côté en avant. Les palpes sont noirs, très-velus. Les antennes sont noires, assez grêles. Le corselet est marqué de chaque côté d'une raie ferrugineuse. Les côtés de la poitrine sont de cette dernière couleur. L'abdomen est marqué vers sa base d'un large anneau ferrugineux. Les pattes sont garnies d'un duvet blanchâtre.

Les ailes supérieures sont d'un noir pourpré, avec une raie basilaire transparente, et une large bande anté-apicale mal arrêtée d'un jaune doré.

Les ailes inférieures sont transparentes avec la bordure d'un noir pourpre.

Cette belle Sésie a été prise dans la vallée de l'Amazone et fait partie de la riche collection de M. Saunders.

#### 20. S. Anomaliformis.

Walker, Heterocera, p. 47, 82.

Elle est d'un noir pourpré, avec la tête argentée en avant. Les palpes sont jaunes. Les antennes sont d'un jaune testacé, simples dans les mâles, quelquefois un peu noirâtres. Le corselet est marqué de trois lignes jaunes. La poitrine est jaune. L'abdomen a les segments bordés de jaune testacé en arrière. Les pattes sont testacées.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont la bordure, et la petite bande transverse, d'un pourpre cuivreux.

Elle a été prise par M. Bates, assez communément, à Tapayos et à Villa Nova. — British Museum.

#### 21. S. DINETIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 48, 83.

On ne connaît que le mâle qui est asses voisin de l'espèce précédente. Sa couleur est d'un brun tanné. La tête est blanche en avant. Les palpes sont jaunes. Les antennes sont noires en dessus et ferrugineuses en dessous. Le corselet est marqué d'une ligne dorsale noire avec les côtés jaunâtres. Les segments de l'abdomen sont bordés de jaune avec le petit pinceau anal de longueur ordinaire. Les pattes sont jaunâtres.

Les ailes sont transparentes avec la bordure d'un pourpre cuivreux; les supérieures ont la petite bande bordée d'une ligne ferrugineuse.

Décrit sur un individu unique pris à Pernambuco par M. Johnson. — British Museum.

## 22. S. TRYPHONIFORMIS.

## Walker, Heterocera, p. 48, 84.

Elle est un peu plus grande que l'espèce précédente et d'un noir cuivreux. La tête est d'un blanc argentin en avant. Les palpes sont jaunes. Les antennes sont noires en dessus et ferrugineuses en dessous. Le corselet offre quatre lignes jaunes avec les côtés et la poitrine du même jaune. L'abdomen a les anneaux bordés de blanchâtre avec les côtés testacés et le ventre blanchâtre. Le pinceau anal est mélangé de quelques poils jaunes. Les pattes sont testacées avec le dessus des cuisses et la base des jambes de couleur noire.

Ailes transparentes un peu irisées avec une petite frange cuivreuse.

Les femelles ou les individus que M. Walker regarde avec doute, comme telles, ont les anneaux de l'abdomen bordés de jaune testacé, ainsi que le ventre, les pattes d'un jaune testacé; les ailes supérieures ont l'extrémité purpurescente striée de jaunâtre.

Cette Sésie a été prise assez communément par M. Bates, au Para et aux environs de Villa Nova. — British Museum.

#### 23. S. Plecticiformis.

## Walker, Heterocera, p. 49, 85.

Elle est un peu plus petite que la précédente et de couleur pourprée. La tête est verte avec le front verdâtre. Les palpes sont jaunes. Les antennes sont noires en dessus et ferrugineuses en dessous. Le corselet est marqué de chaque côté de deux lignes d'un jaune testacé. L'abdomen a chacun des anneaux bordés de

## 19. S. Buprestiformis.

Walker, Heterocera, p. 47, 81.

Elle est bleue et assez grande. La tête est bordée de blanc de chaque côté en avant. Les palpes sont noirs, très-velus. Les antennes sont noires, assez grêles. Le corselet est marqué de chaque côté d'une raie ferrugineuse. Les côtés de la poitrine sont de cette dernière couleur. L'abdomen est marqué vers sa base d'un large anneau ferrugineux. Les pattes sont garnies d'un duvet blanchâtre.

Les ailes supérieures sont d'un noir pourpré, avec une raie basilaire transparente, et une large bande anté-apicale mal arrêtés d'un jaune doré.

Les ailes inférieures sont transparentes avec la bordure d'un noir pourpre.

Cette belle Sésie a été prise dans la vallée de l'Amazone et sat partie de la riche collection de M. Saunders.

## 20. S. Anomaliformis.

Walker, Heterocera, p. 47, 82.

Elle est d'un noir pourpré, avec la tête argentée en avant. Les palpes sont jaunes. Les antennes sont d'un jaune testacé, simples dans les mâles, quelquefois un peu noirâtres. Le corselet est marqué de trois lignes jaunes. La poitrine est jaune. L'abdomen a les segments bordés de jaune testacé en arrière. Les pattes sont testacées.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont la bordure, « la petite bande transverse, d'un pourpre cuivreux.

Elle a été prise par M. Bates, assez communément, à Tapayos et à Villa Nova. — British Museum.

#### 21. S. DINETIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 48, 83.

On ne connaît que le mâle qui est assez voisin de l'espèce précédente. Sa couleur est d'un brun tanné. La tête est blanche en avant. Les palpes sont jaunes. Les antennes sont noires en dessus et ferrugineuses en dessous. Le corselet est marqué d'une ligne dorsale noire avec les côtés jaunâtres. Les segments de l'abdomen sont bordés de jaune avec le petit pinceau anal de longueur ordinaire. Les pattes sont jaunâtres.

Les ailes sont transparentes avec la bordure d'un pourpre cuivreux; les supérieures ont la petite bande bordée d'une ligne ferrugineuse.

Décrit sur un individu unique pris à Pernambuco par M. Johnson. — British Museum.

## 22. S. TRYPHONIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 48, 84.

Elle est un peu plus grande que l'espèce précédente et d'un moir cuivreux. La tête est d'un blanc argentin en avant. Les palpes sont jaunes. Les antennes sont noires en dessus et ferrugineuses en dessous. Le corselet offre quatre lignes jaunes avec les côtés et la poitrine du même jaune. L'abdomen a les anneaux bordés de blanchâtre avec les côtés testacés et le ventre blanchâtre. Le pinceau anal est mélangé de quelques poils jaunes. Les pattes sont testacées avec le dessus des cuisses et la base des jambes de couleur noire.

Ailes transparentes un peu irisées avec une petite frange cui-

Les femelles ou les individus que M. Walker regarde avec doute, comme telles, ont les anneaux de l'abdomen bordés de jaune testacé, ainsi que le ventre, les pattes d'un jaune testacé; les ailes supérieures ont l'extrémité purpurescente striée de jaunâtre.

Cette Sésie a été prise assez communément par M. Bates, au Para et aux environs de Villa Nova. — British Museum.

#### 23. S. Plecticiformis.

Walker, Heterocera, p. 49, 85.

Elle est un peu plus petite que la précédente et de couleur pourprée. La tête est verte avec le front verdâtre. Les palpes sont jaunes. Les antennes sont noires en dessus et ferrugineuses en dessous. Le corselet est marqué de chaque côté de deux lignes d'un jaune testacé. L'abdomen a chacun des anneaux bordés de

jaune d'ocre. Le petit pinceau anal est mélangé de quelque poils jaunâtres. Les pattes sont jaunes striées de noir.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont la côte et le sommet pourpres, striés de jaune.

Prise au Para par M. Bates. — British Museum.

## 24. S. SCIOPHILÆFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 49, 86.

On ne connaît que la femelle. Elle est d'un pourpre foncé. La tête est d'un jaune d'or avec un peu de blanc autour des yeur. Les palpes sont noirs en dessus et blancs en dessous. Les antennes sont noires avec la base ferrugineuse. Le corselet a les côtés un peu fauves. Les anneaux de l'abdomen sont bordés de jaune d'ocre. Le petit pinceau anal est d'un jaune pâle. Le haut des jambes et les tarses sont d'un jaune d'or.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont la côte d'un pourpre foncé et le sommet doré.

M. Bates en a pris un seul exemplaire au Para. — British Museum.

25. S. CERCERIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 49, 87.

Elle est un peu plus petite que la précédente, de couleur pourpre. La tête est d'un noir bleu, avec le front d'un blanc argentin. Les palpes sont jaunes. Les antennes sont fauves en dessous. Le corselet est d'un noir bleu en avant et sur les côtés, avec la poitrine d'un blanc argentin. L'abdomen a les anneaux bordés de jaune. Le petit pinceau anal est d'un jaune d'ocre mélangé de quelques poils bruns. Les pattes sont d'un jaune testacé avec les hanches et les cuisses jaunes.

Les ailes sont transparentes; les supérieures, dont le sommet est doré, ont la côte et la petite bande transverse d'une couleur pourpre.

26. S. RHYSSÆFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 50, 88.

Elle a, comme les précédentes, environ 8 lignes anglaises d'envergure. Elle est d'un bleu verdâtre. La tête est de couleur cuvreuse avec le contour des yeux blanc. Les palpes sont blancs avec le sommet noir. Le corselet est marqué d'une raie jaune sur chaque épaulette. L'abdomen a les anneaux bordés de blanc. Le ventre est de cette dernière couleur. Le petit pinceau anal offre sur les côtés quelques poils testacés. Les pattes sont entrecoupées de blanc.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont la côte, l'extrémité et la petite bande transverse, un peu purpurines.

L'individu que M. Walker suppose pouvoir être le mâle, diffère de celui dont il vient d'être question, par sa couleur d'un bleu noir, par ses palpes noirs en dessus, par ses antennes filiformes et par ses ailes supérieures dont l'extrémité est asses largement opaque.

L'un et l'autre ont été pris au Para par M. Bates et font partie du British Museum.

Nota. Il est probable que l'individu que M. Walker suppose être le mâle de sa Rhyssæformis appartient à une autre espèce; car ce serait le premier exemple d'un mâle ayant les antennes filiformes, lorsque la femelle les a. au contraire, renfiées à l'extrémité.

## 27. S. CLADIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 51, 89.

Elle est un tant soit peu plus petite que les précédentes et d'un noir bleu. Les yeux sont entourés de blanc argentin. Les antennes sont ferrugineuses avec la base et le sommet noirs. L'abdomen offre de chaque côté à sa base, un petit faisceau blanc. Le petit pinceau anal est mélangé de quelques poils blancs. Les pattes sont assez robustes avec les tarses et le dessous des jambes blancs.

Les ailes sont transparentes avec les nervures noirâtres; les supérieures sont un peu ternes depuis la base jusqu'à l'arc discoidal.

M. Bates en a pris un seul exemplaire aux envirous de Santarem. — British Museum.

## 28. S. GLYPTÆFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 51, 90.

Elle est encore un peu plus petite que la précédente et d'un pourpre cuivreux. La partie antérieure de la tête est d'un blanc argentin. Les palpes sont jaunes. Les antennes sont coupées audelà du milieu par un large anneau jaune. Le corselet est marqué en avant de deux taches jaunes. L'abdomen est jaune en dessous avec les anneaux également bordés de jaune. Le petit pinceau anal est jaune en partie. Les pattes sont jaunes avec le sommet cuivreux.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont la côte, le sommet et la petite bande transverse d'un pourpre cuivreux.

M. Bates en a pris un seul exemplaire à Villa-Nova. — British Museum.

## 29. S. OPHFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 51, 91.

Elle est très-petite et d'un bleu noir. La tête a les yeux entourés de blanc argentin. Les palpes sont blancs en dessous. Les antennes sont grêles. Les segments abdominaux sont bordés de blanc. Le petit pinceau anal est d'un jaune d'or. Les pattes sont annelées de blanc argentin.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont la côte et la petite bande transverse d'un noir pourpré.

Un seul exemplaire trouvé au Para par M. Bates. — British Museum.

#### 30. S. Pellastiformis.

Walker, Heterocera, p. 52, 92.

Elle a 8 lignes anglaises et elle est noire. La tête est d'un blanc argentin en avant, et garnie de poils jaunes en arrière. Les palpes sont d'un jaune testacé, garnis en dessous de poils noirs. Les antennes sont en massue, ferrugineuses en dessous. La poitrine est marquée de quatre taches jaunes. L'abdomen a les segments bordés de jaune. Le petit pinceau anal offre en dessous quelques poils noirs sur les côtés. Les cuisses sont rayés de jaune. Les jambes et les tarses antérieurs sont d'un jaune testacé. Les jambes intermédiaires sont annelées de jaune et les jambes postérieures sont hérissées de quelques poils jaunes, aims que les tarses.

Les ailes sont transparentes, mais assez ternes.

Un seul individu femelle pris à Villa-Nova par M. Bates. — British Museum.

## 31. S. CEROPALIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 52, 93.

D'un quart plus petite que la précédente et de couleur noirêtre. La tête est blanche en avant. Les palpes sont blancs. Les antennes sont sétacées, mais finement pectinées. La poitrine est blanche. L'abdomen est ferrugineux. Les pattes sont ferrugineuses avec les cuisses antérieures blanches. Les jambes postérieures sont garnies de cils épais.

Les ailes sont transparentes; les supérieures sont ferrugineuses le long de la côte.

M. Bates a pris plusieurs exemplaires de cette Sésie au Para at à Villa-Nova. — British Museum.

## 32. S. CROESIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 53, 94.

Elle est un peu plus grande que la précédente, assez robuste et de couleur cuivreuse noirâtre. Les palpes sont blancs avec le sommet noirâtre. Les antennes sont ferrugineuses en dessous. L'abdomen a le quatrième segment liseré de blanc. Les pattes sont d'un bleu foncé, avec les jambes ciliées. Les jambes postérieures sont garnies au sommet de poils ferrugineux.

Les ailes sont transparentes, avec la frange et la côte des supérieures d'une teinte cuivreuse.

M. Bates en a pris un exemplaire au Para et l'autre à Villa-Nova. — British Museum.

## 33. S. ISCHNIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 53, 95.

Elle est un peu plus petite que la Crasiformis et de couleur pourpre. La tête est blanche autour des yeux et d'un jaune testacé en arrière. Les palpes sont jaunes, à peine velus. Le corselet est bleu. L'abdomen a les anneaux bordés de jaune testacé. Le ventre est de cette dernière couleur. Le petit pinceau anal est jaunâtre en dessous. Les pattes sont testacées avec les hanches de la première paire blanchâtres. Les jambes postérieures et les tarses sont entrecoupés de pourpre.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont la bordut, le sommet et la petite bande transverse d'un pourpre doré.

Trouvée au Para par M. Bates. — British Museum.

### 34. S. Porizoniformis.

Walker, Heterocera, p. 54, 96.

Elle a 6 lignes anglaises et elle est de couleur pourpre. La tête est d'un noir bleu. Les palpes sont blancs en dessous. La corselet est marqué de trois lignes blanches. Les segment de l'abdomen sont bordés de blanc; le cinquième et le sixième out en dessous un anneau de la même couleur. Les pattes sont annelées de blanc.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont la bordure, le sommet et la petite bande transverse d'un jaune doré.

M. Bates l'a prise assez communément au Para, à Tapayos & à Villa-Nova. — Le British Museum en possède six exemplaires.

## 35. S. PANURGIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 54, 97.

Elle est un peu plus grande que la précédente et d'un pourpre noir. La tête est blanche, garnie en arrière de quelques pois jaunes. Les palpes sont blancs, un peu obscurs au sommet. Les antennes sont en massue, ferrugineuses en dessous. Le corselet est marqué de trois lignes jaunes. La poitrine est jaunâtre. Les anneaux de l'abdomen sont bordés de jaune. Le ventre est marqué d'une ligne longitudinale de la même couleur. Le petit pinceau anal est mélangé sur les côtés de quelques poils jaunes. Les pattes sont coupées par des bandes jaunes avec les jambes postérieures assez fortement velues.

Les ailes sont transparentes, avec la bordure et la petite bande des supérieures, d'un noir cuivreux.

Recueillie assez communément par M. Bates au Para, à Santarem, à Tapayos et à Villa-Nova. — British Museum.

#### 36. S. Panisciformis.

Walker, Heterocera, p. 55, 98.

Elle a 8 lignes anglaises et clle est d'un jaune testacé pale. Le

sommet de la tête est vert avec les côtés blancs. Les antennes sont noires en dessus et fauves en dessous. Le milieu du corselet est vert. L'abdomen est vert, à sa base et à l'extrémité. Le petit pinceau anal est assez long et noir en grande partie.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont le sommet et la petite bande transverse d'une couleur cuivreuse.

Elle a été trouvée dans la vallée de l'Amazone et fait partie de la riche collection de M. Saunders.

## 37. S. BLACIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 55, 99.

Elle est d'une ligne plus grande que la précédente et de couleur verte. La tête est blanche en avant. Les palpes sont blancs en dessous, ainsi que la poitrine. Le petit pinceau anal est noir et très-long. Les pattes sont entrecoupées de blanc.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont le sommet et la petite bande transverse pourpres.

Elle a été trouvée, comme la précédente, dans la vallée de l'Amazone et fait de même partie de la collection de M. Saunders.

#### 38. S. PRODUCTA.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 4.

Elle a 8 lignes anglaises; et est d'une stature assez grêle et d'un pourpre noir. La poitrine est blanche. L'abdomen est assez mince avec le premier et le troisième segment bordés de blanc et deux séries ventrales de points du même blanc. Le pinceau anal est très-long et blanc à son extrémité. Les pattes sont variées de blanc.

Les ailes sont transparentes avec les nervures, une ligne marginale et la frange noires; les supérieures ont la côte, le sommet et la petite bande transverse noirs.

Elle a été trouvée au Mexique aux environs d'Oajaca. — British Museum.

Selon M. Walker, cette espèce est voisine de la Rhyssæfor-mis.

#### 39. S. BASALIS.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 6.

Elle a 12 lignes anglaises, et sa couleur est d'un jaune d'ocr. La tête est argentée autour des yeux. Les antennes sont robustes, longues et noires. Le disque du corselet est cuivreux, marqué de trois lignes d'un jaune testacé. L'abdomen est un peu en massue, d'une couleur pourpre en dessus, avec les anneaux bordés de blanc argentin. Le pinceau anal est très-long, noir en majeure partie. Le ventre est d'un blanc d'argent vers sa base, avec deux petits faisceaux de poils de la même couleur. Les pattes sont robustes avec les cuisses postérieures noirâtres.

Les ailes sont transparentes avec les nervures pourpres; les supérieures ont la côte et la petite bande transverse pourpres.

La femelle a les antennes plus courtes, les palpes plus long et le corselet marqué de deux larges raies, cuivreuses.

Trouvée à Ega et à Villa Nova par M. Bates. — British Museum.

Selon M. Walker, cette Sésie est assez voisine de l'Anomalijormis et de la Dinetiformis.

#### 40. S. FASCICULIPES.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 5.

Elle est de moitié plus petite que la précédente et de couleur noire. La tête est d'un blanc d'argent autour des yeux. Les palps sont saillants en avant, d'un blanc pur en dessous. La poitrisse est d'un blanc argentin. L'abdomen est pourvu d'un petit pirceau d'un noir cuivreux. Les pattes sont garnies de poils serrés, avec les tarses argentés à leur base.

Les ailes sont transparentes avec les nervures et la françe noires, ainsi que la petite bande transverse des supérieures.

Prise à Ega, par M. Bates. — British Museum.

#### 41. S. PULCHRIPENNIS.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 6.

Elle a 10 lignes anglaises, et elle est d'un bleu obscur. La partie antérieure de la tête est d'un blanc d'argent. Les paipes son

ascendants, d'un blanc argentin en dessous. Les antennes sont noires. L'abdomen est pourvu d'un pinceau anal, très-long. Les pattes antérieures sont d'un blanc d'argent en dessous ainsi que les hanches de la même paire. Les jambes postérieures sont entrecoupées de blanc argentin et garnies à leur sommet de petits faisceaux de poils; les tarses de ces mêmes pattes sont aussi frangés de poils serrés.

Les ailes supérieures sont bleues avec la base vitrée et le sommet pourpre.

Les ailes inférieures sont transparentes avec les nervures, une ligne marginale et la frange noires.

Décrite sur un seul individu trouvé à Ega, par M. Bates. — British Museum.

## 42. S. Ruficaudis.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 6.

Elle a 10 lignes anglaises et elle est d'un bleu-métallique varié de nuances pourpres et cuivrées. La tête est blanche antérieurement et d'un jaune d'or en arrière. Les palpes sont avancés et d'un jaune d'or. Les antennes sont noires. L'abdomen est atténué, d'un jaune d'or en dessous et d'un roux ferrugineux à son extrémité. Les pattes sont d'un jaune d'or avec les tarses postérieurs, le sommet des jambes et les cuisses d'un pourpre cuivreux.

Les ailes sont transparentes avec les nervures et les franges pourpres. Les supérieures ont aussi la côte, le sommet et la petite bande transverse de couleur pourpre.

Trouvée à Ega par M. Bates. — British Museum.

#### 43. S. CRASSICORNIS.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 7.

Elle a 13 lignes anglaises (environ 3 centimètres) et elle est très-robuste et d'un noir pourpre. Les palpes sont avancés avec le second article velu. Les antennes sont fortes, un peu en massue et de couleur noire. L'abdomen est un peu fusiforme avec les deux derniers segments et le ventre d'un gris légèrement doré. Les pattes sont robustes; les jambes postérieures sont velues avec l'extrémité des tarses d'un gris un peu doré.

Les ailes supérieures sont d'un pourpre obscur, un peu arrondies au sommet.

Les ailes inférieures sont transparentes avec les nervures, la bordure et la frange d'un pourpre foncé.

Elle a été trouvée à Ega par M. Bates. — British Museum.

Cette Sésie appartient à la section des espèces à ailes supérieures opaques.

## 44. S. PLUMIPES.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 8.

Elle a 8 lignes anglaises et elle est proportionnellement trèslarge. Elle est noire en dessus et d'un noir pourpre en dessus. La partie antérieure de la tête est d'un blanc argentin. Les palpes sont redressés, d'un blanc argentin, avec la pointe noire. Les antennes sont un peu testacées en dessous. Les pattes sont robustes, bleues ou pourpres; les jambes postérieures sont frangées de noir avec le sommet garni de petits faisceaux de poils jaunes et les tarses dorés.

Les ailes sont transparentes avec la frange purpurescente; les supérieures sont un peu ternes vers leur bord interne, elles ont, en outre, la bordure et la petite bande transverse de couleur pourpre.

Elle a été découverte à Ega par M. Bates. — British Museum.

#### 45. S. APICALIS.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 8.

Elle a 14 lignes anglaises (plus de 3 centimètres) et elle est verte avec des nuances pourpres et cuivreuses. Les palpes sont ascendants, blancs en avant. Les tarses sont d'un blanc sale.

Les ailes ont la frange pourpre; les supérieures ont le sommet blanc; les inférieures sont marquées de deux lignes d'un pourpre noir.

Décrite sur un individu femelle pris à Nanta par M. Bates. - British Museum.

Cette espèce, avec ses quatre ailes opaques, n'appartient à aucun des groupes européens.

## 46. S. ÆQUALIS.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 9.

Elle a 10 lignes anglaises et elle est d'un noir cuivreux. La tête est blanche, avec le contour des yeux jaune. Les palpes sont obliquèment ascendants, blancs en dessous. Les antennes ont le sommet jaune en dessous. L'abdamen est marqué en avant d'une petite tache jaune et de quatre lignes de la même couleur; outre cela les anneaux sont bordés de jaune. Le petit pinceau est aussi long que la moitié de l'abdomen et jaune sur les côtés. Les jambes, les genoux et les articles des tarses sont aussi de couleur jaune.

Les ailes sont transparentes avec la frange pourpre; les supérieures ont la côte, le sommet et la petite bande transverse pourpres.

Trouvée au Para par M. Bates. — British Museum.

Selon M. Walker, cette Sésie vient se placer à côté des Rhyssæformis et Pellastiformis.

## 47. S. Unicolor.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 9.

Elle a 8 lignes anglaises et elle est d'un noir cuivreux. Les palpes sont avancés et hlancs en dessous. L'abdomen est linéaire, avec le pinceau anal coupé carrément. Les pattes postérieures sont assez robustes.

Les ailes sont d'un noir cuivreux, nuancées d'un peu de vert. Décrite sur un individu mâle, pris à Ega, par M. Bates.—British Museum.

Cette espèce avec ses quatre ailes opaques appartient au même groupe que l'Apicalis.

Les espèces qui suivent sont africaines et ont un certain rapport avec nos sésies européennes. Nous en possédions plusieurs, dont quelques-unes, du Sénégal et la Casamance, étaient peutêtre nouvelles, mais elles ont toutes été détruites. Nous emprunterons comme pour les précédentes leur description à l'ouvrage de M. Walker.

#### 48. S. Doleriformis.

Walker, Heterocera, p. 56, 100.

Elle a 10 lignes anglaises (à peine 3 centimètres), et elle est noire. La tête est variée de poils blancs. Les palpes sont d'un jaune pâle en dessus et blancs en dessous. Les antennes sont roussâtres, un peu pectinées. Le corselet est garni en avant de quelques poils jaunes et marqué de chaque côté d'une raie ferrugineuse. L'abdomen a les anneaux bordés de jaune, mais le plus rapproché de la base est interregique. Le petit pinceau anal est testacé à son extrémité. Les pattes sont rayées de jaune testacé.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont le bord postérieur et le sommet ferrugineux; la petite bande transverse est aussi bordée de ferrugineux.

Port-Natal. - British Museum.

#### 49. S. Mesochoriformis.

Walker, Heterocera, p. 56, 101.

Elle est un peu plus petite que la précédente et d'un vert foncé. Les antennes sont un peu en massue, fauves, avec le sommet noir. Le corselet est marqué de deux lignes pâles. La poitrine est également pâle. L'abdomen offre aussi des bandes pâles. Le petit pinceau anal offre de chaque côté quelques poils blancs.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont le sommet et la petite bande transverse d'un pourpre doré.

Port-Natal. - Coll. de M. Saunders.

## 50. S. HILARIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 57, 102.

Elle est de la taille de la précédente et d'un vert foncé. Les palpes sont testacés, avec la pointe noire. Le corselet est marqué de deux lignes blanches. La poitrine est blanchâtre. L'abdomes offre de chaque côté, près de sa base, une ligne blanche. Les pattes sont annelées de blanc. Le petit pinceau anal est blanchâtre.

Les ailes supérieures sont vertes chez le mâle, avec une rais transparente interrompue.

s postérieures sont diaphanes.

i femelle les antennes offrent un anneau blanc avant le l'abdomen est marqué d'un anneau blanc, et les ailes se ont une large bordure, et le petit arc discoldal de coupre.

atal. - Coll. de M. Saunders.

## 51. S. PLATYURIFORMIS.

Heterocera, p. 57, 103.

t de la taille de la précédente dont elle est voisine, et 'un noir cuivreux, les palpes sont blancs à leur base et is. Les antennes un peu filiformes sont assez robustes, tes et dentelées en dessous. Le corselet est marqué de les d'un jaune testacé. L'abdomen est traversé par un lanc sur le bord du quatrième segment. Le petit pinceau nélangé à son extrémité de quelques poils blancs. Les it variées de blanc.

es supérieures sont d'un pourpre cuivreux, avec une e discoldale, transparente, interrompue.

s inférieures sont diaphanes, avec la frange cuivreuse.

stal. — British Museum.

#### 52. S. Exochiformis.

Heterocera, p. 58, 104.

t à peine plus petite que la précédente, et d'un vert La tête est d'un blanc argentin en avant. Les palpes :hâtres en dessous. La postrine est d'un blanc argentin. : sont robustes, avec les tarses longs.

s sont transparentes.

Leone. - British Museum.

 Walker a décrit cette espèce si brièvement que nous qu'il n'a pas eu sous les yeux un individu parfaite-

## 53. S. OCHRACEA.

Heterocera, XXXI, Suppl. p. 10.

lignes anglaises, et elle est d'un jaune cebracé en d'un jaune doré en dessous. Les antennes sont noires,

#### 48. S. DOLERIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 56, 100.

Elle a 10 lignes anglaises (à peine 3 centimètres), et elle est noire. La tête est variée de poils blancs. Les palpes sont d'un jaune pâle en dessus et blancs en dessous. Les antennes sont roussâtres, un peu pectinées. Le corselet est garni en avant de quelques poils jaunes et marqué de chaque côté d'une raie ferrugineuse. L'abdomen a les anneaux bordés de jaune, mais le plus rapproché de la base est interragique. Le petit pinceau anal est testacé à son extrémité. Les pattes sont rayées de jaune testacé.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont le bord postérieur et le sommet ferrugineux; la petite bande transverse est aussi bordée de ferrugineux.

Port-Natal. - British Museum.

### 49. S. Mesochoriformis.

Walker, Heterocera, p. 56, 101.

Elle est un peu plus petite que la précédente et d'un vert foncé. Les antennes sont un peu en massue, fauves, avec le sommet noir. Le corselet est marqué de deux lignes pâles. La poitrine est également pâle. L'abdomen offre aussi des bandes pâles. Le petit pinceau anal offre de chaque côté quelques poils blancs.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont le sommet et la petite bande transverse d'un pourpre doré.

Port-Natal. - Coll. de M. Saunders.

#### 50. S. HILARIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 57, 102.

Elle est de la taille de la précédente et d'un vert foncé. Les palpes sont testacés, avec la pointe noire. Le corselet est marqué de deux lignes blanches. La poitrine est blanchâtre. L'abdomen offre de chaque côté, près de sa base, une ligne blanche. Les pattes sont annelées de blanc. Le petit pinceau anal est blanchâtre.

Les ailes supérieures sont vertes chez le mâle, avec une rais transparente interrompue.

Les ailes postérieures sont diaphanes.

Chez la femelle les antennes offrent un anneau blanc avant le sommet, l'abdomen est marqué d'un anneau blanc, et les ailes inférieures ont une large bordure, et le petit arc discoidal de couleur pourpre.

Port-Natal. - Coll. de M. Saunders.

# 51. S. PLATYURIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 57, 103.

Elle est de la taille de la précédente dont elle est voisine, et elle est d'un noir cuivreux, les palpes sont blancs à leur base et en dessous. Les antennes un peu filiformes sont assez robustes, pubescentes et dentelées en dessous. Le corselet est marqué de trois lignes d'un jaune testacé. L'abdomen est traversé par un anneau blanc sur le bord du quatrième segment. Le petit pinceau anal est mélangé à son extrémité de quelques poils blancs. Les pattes sont variées de blanc.

Les ailes supérieures sont d'un pourpre cuivreux, avec une bandelette discoldale, transparente, interrompue.

Les ailes inférieures sont diaphanes, avec la frange cuivreuse.

Port-Natal. - British Museum.

### 52. S. Exochiformis.

Walker, Heterocera, p. 58, 104.

Elle est à peine plus petite que la précédente, et d'un vert bleuâtre. La tête est d'un blanc argentin en avant. Les palpes sont blanchâtres en dessous. La poitrine est d'un blanc argentin. Les pattes sont robustes, avec les tarses longs.

Les ailes sont transparentes.

Sierra-Leone. - British Museum.

Note. M. Walker a décrit cette espèce si brièvement que nous supposons qu'il n'a pas eu sous les yeux un individu parfaitement pur.

53. S. OCHRACEA.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 10.

Elle a 9 lignes anglaises, et elle est d'un jaune ochracé en dessus et d'un jaune doré en dessous. Les antennes sont noires, et un peu en massue. Les segments abdominaux sont bordés de pourpre noir. Le petit pinceau anal est d'un jaune roussatre.

Les ailes sont transparentes, avec les nervures et la frange d'un pourpre cuivreux; les supérieures ont également le sommet d'un pourpre cuivreux.

Port-Natal. Décrite sur deux exemplaires. - British Museum.

Le British Museum, dont les relations sont si étendues sur toute la surface du globe, possède, outre les espèces américaines et africaines que nous venons de décrire, d'autres sésies propres aux Indes orientales et à l'Australie que nous n'avons jamais vues. Les descriptions que nous en donnons ci-après sont comme celles des précédentes, extraites de l'ouvrage de M. Walker.

### 54. S. LELEFORMIS.

Elle a 8 lignes anglaises, et elle est d'un bleu noir : là tête et blanche en avant et en dessous. Les palpes sont blancs, asser grêles. Les antennes sont grêles, à peine plus longues que le corselet. Le corselet est marqué de deux lignes jaunes. L'abdomen offre trois bandes jaunes. Le petit pinceau anal est jaune, avec les côtés et l'extrémité noirs. Les hanches sont blanches. Les pattes antérieures sont testacées avec les tarses noirs. Les jambes postérieures et leurs tarses sont coupés par une bande blanche.

Les ailes sont très-étroites; les supérieures sont unicolores, d'un pourpre cuivreux; les inférieures sont transparentes.

Décrite sur un individu femelle pris dans le nord de la Chine, par M. Cuming. — British Museum.

#### 55. S. ALTERNA.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 10.

Elle est grande, elle a 13 lignes anglaises. Elle est robuste et d'un vert obscur. La tête est dorée en avant. Les palpes, un peu redressés, sont d'un jaune doré. Les antennes sont fortes. Le corselet est marqué de trois taches d'un jaune d'or, une sur chaque épaulette et une sur l'écusson. L'abdomen est nuancé de bleu et de pourpre; il est, en outre, marqué d'une bande courte, d'une autre bande interrompue, d'une liture postérieure et d'un petit espace apical d'un jaune d'or. Les pattes sont robustes

avec les jambes antérieures frangées et les postérieures annelées de jaune.

Les ailes sont transparentes avec les nervures, la frange et une ligne marginale pourpres; les supérieures ont la côte verte, la base et une petite ligne oblique de couleur pourpre, et un petit espace extérieur un peu ochracé; les ailes inférieures ont un trait transversal vert.

Du Sud de l'Hindostan. - British Museum.

### 56. S. CUPREIPENNIS.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 11.

D'un tiers plus petite que la précédente. Elle est noire et assex large. Les palpes sont jaunes. La partie postérieure du corselet et la poitrine sont d'un jaune d'or. L'abdomen a le bord des segments d'un jaune d'or. Le petit pinceau anal est jaunâtre à son extrémité. Les pattes sont un peu dorées avec les jambes intermédiaires garnies de deux petits faisceaux de poils. Les tarses postérieurs sont jaunes avec leur base noire en dessus.

Les ailes supérieures sont cuivreuses avec une ligne médiane vitrée.

Les ailes inférieures sont diaphanes avec le bord extérieur, la frange et les nervures un peu irisés.

Sud de l'Hindostan. - British Museum.

### 57. S. GRAVIS.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 12.

Elle a 16 lignes anglaises et elle est d'un noir de poix, nuancée de vert et de pourpre. La tête offre en dessous une pubescence blanche. Les palpes sont avancés, blancs en dessous. Les antennes sont noires. Le corselet est terne, marqué de deux lignes d'un noir de poix, et antérieurement de deux taches d'un jaune d'or. L'abdomen a des points latéraux d'un jaune d'or et les anneaux bordés du même jaune. Les pattes sont d'un noir rous-satre.

Les ailes supérieures sont de couleur pourpre.

Les ailes inférieures sont transparentes mais un peu ternes, avec les nervures pourpres et la base d'un jaune pâle.

Décrite sur un individu unique rapporté du nord de la Chine par M. Fortune. — British Museum.

Cette Sésie est voisine de notre Vespipennis, mais ses ailes sont notablement plus longues.

### 58. S. BIGINGTA.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 12.

Un tant soit peu plus grande que la précédente, robuste et d'un vert métallique, nuancé de pourpre. La tête est d'un blant argentin en avant. Les palpes sont ascendants, d'un jaune d'or avec leur base noire. Les antennes sont robustes, de couleur pourpre. La poitrine est marquée de deux litures d'un jaune d'or. L'abdomen offre deux bandes d'un jaune d'or, l'une près de la base et l'autre au-delà du milieu. Les pattes postérieures sont un peu velues et les jambes sont cendrées.

Les ailes supérieures sont pourpres nuancées de bleu.

Les ailes inférieures sont vitrées avec la bordure, la frange et une ligne transverse d'un pourpre bleu.

Prisa dans le nord de la Chine par M. Fortune. — British Museum.

Cette Sésie appartient au même groupe que la Vespipennis.

### 59. S. Phaslæformis.

Felder, Sitz. Akadem, Wiss. XLIII, 26.

Elle se rapproche un peu de la Tipuliformis.

Ses ailes sont vitrées; les supérieures sont extérieurement d'un bleu luisant avec la côte et la petite bande transverse noires; leur limbe extérieur est brun en dessus et strié de jaune doré en dessous. Chez le mâle, les pattes sont jaunâtres en dedans, et en dehors d'un bleu noir, annelées de jaune. L'abdomen est noir, à restet bleu, annelé de jaune. Le petit pinceau anal est noir, entrecoupé de jaune longitudinalement.

Chez la femelle, les pattes sont presque entièrement fauves et le pinceau anal est presque entièrement d'un jaune orangé.

Amboine. - Felder.

### 60. S. AURIPLENA.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 13.

Elle a 11 lignes anglaises et elle est d'un doré brillant. La tête est d'un blanc argentin avec le sommet d'un pourpre verdâtre. Les antennes sont noires avec la base jaune. Le corselet a le disque d'un pourpre bleu. Les cuisses sont d'un bleu pourpre, avec les tarses postérieurs fasciés de pourpre.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont la côte, le sommet et la petite bande transversale de couleur pourpre.

Décrite sur un individu femelle pris à la Nouvelle-Guinée. — Collect. de M. Saunders.

### 61. S. CLAVIFORMIS.

### Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 14.

Elle est de la taille de la précédente, assez robuste et d'un bleu à reflet vert. Les palpes sont d'un jaune testacé, avec la bise d'un pourpre bleu. Les antennes sont fortes et en massue. Le corselet a le bord antérieur, deux lignes longitudinales et recusson d'un jaune doré. L'abdomen est marqué de trois bandes d'un jaune d'or. Les pattes sont fasciées de jaune, avec les jambes postérieures garnies de petits faisceaux de poils vers leur sommet.

Les ailes supérieures sont opaques, d'un bleu pourpre. Les ailes inférieures sont vitrées.

Décrite sur un individu mâle pris à Batchian. — Collect. de M. Saunders.

### 62. S. LÆTA.

### Walker, Heterocera, p. 59, 107.

Elle a 10 lignes anglaises; elle est assez robuste et d'un noir 'acé. Les antennes sont blanches au sommet. Le corselet est rarqué de deux lignes blanches. Les côtés de la poirrine sont ralement blancs. L'abdomen est noir à sa base et marqué de rax taches blanches; il offre, en outre, des taches dorsales poires. Les pattes sont blanches avec le sommet des jambés et es cuisses d'un bleu noir.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont le sommet d'un noir cuivreux et la petite bande transverse noire.

Patrie incennue. - British Museum.

### 63. S. CRYPTIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 59, 108.

Elle a 9 lignes anglaises et elle est de couleur noire. La paria postérieure de la tête est garnie de poils jaunes. Les antenes sont filiformes, dentalées et pubescentes en dessous. Les épares des jambes sont fauves.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont le sommet brun avec la côte et la petite bande transverse d'un pourpre noir.

Patrie inconnue. - British Museum.

### 64. S.? LONGIPES.

Teinotarsina Longinia, Feld. Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 75, 2. — Sitz. Akadem. Wissen. XLIII, 26.

Cette espèce devra nécessairement former un genre propre en raison de ses pattes postérieures d'une longueur tout à fait insilite. Nous ne l'avons jamais vue, et notre description est faite d'après la figure qu'en a donnée M. Felder.

Elle a près de 3 centimètres d'envergure. La tête est noire, avec les palpes d'un jaune orangé. Le thorax est noir, avec les épaulettes largement d'un jaune orangé. L'abdomen est d'un jaune orangé, avec six taches dorsales noires, transversales.

Les pattes postérieures d'une longueur démesurée sont d'un fauve orangé, avec les jambes un peu velues, trois fois plus longues que la cuisse. Les tarses sont très-longs, un peu noirêtes à leur extrémité.

Les ailes supérieures sont transparentes, légèrement jaunâtres, avec l'extrémité un peu plus obscure, à reflet bleuâtre.

Les ailes inférieures sont transparentes.

La frange des quatre ailes est noirâtre.

Elle se trouve à Amboine, et fait partie de la collection de M. Felder.

### 65. S.? RUFICINCTA.

Eublepharis ruficincia, Feld. Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. 11, Abth. 2, pl. 75, f. 3.

Nous ne garantissons pas que cette espèce soit une véritable Sessis; si ses pattes postérieures étaient fasciculées nous n'hésiterions pas à la placer dans le genre Melittis.

Elle est d'un tiers plus grande que la Melittia Cucurbitæ de

La tête est brune, avec le collier orangé. Le corselet est pareillement brun, avec les épaulettes liserées de jaune orangé en dedans. L'abdomen est d'un fauve orangé, avec une suite de sept taches dorsales noires, transversales.

Les pattes sont d'un brun noirâtre.

Les ailes supérieures sont opaques, entièrement brunes, avec une petite ligne terminale orangée, placée tout près de la frange.

Les ailes inférieures sont diaphanes avec les nervures, un petit are sous-costal et une légère bordure noirâtres.

Décrite d'après l'ouvrage de M. Felder.

Nous ignorons sa patrie.

### 66. S. INSULARIS.

Pseudosetia insularis, Feld. Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 75, f. 3.

Elle a tout à fait le port de notre Scoliæ/ormis, et elle appartiont évidemment à notre genre Sesia.

La tête et les palpes sont noirs, avec les yeux liserés de blanc en arrière. Le corselet et l'abdomen sont noirs, avec les épaulettes légèrement bordées de blanc en decians.

Les ailes supérieures sont transparentes, avec les bords et l'extrémité noirs; la partie transparente de la base forme une tache longitudinale, cunéiforme, coupée par une nervure noire; à son extrémité il y a une bande transversale noire, suivie d'un espace transparent, coupé en cinq par les nervures.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures, un arc sous-costal et une légère bordure noirs.

Les pattes postérioures sont noires.

Décrito d'après la figure qu'en a donnée M. Felder.

Nous ignorous sa patrie.

### 67. S. CANDESCENS.

Trochilina candescens, Felder, Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 82, fig. 23.

Elle est au moins aussi grande que l'Asiliformis. Ses palpes sont jaunes. Le collier est rouge. Les épaulettes sont brunes, bordées de jaune en dedans. Le milieu du corselet est noir. Le cuisses et les jambes sont entrecoupées de jaune, avec les tans jaunâtres. L'abdomen est noir, avec cinq anneaux jaunes, dont celui de la base est un peu interrompu. La brosse anale est jaune, avec quelques poils noirs sur les côtés. Les antennes sont brunes et plus longues que dans nos espèces européennes.

Les ailes supérieures sont transparentes, lavées de rouge, avec les bords et les nervures noirâtres; outre cela, elles sont marquées de deux bandes transverses noires, dont une à l'extrémité de la cellule discoïdale, et l'autre vers le bord terminal.

Les ailes inférieures sont diaphanes, avec la bordure et les nervures noires.

Elle se trouve...

Cette espèce pourrait être placée dans le voisinage de la Sœliæformis.

68. S. SEMIRUFA.

Austrosetia semirufa, Felder, Novara, Exp. Zool. Theil. Bad. L. Abth. 2, pl. 82, f. 22.

Cette espèce forme évidemment uu genre propre. Mais comme M. Felder n'a pas encore publié le texte de ses belles figures, nous ne connaissons pas les caractères qu'il assigne à son genre Autrosetia.

Elle est de la taille de la Sphecijormis. Les palpes nous paraissent avoir le dernier article très-pointu. La tête est d'un rouge fauve, avec les yeux noirs. Les antennes sont un peubriquetées, assez fortes. Le corselet est d'un brun noir, avec les épaulettes bordées en dedans par une ligne blanchâtre. Les passes sont brunes, avec les tarses blanchâtres. L'abdomen est noir, avec deux anneaux blancs, l'un au commencement du sixième sement et l'autre sur le dernier. La brosse anale est noire.

Les ailes supérieures sont rougeatres, avec les nervures et à bordure noires; outre cela, la nervure médiane se dilate en a-

rivant à l'extrémité de la cellule discoldale, pour former une espèce de tache cunéiforme noire, allongée; il y a aussi, près de l'extrémité, une petite tache de la même couleur.

Les ailes inférieures sont entièrement d'un roux fauve, avec une bordure noire assez large.

Cette curieuse espèce n'a aucun rapport avec nos espèces européennes.

Elle habite...

N'ayant pas eu sous les yeux les sésies que nous venons de décrire d'après MM. Walker et Felder, nous n'avons pas osé les intercaler parmi nos espèces européennes, dans la crainte de ne pas leur assigner leur véritable place.

Nous avons pensé qu'il était préférable de laisser aux entomologistes qui pourront les recevoir un jour, le soin de les grouper d'une manière naturelle.

A la suite de ses *Egeria* (Sesia nobis), M. Walker décrit plusieurs genres nouveaux appartenant à la même famille, dont nous ne possédons en France aucun des types. C'est sous la propre responsabilité de ce savant distingué que nous allons en parler.

#### GENRE TARSA. Walker.

Corps robuste. Trompe longue. Palpes forts, arqués, ascendants; leurs deux premiers articles poilus en dessous; le troisième lancéolé, moitié de la longueur du second. Antennes robustes, largement pectinées, un peu plus longues que le corselet. Pinceau anal allongé. Pattes robustes, un peu velues. Ailes transparentes; les supérieures étroites; les inférieures assez larges.

#### T. BOMBYCIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 61, 1.

Elle a 46 lignes ang'aises, et elle est de couleur noire. La partio postérieure de la tête est garnie de poils ferrugineux. Les palpes sont ferrugineux, avec quelques poils jaunes à leur base. Les antennes sont de cette dermère couleur. Le collier est ferrugineux. Le corselet est en grande partie testacé, avec une bande à sa partie antérieure et deux lignes d'un roux ferrugineux.

L'abdomen a les anneaux bordés de jaune testacé. Le petit pisceau anal est jaune. Les pattes sont également jaunes avec les cuisses presque entièrement noires.

Les ailes sont transparentes, avec la frange d'un pourpre neir; les supérieures ont la côte, la bordure et la petite hande tranverse d'un pourpre noir.

Patrie inconnue. - British Museum.

### GENRE SINCARA. Walker.

Corps assez robuste. Tête large. Trompe courte, rudimentaire. Palpes ascendants, garnis en dessous de longs poils serrés; leur troisième article court et conique. Antennes simples, filiformes, assez fortes, éloignées à leur base, de la longueur du corselet. Abdomen fusiforme, à peine plus long que le corselet, rétréci à sa base, un peu fasciculé à son extrémité. Pattes assez longues et assez fortes. Jambes antérieures fasciculées. Ailes étroites.

### S. EUMENIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 62, 1.

Elle a 14 lignes anglaises, et est d'un ferrugineux obscur, avec un léger duvet blanc sur sa partie antérieure. La tête est noirâtre. Les palpes sont garnis en dessous de poils serrés d'une couleur testacée. Les antennes sont d'un bleu noir. L'abdomen est roussâtre, avec le premier segment d'un brun noir, et le ventre blanchâtre.

Les pattes sont noirâtres, rayées de jaune testacé, avec les éperons blancs.

Les ailes supérieures sont légèrement brunâtres, demi transparentes.

Les ailes inférieures sont diaphanes.

Trouvée au Para par M. Bates. — British Museum.

### GENRE ALONINA. Walker.

Corps assez grêle. Trompe de longueur moyenne. Palpes robustes, ascendants, assez longs; leur premier et leur second article poilus en dessous; leur troisième article lancéolé, moitié plus court que le second. Antennes fortes, légèrement pectinées, à peine plus grosses au sommet, beaucoup plus longues que le corselet. Abdomen un peu cylindrique, beaucoup plus long que le corselet, un peu fasciculé à son extrémité. Pattes robustes. Jambes postérieures velues. Ailes assez étroites.

# A. RYGCHIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 63, 1.

Elle a 13 lignes anglaises et elle est ferrugineuse. Les palpes sont fanves. Les antennes sont roussâtres. Les pattes sont roussâtres avec les hanches et les cuisses noires. Les jambes postérieures sont noires avec un trait roussâtre à la base. Le petit pinceau anal est fauve en grande partie.

Les ailes sont transparentes, un peu ternes; les supérieures ent la côte roussâtre, le sommet un peu purpurescent ainsi que la petite bande transverse qui est, en outre, hordée de roux en dehors.

Port-Natal. - British Museum.

#### GENRE SAUNINA. Walker.

Corps assez robuste. Trompe à peine visible. Palpes grêles, arqués, acuminés, un peu obliquement ascendants; leur troisième article très-grêle, pas moitié plus court que le second. Antennes simples, filiformes, assez grêles, pointues au sommet, à peine moitié plus longues que le corselet. Pattes grêles. Jambes postérieures longues, fortes, velues. Ailes étroites, opaques; les inférieures diaphanes à leur base.

#### 1. S. UROCERIPENNIS. Boisd.

S. l'roceriformis, Walker, Heterocera, p. 64, 1.

E.le a 14 lignes anglaises et elle est d'un bleu noir. La tête est ferrugineuse en arrière. Les palpes sont d'un ferrugineux obscur

Lépidoptères. Tome 1.

vers leur sommet. Le corselet est un peu ferrugineux. L'abdomen offre sur le quatrième segment une large bande orangés.

Ailes d'un vert métallique, à reflets bleus et pourpres, avec la frange cuivreuse; les inférieures vitrées à la base.

Les individus que M. Walker regarde comme pouvant être des femelles, ont la tête et les palpes noirs, les antennes blanchâtres à leur base et les ailes inférieures transparentes avec la base d'un noir bleu.

Etats-Unis. - British Museum.

Nous possédions autrefois cette espèce de Sésiaire, que neus avions reçue de feu John Leconte; mais elle a été anéantie avec les autres.

Nous avons un peu modifié-le nom d'*Uroceriformis*, donné à cet insecte par M. Valker, pour éviter toute confusion, attendu qu'il y a déjà une Sésie européenne qui porte le même nom d'*Uroceriformis*.

### 2. S. CAMBODGIALIS.

Walker, Heterocera, Suppl. p. 15.

Elle est grande, elle a 18 lignes anglaises et elle est d'un noir pourpre. La tête est marquée en avant de deux lignes argentées. Les palpes sont jaunes en dessous. Le corselet est marqué, de chaque côté, d'une tache d'un jaune doré, tirant sur le jaune d'ocre, précédée de quelques poils blancs. Le petit pinceau anal est jaunâtre en dessous. Les pattes ont les cuisses et les jambes frangées; les tarses antérieurs sont blancs, les postérieurs sont seulement variés de blanc.

Les ailes supérieures sont vertes, un peu nuancées de pourpre vers le sommet.

Les ailes inférieures sont vitrées avec le bord costal d'un bleu pourpre.

Elle se trouve au Cambodge et fait partie de la collection de M. Saunders.

Selon M. Walker, cette espèce est très-rapprochée de la Pulchripennis de Bornéo, mais chez cette dernière il n'y a pas de taches jaunes sur le corselet et les palpes ne sont pas jaunes en dessous.

### GENRE TOOSA Walker.

Corps assez robuste. Trompe assez longue. Palpes avancés, longs, robustes; leur troisième article long, conique, à peine plus court que le second. Antennes simples, presque filiformes, beaucoup plus longues que le corselet. Abdomen un peu linéaire, beaucoup plus long que le corselet. Pinceau anal très-petit. Pattes fortes. Ailes opaques de largeur moyenne.

### T. GLAUCOPIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 63, 1.

Elle a 14 lignes anglaises, et elle est noire avec quelques écailles d'un vert doré. L'abdomen offre, près de l'extrémité, une bande d'un jaune d'ocre. Les jambes postérieures sont d'un jaune d'ocre avec la base et le sommet noirs.

Les ailes inférieures sont bleues avec le bord costal pourpre. Pays des Amazoulous. — British Museum.

# GENRE SURA. Walker.

Corps assez grêle. Trompe rudimentaire. Palpes assez longs, ascendants; leur premier et leur second articles velus en dessous; le troisième article lancéolé, de moitié plus long que le second. Antennes simples, presque filiformes. Abdomen presque cylindrique, de moitié plus long que le corselet. Pattes pubescentes, assez fortes. Ailes opaques, assez étroites.

#### S. XYLOCOPIFORMIS.

Walker, Heterocera, p. 65, 1.

Elle à 14 lignes anglaises et elle est d'un bleu-verdâtre foncé. Les palpes et les antennes sont noirs. L'abdomen a les segments de couleur pourpre. Les jambes ont les éperons blanchâtres. Les ailes sont de la couleur du corps; les inférieures ont une tache transparente près de leur base.

Port Natal. - British Museum.

GENRE MELITTIA. Walker. — Trochilium. Westwood. — Sphinx. Drury. Cramer. — Poderis. Boisd. M.

Ce genre a presque tous les caractères des Seria. Les antennes sont plus courtes, plus fortement en massue à l'extrémité. Les palpes sont plus velus, un peu plus court, avec le dernier article lancéolé, à peine moitié plus court que le second. La trompe est un peu plus courte. Les pattes postérieures sont beaucoup plus longues que le corps, garnies de longs poils fasciculés, très-serrés, qui remplacent les éperons. Le pinceau anal est souvent peu développé et presque nul.

Les Melittia sont reconnaissables au premier comparate à leurs longues pattes postérieures, garnies de longs poils, ce qui leur donne une certaine analogie avec quelques espèces de Glaucopides de notre genre Copæna, telles que Maja, Corynthia, etc., dont les pattes postérieures sont rémiformes. Elles sont propres à l'ancien et au nouveau continent. Leur vraie patrie paraît être l'Inde. Aucune espèce ne se trouve en Europe.

Ailes supérieures opaques.

# 1. M. ASHTAROTH.

Westwood, Orient. Cabinet, pl. 6, f. 5, p. 14. — Longra id. Walker, Heterocera, p. 71, 1.

Cette grande et splendide espèce a 44 millimètres d'envergure. Ses antennes sont d'un noir bleu, renflées à leur sommet comme chez les Zygènes. Les palpes et la tête sont noirs. Les yeux sont roussâtres. Le corselet est d'un pourpre cuivreux. L'abdomen si aussi d'une belle couleur cuivreuse. La brosse anale est noirête, peu développée.

Les ailes supérieures, relativement assez étroites, sont trèbrillantes, d'un vert-doré un peu cuivreux.

Les ailes inférieures sont bleuatres, à reflet légèrement purpurin, avec la hase plus obscure.

Les pattes postérieures sont garnies de longs poils noirs, serés

Nous avons reçu cette belle espèce de l'Inde, sans indication de localité, mais M. Westwood dit que l'exemplaire dont il donne la figure vient d'Assem, et que le British Museum en possède un individu de la même contrée.

M. Walker a créé pour cette espèce le genre Lenyra.

### 2. M. TIBIALIS.

Sph. Tibialis, Drury, Ins., II, pl. 28, fig. 5. — Zygoma tibialis, Fab. Ent. S. III, 1, p. 404, 62.

idem, Walker, Heterocera, p. 68, 5.

Envergure 30 à 32 millimètres. La tête est brune. Les yeux sont bruns avec une liture blanchêtre. Les antennes sont noires. Les palpes sont jaunêtres. La poitrine est jaunêtre ainsi que le ventre. Les pattes antérieures sont noirêtres; les pattes postérieures sont très-poilues, rouges sur leur côté externe, noires en dedans et en dessous, antrecoupées d'un peu de blanc. Le corselet est d'un brun verdêtre. L'abdomen est brunêtre, avec le pinceau anal de la même couleur, et peu saillant.

Les ailes supérieures sont d'un hrun uu peu verdâtre, sans ancune tache.

Les ailes inférieures sont transparentes avec les nervures et la bordure d'un brun noirâtre.

Selon Drury elle se trouve à Sierra Leone. Feu le baron Feisthamel nous en a communiqué deux individus pris dans la Casamance.

#### 3. M. CUCURBITÆ.

Harris, Catal. descrip. — Trochilium Ceto, Westw. Orient. Cabin. pl. 30, f. 6, pl. 63. — M. Ceto, Walker, Heterocera, p. 66, 1.

Cette espèce américaine est confondue à tort par plusieurs entomologistes avec la précédente, dont elle a le port et la taille.

La tête est brune. Les yeux sont roussâtres avec une petite liture blanche. Les antennes sont noires. Les palpes sont entièrement d'un rouge un peu fauve. La poitrine est cendrée ainsi que le ventre. L'abdomen est d'un rouge un peu fauve en dessus, avec les incisions liserées de blanchâtre, et marquées d'un trait transversal noir. Le pinceau anal est peu prononcé. Les pattes antérieures sont noires, entrecoupées d'un peu de blanc. Les pattes postérieures sont très-poilues, d'un rouge un peu fauve sur

leur côté externe, mélangé de deux ou trois touffes de petit pois blancs; elles sont noires en dedans ainsi que les tarses.

Les ailes supérieures sont d'un bran verdâtre, avec une petite ligne médiane, longitudinale, transparente à leur base.

Les ailes inférieures sont transparentes avec les nervures, une lunule sous-costale et la bordure d'un noir foncé.

La chenille dont nous avons reçu d'Abbot un très-beau dessin, est blanchâtre, étiolée comme la plupart des espèces endophytes. Elle vit en Géorgie dans les tiges des Cucurbitacées.

Cette espèce ne doit pas être très-rare, car nous l'avons reçus trois ou quatre fois de l'Amérique du nord.

C'est d'après une fausse indication de M. Harrington que M. Westwood l'a figurée, à la vérité avec doute, comme se trouvant dans l'Inde, car il ajoute avec raison qu'il a vu au Bristish Museum un exemplaire semblable provenant des Etats-Unis d'Amérique.

4. M. PULCHRIPES.

Walker, Heterocera, p. 67, 3.

Elle a 2 centimètres 1/2. Elle est d'un vert doré.

La tête est blanche en arrière et autour des yeux.

Les palpes sont blancs en grande partie.

Le corselet est garni de poils blancs des deux côtés.

L'abdomen a deux raies rousses et le ventre jaune.

Les pattes sont noires, fasciées de blanc; les postérieures sont garnies, sur leur côté externe, de longs poils roux.

Les ailes supérieures sont d'un vert doré.

Les ailes inférieures sont transparentes.

Walker. — Le British Museum possède deux exemplaires de cette brillante espèce, l'un de Venezuela et l'autre du Para.

### 5. M. Andrænæpennis.

Walker, Heterocera, p. 69, 7. — Sesia Andranapennis, Boisd. M.

Nous avons décrit autrefois cette espèce sur la collection de M. Drège.

Elle est un peu plus petite que la Cucurbitæ, elle n'a guère que deux centimètres.

Ses ailes supérieures sont opaques, roussâtres, saupoudrées de brun noirâtre, avec le sommet et le bord terminal noirâtres. Les ailes inférieures sont transparentes.

Les antennes sont brunes, annelées de blanc.

Le corselet est testacé, pointillé de noir. L'abdomen est noir avec les segments bordés de gris blanchâtre.

Les pattes postérieures sont garnies, sur leur côté externe, de poils roussâtres.

Cette Melittia a été prise au cap de Bonne-Espérance par M. Drège, et fait aujourd'hui partie de la collection du British Museum.

### 6. M. SATYRINIFORMIS.

Züt. 453, 454.

dont elle a le port. La tête est brune ainsi que les antennes. Les yeux sont d'un brun roussâtre. Les palpes sont fauves. La poitrine est noire. Les cuisses et la partie supérieure des jambes sont fauves extérieurement, marquées de quelques points blancs, avec les tarses noirâtres, un peu entrecoupés de poils blancs. Les pattes postérieures sont frangées en dehors de poils fauves, et en dedans de poils noirs. Le corselet est brun, un peu luisant. L'abdomen est noir avec les articulations liserées de blanchâtre. Les côtés du corps sont un peu roussâtres en dessous. Le pinceau anal est presque nul.

Les ailes supérieures sont entièrement brunes, marquées vers la base d'une petite raie médiane, longitudinale, transparente.

Les ailes inférieures sont transparentes comme chez la Cucurbitæ, avec les nervures et la frange d'un brun noirâtre.

Nous l'avons reçue de la Géorgie d'Amérique.

Elle est très-voisine de la Cucurbitæ.

# 7. M. RUTILIPES.

Walker, Heterocera, p. 67, 5.

Elle a 17 lignes anglaises et elle est d'un pourpre noir. La tête est ferrugineuse. Les palpes sont ochracés, pointillés de noir. Les antennes sont noires en dessus et d'un roux ferrugineux en dessous. Le corselet offre, de chaque côté, une tache d'un jaune d'ocre. Les segments abdominaux sont bordés de jaune. Les pattes sont variées de jaune; les postérieures sont amplement garnies de poils fasciculés.

Les ailes supérieures sont opaques, d'un jaunâtre doré avec la base et la côte d'un pourpre noir.

Les ailes inférieures sont transparentes, teintées de januaire.

Elle se trouve à Batchian. — Collect. de M. Saunders.

Selon M. Walker, cette *Melittia* se rapproche de l'*Ambeinensii* de Felder, mais elle en est bien distincte par la couleur de ses premières ailes. Au reste, nous ne la connaissons pas; il en est de même de la *Fasciata* de Bornéo.

### 8. M. Mysolica.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 18.

Elle a 14 lignes anglaises et elle est d'un pourpre noir. La tête a les orbites d'un blanc argentin. Les antennes sont filiformes, roussâtres en dessous. La poitrine est d'un gris argenté. L'abdomen est long, lancéolé, avec des écailles d'un jaune doré. Les jambes postérieures sont garnies d'une large frange de pois.

Les ailes supérieures sont d'un pourpre noir.

Les ailes inférieures sont d'un jaunâtre hyalin, avec les nervures noires et la frange pourpre.

Elle se trouve à Mysol et fait partie de la collection de M. Sanders.

### 9. M. ASTARTE.

Trochilium Astarte, Westwood, Orient. Cabin. pl. 30, f. 4, p. 61. Walker, Heterocera, p. 70, 10.

Elle a tout-à-fait le port et la taille des trois espèces précédentes. La tête et le collier sont d'un rouge-fauve orangé. Palpes? Les antennes sont noires. Les pattes antérieures sont fauves, entrecoupées de noir. Les pattes postérieures sont trèvelues, d'un fauve orangé en dehors, mélangé de quelques petites touffes de poils blancs, et d'un noir foncé en dedans. Le corselet est d'un vert bronzé. L'abdomen est également d'un vert bronzé, avec un anneau d'un fauve orangé, sur le second segment. Le pinceau anal est peu saillant, d'un rouge fauve.

Les ailes supérieures sont d'un vert-bronzé obseur, sans taches, avec la frange d'un fauve orangé.

Les ailes inférieures sont transparentes avec les nervures et la frange d'un fauve orangé.

Elle se trouve dans l'Inde centrale.

Nous n'avons jamais vu cette espèce : notre description est faite sur la figure qu'en a donnée M. Westwood, in The Cahinet of oriental Entomology.

Ailes supérieures vitrées.

### 10. M. BOMBYLIPENNIS. Boisd.

Sph. Bombyliformis, Cram. 400, C.

Nous n'avons jamais vu cette belle espèce. Notre description est faite sur la figure qu'en a donnée Cramer. Elle a 45 millimètes. La tête est d'un fauve roussâtre. Les antennes sont noires avec le sommet roux. Les pattes antérieures sont d'un fauve ferrugineux. Les pattes postérieures sont très-velues, d'un fauve roux en dehors et noires en dedans. Tout le corselet est largement d'un fauve roux. L'abdomen est brun avec les incisions un peu fauves.

Les ailes supérieures sont brunes avec deux taches transparentes, dont l'une cunéiforme à la base, divisée par une nervure, et dont l'autre, arrondie, est partagée en trois rayons par deux nervures; outre cela, ces deux taches transparentes sont bordées de ferrugineux.

Les ailes inférieures sont transparentes avec les nervures et la bordure d'un brun noirâtre.

Le dessous du corps est blanc.

De la côte de Coromandel, selon Cramer.

### 11. M. PHORCUS.

Melittia Bombyliformis, Walker, Heterocera, p. 69, 8.

Trochilium Phoreus, Westwood, Orient. Cabinet, pl. 30, flg. 7, p. 62.

Cette espèce, à en juger par la figure qu'en a donnée M. West-wood, est très-voisine de la Bombylipennis, mais elle est d'un quart plus petite. La tête est d'un jaune un peu fauve avec les antennes noires. Le collier est d'un jaune fauve. Les pattes antérieures sont variées de fauve et de noir. Les pattes postérieures sont très-velues, d'un jaune fauve en dehors, d'un brun noir en dedans, ainsi que les tarses. Le corselet est d'un jaune fauve. L'abdomen est noir avec les incisions d'un jaune un peu fauve.

Les ailes supérieures sont noires avec deux taches transpa-

rentes, dont la première, cunéiforme, coupée en deux par une forte nervure, et dont la seconde, transversale, est divisée en cinq rayons par les nervures; outre cela, le bord interne est lavé de jaune.

Les ailes inférieures sont transparentes avec de fines nervures et la bordure noires; l'angle anal est d'un jaune fauve.

Nous n'avons pas vu cette espèce qui, selon le colonel Hearsey, habite l'Asie centrale.

M. Walker la regarde comme une variété de la Bombylipennis.

M. Lorquin nous a envoyé de Ternate un individu mutilé, appeu plus petit, qui est peut-être une variété locale de la Phoress de M. Westwood.

### 12. M. EURYTION.

Trochilium Eurytion, Westw. Orient. Cabinet, pl. 30, f. 5, p. 62. Walker, Heterocera, p. 70, 9.

Elle a environ 30 millimètres. La tête est brune avec les antennes noires. Le collier est d'un vert bronzé ainsi que le corselt. Les pattes antérieures sont noires, variées de gris plombé. Le pattes postérieures sont très-velues, d'un gris cendré, mélangé de poils noirs sur leur côté externe, et d'un brun noirâtre sur leur côté interne. L'abdomen est noir avec les incisions blanchâtres.

Les ailes supérieures sont noires avec deux taches transparentes, dont l'antérieure est divisée par les nervures en trois lignes parallèles, et la postérieure, un peu transverse, est coupée en quatre rayons.

Les ailes inférieures sont transparentes avec de fines nervures et la bordure noires; l'angle anal est d'un cendré argentin.

Elle se trouve à Sylhet, d'où elle a été envoyée au British Museum et à M. Harrington.

### 13. M. Bombiformis.

Desmopoda Bombiformis, Feld. Novara, Exped. Zool. Theil. Bad. Abth. 2, pl. 75, f. 5.

Elle est aussi grande que la Bombyliformis figurée par Cramet. La tête, les palpes et les antennes sont brunâtres. Le thorax est noir au milieu, avec les épaulettes brunes garnies en dedans d'un duvet jaunâtre.

L'abdomen est brun, avec une tache basilaire et toutes les indisons jaunes.

Les pattes postérieures sont extrêmement velues, garnies en dedans de poils très-denses, d'un fauve roux, et, en dehors, de poils jaunes. Les tarses sont également jaunes.

Les ailes supérieures sont noires, avec trois raies longitudinaies diaphanes, allant de la base jusqu'à la cellule discoïdale, sauf la costale, qui est plus grêle et plus courte; outre cela, elles offrent, entre la cellule et l'extrémité, une tache transparente coupée en six par les nervures,

Les ailes inférieures sont disphanes, avec la frange noirâtre. Décrite sur la figure donnée par M. Felder.

M. Felder l'a reçue de Bogota.

### 14. M. LAGOPUS. Boisd.

Elle est de la taille de la Sesia Ichneumoniformis. Les antennes sont noires, dentées dans les mâles. Les palpes sont blancs, ainsi que la poitrine. Le collier est garni de quelques poils blancs. Les pattes sont brunes, annelées de blanchâtre près des articulations. Les pattes postérieures sont fasciculées de poils noirs. Le corselet est brun. L'abdomen est noir, un peu luisant, avec le second segment liseré de blanc. La brosse anale est noire.

Les ailes supérieures sont noirâtres, avec deux taches transparentes, dont une longitudinale, allant de la base au-delà du milieu, est coupée en deux, par une nervure, et dont la seconde un peu arrondie, placée près de l'extrémité, est divisée en quatre par trois nervures.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervures, la frange et un petit arc sous-costal de couleur noire.

Elle a été prise à Cayenne, sur les bords de l'Oyapock.

## 15. M. Ursipes.

Walker, Heterocera, p. 68, 6. Poderis Hirtipes, Boisd. M.

Elle est de la taille des précédentes, de couleur roussatre. La tête est blanche en avant, avec les yeux entourés de blanchâtre. Les antennes sont fanves et les palpes blanchâtres en dessus. Le corselet est marqué de deux lignes blanches, avec le collier également blanc. L'abdomen est d'un noir un peu violacé, avec les anneaux liserés de blanc; le ventre est d'un gris blanchête.

Les pattes antérieures sont un peu ferrugineuses. Les pattes postérieures sont très-velues, couvertes de longs poils noirs et ferrugineux.

Les ailes sont transparentes, avec la bordure et les nervures roussatres.

Décrite sur deux individus que le général Feisthamel avait reçus de la Casamance. L'exemplaire décrit par M. Walker a été envoyé de Natal au British Museum.

### 16. M. CYANEIFERA.

Walker, Heterocera, p. 67, 4.

Nous ne connaissons pas cette espèce. Selon M. Walker elle est noire, avec les contours des yeux testacés. Les palpes sont testacés, avec le sommet noir. Les antennes sont ferrugineuses à l'extrémité. Le corselet et l'abdomen sont couverts d'un léger duvet roussatre. Le vontre est testacé. Les pattes antérieures sont testacées, pubescentes. Les pattes postérieures sont très-velues, garnies de longs poils serrés, noirs en dehors et ferrugineux en dedans.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont la bordure et la bande transverse d'un noir un peu violâtre.

Elle habite les environs de Rio-Janeiro. - British Museum.

### 17. M. PRODUCTALIS.

Walker, Heterocera, XXI, Suppl. p. 19.

Elle a 16 lignes anglaises; elle est d'un pourpre noir, grêle et un peu cylindrique. La tête est d'un blanc argentin en avant. Les antennes sont filiformes, un peu dentées en scie, avec une petite houppe soyeuse à l'extrémité. L'abdomen est garni en dessous de petits faisceaux de poils blancs. Les pattes sont longues, avec les jambes frangées de longs poils et les tarses antérieurs argentés.

Les ailes supérieures sont d'un bleu pourpre, avec une raie médiane vitrée, suivie en dehors d'une grande tache également vitrée.

Les ailes inférieures sont transparentes, avec la frange, les nervures et un trait transversal pourpres.

Elle se trouve à Célèbes, et fait partie de la collection de M. Sannders.

### 18. M. SIAMICA.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 18.

Elle a 14 lignes anglaises, et elle est d'un fauve doré. La poitrine et le dessous de la tête sont d'un blanc argentin. Les antennes sont fortes, un peu en massue, et roussâtres en dessous. L'abdomen est marqué, sur chaque segment, d'une petite bordure d'un blanc bleuâtre. Les pattes sont frangées, avec les poils melangés de jaune doré et de blanc argentin.

Les ailes sont vitrées, avec la frange pourpre; les supérieures sont marquées d'une petite bande transverse purpurescente, et, vers le sommet, de quelques points blancs.

Elle a été rapportée de Siam, et fait partie de la cellection de M. Saunders.

### 19. M. STRIGIPENNIS.

Walker, Heterocara, XXXI, Suppl. p. 47.

Elle a 10 lignes anglaises, et elle est d'un pourpre noir. La poitroine est d'un blanc argentin, ainsi que le contour des yeux. Les palpes sont striés de blanc argentin. Les antennes, un peu en massue, sont ferrugineuses en dessous. Le corselet est marqué, de chaque côté, d'une tache d'un brun jaunâtre. L'abdomen a les segments bordés de blanc argentin. Les pattes postérieures sont très-plumeuses, pointillées de blanc.

Les ailes supérieures sont d'un noir pourpre, avec une bandelette longitudinale, vitrée et interrompue.

Gilolo. — Collection de M. Saunders.

#### 20. M. CHRYSOGASTER.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 16.

Elle est très-grande, elle a 18 lignes anglaises; sa couleur est d'un pourpre noir. Les palpes sont marqués de deux lignes blanches. Les antennes sont d'un roux ferrugineux en dessous. Le corselet offre, de chaque côté, une tache d'un blanc d'argent. L'abdomen est d'un jaune ochracé en dessus, et d'un jaune d'œ en dessous. Le dessous des tarses est d'un jaune pâle.

Les ailes sont d'un jaune ochracé à la base; les supérieurs sont d'un pourpre noir, avec une bandelette vitrée interrompus. Les inférieures sont transparentes.

Elle se trouve à Célèbes. — Collection de M. Saunders.

### 21. M. STAUDINGERI. Boisd.

Elle a de 28 à 30 millimètres. La tête est brune. Les yeux sont d'un brun roux. Les antennes sont d'un brun roussâtre. Les papes sont jaunâtres en dessous, noirâtres au sommet et en dessus. La poitrine est garnie de quelques poils jaunâtres. Les pattes antérieures sont velues, roussâtres. Les pattes postérieures sont d'un noir roussâtre, très-poilues avec une crête de poils jaunâtres à la base de leur côté externe. Le corselet est d'un roux brunâtre. L'abdomen est brun, avec les incisions un peu blanchâtres. Le pinceau anal est peu développé.

Les ailes supérieures sont transparentes avec les bords, le sommet et les nervures noirs. L'espace longitudinal antérieur est coupé en deux par une nervure; l'espace postérieur, qui est assez grand, est divisé en cinq rayons.

Les ailes inférieures sont transparentes avec de fines nervues et la frange noires; l'angle anal est pourvu d'une longue frange noire.

Nous avons obtenu cette espèce de feu Becker qui nous l'a donnée comme venant de Sylhet. Nous l'avons dédiée à M. Staudinger (1).

(1) M. Otto Staudinger, docteur en philosophie à Dresde, est un de nos Lépidoptéristes distingués. Il a fait des excursions entomologiques en Norwège, en Islande, en Espagne, en Sardaigne, etc. Il a publié, principalement dans la Gazette entomologique de Stettin, divers mémoires, ainsi que la relation de ses voyages. A l'exemple du savant Laspeyres, il s'est occupé spécialement des Sésies. Le premier ouvrage qu'il a publié à ce sujet, a pour titre « De Sesiis agri Berolinensis, dissertatio entomologica » brochure de 65 pages, ornée de deux planches. Ce travail fort estimé n'était que le prélude de sou « Beitraege zur Feststellung der bisher bekannten Sesien-arten Europa's und des Angrensenden Asien's » qui comprend la classification des Sésies propres à l'Europe et à l'Asie-Mineure avec la description des espèces nouvelles et une sage critique sur la synonymie.

### 22. M. FLAVITIBIA.

Walker, Heterocera, p. 67, 2. — Trochilium Tibiale, Harris, Am. Janra. Sc. 36.

Nous ne connaissons pas cette espèce dont nous donnons la description d'après Harris. Elle est d'une couleur brunâtre. Elle a les yeux bordés de jaune. Les antennes sont noires. Le corselet est marqué de deux raies jaunes. Les anneaux de l'abdomen sont bordés de jaune. Les pattes sont jaunes; les postérieures sont garnies de poils serrés de la même couleur.

Les ailes sont transparentes; les supérieures ont la bordure et une bande courte d'un brun pâle.

Harris. - New Hampshire.

Nous supposons avec M. Walker, que cette espèce, que nous m'avons vue ni l'un ni l'autre, appartient probablement au genre **Melittia**, sans pouvoir l'affirmer d'une manière positive.



# TRIBU DES STYGIDES.

Antennes bipectinées dans les mâles et quelquesois dans les deux sexes. Palpes cylindriques, très-velus, dépassant le chaperon. Pattes pourvues d'ergots. Abdomen assez allongé, conique dans les semelles. Trompe très-courte. Ailes sans taches diaphanes. Vol diurne.

GENRE STYGIA. Latreille.— Draparn.— Boisd.— Treitschke.—
Dup., etc. — Chimæra. Ochs.

Chenilles: Etiolées vivant à la manière des Sésies et des Hépiales dans l'intérieur des végétaux.

Insecte parfait robuste: Antennes bipectinées dans les deux sexes. Palpes cylindriques, obtus, entièrement garnis d'écailles et dépassant un peu le chaperon. Trompe trèscourte, presque nulle. Tête et corselet couverts de poils squammeux. Abdomen allongé, gros, velu, garni de crêtes sur les côtés et sur le dos, terminé par un bouquet de poils

melles par un oviducte saillant. Ailes en toit dans le repus; les supérieures assez courtes; les inférieures arrondies.

Les Atychia sont peu nombreuses; chez la plupart des espèces, les ailes supérieures des mâles sont à peu près semblables. Elles volent au soleil sur les fleurs comme les Sésies.

Les premiers états de ces petits Lépidoptères nous sont inconnus, mais il y a lieu de croire que leurs chenilles vivent dans l'intérieur des végétaux.

Nota. Ce genre pourrait très-bien devenir le type d'une petite tribu particulière.

# 1. A. APPENDICULATA. Latreille.

Chimera Appendiculata, Ochs. Schmet. von Europ. 3, p. 4, 1.—Boisd. Icones, pl. 56, f. 5, 6. — Sph. Appendiculata, Esp. Schm. 3, Cont. X, f. 5, 6. — Sph. Chimera, Hubn. Sph. f. 1. — Noctus Chimera, Hubn. Noct. f. 314-315. — Pyralis Vahliana, Fab. Ent. S. III, 2, p. 35, 10. — Noctus lines, Borkh. Schm. IV, p. 70, 26.

Elle est d'un quart plus petite que la Procris injusta. Se ailes supérieures sont d'un vert jaunâtre, avec une raie médiant, longitudinale, d'un blanc un peu jaunâtre, s'étendant depuis le base jusqu'au-delà du milieu. La frange est un peu plus pâle é entremèlée de quelques poils blancs.

Les ailes inférieures sont noires, avec la frange blanche et un tache discoïdale transverse de la même couleur.

Le dessous des quatre ailes est noir, avec la frange et les contours blancs, ainsi qu'une tache de la même couleur sur le de que de chacune.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures. L'abdons est noirâtre un peu luisant, avec les incisions jaunâtres.

Les antennes sont brunâtres, garnies çà et là de quelque écailles verdâtres. Les palpes sont garnis de poils d'un jame verdâtre.

La semelle est plus petite que le mâle et entièrement noire part et d'autre.

Cette espèce est la plus commune du genre. On la trouve de Hongrie, en Autriche et en Italie.

### 2. A. Pumila.

Duponch. Suppl. — Chimara Pumila, Ochs. Schm. von Europ. III, p. 3, 1. — Boisd. Icones, pl. 56, fig. 7, 8. — Noctua Chimara, Hubn. Noct. 1. 405.

Elle a tout à fait le port et la taille de l'Appendiculata. Les ailes supérieures du mâle sont presque de la même couleur : tantêt elles ont une petite raie longitudinale, médiane, jaunâtre, peu marquée, et deux points de la même couleur formant une espèce de bande transverse, et tantôt elle ont quatre points jaunâtres, mal écrits, formant deux bandes transverses.

Les ailes inférieures sont noires avec la frange blanche, et une bande transverse presque basilaire de la même couleur, plus étroite que dans *Appendiculata*, paraissant quelquefois formée de deux taches contigués.

Le dessous des quatre ailes est noirâtre, dans les deux sexes, avec la frange blanche et une bande transverse de la même couleur, interrompue sur les inférieures, et surmontée, près du sommet des supérieures, d'un point blanc.

Le corselet, l'abdomen et les pattes sont à peu près comme chez l'Appendiculata.

La femelle est un peu plus petite que le mâle. Ses ailes sont d'un brun noirâtre. Les snpérieures sont marquées de deux petites bandes blanches, transverses, dont l'externe est interrompue. Les inférieures sont à peu près comme dans le mâle. Le corselet est noirâtre, mélangé de poils écailleux jaunâtres.

Elle habite la Hongrie. On la trouve aussi quelquefois aux environs de Montpellier. Elle est plus rare que la précédente.

### 3. A. RADIATA.

Chimera Radiata, Ochs. Schmett. von Europ. III, p. 5, 3.

Nous ne connaissons pas cette espèce qu'Ochsenheimer a décrite d'après un exemplaire unique, faisant partie de la collection de l'abbé Mazzola.

Elle a tout à fait le port et la taille de l'Appendiculata et de la Pumila. Les palpes sont blancs ainsi que la poitrine et le ventre. Le corselet est d'un gris verdâtre. L'abdomen est brun avec les articulations jaunes et l'extrémité anale noire.

Les ailes supérieures sont d'un gris verdâtre, avec une nis obscure, médiane, qui s'étend jusqu'au milieu de leur surface; le bord extérieur offre quelques petites taches blanches.

Les ailes inférieures sont noires avec deux rayons james, allant de la base jusqu'à la frange qui est également jame.

Le dessous des premières ailes est jaunâtre, pointillé de noir.

Le dessous des secondes ailes est jaune avec une large bordun noire.

Cette description est extraite de l'ouvrage d'Ochsenheimer.

Cette Atychie a été prise dans les environs de Vienne en Artriche. Nous ne savons pas si elle a été retrouvée depuis par quelque entomologiste.

### 4. A. ORBONATA.

Freyer, tab. 351, f. 4, p. 108.

Elle a le port et la taille de l'Appendiculata. Les ailes suprieures sont d'un gris jaunâtre, à reflet un peu doré, avec la die et le bord interne fortement saupoudrés de noirâtre, et la frage d'un blanc pur; outre cela, elles ont une raie médiane, longindinale, allant de la base au-delà du milieu.

Les ailes inférieures sont blanches avec une bordure noire asset large, et la frange entièrement blanche; la base et le bord dominal sont noirâtres.

Le dessous des ailes supérieures est blanc avec la base et sommet noirs; la frange est blanche.

Le dessous des ailes inférieures est blanc ainsi que la françe, avec la base et la bordure noirâtres.

Les palpes et les pattes sont d'un blanc grisâtre. Le ventre d'un gris-noirâtre luisant.

Le corselet est brun, garni de poils jaunâtres. L'abdomen d'un noir luisant, avec les articulations d'un blanc argentis.

Cette espèce, dont nous avons reçu deux mâles, a été décoverte par Kinderman fils, aux environs de Sarepta. Nous ne maissons pas la femelle qui sans doute diffère beaucoup du mile.

### 5. A. CONFINIS. Eversmann. M.

Nous avons reçu de feu Eversmann un très-bel individumit, de cette espèce qui pourrait bien n'être qu'une simple varie de l'Orbonata. Elle est un peu plus grande. Ses ailes supérieures sont un peu plus brillantes, un peu plus saupoudrées de noirâtre sur leur bord interne. Leur frange est blanche.

Les ailes inférieures sont entièrement d'un blanc pur, sans la moindre trace de bordure; elles ont, comme dans l'espèce précédente, la base et le bord abdominal noirâtres.

Le dessous des premières ailes est blanc, avec la base noirâtre. Le dessous des secondes ailes est semblable au dessus.

Le corselet et l'abdomen sont à peu près comme dans l'Orbonata. Les palpes et les pattes sont presque noirâtres.

Elle se trouve dans le gouvernement de Saratow.

Nous ne connaissons pas la femelle.

### 6. A. MINUTULA.

Erschoff, Lépid. de la Perse, pl. 6, fig. 105.

Elle est un peu plus petito que l'Appendiculata, avec les ailes plus allongées. Les quatre ailes sont d'un brun noirâtre; les supérieures ont sur le milieu une bande longitudinale, cunéiforme, d'un blanc un peu jaunâtre; les inférieures ont une bande transversale médiane de la même couleur, coupée par de fines nervures. Outre cela, les quatre ailes ont la frange ciliée de blanc.

Elle a été prise dans la vallée de Sarafschan sur les bords du

Nous n'avons jamais vu cette espèce que M. Erschoff a décrite et figurée d'après un individu unique, sans antennes.

# 7. A. FULGURITA.

Fischer, Lepid. rarior. rossiæ, Observ. quinque, pl. 21, f. 5, p. 360.

Elle a le port de l'Appendiculata; ses alles supérieures sont d'un blanc grisâtre, à reflet jaunâte; elle sont traversées, un peu an-delà du milieu, par une petite bande noirâtre, coudée en angle sigu; la bordure est brunâtre, assez large, avec les cils blancs.

Les ailes inférieures sont blanchâtres, avec la bordure noirâtre ta françe blanche.

Les antennes sont grises, assez harbues, avec le sommet brumâtre. Les palpes sont bruns. La tête est noire. Le corselet est également noir, avec les côtés et la partie postérieure garnis d'un davet d'un gris jaunâtre. ų.

L'abdomen est noir, annelé de gris jaunâtre.

Nous n'avons jamais vu cette espèce, qui n'a encore été trouvée que dans le désert des Kirghises.

### 8. A. NANA.

Treitsch. 10, Bd. 1, Abth. p. 97. — Freyer, tab. 351, fig. 2.— Necim Pumila, Hubn. Noct. fig. 678-679.

La Pumila de Hubner n'est pas la même que celle décrite sous le même nom par Ochsenheimer et figurée dans notre lesses. Cette Pumila est, selon M. Freyer, le mâle de l'espèce que Treischke a fait connaître sous le nom de Nana. Quant à nous, nous ne l'avons jamais vue en nature.

Elle est un peu plus petite que l'Appendiculata. Les ailes supérieures sont bronzées, saupoudrées de brunâtre, principalement vers la base, avec une bordure d'un brun noir.

Les ailes inférieures sont d'un brun noir, avec une petite frange plus claire et une strie allongée, jaunâtre, entre la base et le bord abdominal

Les antennes sont brunâtres. Les palpes sont très-noirs an sommet. Le corselet est d'un brun terreux. L'abdomen est un peu plus obscur, avec les incisions grisâtres.

La femelle est plus obscure et plus noirâtre que le mâle.

Dans le mûle figuré par Hubner, les ailes inférieures sont noires avec deux petites taches allongées, blanchâtres, situés près de la base.

Le dessous des secondes ailes est marqué d'une petite bande blanche discoïdale.

Le dessous des premières ailes est d'un brun noirâtre, avec le bord interne blanchâtre.

Cette espèce a été découverte en Sicile par Dahl. Kindermann l'a trouvée depuis, aux environs de Raguse. Elle est toujours for rare.

### 9. A. FUNEBRIS.

Chimæra Funebris, Feisthamel, Ann. de la Soc. Ent. de France, 1833, pl. 9, fig. D, p. 259. — Boisd. Icones, pl. 56, f. 4, p. 86.

L'individu décrit par Feisthamel et par nous est un peu plus grand que la femelle de *Pumila*.

Les ailes supérieures sont d'un brun noir, mélangé de quel-

ques poils jaunâtres clair-semés. A leur base elles sont marquées d'un point blanchâtre, obsolète, et au-delà du milieu, de deux petites raies blanchâtres, transverses, interrompues, formées chacune de deux points peu apparents.

Les ailes inférieures sont d'un noir brun, avec une petite tache en éclaircie blanchâtre, sur le milieu, près du bord abdominal. La frange des quatre ailes est d'un brun plus pàle que le fond.

Le corselet est noirâtre. L'abdomen est de cette dernière couleur, avec les incisions blanchâtres. Les antennes sont noires.

Le dessous des quatre ailes est brun. Les palpes sont blanchâtres, avec l'extrémité du dernier article noirâtre. Le ventre est arisâtre.

On ne connaît que la femelle. — Coll. Bd.

Feisthamel avait reçu cette espèce de Barcelone. M. Daube a peis, aux environs de Montpellier, un autre exemplaire femelle.

## 10. A. PUSILLA. Boisd.

Atychia Punebris? Duponch. Suppl. pl. 8, f. 3.

Elle est de moltié plus petite que l'espèce précédente avec laquelle elle a quelques rapports.

Ses ailes supérieures sont d'un brun noirâtre, traversées par deux petites raies blanches, bien nettes, dont l'une au milieu, et l'autre entre celle-ci et l'extrémité. La bordure est un peu rous-altre.

Les ailes inférieures sont d'un brun noirâtre, avec la frange tachetée de blanc sur le bord externe.

Le dessous des ailes est d'un gris-brunâtre luisant. Les pattes antérieures sont d'un gris blanchâtre; les autres sont noirâtres ainsi que les antennes. Le ventre est brun.

Le corselet est de la couleur des premières ailes. L'abdomen est brun avec les incisions bordées de blanchâtre, principalement sur les côtés.

Décrite sur une femelle.

Cette petite Atychie a été prise en Andalousie par Lorquin, qui n'a trouvé qu'un seul exemplaire.

Coll. Bd.

Nota. L'Atychia Funebris, figurée et décrite par Duponchel, et prise par lui aux environs d'Aix, nous paraît être la même que sotre Pueilla.

# TRIBU DES THYRIDES.

Chenilles: Vermiformes, assez épaisses, d'une couleur pâle, étiolée, garnie de petits tubercules plus colorés, pourvus chacun d'un petit poil. Chrysalides courtes, coniques, un peu renslées au milieu, avec de petites aspérités peu saillantes sur le bord des anneaux.

Insecte parfait: Palpes s'élevant au-delà du chaperon, cylindrico-coniques, velus avec le dernier article presque nu et terminé en pointe. Antennes fusiformes, presque sétacées, un peu renslées au milieu, principalement dans les mâles. Abdomen conique. Jambes postérieures minies d'ergots assez développés. Ailes concolores, horizontales, courtes, denticulées.

Les insectes appartenant à cette tribu sont peu nombreux. A l'état de chenilles, ils vivent comme les Sesis dans l'intérieur des végétaux.

Les Thyrides volent à l'ardeur du soleil, sur les fleurs, comme des mouches.

GENRE THYRIS. Illiger, - Latreille, etc.

Mêmes caractères que ceux de la tribu.

#### 1. T. FENESTRINA.

Ochsenh. Schm. von Europ. t. III, p. 115, 1. — God. Pap. de Fraec. t. III, pl. 22, fig. 1. — Sph. Fenestrina, Fab. Ent. S. III, 1, p. 387, 8. — Esp. Schm. II, tab. 23, Suppl. V, f. 1. — Sph. Pyralidiforms, Hubs. Sphing. f. 16.

Ce petit Lépidoptère est fort connu des Entomologistes et fait partie des plus modestes collections.

Le corps est brun, lavé de roussatre. L'abdomen a le quatrième et le dernier anneau liserés de blanc en dessus et entièrement blanc en dessous. Les antennes sont noiratres. Les pattes

sont brunes avec le côté interne des cuisses antérieures, les ergots et les tarses blanchâtres.

Les quatre ailes sont, de part et d'autre, d'un noir brun, ponctuées et striées transversalement de fauve-ferrugineux doré; elles sont marquées chacune de deux taches centrales blanches, demitransparentes, un peu plus grandes et plus rapprochées sur les ailes inférieures que sur les supérieures.

Les premières ailes sont un peu denticulées, mais elles le paraissent davantage, parce que la frange noire est entrecoupée de blanc en deux endroits.

Les secondes sont dentelées avec la frange entrecoupée de moir et de blanc.

'La semelle diffère du mâle en ce qu'elle est un peu plus grande, plus brillante avec les anneaux blancs de l'abdomen plus ou moins effacés.

Les exemplaires de l'Espagne et de l'Italie sont généralement d'un tou plus noir que ceux que nous trouvons en France.

La chenille, que nous avons trouvée plusieurs fois en Normandie, est d'un blanc livide, avec deux lignes latérales de petits points noirs. La tête, les pattes écailleuses et la plaque du premier anneau sont d'un noir brun.

La Thyris Fenestrina se trouve en juin dans une grande partie de l'Europe, particulièrement sur les fleurs en ombelles.

Nous avons reçu de seu notre ami John Leconte, deux exemplaires, comme ayant été pris dans l'Amérique septentrionale, qui ne nous paraissent différer en rien de ceux que l'on trouve en France.

# 2. T. VITRINA.

Walker Heterocera, p. 72, 2.

Boisd. Monograph. des Zygénides, pl. 1, f. 5, p. 19. — Icones, pl. 48, f. 1.

Elle est presque d'un tiers plus grande que la Fenestrina.

La tête et le corselet sont brunâtres. L'abdomen est d'un rouge rutilant en dessus et grisâtre en desous. Les pattes et les antennes sont brunes.

Les ailes supérieures sont d'un brun uniforme, avec deux taches rouges, situées vers l'extrémité, dont la plus inférieure est près de l'angle interne, et une tache centrale, très-étroite, d'un blanc transparent.

Les ailes inférieures sont brunes avec la base et le bord abdominal rouges, et une large tache presque carrée, d'un blanc transpagent, placée sur le milieu du disque.

Le dessous des premières ailes est d'un gris-violâtre luisant, avec la tache blanche du disque ocellée de noir.

Le dessous des secondes est aussi d'un gris violâtre avec les taches rouges du dessus dessinées en jaunâtre.

Cette Thyris nous a été donnée par Goudot, comme ayant été prise par lui dans le midi de l'Espagne.

Nous avons reçu de la Géorgie d'Amérique des individus parfaitement identiques.

La chenille, d'après un dessin d'Abbot, est d'un blanc-roussite éticlé, avec deux rangées de petits points noirs et une bande dorsale verdâtre, qui s'étend du cinquième anneau jusqu'an dixième. La tête, la plaque du premier segment et les pattes écailleuses sont d'un brun clair.

Selon Abbot, elle vit dans les tiges des haricots (*Phaseolus*), et quelquefois même entre les feuilles de cette plante.

Nota. Nous possédions deux autres espèces de Thyris voisines de celles que nous venons de décrire, l'une de Java et l'autre des Etat-Unis. Elles étaient dans une boîte laissée sur notre table de travail avec une vingtaine de Sésies de l'Amérique du nord de l'Afrique, lorsque l'explosion de la poudrière du Luxembourg, en lançant cette boîte au loin, l'a réduite en poussière avec tout son contenu.

#### 3. T. Lugubris.

Boisd. Spec. General. pl. 14, 10, B, fig. 11. — Walker, Heterocera, p. 74, 3. — Var. Th. Sepulchralis, Boisd. in Guérin, Règne animal, pl. 84, f. 1.

D'un tiers plus grande que la Fenestrina, elle est d'un noir profond. Les antennes sont noires. Les palpes sont blancs. Le pattes sont noires, avec les genoux blancs. Le collier est blanc. Le corselet offre une tache blanche sur chaque épaulette. L'abdomen est marqué sur le dos de deux taches blanches.

Les quatre ailes sont traversées au milieu par une bande blanche, interrompue, et formée de deux taches sur les supérieures; outre cela les premières ailes ont le long de la côte une rangée de points blancs; elles ont encore avant l'extrémité, une série commune de peints semblables, mais moins accentués sur les ailes inférieures. La frange des quatre ailes est entrecoupée de blanc.

Cette jolie *Thyris* habite les Etats-Unis, principalement la Caroline. Nous en avons reçu quatre exemplaires; il nous en reste encore deux.

Notre Thyrig Sepulchralis est une variété dont la bande blanche est un peu plus large et les points marginaux plus marqués.

# 4. T. MACULATA.

Harris, Catal. Descript. N. Amer. Sphing. 33. — Walker, Heterocera, p. 74, 5.

Nous ne connaissons pas cette espèce, M. Walker ne l'a jamais vue non plus. Notre description est une traduction de celle qu'en a donnée Harris.

Elle est d'un noir brunâtre avec des irrorations d'un jaune roussâtre; le bord des ailes est fortement échancré avec les denticulations liserées de blanc. Chacune des ailes est en outre marquée d'une tache blanche, transparente, qui, sur les premières ailes est presque ovale, un peu rétréci dans son milieu; la tache des secondes ailes est plus large, réniforme et presque partagée en deux.

En dessous les palpes sont blancs ainsi qu'une tache à la partie antérieure des cuisses; l'extrémité des articulations tarsiennes, et le bord de trois ou quatre segments abdominaux sont blanchâtres.

Massachusetts. — Harris.

# GENRE PACHYTHYRIS. Felder.

Quoique nous n'ayons aucun renseignement sur les premiers états des deux insectes qui font partie de ce petit genre, nous pensons que leur véritable place est à côté des Thyris.

Insecte parfait: Tête de grosseur moyenne. Yeux sailiants. Palpes velus, écailleux, ascendants, avec le dernier article pointu et assez long. Antennes assez longues, de grosseur moyenne, atténuées à leur sommet. Trompe preque aussi longue que le corps. Pattin sièzez longues; les postérieures (au moins dans le mâle) pourvues à l'extrémité de la jambe, d'une grosse brosse de poils serrés, du milieu de laquelle sort un ergot. Corps et corselet robustes. Ailes assez larges, sinuées, et un peu anguleuses comme les Thyris.

1. P. RAJAH. Boisd.

Elle est notablement plus grande et de beaucoup plus robuse que les Thyris.

Elle est entièrement d'un fauve-roux très-vif avec les quatre ailes traversées au milieu par une bande assez étroite, plus foncée que la teinte générale.

Les supérieures ont vers la base une seconde bande et quelques traits irréguliers de la même couleur; elle ont en outre, près de la côte, sur le côté externe de la bande médiane, un point blant transparent, et vers l'extrémité, des petites lignes ondulées, un peu ferrugineuses; indépendamment de ces caractères, on voit sur le bord de la côte quatre à cinq petites hachures blanches. Le bord terminal est sinué avec la frange un peu entrecoupée de blanchatre.

Les ailes inférieures ont le même dessin que les supérieures; elles sont marquées près de la côte de deux points d'un blanc transparent, placés l'un au-dessus de l'autre.

La tête a un reflet légèrement violâtre. Le corselet est de la couleur des ailes; mais l'abdomen est plus rougeâtre et sans taches.

Le dessous des ailes est d'une teinte obscure, avec le même dessin que sur la face opposée.

Décrite sur un très-hel exemplaire que Becker nous a donné comme venant de l'Inde centrale.

### 2. P. SICULOIDES.

Felder, Novara, Exped. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 75, f. 1.

Elle a tout-à-fait le port et la taille de la P. Rajah.

Les ailes supérieures sont d'une teinte ochracée grisâtre, traversées par trois bandes brunes, dont la plus accusée est placée un peu au-delà du milieu; outre cela, il y a, entre ces bandes, mais surtout à l'extrémité, des petites lignes ondulées brunâtres. Le bord terminal est sinué avec la frange un peu entrecoupée de blanchâtre.

Les ailes inférieures sont d'un roux vif, traversées par plusieurs raies ferrugineuses, irrégulières, ondulées, dont une plus indiquée au-delà du milieu.

La tête et le corselet sont d'un gris ochracé. L'abdomen est de cette dernière teinte, marqué de deux lignes dorsales parallèles, de couleur brunâtre.

Chez cette espèce, il n'y a pas de points blancs transparents. Décrite d'après une très-belle figure donnée par M. Felder.

La patrie n'est pas indiquée, mais on peut assurer à priori, qu'elle habite, comme sa congénère, quelque partie des Indes orientales.

# FAMILLE DES CASTNIDES

•

Cette famille, entièrement propre aux régions tropicales de l'Amérique et à l'Australie, est, sans contredit, l'une des plus intéressantes, elle constitue une création à part, sans analogues sur l'ancien continent.

Chenilles endophytes, armées de fortes mâchoires, vivant, à la manière des Sésiaires et des Zeuzérides, dans l'intérieur des végétaux, de couleur rougestre étiolée, ou blanchâtre, munies de petits tubercules portant chacun un petit poil très-court, peu apparent, et d'une plaque cornée écailleuse sur le premier et dernier segment.

Chrysalides: Cylindrico-coniques, garnies de petites épines sur le bord des anneaux.

Insecte parfait: Antennes en massue, amincies à la pointe et terminées par une petite houppe visible à la loupe. Palpes un peu divergents, de trois articles, montant à peine au milieu du front. Tête relativement petite, pourvue de deux stemmates. Ailes larges; les inférieures munies d'un frein.

# TRIBU DES CASTNIAIRES.

Mêmes caractères que ceux de la famille.

Cette tribu se compose seulement des genres Castnia, Ceretes, Orthia et Gazera.

100

### GENRE CASTNIE. Castnia.

Fab. Syst. Glossat. In Illiger, Magaz. — Latreille, Genera. — Godart, — Boisd. — G.-R. Gray, Trans. Ent. Soc. London, 1838, t. II. — Walker. — Papillo, Fabricius, Ent. Syst. — Pap. Cram. — Drury, — Herbst.

Les chenilles des Castnies vivent dans l'intérieur de diverses espèces de Bananiers (*Musa sapientium*, paradisiaca, etc.), dans les bulbes des Orchidées, dans les Broméliacées, dans les Cactus, etc., vers la racine ou dans les tiges.

Lorsqu'arrive l'époque de l'éclosion, la chrysalide se meut à l'aide des petites pointes qui garnissent le bord de ses anneaux, en avançant sa partie antérieure pour faciliter la sortie de l'insecte parfait.

Insecte parfait: Palpes divergents, de trois articles, écailleux, montant à peine au niveau du front; le dernier article petit et conique. Trompe moins longue que le corps. Antennes en massue, cylindriques, jamais ciliées, ou scabres, terminées par une très-petite houppe soyeuse. Pattes écailleuses, avec les jambes munies de deux ergots. Corselet robuste, écailleux. Abdomen conique, un peu plus court que les ailes inférieures. Ailes larges sans dentelures, recouvertes d'écailles grossières, beaucoup plus larges que dans aucun autre genre de Lépidoptères. Les inférieures munies d'un crin comme dans les Sphinx.

Les Castnies volent en plein jour à l'ardeur du soleil avec une grande rapidité; elles aiment à se reposer à plat sur la terre ou sur le tronc des arbres comme des Catocala. A certaines heures, elles butinent sur les fleurs comme les Sphingides.

Linné ne paraît pas avoir vu de Castnies. La *Licus* dont Séba et Mérian ont donné chacun une très-mauvaise figure est la première espèce connue.

Quelques auteurs se sont occupés spécialement de ce genre, Dalman a publié, en 1825, une excellente Monographie dans laquelle il mentionne dix-sept espèces. En 1838, G.-R. Gray nous a donné « Trans. En!. Society » un synopsis des Castnies, dans lequel il a décrit plusieurs espèces nouvelles. Nous-même nous en avons réuni depuis une trentaine d'années un certain nombre. Mais qui sait œ qu'il en reste encore à découvrir dans les vastes forêts de l'Amérique centrale?

# 1. C. GERON.

Kollar, Lepid. Bras. Ann. Wien. pl. 13, f. 1. — Walker, Heterocea, p. 20, 12.

Cette Castnie est très-grande, elle a environ 14 centimètres. Ses ailes sont d'un brun grisatre à reflet vert ou violet, selon les aspects; elles sont traversées par deux bandes blanches.

Les ailes inférieures sont également d'un brun grisatre avec la base et le disque garnis de longs poils, et le bord terminal divisé par une rangée de taches jaunatres.

Le dessous des premières ailes offre à peu près le même dessia qu'en dessus, mais elles ont leur disque garni de longs poils.

Le dessous des secondes est marqué de deux séries terminales, de taches blanchâtres, obsolètes.

Le corselet et l'abdomen participent de la couleur des ailes. Nous ne l'avons jamais vue en nature. Kollar, en lui donnant le nom de *Geron*, l'a comparée à la barbe d'un vieillard.

Elle habite le Brésil.

### 2. C. RUTILA.

Felder, Novara, Exped. Zoolog. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 79, f. 1.

Cette grande et belle Castnie a de 13 à 14 centimètres d'envergure. Ses ailes supérieures, un peu plus arrondies que dans Japix, sont d'un ton beaucoup plus rouge; elles offrent sur le milieu de la côte, une tache de couleur brune, en forme de pince, et avant l'extrémité, une rangée mal alignée, de gros points plus obscurs que le fond, dont le supérieur est noir, pupillé de blance.

Les ailes inférieures sont entièrement d'un rouge brique, traversées entre le milieu et l'extrémité, par une série bien alignée, de huit petites taches noires; outre cela, il y a près de la frange, une ligne marginale noire, qui se prolonge un peu sur les pervures en petites taches cunéiformes. On voit aussi sur le bord terminal des premières ailes, entre les nervures, une rangée de taches cunéiformes obsolètes.

Le corselet et l'abdomen sont de la couleur des ailes supérieures.

Elle a été rapportée de l'Amazone et fait partie de la collection de M. Felder, à Vienne. Cet entomologiste distingué en a donné une très-belle figure, sur laquelle nous avons fait notre description.

### 3. C. JAPYX.

Hubn. Exot. Samml. — Castnia Fonscolombe, God. Enc. meth. IX, p. 799, 13. — Gray, Synops. 144, 12. — Walker, Heterocera, p. 20, 10.

Godart a dédié cette grande Castnie à M. le comte Boyer de Fonscolombe, Entomologiste à Aix, en Provence, mais comme le nom de Japyx donné à cette espèce, par Hubner, nous paraît avoir l'antériorité, nous l'adoptons de préférence.

Le mâle a 10 et la femelle 11 1/2 centimètres. Ses ailes supérieures sont d'un roux olivâtre, très-chatoyantes, marquées sur leur tiers postérieur d'une raie oblique brune, allant de la côte au bord interne; elles ont, en outre, au-dessous de la côte, une tache blanchâtre, arrondie, un peu obsolète, et sur la bande brune oblique, un petit point blanc.

Les ailes inférieures sont d'un fauve-orangé vif avec la base d'un brun olivâtre; l'extrémité est d'un rouge ferrugineux, avec une rangée de gros points, d'un brun un peu roussatre, vers l'angle externe seulement. L'extrémité des nervures offre aussi sur un fond assez intense, des taches d'un brun roux.

Le dessous des premières ailes est d'un rouge brique avec la bande transverse assez obsolète.

Le dessous des secondes ailes est jaune d'ocre, avec trois raies noirâtres incomplètes, dont les deux premières sinuées et la dernière maculaire et un peu effacée.

Le corselet est de la couleur des premières ailes. L'abdomen est d'un jaune un peu fauve.

La femelle a les ailes supérieures moins pointues au sommet, d'une couleur plus ferrugineuse, avec cinq taches blanches, dont quatre alignées sur la bande transversale brune, et une plus grosse sous la côte. Ses ailes inférieures sont marquées sur leur bord terminal de deux rangées de taches d'un brun-roux ferrugineux.

Cette espèce n'est pas très-rare; on la reçoit souvent du Brésil. Godart n'a connu que la femelle.

### 4. C. GRAYI. Boisd.

Elle est un peu plus grande que Japyx. Ses ailes supérieures sont d'un brun un peu ferrugineux, à reflet verdâtre; elles out entre le milieu et le sommet une raie oblique, d'un blanc pur, allant de la côte au bord interne, précédée en dehors d'un peut point de sa couleur.

Les ailes inférieures sont d'un brun olivâtre à la base, marquées au milieu d'une large tache blanche, transversale, atteignant le bord abdominal; ensuite le contour est rouge, divisé en arrière par un cordon de taches noires, asses grosses et bien marquées.

Le dessous des premières ailes est d'un fauve ferrugineux, avec cinq taches blanches, dont une ronde, sous-costale, une plus grosse, presque carrée, sur le bord interne, et trois alignées sur la place occupée en dessus par la raie blanche.

Le dessous des secondes ailes est blanc, avec les contours d'un gris-pâle un peu rosé; l'angle anal est marqué d'une grosse tache brunâtre.

Le corselet est de la couleur des premières ailes. L'abdomen est blanc de part et d'autre, avec l'extrémité anale ferrugineuse.

Cette belle espèce, voisine de Japyx, a été reçue du Brésil par Becker qui nous l'a offerte comme une rareté de premier ordre.

Nous avous dédié cette grande et belle espèce à feu George Robert Gray du British Museum, qui a publié en 1838 un synopsis des Castnies, et en outre un certain nombre de mémoires sur les Lépidoptères de l'Inde et sur plusieurs insectes trèccurieux de la Nouvelle-Hollande. George Gray était le frère du célèbre naturaliste Edward Gray, directeur de la partie zoologique au British Museum. La reconnaissance nous fait un devoir de déclarer hautement ici que nous n'avons eu qu'à nous féliciter de l'accueil cordial que ces deux messieurs nous ont fait en Angleterre, et de l'obligeance parfaite avec laquelle ils ont mis à notre disposition les immenses richesses confiées à leurs soins-

#### 5. C. DARDALUS.

Dalm. Monog. p. 7, 1. — Walker, Heterocera, p. 16, 1. — Castnia Cyparissias, God. Enc. t. IX, p. 797, 1. — Gray, Synops. 142, 1. — Pop. Cyparissias, Fab. Ent. S. III, 1, p. 39, 115. — Pop. Dadatus, Cram. pl. 1, fig. A. B.

Cette grande espèce a de 15 à 19 centimètres. Le corselet est noir avec un reflet vert. L'abdomen est d'un brun noirâtre.

Les alles supérieures sont d'un brun foncé, avec un reflet vert; elles sont marquées de deux bandes blanches, obliques, de dedans en dehors, dont la première plus longue, atténuée inférieurement, se termine par un point de sa couleur, et dont la seconde, plus rapprochée du sommet, est courte, sinuée, paraissant formée de trois taches; elle est suivie en dehors de deux gros points également blancs.

Les ailes inférieures sont un peu plus obscures que les supérieures; elles offrent, entre le milieu et le bord marginal, deux séries de taches d'un blanc un peu jaune, dont celles de la première rangée sont plus petites et moins bien indiquées, quelque-fois même un peu obsolètes dans les mâles.

Le dessous des ailes supérieures offre le même dessin que la face opposée, mais le sommet et l'extrémité sont d'un brun plus pâle.

Le dessous des ailes inférieures est d'un brun roux, avec les deux séries de taches moins bien marquées qu'en dessus.

La femelle est plus grande que le mâle. Ses ailes sont plus noires; la bande blanche de l'extrémité est suivie de trois taches blanches alignées parallèlement au bord terminal; sur les ailes inférieures les deux séries de taches sont entièrement blanches, plus grosses et bien marquées; en dersous ces mêmes taches sont cerclées de noir.

Cette Castnie est toujours extrêmement rare. Nous la devons à l'obligeance de Messieurs Bar, qui en ont découvert les Chrysalides à Cayenne dans le tronc d'un Bananier.

Godard et Dalman ne l'ont jamais vue en nature. Leur description est faite sur la figure de la femelle représentée par Cramer, qui du reste est fort exacte, sauf qu'elle est un peu trop noire.

. . . . .

### 6. C. Papilionaris.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 42.

Nous ne connaissons pas cette grande Castnie que M. Walke compare pour la taille à notre Cacica. Elle est d'un brun-ferragineux foncé, à reflet vert ou doré selon les différents aspects. La poitrine et le dessous de l'abdomen sont d'un jaune d'ocre.

Les ailes supérieures ont un stigmate discoldal jaune, et sont marquées à l'extrémité d'une bande oblique d'un jaune pâle. Le dessous de ces mêmes ailes offre une large bande qui traverse un espace irrégulier d'un jaune ochracé.

Les ailes inférieures sont noirâtres, traversée par une bande bleue, dentée.

Cette belle Castnie a été rapportée des environs de Bogota.

— British Museum.

### 7. C. Schrebersii.

Mikan, Delectus Floræ et Faunæ Brasiliensis, 1830. — C. Letreille, God. Enc. meth. IX, p. 799, 9. — G.-R. Gray, Synops. 142, 2. — Walker, Heterocera, p. 17, 2. — Castnia Actor, Dalman, Monogr. p. 8, 2, pl. 1, f. 1. — Eupalamides Ctesiphon, Hubn. Exot. Schmett.

Cette belle Castuie a été décrite ou figurée presque simultanément par quatre auteurs sous des noms différents. Il est même assez difficile de dire auguel appartient la priorité. Mikan en a donné une bonne figure en 1820, et l'a dédiée au savant directeur du Museum de Vienne. En 1824, Godard, de son côté, la dédia à Latreille, surnommé à juste titre le prince des Entomologistes. En 1825, Dalman l'a décrite sous le nom d'Actor. Nous re savons si c'est avant ou vers la même époque que Hubner l'a figurée sous celui de Ctesiphon. Le titre de son ouvrage porte la date de 1806, mais les planches ont été publiées successivement jusqu'en 1825. Ce qu'il y a de positif, c'est qu'il ne la connaissuit pas en 1816 puisque son catalogue ne mentionne que les espèces représentées dans l'ouvrage de Cramer. Ce n'est qu'en 1826, l'année même de la mort de ce célèbre iconographe, que le planches, contenant plusieurs espèces de Castnies, nous sost parvenues.

Elle a de 14 à 15 centimètres. Ses ailes supérieures sont d'un

brun-grisâtre ensumé, chatoyant en vert olivâtre, avec le milieu occupé par une large bande oblique, indéterminée, d'un blanchâtre sale; outre cela, l'angle interne et le sommet offrent un grand espace rembruni.

Les ailes inférieures sont noires, et ordinairement marquées sur le disque, un peu en arrière de la cellule discoldale, d'une grande tache, longitudinale, bleue, allongée, dilatée antérieurement; en arrière de cette tache il y a, vers le bord marginal, un cordon de trois à cinq gros points de la même couleur.

Le dessous des ailes supérieures est brun, sans reflet, avec une bande bifide, blanche, ou d'un blanc lavé de violâtre.

Le dessous des ailes inférieures est brun, et offre, entre le milieu et l'extrémité, une série transverse de points bleuâtres.

Cette Castnie varie pour la forme de la tache des secondes ailes. On rencontre même des individus mâles, chez lesquels elle disparait complétement, comme dans l'exemplaire figuré par Dalman.

Elle habite les environs de Rio-Janeiro, mais surtout la province de Minas. Elle n'est pas très-rare aujourd'hui.

### 8. C. PYLADES.

God. Enc. meth. 9, p. 797, 2. — Dalman, Monograph. p. 9, 3. — G.-R. Gray, Synops. 142, 4. — Walker, Heterocera, p. 17, 4. — Papilio Pylades, Cr. 397, A. B.

Cette belle et rare espèce est au moins aussi grande que Dædalus. Ses ailes sont d'un noir-brun chatoyant en vert, selon les asperts, comme, du reste, cela a lieu dans la plupart des espèces du même genre.

Les ailes supérieures ont deux larges bandes transverses, sinuées, d'un blanc sale, saupoudrées d'atomes obscurs, dont la première est située un peu au-delà du milieu, et la seconde plus courte, entre celle-ci et le sommet.

Les ailes inférieures sont d'un noir plus foncé, et offrent, parallèlement au bord postérieur, une large bande rouge, ou d'un rouge légèrement fauve, dentée en dedans, et divisée dans le sens de sa longueur par une rangée de taches noires orbiculaires, dont les trois dernières sont confluentes.

Le dessous des ailes supérieures est brun, avec les handes du dessus d'un fauve rougeatre ainsi que le bord interne; ces mêmes ailes ont entre les nervures, des espèces de taches oblongues ou éclaircies longitudinales, demi-transparentes.

Le dessous des ailes inférieures est d'un noir brun saupoudré d'atomes d'un gris jaunâtre; la bande terminale a la même forme qu'en dessus, mais elle est obscure et à peine rougeâtre.

La femelle, qui est énorme, diffère du mâle en ce que ses aîles supérieures ont, entre la base et le milieu, une large bande mal définie, d'un blanc sale.

Cette espèce est fort rare dans les collections. Nos individus proviennent de chrysalides trouvées par hasard, à Cayenne, par le capitaine Cathernault, dans le tronc d'un bananier.

Godart et Dalman l'ont décrite sur la figure de Cramer.

### 9. C. CACICA.

Boisd. in Herrich-Schæffer, 141 (1).

Elle est presque aussi grande que la Pylades. Elle est d'un noir brun avec la frange des quatre ailes blanches.

Les ailes supérieures ont un point blanc discordal bien indiqué, et entre celui-ci et l'extrémité, une raie transversale étroite, droite, du même blanc.

Les ailes inférieures offrent, un peu au-delà du milieu, une bande transversale de largeur moyenne, d'un rouge orange, dentée en dehors, et dilatée à l'angle anal; entre cette bande et l'extrémité, il y a une série de cinq gros points de la même couleur.

Le dessous des ailes est d'un brun un peu roussâtre avec le même dessin qu'en dessus, sauf que le point discoïdal des premières est beaucoup plus gros.

La femelle figurée par M. Herrich-Schæffer diffère du mâle en ce que la bande et la rangée de points des secondes ailes sont rouges au lieu d'être d'un rouge orange.

Le corps, dans les deux sexes, est d'un brun noirâtre en des sus avec le dessous de l'abdomen rougeâtre.

Nous avons reçu cette rare espèce de Goudot ainé, qui a

(1) Nous avons prêté au savant entomologiste Herrich-Schmstet toutes les Castnies figurées dans son remarquable ouvrage (Sammluss Aussereuropäescher Schmetterlinge), moins cependant la Cronides et l'Endesmia qui n'appartenaient pas à notre collection.

trouvé accouplés le mâle et la femelle sur les bords de la Magdalena, en Colombie.

### 10. C. PROCERA. Boisd.

Si Goudot ne nous avait pas dit qu'il avait trouvé accouplés le mâle et la femelle de la *Cacica*, nous n'aurions pas hésité à considérer comme le mâle de cette Castnie, la grande et belle espèce mexicaine dont il va être question.

Elle a le même port et la même taille que la Cacica, c'est-àdire 13 centimètres d'envergure. Elle est de même d'un noir brun à reflet verdâtre. Les ailes supérieures, dont la frange est blanche, sont traversées, sur leur tiers postérieur, par une raie blanche, droite, régulière, ne touchant pas tout-à-fait à la côte.

Les ailes inférieures offrent un peu au-delà du milieu, une bande transverse, assez étroite, rouge, un peu crénclée, et dilatée à l'angle anal. Entre cette bande et l'extrémité il y a, en outre, une série de quatre gros points de la même couleur.

Le dessous des ailes est brun avec le même dessin qu'en dessus, sauf qu'il est beaucoup moins indiqué sur les inférieures que sur la face opposée.

Le corps est d'un noir brun de part et d'autre.

Cette belle espèce diffère de la Cacica par ses ailes supérieures un peu plus pointues au sommet, par l'absence de la petite tache blanche discoïdale, par ses ailes inférieures dont la bande transversale est moitié plus étroite, et enfin par le dessous des ailes qui est entièrement d'un brun uniforme ainsi que le corps.

M. de l'Orza a reçu cette belle espèce du Guatemala, et nous a fait don de l'unique exemplaire qu'il possédait.

#### 11. C. ICARUS.

God. Enc. meth. IX, p. 798, 5. — Dalman, Monograp. p. 40, 4. — G.-R. Gray, Synops. 144, 9. — Boisd. Consid. sur les Lépid. du Guatemala, p. 75. — Walker, Heteroc. p. 19, 8. — P. Icarus, Cram. 18, A. B.

Elle a de 10 à 12 centimètres. Elle est d'un gris brunâtre trèschatoyant en vert.

Ses ailes supérieures sont traversées par deux bandes blanches, chliques, dont la première, plus étavite, s'étend du tiers antérieur de la côte jusqu'à l'angle anal, et la seconde plus courte et

un peu plus large, située sur le tiers postérieur, n'atteint pas les bords.

Les ailes inférieures sont rouges, traversées par deux bandes noires n'arrivant pas jusqu'au bord abdominal; la première de ces bandes est très-courte; le seconde est séparée, le plus ordinairement, de la bordure, par de grosses nervures noires; la bordure est noire, assez large, divisée par un cordon de taches de la couleur du fond, dont les trois premières sont souvent lavées de blanc.

Les ailes supérieures ont en dessous trois bandes obliques blanches, la base rouge, avec un point discoldal et une gresse tache vers l'angle anal, également rouges.

Le dessous des ailes inférieures est rouge avec une bande anguleuse, blanche; les taches de la bordure sont également presque blanches.

Le mâle est d'un tiers plus petit que la femelle que nous venons de décrire; ses ailes inférieures sont entièrement rouges avec trois bandes maculaires noires; outre cela, on voit entre le milieu et l'angle externe deux ou trois taches blanches correspondant à la bande anguleuse du dessous. Ces taches blanches existent même quelquesois chez certaines femelles.

L'abdomen du mâle est presque d'un rouge briqueté; celui de la femelle est lavé de rouge sur les côtés.

Nous l'avons reçue de Cayenne, du Brésil et de Guatemala.

Il paraît que cette espèce était fort rare dans les collections du temps de Godart et de Dalman, car les descriptions qu'ils en donnent sont faites d'après l'ouvrage de Cramer.

### 12. C. AMYCUS.

Dalman, Monograph. p. 19, 12. — G.-R. Gray, Synops. 145, 15. — God. Enc. meth. IX, p. 798, 6. — Walker, Heterocera, p. 27, 29. — Pap. Amyous, Cram. 227, D. E.

Elle a environ 8 centimètres. Ses ailes supérieures sont d'un brun noir, sablées de quelques atomes blanchâtres; elles sont traversées un peu au-delà du milieu, par une bande blanche, courbe, un peu sinuée en dedans, très-fortement sablée de noirâtre, allant de la côte à l'angle interne; entre cette bande et la base il y a sur la côte le commencement d'une autre petite bande blanche; on voit encore, un peu avant d'arriver au sommet, deur

CASTNIE. 505

petites taches blanches superposées, ou réunies comme dans la figure de Cramer.

Les ailes inférieures sont noires à la base, ensuite rouges avec une bande transverse noire; le bord terminal est noir, divisé par un cordon de taches rouges.

Le dessous des premières est largement rouge à la base avec la bande transverse entièrement blanche.

Le dessous des secondes ailes est complétement rouge, avec l'apparence de deux bandes parallèles, d'un rouge plus obscur; outre cela, il y a sur la première de ces deux bandes, non loin de l'angle externe, deux points blanchâtres cerclés de brun.

Décrite zur deux exemplaires mâle et femelle que nous avons reçus de Surinani.

Les descriptions données par Godard et Dalman sont faites d'après Cramer, aucun de ces deux auteurs n'ayant vu en nature cette rare espèce.

Coll. Bd.

# 13. C. MEDITRINA.

Hopffer, Neue Schm. Heft. II, tab. V, f. 4.

Cette espèce a un peu le port d'Amycus, mais outre qu'elle est un peu plus petite elle a le sommet plus arrondi. Ses alles supérieures d'un noir un peu verdâtre, ont le bord interne fortement sinud; elles sont marquées d'un point blanc sur la côte et ensuite d'une bande transverse également blanche, sinuée, rétrécie inférieurement, allant de la côte presque à l'angle anal; on voit, en outre, entre cette bande et le sommet, tout près de la côte, deux petites taches blanches superposées.

Les ailes inférieures sont noires avec un reflet bleu, sans aucune tache; la franço est blanche.

Le dessous de ces mêmes ailes est en tout semblable au dessus. Le dessous des premières ailes a la base d'un jaune rougeâtre.

Le corselet et l'abdomen sont de la même couleur que lesailes.

Cette Castnie, d'une tenue assez modeste, est fort rare. Le musée de Berlin n'en possède qu'un individu unique pris au Brézil par M. Chavannes.

### 14. C. MORPHOIDES.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 43.

Elle est de la taille de l'*Icarus*, et elle est d'un brun ferregineux à reflet d'un vert doré. La poitrine et l'abdomen sont d'un jaune d'ocre un peu doré.

Les ailes supérieures sont traversées par trois bandes bruses, dont la première n'atteint pas la côte, dont la seconde, plus large, arrive jusqu'à la côte en s'atténuant et en s'interrompant peu inférieurement, et enfin dont la troisième est près du but extérieur. Le dessous de ces mêmes ailes est d'une teinte ochracke avec des bandes noires.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocre, un peu purpurecentes, avec l'extrémité très-noire, divisée par deux bandes arquées, d'un jaune d'ocre, dont la première est sub-maculaire et la seconde maculaire. Leur dessous est traversé, sur la parie noire, par trois bandes brunes, dont la première est marquée de quelques points blancs de grosseur inégale.

Brésil. - British Museum.

### 15. C. ZERYNTHIA.

G.-R. Gray, Synops. in Trans. of the Entom. Soc. of London, p. 144.

11. — Walker, Heterocera, p. 18, 6. — Castnia Langsdorfi, Ménétr.
Enum. corp. anim. mus. Petrop. pl. XI, f. 1.

Cette espèce est l'une des plus belles et des plus grandes du genre ; la femelle a jusqu'à 14 centimètres.

Les ailes supérieures sont brunes à reflet verdâtre; elles ont, sur le milieu de la côte, une tache noire triangulaire, bordée et entourée de blanc à peu près comme dans la Schrebersii; elles ont, plus loin, en tirant vers le sommet, un espace d'un brun noir, marqué de deux petites taches d'un blanc transparent; il existe en outre, une bande oblique, noirâtre, liserée de blanchâtre, en dedans, allant de la principale nervure au milieu du bord interne.

Les ailes inférieures sont brunes à la base, noires dans leur tiers postérieur, traversées au milieu par une large bande d'un blanc pur, n'atteignant pas le bord antérieur; la partie noire est divisée par deux rangées de taches d'un jaune d'ocre, dont celles de la première série sont plus grosses vers l'angle externe, et beaucoup plus petites et presque confluentes du côté de l'angle anal; celles de la seconde série sont, au contraire, ponctiformes et presque nulles vers l'angle externe.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures. L'abdomen est brun à la base, ensuite d'un blanc pur de part et d'autre, avec l'anus d'un brun roussêtre.

Le dessous des premières ailes est fascié irrégulièrement de blanc et de noir, avec les deux petites taches transparentes comme en dessus.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris brunâtre à la base et à l'extrémité, avec le milieu blanc et une bande noire sinuée à l'angle anal.

Décrite sur quatre individus très-frais que nous avons reçus du Brésil.

Cette Castnie nous arrive généralement en très-bon état, ce qui pourrait faire supposer qu'on l'obtient de Chrysalides.

### 16. C. PALLASIA.

Eschscholtz in Kotzebue ilinere, III, pl. 6, fig. 17, p. 217. — Castnia Ardaius, Dalman, Monogr. p. 17, 10. — Gray, Synops. 147, 22. — Walker, Heterocera, p. 24, 20. — Castnia Brecourt. God. Enc. meth. IX, p. 798, 7.

Cette belle espèce a de 9 à 12 centimètres. Ses ailes supérieures sont d'un noir olivâtre à reflet vert ou violâtre, traversées au milieu, et obliquement, par une large bande très-difforme, d'un blanc grisâtre, sinuée des deux côtés; il y a en outre vers le sommet, sur la côte, une tache noire, semi-lunaire, suivie en dehors d'une petite liture blanche.

Les ailes inférieures sont noires, traversées dans leur milieu par une large bande blanche, suivie d'une raie maculaire, d'un rouge vermillon, dont les taches se dilatent et deviennent plus ou moins confluentes vers l'angle anal; cette bande est suivie elle-même, sur le bord marginal, d'une rangée de points d'un blanc pur.

Le dessous des premières ailes a la bande difforme beaucoup plus blanche qu'en dessus, et le bord marginal divisé par une rangée de gros points blancs; outre cela, l'origine de la côte est rouge. Le dessous des secondes ailes est presque semblable à la face opposée.

L'extrémité de l'abdomen est d'un rouge minium.

Elle se trouve dans l'intérieur du Brésil, mais elle est toujous rare.

Coll. Bd.

Nota. Dalman a changé sans raison le nom de Pallasia donsé à cette Castnie par Eschscholtz, pour lui substituer celui de Ardalus, sous le prétexte qu'il était d'usage de donner aux Lépidoptères des noms mythologiques.

# 47. C. JUTURNA. Hopffer, Neue Schm. pl. IV, f. 3.

Castnia Lorza, Boisd. M.

Elle est à peu près de la taille de la Licus, c'est-à-dire qu'elle a environ 7 1/2 centimètres.

Ses ailes supérieures sont brunes à reflet olivâtre, marquées de quatre bandes d'un blanc sale, dont les deux premières obliques, un peu sinuées, partent de la côte, mais n'arrivent pas tout à fait au bord interne, et dont les deux dernières, placées vers le sommet, sont très-courtes, transverses, coupées par les nervures et un peu maculaires.

Les ailes inférieures ont à la base une tache d'un rouge sanguin marquée d'un gros point noir, au milieu une bande blanche sinuée des deux côtés, et vers l'extrémité une bande d'un noir profond, élargie vers l'angle anal, bordée des deux côtés, mais surtout en dehors, par une raie d'un rouge sanguin; la bordure est noire, très-étroite, avec la frange blanchâtre.

Le dessous des premières est blanc avec la base d'un rouge vermillon, et deux grosses taches sous-costales noires ainsi que le bord terminal.

Les ailes inférieures sont blanches, marquées, près de la base, d'une grosse tache noire et d'un peu de rouge vers le bord abdominal; la bande noire du bord postérieur est largement bordée de rouge sanguin en dehors, et très-faiblement en dedans.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures. L'abdomes est brunâtre en dessus et blanc en dessous avec l'extrémité anale rouge.

Elle se trouve au Brésil dans la province de Minas.

Nous nous faisions un véritable plaisir de dédier cette belle et rare Castnie à M. de l'Orsa, à qui nous sommes radevable de l'unique exemplaire que nous possédens, lorsque nous nous sommes aperçu, à notre grand regret, qu'elle était figurée et décrite par le savant M. Hopffer, de Berlin, sous le nom de Jusurna, que nous avons dû adopter.

### 18. C. ORESTES. Boisd.

Walker, Catal. of the Heterocera, p. 26, 27. — C. Umbrata. Ménétriés, Enum. corp. anim. Mus. Petrop. pl. XI, f. 2.

Elle est à peu près de la taille de la Licus. Ses ailes supérieures sont d'un brun plus ou moins foncé, ou plus ou moins clair, chatoyant en vert, avec la base et des bandes noires, savoir : une bande oblique partant du milieu de la côte pour gagner l'angle interne où elle s'anastomose en dedans, avec un demi-cercle de la même couleur, une bande courte, bifide, située près du sommet, renfermant dans sa fissure trois petites taches blanchâtres.

Les ailes inférieures sont d'un noir profond, traversées au milieu par une large tache blanche, s'élargissant vers le bord abdominal; l'extrémité postérieure est marquée d'une double série de points d'un rouge vif, dont ceux du premier rang sont beaucoup plus gros, et en forme de taches vers le bord externe.

Le dessous des premières ailes est d'un jaune rougeatre avec les bandes noires bien nettes et bien marquées.

Le dessous des secondes ailes est roussâtre avec la tache blauche transversale un peu bleuâtre; les deux séries de points rouges sont un peu effacées et bien moins apparentes que sur la face opposée.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures. L'abdomen est neir à la base et ensuite blanc, avec l'anus rougeâtre.

La femelle ne diffère pas sensiblement du mâle.

Cette jolie Castnie se trouve dans la province de Rio-Janeiro, d'où nous l'avons reçue plusieurs fois de Beske.

La figure donnée par Ménétriés est assez bonne quoique un peu grossière.

### 19. C. BOISDUVALII. Becker.

Walker, Heterocera, p. 27, 28. — La femelle Castnia Herrichii, Boisi in Herrich-Schæffer, Samml. Aussereurop. Schm. fig. 444.

Le mâle Castvia Beskei, Ménétr. Rnum. corp. animal. Mus. Petrop. pl. XI, f. 3.

Ménétriés a figuré le mâle de cette Castnie sous le nom de Beskei, en disant avec raison, p. 129, qu'il lui trouve une grande ressemblance avec Herrichii Boisd.

Le mâle a 8 centimètres au plus. Ses ailes supérieures sont d'un brun noirâtre, à reflet vert très-prononcé, avec la base plus obscure; elles ont, en outre, une bande transversale noire, largement bifide, dont le rameau extérieur s'étend obliquement du bord interne au sommet, où il se dilate en formant un espect triangulaire, marqué de trois petites taches transparentes, allongées; le rameau interne beaucoup plus court, un peu moins secentué, se termine sur la côte.

Les ailes inférieures sont noires, avec le milieu très-largement d'un rouge sanguin; la bordure est sinuée en dedans, divisée par une rangée de taches, mal alignées, du même rouge, suivis, tout près de la frange, de deux ou trois points de la même couleur.

Le dessous des premières ailes est d'un rouge briqueté, avec quelques taches noires sur le disque, et les petites taches transparentes comme en dessus.

Le dessous des ailes inférieures est aussi de couleur rouge avec l'empreinte de deux raies parallèles, brunâtres.

Le corps est de la couleur des ailes supérieures.

La femelle diffère beaucoup du mâle par la taille et par la couleur : tout ce qui est rouge dans le mâle est d'un jaune pâle chez elle. Son abdomen, au lieu d'être brun, est d'un blant jaunâtre.

Nous l'avons reçue de Bahia et de Pernambuco.

La figure du mâle, dans l'ouvrage de Ménétriés est bonne. Celle de la femelle, dans l'Iconographie de M. Herrich-Schæfer, ne laisse rien à désirer. Nous avions pris la femelle pour une espèce nouvelle, que nous avions dédiée au savant auteur de travaux nombreux sur les Lépidoptères.

### 20. C. MENETRIESI. Boisd.

Elle est à peu près de la taille de la famelle de l'espèce précédente, dont elle a le port, ainsi que de la *Dalmani*.

Ses ailes supérieures sont pointues au sommet, comme dans ces deux espèces; elles sont d'un brun-noir assez obscur, avec deux handes transverses d'un noir plus foncé, dont l'antérieure bifide et la postérieure sinuée; outre cela, ces deux handes paraissent réunies par un rameau latéral; le long de la côte, on roit aussi deux taches plus pâles que la teinte générale.

Les ailes inférieures sont noires, marquées vers leur milieu d'une grande tache jaune, transversale, sinuée en avant, suivie en arrière, du côté de l'angle externe, de quatre à cinq points erangés, alignés et d'un autre point semblable rejeté en dehors. La gouttière abdominale est blanche.

Le dessous des premières ailes est noir, lavé de fauve vers l'angle interne, avec trois taches d'un blanc jaunâtre, bien marquées, dont deux en forme de bandes courtes, sous la côte.

Le dessous des secondes ailes est en grande partie de couleur blanche, avec l'extrémité d'un gris violâtre, l'angle anal est brunâtre et marqué d'une liture noire, qui s'éteint insensiblement le long de la portion violâtre.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures. L'abdomen est noir à sa base et ensuite entièrement blanc. L'anus est ferrugineux.

Nous ne connaissons que la femelle, nous l'avons reçue du Brésil. Le mâle en diffère peut-être beaucoup par la couleur.

Nous avons dédié cette espèce à feu notre ami Ménétriés, directeur et conservateur des collections entomologiques de l'Académie de Saint-Pétersbourg. Ménétriés était élève du Museum de Paris. Il en est parti pour accompagner M. Langsdorff au Brésil. A son retour en Europe il se fit naturaliser Russe. Il a aussi voyagé dans le Caucase et sur les frontières de la Perse, où il a fait des découvertes fort intéressantes. Excellent observateur, il a doté l'Entomologie de plusieurs mémoires très-remarquables sur les Lépidoptères et sur les Coléoptères, publiés pour la plupart dans des recueils scientifiques.

### 21. C. GALINTHIAS.

Hopffer, Neue Schm. tab. IV, fig. 4.

Elle est un peu plus grande que l'Orestes. Ses ailes supérierres, pointues au sommet, sont d'un brun un peu grisatre, mélangé de teintes roussatres à reflet verdâtre, marquées entre les nervures, de petites taches allongées, d'un blanc légèrement junâtre, divisées dans le sens de leur longueur par des traits nois de même forme.

Les ailes inférieures sont noires, traversées dans leur milies par une bande d'un blanc un peu jaunâtre, coupée par les nervures. Cette bande est suivie de trois ou quatre points plus on moins bien accusés, de sa couleur. En avant de la frange il y a, en outre, une bande terminale très-étroite, un peu maculaire, ferrugineuse.

Le dessous de ces mêmes ailes a, comme sur la face opposée, un reflet d'un vert bleuâtre, mais ici la bande médiane blanche s'étend presque jusqu'à la base.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures. L'abdomen est d'un brun grisâtre en dessus, et d'un gris jaunâtre en dessous.

Cette Castnie a été rapportée du Brésil par M. Langsdorf, et fait partie aujourd'hui de la riche collection du Musée de Berlis.

# 22. C. DALMANII.

G.-R. Gray, Synops. in Entom. Societ. of London, 145, 13.—Walker, Heterocera, p. 26, 25.

Elle a de 8 à 9 centimètres. Ses ailes ferrugineuses, pointes au sommet, sont d'un brun roussâtre à reflet violâtre, avec des bandes transverses plus obscures, dont la postérieure se dilate à son extrémité près de l'angle apical en forme de tache triangulaire.

Les ailes inférieures sont noires à la base, avec une grande tache transversale jaune devenant blanche vers le bord abdominal; cette tache est entourée par une large bande terminale d'un rouge un peu orangé, liserée d'un peu de noir en dedans, et divisée, un peu avant la frange, par une raie noire, un peu maculaire, dilatée à l'angle anal.

Le dessous des premières ailes est rouge, avec les bandes d'une couleur plus intense et une tache noire sur le bord interne.

Le dessous des ailes est blanchâtre jusqu'au-delà du milieu, et ensuite d'un brûn rougeâtre, avec une grosse tache beaucoup plus foncée sur l'angle anal.

Le corselet participe de la couleur des ailes supérieures. L'abdomen est très-noir à sa base, et ensuite complétement blanc, avec l'anus rougeatre.

La femelle a les ailes supérieures un peu moins pointues que le mâle et d'un ton plus clair, avec les bandes plus distinctes, mais chez elle, la bande postérieure est ordinairement interrompue. Ses ailes inférieures ont une bande transversale d'un blanc de neige, et non jaune; la bande rouge terminale est bordée en dedans par une raie noire dentée, et la raie transverse qui la divise est beaucoup plus accentuée.

Cette belle Castnie a été dédice à Dalman par G.-R. Gray.

Nous l'avons reçue de plusieurs contrées du Brésil. Elle est toujours rare.

23. C. PALATINUS.

God. Encycl. meth. IX, p. 799, 12. — Dalman, Monograph. p. 18, 11. — G.-R. Gray, Synops. 147, 24. — Walker, Heterocera, p. 23, 23. — Papilio Palatinus, Cram. 159, B. C.

Elle a environ 8 centimètres. Ses ailes supérieures, un peu allongées, sont d'un brun un peu roussâtre, à reflet verdâtre, avec la base, une grosse tache sous-costale et une raie oblique transverse un peu plus obscure; la ligne oblique va du bord interne auprès du sommet, où elle se dilate, et où elle est marquée d'un point blanc transparent.

Les ailes inférieures sont noires, traversées au milieu par une large bande, bien nette, d'un blanc jaunâtre, sauf vers l'angle externe, où elle est d'un fauve orangé; le bord marginal est marqué d'une rangée de cinq à six points d'un jaune orange.

Le dessous des premières ailes est blanchâtre, lavé de fauve avec une tache aunulaire noire sous le milieu de la côte; le sommet est brunâtre, avec le même point transparent qu'en dessus.

Le dessous des secondes ailes est blanchâtre, avec une petite bande noire, très-courte, sur le milieu du bord externe; le bord terminal offre une bande brunâtre, devenant noire en arrivant à l'angle anal; les points marginaux de la face opposée reparaissent en gris blanchâtre.

Le corselet est brun, l'abdomen est noir à la base, et ensuite d'un blanc faiblement jaumâtre. L'anus est d'un roux brun.

Cette espèce est toujours fort rare dans les collections. Nous l'avons reque de Cayenne où elle a été prise par M. Bar.

Godart l'a décrite d'après la figure de Cramer qui, du reste, est assez exacte. Dalman, plus heureux, en a vu un exemplaire dans la collection de Schoenhert.

### 24. C. HEGEMON.

Kollar, Lepid. Brasil. Ann. Wien. pl. 13, f. 2. — Walker, Heterocera, p. 26, 26.

Elle a de grands rapports avec la *Dalmanii*. Ses ailes supérieures sont d'un brun obscur à reflet vert, avec la base et un bande médiane, transverse, bifide en dehors, d'une couleur plus obscure.

Les ailes inférieures sont rouges, avec une tache noire à leur base et deux raies du même noir vers l'angle anal; outre cela, elles sont traversées par une bande médiane jaune.

Le dessous des quatre ailes est ferrugineux, avec la base blanche; celui des inférieures a également le bord interne blanc.

Elle habite la province de Rio-Janeiro. - British Museum.

Nous n'avons pas vu cette espèce, mais nous lui trouvons de grands rapports avec le mâle de Dalmanii.

#### 25. C. EVALTHE.

Dalman, Monog. p. 14, 8, fig. 3. — God. Enc. meth. IX, p. 797, 4.— G.-R. Gray, Synops. 143, 7. — Walker, Heterocera, p. 21, 14. — Pop. Evalphe, Fab. Ent. S. III, p. 45, 136. — Papilio Dardanus, Cr. 17, E. I. — C. Euphrosyne, Perty, Delect. animal. pl. 31, fig. 1.

Elle varie pour la taille depuis 7 jusqu'à 10 centimètres. Se ailes supérieures sont d'un brun-noir, chatoyant en vert seleu les aspects; elles sont marquées de deux bandes parallèles, trèsnettes, d'un jaune citron, dont la première très-légèrement courbe, commence un peu avant le milieu de la côte, pour arriver à l'angle interne; et dont l'autre très-étroite, linéaire, est située entre celle-ci et le sommet.

Les ailes inférieures sont noires comme les supérieures, traversées au milieu par une bande étroite, un peu maculaire, d'un jaune citron, suivie sur le bord terminal d'une rangée de taches rouges arrondies.

Le dessous des premières ailes est semblable au dessous, sauf que la côte et le sommet sont un peu lavés de rouge.

Le dessous des secondes ailes est entièrement rouge, avec une bande maculaire, jaune, correspondant à celle de la face opposée.

Telle est la description de l'Evalthe d'après des exemplaires que nous avons reçus de Cayenne, et parfaitement conformes à la tigure donnée par Cramer sur un individu de Surinam.

L'Evalthe du Brésil qui répond à la figure donnée par Dalman et à l'Euphrosyne de Perty, diffère notablement du type par ses ailes inférieures. Elle constitue une race particulière ou peut-être même une espèce propre.

La petite bande transverse est remplacée par un espace jaune semi-lunaire, et les taches rouges du bord marginal deviennent confluentes et s'étalent jusqu'à la partie jaune, en dessous on retrouve l'espace semi-lunaire jaune.

Outre cela, la frange des ailes supérieures est d'un blanc jaune dans ses deux tiers inférieurs.

L'extrémité de l'abdomen est rouge ou rougeâtre dans les individus des deux provenances.

Coll. Bd.

#### 26. C. Viryi, Boisd.

Elle est un peu plus grande que l'Evalthe typique, dont elle a le port et le facies. Ses quatre ailes sont d'un brun noir, chatoyant en vert, selonles aspects; les supérieures sont traversées, du milieu de la côte à l'angle interne, par une bande oblique, régulière, d'un blanc à peine soufré. Les ailes inférieures sont marquées, un peu au-delà du milieu, d'une bande maculaire jaune, formée de quatre taches séparées par les nervures, dont la plus interne de ces taches se fond vers l'angle anal avec un espace d'un rouge brique. Outre cela, il y a comme chez Evalthe, près du bord terminal, une série de cinq à six points du même rouge. La frange des ailes est brune.

Le dessous des ailes supérieures est brun avec la même bande qu'en dessus, et le sommet lavé de rouge brun. Le dessous des secondes ailes est d'un rouge pâle comme dans Evalthe et Euphrosyne, avec les mêmes taches qu'en dessus.

Le corps est brun en dessus avec le ventre et l'anus rouges.

Cette nouvelle espèce ne pourra pas être confondue avec Evalthe ni avec Euphrosyne qui ont chacune deux bandes james sur les ailes supérieures.

M. de l'Orza qui s'est défait généreusement en notre faveur de seul exemplaire qu'il possédait dans sa collection, lui avait imposé le nom de Viryi, comme témoignage de son amitié pour M. Viry, entomologiste distingué à Nancy. C'est avec plaisir que nous nous somme empressé de l'adopter.

La Castnia Viryi habite le Mexique.

### 27. C. HUBNERI. Boisd.

Latr. Cuv. Règne anim. III, pl. 20, fig. 2, p. 439. — Gray, Sysops. 146, 19. — Walker, Heterocera, p. 30, 36. — Castnia Sternbergii, Kolar, Lepid. Bras. ann. Wien. pl. 12, f. 4.

Nous avons prêté à M. Latreille cette Castnie, dédiée à Huhner, pour être figurée dans son Règne animal.

C'est une des plus petites espèces, elle n'a pas plus de 5 centimètres.

Ses ailes supérieures sont d'un brun roux, avec deux bandes blanches un peu maculaires, parallèles, de largeur égale, dont la première s'étend du milieu de la côte presque jusqu'à l'angle interne, et dont la seconde, plus courte, est située entre celle-ci et le sommet.

Les ailes inférieures sont d'un rouge un peu briqueté, traversées au milieu par une bande très-noire, marquée d'une rangée de points blancs mal alignés; la partie rouge de l'estrémité est divisée en taches cunéiformes par les nervures; le bont abdominal est d'un brun roussatre.

Le dessous des premières ailes est d'un rouge ferrugineur avec les mêmes bandes blanches qu'en dessus, mais ici la postrieure est bordée en dehors par une ligne très-noire.

Le dessous des secondes ailes est semblable à la face opposés seulement les points blancs sont un peu plus gros.

Elle se trouve au Brésil, d'où on la reçoit très-rarement. Coll. Bd.

### 28. C. EUDESMIA.

G.-R. Gray, Synops, in Trans. of the Ent. Soc. p. 145, no 14. — Herrich-Schreffer, 140, 141. — Gay, Historia fisica y politica de Chile, pl. 5, f. 8, p. 47. — Walker, Heterocera, p. 19, 7.

Elle a de 9 à 11 centimètres. Ses ailes supérieures sont grisâtres, un peu plus obscures à l'extrémité, à reflet vert; elles sont marquées de deux bandes blanches parallèles, dont la première, un peu sinuée, commence au milieu de la côte et s'atténue en pointe, bien avant d'arriver à l'angle anal, et dont l'autre plus courte, plus étroite, est située entre celle-ci et le sommet; la frange est blanche.

Les ailes inférieures sont noires, saupoudrées de quelques atomes bleus et traversées, un peu au-delà du milieu, par une hande rouge, assez étroite, sinuée, marquée entre chaque nervure, d'un point d'un blanc rosé; le bord marginal est divisé par une série de points rouges, dont le centre est d'un blanc rosé; la frange est d'un rose roussâtre.

Le dessous des premières ailes est d'un blanc lavé de roux avec la base et une bande oblique noires; cette dernière offre au sommet quelques écailles bleues.

Le dessous des secondes ailes diffère du dessus, en ce que l'extrémité est grise, et que les points du bord marginal sont d'un blanc rosé, cerclés de rouge.

L'abdomen se termine par une petite brosse rouge.

Nous avons reçu plusieurs fois cette Castnie du Chili. Il paraît qu'elle n'y est pas fort rare, car Lorquin en a pris plusieurs exemplaires usés, butinant sur des chardons, en pleiu soleil.

M. Herrich-Schæffer en a donné une figure parfaite.

### 29. C. Cochrus.

God. Enc. meth. IX, p. 798. — Gray, Synops. p. 147, 25. — Walker, Heterocera, p. 20, 11. — Pap. Cochrus, Fab. Ent. S. III, 1, p. 42, 125. — Donov. Nat. repos. pl. 150. — Castnia Maris, Dalman, Monog. p. 16, 9. — Prometheus Casmilus, Hubn. Exot. Samml.

Godart, qui ne connaissait ni les dessins de Jones, ni l'ouvrage de Donovan, « The Naturalists repository » est le premier auteur qui ait reconnu que le Papilio Cochrus de Fabricius, était une Castnie.

Elle a environ 11 centimètres. Ses ailes ont les nervures plus saillantes que dans aucune autre espèce, et sont proportionnellement plus allongées. Les supérieures sont d'un noir brun, traversées obliquement, au-delà du milieu, par une bande d'un blanc sale, coupée par les nervures, bordée en dedans par une raie noire très-faiblement sinuée.

Les ailes inférieures sont d'un noir obscur, marquées dans leur milieu d'une tache blanche assez grande, transversale, coupée par des nervures de la couleur du fond.

Le dessous des ailes est semblable au dessus.

Le corselet est d'un noir brun. La base de l'abdomen est noire; les cinq auneaux suivants sont rouges, avec les articulations noires, liserées par des écailles blanches. La poitrine est ponctuée de rouge.

La femelle ressemble complétement au mâle.

Cette belle Castnie se trouve au Brésil, d'où on la reçoit de temps en temps. Elle est encore assez rare.

### 30. C. MIMICA.

Felder, Novara, Exp. Zoolog. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 79, f. 4.

Cette belle espèce est la plus extraordinaire de toutes celles que l'on connaît; par ses ailes noires et par son abdomen marqué de taches rouges sur les côtés, elle rappelle certains *Papilio* de l'Amérique centrale.

Elle est de la taille de Cochrus, dont elle a un peu le port.

Ses ailes supérieures sont noires, sans reflet, avec l'extrémité un peu grisatre, coupée par les nervures.

Les ailes inférieures, d'un noir profond, sont marquées, un peu au-delà du milieu, d'une tache d'un jaune soufre, un peu transversale et un peu crénelée postérieurement.

La tête est noire avec les yeux bordés de blanc. Le corselet est également noir, marqué de chaque côté, vers l'insertion des ailes supérieures, d'un gros point d'un rouge sanguin.

L'abdomen est noir, avec une bande latérale d'un rouge sanguin, dentée régulièrement sur son côté dorsal.

Elle a été rapportée de l'Amazone et fait partie de la riche collection de M. Felder.

Nous ne disons rien du dessous, attendu que notre description est faite sur l'excellente figure donnée par M. Felder dans son bel ouvrage (Expédition zeologique de la Novara).

### 31. C. DECUSSATA.

God. Eac. meth. IX, p. 799, 10. — Walker, Heterocera, p. 29, 32. — G.-R. Gray, Synops. p. 146, 18. — Hubn. Zütr. fig. 639, 640.

Elle a de 6 à 6 1/2 centimètres. Elle est d'un noir-olivâtre chatoyant.

Les ailes supérieures ont deux bandes blanches en sautoir, dont l'inférieure, qui se prolonge presque jusqu'au born terminal, s'appuie, vers l'angle interne, sur deux croissants blancs disposés transversalement, outre cela, il y a près du sommet une bande courte, blanche, sinuée, composée de quatre taches de la même couleur.

Les ailes inférieures ont, un peu au-delà du milieu, une bande transverse, maculaire, blanche, formée de cinq taches dont la seconde est rejetée en dehors.

Le dessous des premières ailes ressemble au-dessus, sauf que le rameau inférieur de la bande en sautoir ne reparaît pas

Le dessous des secondes ailes est d'une teinte roussatre avec la bande maculaire, bordée en avant, par une raie sinueuse brune.

Nous l'avons reçue plusieurs fois du Brésil.

Cette Castnie est très-bien représentée par Hubner.

#### 32. C. STRIGATA.

Walker, Heterocera, p. 30, 35. — Custnia Godartii, Ménétriés, Enum. corp. animal. Mus. petropol. pl. 11, f. 4, p. 130, 1463.

Elle a de 6 à 6 1/2 centimètres. Ses quatre ailes sont noires, légèrement chatoyantes avec des taches et des bandes blanches à reflet nacré opalin, selon les aspects.

Les supérieures ont du côté de la base deux grosses raies longitudinales, une bande oblique de dedans en deltors, allant de la côte à la nervure médiane, puis deux rangées terminales de taches arroudies, dont la postérieure est presque interrompue dans son milieu, par deux ou trois très-petits points de sa couleur; elle se termine au sommet par deux petites taches; la rangée interne est tout à fait interrompue dans son milieu et terminée, près de la côte, par un groupe de trois petites taches allongées.

Les ailes inférieures offrent, un peu au-delà du milieu, deur rangées de taches, dont celles de la première série sont un peu plus grosses, oblongues et précédées vers le bord externe de deux petites taches fauves; l'angle anal et l'extrémité de la seconde rangée, vers l'angle externe, sont un peu fauves; la frange est roussatre.

Le corselet et l'abdomen sont d'un brun noirâtre. L'anus est un peu ferrugineux.

Le dessous des premières ailes offre à peu près le même dessin qu'en dessus, sauf que les deux bandes longitudinales sent réunies et que l'origine de la côte est d'un rouge ferrugineux.

Le dessous des secondes ailes est blanc avec deux bandes transverses ferrugineuses, entre lesquelles sont placées les deux rangées de taches blanches correspondant à celles de la face opposée.

Nous en avons reçu une paire du Brésil d'une pureté remarquable, où sa chenille, nous a-t-on dit, vit dans les Bulbes des Orchidées.

Nous regrettons beaucoup que M. Walker ait décrit cette espèce avant Ménétriés. Car nous aurions été bien heureux de lui conserver le nom de Godartii, qui rappelle celui de l'auteur de l'article Papillon de l'encyclopédie: ouvrage que nous considérons comme un véritable monument scientifique, surtout si on se reporte à l'époque où il a été écrit, et le peu de matériaux que feu notre ami Godart avait à sa disposition.

#### 33. C. ACTINOPHORUS.

Kollar, Lepid. Brasil. ann. Wien. pl. 13, f. 2. — Walker, Heterocera, p. 20, 32.

Elle a environ 7 centimètres. Ses ailes supérieures sont noires, rayonnées de vert obscur, avec la base et une bande courte prèdu sommet, d'un jaune clair.

Les ailes inférieures sont d'un rouge terne, avec des rayons et le limbe terminal noirs; ce dernier est en outre marqué d'une rangée de taches jaunes.

Décrite d'après Kollar qui l'indique comme habitant la province de Rio-Janeiro.

### 34. C. MYGDON.

Dalman, Monograph. p. 20, fig. 13.

Elle est à peu près de la taille de Licus, avec les ailes peu arrondies au sommet; elle a tout à fait le port de la Phalaris.

Ses ailes supérieures sont d'un brun olivâtre, à refiet verdâtre, avec une bande oblique d'un brun obscur, allant du milieu de la côte presque jusqu'à l'angle interne. Entre celle-ci et le sommet il y a une bande courte, bifide, de la même couleur, renfermant trois taches blanches sous-costales, séparées par les nervures; la base de l'aile est aussi assez largement d'un brun noirrâtre, ainsi que le bord terminal.

Les ailes inférieures sont noires, marquées au-delà du milieu, de deux rangées de petites taches un peu oblongues, d'un jaune d'ocre, dont celles de la première série sont mal alignées.

Le dessous des premières ailes est d'un blanc jaunâtre avec les bandes noires bien détachées.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun roux avec les deux rangées de taches comme en dessus, mais moins nettes.

Nous l'avons reçue du Brésil où elle est beaucoup moins répandue que la *Phalaris*.

Dans quelques individus on voit quelquesois deux ou trois points jaunes sur le disque des ailes inférieures.

La figure donnée par Dalman est très-exacte.

### 35. C. PHALARIS.

God. Enc. meth. IX, p. 799, 11. — Dalman, Monogr. p. 22, 15. — G. Gray, Synopsis.— Castnia Mygdon, Ménétriés, Enum. corp. animalamus. petrop. p. 88, 1483. — C. Mygdon, Gray, Synops. 148, 16. — Walker, Heterocera, p. 28, 30. — Pap. Phalaris, Fab. Ent. S. III, 1, p. 45, 138. — Pap. Mimon, Hubn. Ex. Sammi.

Elle a de 8 à 12 centimètres. Ses ailes supérieures sont d'un gris obscur, on d'un gris un peu blanchâtre, à reflet verdâtre; leur base est noirâtre; elles sont, en outre, marquées de deux bandes brunes, dont l'une se dirige du milieu de la oûte vers l'angle anal, et dont l'autre, assez rapprochée du sommet, est bifide, oblique en sens inverse, et coupe la première pour arriver au milieu du bord interne.

Les ailes inférieures sont d'un gris brunâtre jusqu'au-delà du milieu, ensuite plus ou moins noires, divisées par deux rangés parallèles de taches blanches, ou plutôt blanchâtres, dont celles de la première série sont plus grosses et un peu oblongues.

Le dessous des premières ailes est blanc avec les bandes noires bien détachées; la bande bifide renferme une tache blanche, et l'autre est marquée près de la côte, d'une tache annulaire plus ou moins nette, également de couleur blanche.

Le dessous des secondes ailes est grisâtre avec les taches moins bien indiquées qu'en dessus; le milieu de l'aile est traversé par une petite ligne noire flexueuse.

Cette espèce est la plus commune de toutes celles que l'on reçoit du Brésil.

Dalman ne l'avait pas vue, il la mentionne seulement d'après Fabricius.

Ménétriés, qui ne connaissait pas la Mygdon, y a rapporté à tort la Mimon de Hubner qui est hien la même que la Phalaris de Fabricius.

### 36. C. ARGUS. Boisd.

Elle a environ 12 centimètres. Ses ailes supérieures, pointus au sommet, sont d'une teinte brune obscure, qui oblitère en partie des bandes d'une couleur plus foncée, disposées comme dans les espèces précédentes, mais beaucoup moins distinctes; cependant on voit toujours dans la fissure de la bande bifide, trois petites taches blanches plus ou moins marquées, un peu confluentes.

Les ailes inférieures sont noires avec trois rangées parallèles de taches mal alignées, dont celles des deux premières séries sont blanches, plus ou moins cerclées de roux vif, et celles du bord marginal, qui sont presque ponctiformes, d'un fauve orangé, ainsi que la frange de l'angle anal.

Le dessous des ailes supérieures est d'un blanc un peu jaunâtre avec les bandes du dessus bien détachées en noir, et une tache blanche transversale dans la fissure de la bande bifide; la base et le bord terminal sont d'un roux brunâtre.

Le dessous des ailes inférieures est d'un gris brunâtre à reset vert, avec les taches du dessus obsolètes, reparaissant en blanc; la première rangée est précédée d'une raie maculaire trèsnoire. Le corps est brun avec l'anus rougeâtre.

Chez la femelle, on voit sur les secondes ailes, une tache fauve, entre le disque et la base.

Décrite sur deux individus très-purs, mâle et semelle, élevés ou pris au Brésil par Beske.

# 37. C. DIONÆA. Hopff. Neue Schm. pl. 5, fig. 3.

### Castnia Klugii, Boisd. M.

Elle a le port et la taille de la *Phalaris*. Ses ailes supérieures sont d'un brun plus ou moins foncé, chatoyant en vert, avec des bandes plus obscures, disposées comme dans la *Phalaris* et autres espèces du même groupe, mais se détachant assez mal du fond.

Les ailes inférieures sont noires à reflet verdâtre, avec une bande terminale d'un rouge orangé, couvrant tout le tiers postérieur de l'aile; cette bande est crénelée en avant et comme divisée en taches cunéiformes; en dehors elle est suivie d'une rangée marginale de points de sa couleur, renfermés entre deux petites lignes noirâtres.

Le dessous des premières ailes est rougeâtre avec les bandes noires bien indiquées, et une tache sous-costale blanchâtre, dans la fissure de celle qui est bifide.

Le dessous des secondes ailes est presque semblable à la face opposée, sauf que les deux tiers basilaires sont d'un brun rougeatre, au lieu d'être noirs comme en dessus.

L'anus est d'un rouge brique.

Cette Castnie est très-rare jusqu'à présent; nous n'en avons vu qu'un seul exemplaire, qui nous a été envoyé de l'intérieur du Brésil.

Nous avions dédié cette espèce à la mémoire du célèbre Entomologiste Friedrich Klug, de Berlin, dont la longue carrière scientifique a été si bien remplie. Ses travaux sur les Hyménoptères sont très-appréciés par tous les savants du monde, et serviront longtemps de modèle aux personnes qui s'occuperont de cet ordre. Klug s'est également occupé avec succès de Coléoptères, de Lépidoptères, etc.

### 38. C. Subvaria.

Walker, Catal. of the Lepid. Heterocera, p. 25, 24.

Elle a le port et la taille de la Dionæa, dont elle se rapproche un peu.

Ses ailes supérieures sont brunes à reflet vert, avec quelques grandes taches plus pâles que le fond, et deux ou trois petits points un peu transparents dans le voisinage du sommet.

Les ailes inférieures sont d'un brun-noirâtre chatoyant, avec une bordure fauve précédée d'une rangée de petites taches brunes un peu confluentes.

Le dessous des premières ailes est d'une couleur testacée, avec la base et le sommet brunâtres; on voit, en outre, sur le disque, deux bandes irrégulières noires.

Le corselet est brun. L'abdomen est également brun avec l'anus ferrugineux.

Elle habite le Brésil et fait partie de la collection du British Museum.

### 39. C. INCA.

Boisd. in Herrich-Scheeff. Samml. Aussereup. Schm. fig. 488, 489. — Walker, Heterocera, p. 24, 21. — Hopffer, Neue Schm. II, Heft, tab. IV, fig. 2.

Elle a da: 2 à 10 centimètres. Ses ailes supérieures sont d'une teinte brunâtre, plus ou moins foncée, avec des nuances et des taches plus obscures; elles sont traversées obliquement, du sommet au milieu du bord interne, par une ligne noirâtre, précédée, vers la côte, de trois petites taches transparentes, dont la première et la troisième sont ponctiformes; outre cela, elles offrent près de la côte, deux taches blanchâtres obsolètes, l'une ronde et l'autre irrégulière, vers l'origine apicale de la ligne transverse.

Les ailes inférieures sont noires, traversées dans leur milieu par une bande assez large, d'un orangé vif, coupée par des nervures noires, et marquée sur le bord externe d'une tache noire; le bord postérieur est divisé par un cordon de taches d'un blanc jaunatre, sauf les deux premières, qui sont orangées; en avant de ces taches on voit, dans le mâle, une série de cinq à sit points bleus.

Le dessous des premières ailes est fauve du côté de la base, avec deux taches jaunâtres sous-costales; à l'extrémité de la partie fauve, il y a trois ou quatre points noirs, alignés transversalement, dont un plus gros, pupillé de bleu.

Le dessous des secondes est d'un fauve grisatre, marqué, vers la base, d'une tache elliptique d'un gris jaunatre, environnée de brunâtre; les taches blanches du cordon terminal sont ternes, et précédées d'une rangée de gros points d'un bleu cendré.

La femelle a les ailes supérieures plus pâles, avec les caractères plus lisibles; la bande orangée des secondes ailes est plus large, non divisée par des nervures noires; les taches du cordon terminal sont orangées, excepté les deux dernières, qui sont plus ou moins d'un biane un peu jaunâtre; ces taches ne sont point précédées, comme dans le mâle, d'une série de points bleus, ni en dessus ni en dessous.

Cette jolie Castnie se trouve au Mexique aux environs d'Oajaca. C'est par erreur que M. Herrich-Schæsser lui donne le Brésil pour patrie, peut-être sur notre indication.

### 40. C. HARMODIUS.

Dalman, Monog. p. 11, 5. — G.-R. Gray, Synops. 143, 6. — Walker, Heterocera, p. 21, 13. — Pap. Harmodius, Cram. 223, C. D. — Papilio Syphax, Fab. E. S. III, 1, p. 45, 135. — Castnia Licas, Var. God. Enc. meth. IX, p. 797, 3.

A l'époque où Godart publiait le nouveau volume de l'Encyclopédis méthodique, les Musées et les Collections particulières étaient bien pauvres en Castnies. Il n'est donc pas très-étonnant que ce savant auteur, qui n'avait guère à sa disposition que les figures de l'ouvrage de Cramer, ait pris l'espèce dont il s'agit pour une variété de la Licus, à laquelle elle ressemble par ses ailes supérieures.

Elle a environ 10 centimètres. Ses ailes supérieures sont d'un brun noirâtre, avec la frange blanche et un léger reflet verdâtre; elles sont marquées de deux bandes blanches, dont la première presque droite, un peu atténuée inférieurement, descend du milieu de la côte à l'angle interne, et dont la seconde, courte, sinuée, maculaire, composée de cinq taches, est située vis-à-vis du sommet.

Les ailes inférieures sont brunes, avec une large bande ter-

minale rouge, coupée par les nervures, un peu sinuée en dedass, et dilatée vers l'angle anal; la frange est brune.

Le dessous des premières ailes est brun; il diffère du desses en ce que la bande flexueuse, maculaire, descend plus bas et est composée de huit taches.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun pâle, traversé au milieu par une bande noirâtre, obsolète; la bande terminale rouge est beaucoup moins tranchée qu'en dessus, plus étroite et un peu maculaire.

Décrite sur un très-bel exemplaire pris à Cayenne par Année. Ni Dalman, ni Godart n'ont vu cette espèce.

### 41. C. Licus.

Dalman, Monog. p. 13, 7. — G.—R. Gray, Synops. 143, 5. — Walker, Heterocera, p. 18, 5. — Cuv. Règne anim. Ins. pl. 145, f. 1. — Pop. Licus, Cram. 223, A. B. — Drury, Ins. I, pl. 145, f. 1-2. — Papilio Licus, Fab. Ent. S. III, 1, p. 47, 137. — Castnia Licas, God. Rnc. meth. II, p. 397, 3.

Elle a de 7 à 11 centimètres. Ses ailes supérieures sont d'un noir-brun plus ou moins clair, chatoyant en vert-selon les aspects, avec deux bandes blanches ou d'un blanc un peu enfumé, dont la première, presque droite; un peu atténuée inférieurement, descend du milieu de la côte à l'angle interne, et dont la seconde, courte, sinuée, un peu maculaire, composée de six taches, est située vis à vis du sommet; la frange est un peu blanche du coté de l'angle interne.

Les ailes inférieures sont d'un brun noir, traversées dans leur milieu par une bande hlanche, rétrécie antérieurement et s'élargissant insensiblement pour gagner l'angle anal; en arrière de cette bande, près du bord terminal, il y a une rangée de cinq à six taches rouges, dont les trois du milieu sont plus grosses; la frange est blanche dans ses deux tiers extérieurs.

Le dessous des ailes supérieures est d'un brun pâle à la base et au sommet, avec les deux bandes blanches comme en dessus, mais ici la bande sinuée n'est plus maculaire; il y a en outre en dehors de cette bande, un peu plus bas, une rangée de trois points blancs dont l'inférieur est quelquefois pupillé d'un peu de rouge.

Le dessous des ailes inférieures est d'un gris légèrement bru-

nâtre avec la bande blanche comme en dessus; les taches rouges du dessus reparaissent à peine et sont très-obsolètes.

On rencontre quelquesois des semelles, dont les ailes supérieures, d'un brun grisâtre, sont presque dépourvues en dessus de la bande sinuée de l'extrémité.

Cette espèce est l'une des plus communes, elle habite presque toute l'Amérique intertropicale. Sa chenille n'est pas très-rare dans les bulbes des Orchidées.

Cramer a donné la figure d'un individu de Surinam qui est dépourvu, en dessus, de la bande blanche sinuée du sommet, il fait le gassage à l'espèce suivante.

C'est bien la Castnia Licus que M<sup>11e</sup> de Merian Ins. Surin. a représentée sur la table 36, mais la chenille qu'elle donne comme produisant cette espèce est une chenille de fantaisie qui appartient peut-être à quelque espèce de Pavonides.

### 42. C. LICOIDES.

Licus, Hubn. Exot. Schm.

Elle a tout à fait le port et la taille de l'espèce précédente, dont elle est très-voisine, mais la massue de ses antennes est juine. Ses ailes supérieures sont de même d'un brun-noir chatoyant en vert, avec une bande linéaire blanche dentés en dehors, allant du milieu de la côte à l'angle anal. Il n'y a pas de bande sinuée à l'extrémité; la frange est blanche.

Les ailes inférieures sont d'un noir brun, traversées dans leur milieu par une bande blanche, à reflet un peu violet, dentée en dehors, s'élargissant insensiblement pour arriver à l'angle anal; le bord terminal est divisé par un cordon de sept taches rouges dont l'anale est double et plus petite.

Le dessous des ailes supérieures est brun avec la bande blanche sinuée dans su partie antérieure; on retrouve sur cette face la bande flexueuse de Licus, mais elle est plus étroite et plus éloignée du sommet; les trois ou quatre petites taches blanches du bord marginal sont comme chez les espèces voisines.

Le dessous des ailes inférieures est à peu près comme dans Licus, sauf que les taches rouges du bord terminal sont à peu près aussi indiquées qu'en dessus.

Elle habite la province de Sainte-Catherine au Brésil.

Plus rare que l'espèce précédente. - Coll. Bd.

#### 43. C. ATYMNIUS.

Dalman, Monograph. p. 12, 6. — Gray, Synops. p. 142, 3. — Walker, Heterocera, p. 17, 3. — Boisd. Cons. sur les Lépid. du Guatemai, p. 75. — C. Spixii, Perty, Delect. pl. 31, f. 8.

Elle est un peu plus grande que la Licus dont elle a le port. Ses antennes ont toute la massue d'un jaune testacé. Ses alles sont d'un noir foncé, à reflet d'un vert olive.

Les supérieures sont traversées, du milieu de la côte à l'angle interne, par une bande blanche à peu près comme dans *Lieu*s; elle sont toujours dépourvues de la bande maculaire, sinuée, qui existe chez les espèces voisines.

Les ailes inférieures sont traversées dans leur milieu par une bande d'un blanc pur, qui s'élargit insensiblement pour arriver à l'angle anal.

Le dessous des ailes supérieures est noir au milieu, brun à la base et à l'extrémité, avec la bande blanche comme en dessus; l'extrémité est marquée d'une raie flexueuse, maculaire, également blanche, composée de deux gros points, puis de trois autres beaucoup plus petits; en dehors de ceux-ci, près du bord terminal, il y a, comme dans les espèces du même groupe, trois su quatre points alignés.

Le dessous des ailes inférieures est d'un gris légèrement brunâtre, avec la même baude blanche qu'en dessus.

Cette espèce et les deux suivantes sont dépourvues de taches rouges à l'extrémité des ailes inférieures.

Elle se trouve au Brésil. M. de l'Orza nous en a communiqué un individu comme venant du Guatemala.

## 44. C. HUMBOLDTI. Boisd.

Elle est un peu plus grande que l'Alymnius avec les ailes plus pointues au sommet.

Les supérieures sont d'un brun noirâtre, avec un reflet olivaire très-prononcé; elles sont traversées, du milieu de la côte à l'angle anal, par une bande blanche, atténuée inférieurement; elles ont, en outre, du côté du sommet, une bande courte, flexueux, maculaire, bien nette, composée de cinq taches un peu oblongues.

Les ailes inférieures sont d'un brun roux à leur extrémié, traversées par une bande d'un blanc pur, sinuée en dedans, et s'élargissant insensiblement pour arriver à l'angle anal; leur frange est entièrement blanche.

Le dessous des premières ailes offre le même dessin qu'en dessus, mais la bande sinueuse qui précède le sommet est un peu moins maculaire qu'en dessus, et les trois points situés près du bord terminal sont plus gros que dans les espèces voisines.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris brun avec la bande blanche comme sur la face opposée; il y a, en outre, sur le disque, un petit œil blanchâtre, cerclé de brun : caractère que nous n'avons observé dans aucune autre espèce.

Les antennes ont la massue ferrugineuse.

Cette belle espèce que nous dédions à la mémoire du célèbre Alexandre de Humboldt, a été trouvée à la Nouvelle-Grenade.

Coll. Bd. Très-rare.

## 45. C. SALASIA. Boisd.

Elle est de la taille de l'Atymnius, avec les ailes plus pointues au sommet.

Les supérieures sont d'un noir brunâtre, à reflet verdâtre; elles sont marquées d'une bande linéaire très-étroite, ou plutôt d'une raie enfumée, allant du milieu de la côte à l'angle interne; on voit, en outre, vers le sommet, mais très-faiblement, l'empreinte de la bande sinuée du dessous.

Les ailes inférieures sont noires vers la base, avec un reflet vert, brunes à l'extrémité à reflet rougeâtre; elles sont traversées, comme dans les espèces du même groupe, par une bande d'un blanc pur, mais à reflet violâtre, légèrement sinuée en dedans, et s'élargissant insensiblement pour gagner l'angle anal.

Le dessous des premières ailes est marqué d'une bande blanche bieu indiquée, ainsi que la petite bande sinuée du sommet; dans cette espèce, la série de points manque le long du bord terminal; l'angle interne a un reflet rougeâtre.

Les secondes ailes ont la même bande blanche qu'en dessus, coupée par les nervures; leur extrémité est très-chatoyante.

La frange des quatre ailes est entièrement noire.

Décrite sur un bel exemplaire unique que nous avons reçu du Mexique.

Coll. Bd.

## 46. C. INVARIA.

Walker, Heterocera, p. 23, 19.

Elle est d'un brun noirâtre, avec un reflet d'un bleu verdâtre. Ses ailes supérieures sont marquées de trois bandes transparentes, dont deux obliques et la troisième courte, verticale, située près du sommet.

Les ailes inférieures sont ferrugineuses avec la base blanchétre; elles sont traversées par une bande maculaire, transparente, assez courte, formée de taches oblongues, et suivie d'une bande noire plus courte encore; la bordure est noire, marquée de deux ou trois taches ferrugineuses.

L'abdomen est d'un jaune testacé.

Cette rare Castnie habite le Brésil et fait partie du British Museum,

#### 47. C. CHELONE.

Hopffer, Neue Schm. II, Heft, tab. IV, fig. 1-2.

Le mâle a 7 centimètres et la femelle Dentimètres d'envergure. Chez le premier, les ailes supérieures sont grises, à reflet verdâtre, avec deux bandes transversales assez larges, d'un gris plus clair, tirant un peu sur le jaunâtre; la première de ces bandes est sinuée, placée vers le milieu, élargie inférieurement, ne touchant ni le bord costal ni le bord interne; la seconde, beaucoup plus courte, est située entre la première et le sommet, et ne descend pas plus bas que la nervure médiane.

Les ailes inférieures sont noires avec la base et le bord marginal grisâtres; elles sont traversées par deux raies blanches irrégulières.

Chez la femelle, les deux bandes des ailes supérieures sont d'un blanc lavé de grisatre, bien indiquées; sur ses ailes inférieures, l'intervalle entre les deux raies transverses irrégulières, est d'un blanc grisatre.

Le dessous des ailes, dans les deux sexes, est traversé par des bandes grises et par des bandes noires.

Le corselet est de la couleur des ailes supérieures et a de même un reflet d'un vert bleuâtre. L'abdomen est gris avec les articulations noirâtres. Cette belle espèce a été rapportée du Mexique et fait partie du musée de Berlin.

#### 48. C. TRICOLOR.

Felder, Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2. — C. Diez, Butter, Lepid. exotica, pl. 17, f. 1, 2.

M. Butler a figuré sous le nom de Diva, le mâle de la C. Tricolor de M. Felder. Ce dernier sexe a environ 8 1/2 centimètres d'envergure; le mâle est d'un tiers plus petit. Ses ailes supérieures, un peu aigués au sommet, sont bruncs, traversées obliquement, du milieu de la côte au bord interne, par une large bande irrégulière, d'un roux ferrugineux, un peu interrompue; cette même bande est coupée, dans sa partie supérieure, par une rangée de quatre petites taches d'un blanc un peu transparent, il y a, en outre, dans la cellule discoïdale, un gros point de la même couleur; on volt encore deux taches d'un jaune pâle près de l'angle anal, et une petite liture ferrugineuse près de la côte, vers le sommet.

Les ailes inférieures sont noires avec un très-beau reflet bleu, et une bordure d'un fauve orangé, un peu crénelée en dedans; la frange est d'un brun noir.

Le dessous des ailes supérieures offre un reflet bleu à la base; ici la bande oblique est beaucoup plus nette et le bord marginal varié de ferrugineux.

Le dessous des ailes inférieures est d'un brun roussâtre, avec une tache discoïdale d'un fauve ferrugineux, et la bordure plus terne qu'en dessus, mais divisée par une rangée de cinq à six taches jaunâtres.

Cher la femelle, la bande ferrugineuse des premières ailes est plus nette, non interrompue, avec les taches blanches plus nombreuses.

Nous l'avons reçue de l'Amérique centrale. - Coll. Bd.

M. Felder en a donné une très-belle figure.

#### 49. C. HECATE.

Boisd. in Herrich-Schæff. Samml. Aussereurop. Schm. fig. 430.

Elle a près de 8 centimètres. Ses ailes supérieures sont d'un brun uniforme, un peu roussâtre, chatoyant, avec deux bandes

blanches, dont l'une, oblique, part presque du sommet pour arriver au bord interne, avant lequel elle devient bifide; cette bande commence par trois petites taches transparentes, et se continue en formant des petits anneaux réunis en chaînettes; la seconde bande, qui est oblique en sens inverse, prend naissance au milieu de la côte et se termine en s'anastomosant avec l'autre.

Les ailes inférieures sont d'un fauve-orangé vif, traversées, un peu au-delà du milieu, par une bande noire, un peu sinuée en avant, dentelée en arrière et se prolongeant sur les nervures jusqu'à la bordure, qui est brunâtre et très-étroite.

Le dessous des premières ailes est fauve, avec le sommet noirâtre et l'empreinte des bandes de la face opposée; les trois petites taches transparentes sont aussi bien indiquées qu'en dessus.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun-grisatre pale, avec une bande transversale, plus obscure, correspondant à celle du dessus.

Nous ne savons pas au juste de quelle contrée de l'Amérique méridionale provient l'unique exemplaire qui existe danz notre collection.

M. Herrich-Schæffer en a donné une excellente figure.

#### 50. C. CIELA.

Boisd. in Herrich-Schæffer, Samml. Aussereurop. Schm. fig. 486-487.

Elle a environ 8 centimètres. Ses ailes supérieures sont d'un gris-blanchâtre chatoyant en vert ou en violet, avec la base, le bord terminal, une grosse tache sous-costale et une bande transversale de couleur brune; la bande transversale située sur le tiers postérieur est sinuée; elle se dilate sur la côte et sur le bord interne, de sorte qu'elle est un peu étranglée dans son milieu.

Les ailes inférieures sont d'une belle couleur orange, avec un arc discoïdal noir; leur tiers postérieur est marqué d'une rangée de taches, un peu oblongues, un peu plus pâles que le fond, séparées par des nervures noires et renfermées entre deux lignes ondulées, d'un noir foncé.

Le dessous des premières ailes est d'un jaune un peu fauve, avec les bandes et taches du dessus dessinées en blanc lavé de jaune.



Le dessous des secondes est d'un brun-grisatre pale; la moitié postérieure est blanchâtre, avec les mêmes taches que sur la face opposée, sauf qu'ici elles sont d'un blanc grisatre.

Cette espèce est encore assez rare. Nous l'avons reçue de Bahia et de Pernambuco.

La figure donnée par M. Herrich-Schæsser est parsaite.

#### 51. C. SATRAPES.

Kollar, Lepid. Bras. ann. Wien. pl. 13, f. 1. — Walker, Catalog. of Heterocera, p. 33.

Elle a 7 1/2 centimètres. Ses ailes supérieures sont d'une couleur olivâtre foncée, à reflet verdâtre, marquées de deux bandes d'un blanc un peu violâtre, légèrement saupoudrées d'atomes olivâtres; la première de ces bandes couvre le bord interne; elle est un peu semi-lunaire, divisée transversalement par une raie interrompue de la couleur du fond; la seconde bande est oblique, sinuée et se dirigeant, du tiers postérieur de la côte, au milieu du bord terminal qu'elle n'atteint pas complétement.

Les ailes inférieures sont d'un jaune d'ocre, avec les nervures noires; le bord terminal est largement d'un noir profond, divisé près de la frange, par une série de petites lunules d'un jaune d'ocre.

Le dessous des ailes supérieures offre sur un fond brun les mêmes taches qu'en dessus, mais d'un jaune d'ocre, avec l'origine de la côte d'un rouge un peu ferrugineux.

Le dessous des ailes inférieures diffère du dessus, en ce que la bordure est ferrugineuse en avant dans toute sa longueur, et divisée par deux rangées de lunules dont les antérieures sont bleuâtres et plus petites, et les autres d'un jaune d'ocre correspondant à celles de la face opposée.

Le corselet est d'un brun olivâtre. L'abdomen est d'un jauned'ocre pâle, avec le dos un peu grisâtre.

Nous devons cette Castnie à la munificence de M. Deyrolle qui l'avait reçue du Brésil. Elle est rare, nous n'en avons vu que deux exemplaires.

# 52. C. CRONIS.

Dalman, Monograph. p. 23, 16. — God. Enc. meth. IX, p. 801, 17. — Gray, Synops. 146, 21. — Walker, Heterocera, p. 30, 36. — Papilie Cronis Q Cram. 178, A.

Nous n'avons jamais vu cette espèce de Surinam, qui n'existe, à notre connaissance, dans aucune collection en France. Il y en a un exemplaire en Angleterre, éclos, nous a dit Ed. Doubleday, dans une serre chaude où l'on cultivait des plantes tropicales. Il n'est pas douteux dans ce cas, que la chenille ou la chrysalide n'ait été transportée de la Guyane en Europe avec quelque bananier ou autres plantes.

D'après la figure 178 de Cramer, les ailes supérieures sont noîres avec des taches blanches disposées ainsi : une très-grande, lougitudinale, sur le disque, une beaucoup moins grande vers le milieu de la côte, et les autres beaucoup plus petites disposées sur trois rangées, dont la première est incomplète, formée de trois taches, dont la seconde est composée de neuf taches bien alignées, et enfin dont la troisième, placée presque sur la frange, est formée de points. Outre cela, l'origine de la côte est rouge.

Les ailes inférieures sont d'un blanc jaunâtre, avec une trèspetite bordure noirâtre, crénelée.

Le dessous, selon Cramer, est semblable au dessus; ce qui est d'autant plus probable que dans la *Cronida* qui en est très-voisine, les deux faces se ressemblent.

Le corselet est noir marqué de deux points rouges. L'abdomen est de la couleur des secondes ailes.

Cramer a donné pl. 60, fig. C, la figure d'un individu qu'il dit être le mâle, et que Godart a décrit sous le nom de Pieris Cronisse, et nous-même, dans notre species, sous celui de Pieris Cronis. Il est bien évident que par les antennes et les ailes inférieures, et individu est une véritable Piéride, tandis que ses ailes suprieures ont tous les caractères de la Castnia Cronis; c'est ce qui nous fait croire aujourd'hui que Cramer a été victime d'une mytification. Voilà selon nous ce qui est arrivé: un mâle de la Castnie dont il s'agit a eu la tête et la partie postérieure détruites par un accident, et un amateur, sans y attacher la moindre importance, l'a réparé en lui substituant la tête et la partie postérieure d'une Piéride.

Dalman et Godart n'ont pas été plus heureux que nous, ils n'ont jamais vu la C. Cronis.

## 53. C. CRONIDA.

Herrich-Schæffer, Samml. Aussereurop. Schm. fig. 142.

Le mâle a 8 1/2 et la femelle 10 1/2 centimètres. Elle est voisine de la *Cronis* de Cramer.

Ses ailes supérieures sont noires avec des taches blanches disposées à peu près comme dans la *Cronis*, savoir : une très-grande longitudinale sur le milieu, une médiocrement grande sur la côte, et les autres plus petites à l'extrémité; ces dernières sont alignées, au nombre de quatre ou de cinq seulement, et sont précédées vers le sommet de trois autres taches blanches allongées; il y a, en outre, sur les nervures, une série de petits points blancs, très-peu indiqués; l'origine de la côte est rouge comme dans la *Cronis*.

Les ailes inférieures sont d'un blanc un peu jaunâtre avec une large bordure noire, divisée par un cordon de gros points d'un blanc un peu jaunâtre.

Le dessous des ailes est semblable au dessus, sauf que la tache discoïdale des ailes supérieures occupe plus d'étendue.

Le corselet est noir, marqué de deux points rouges, avec le collier blanc, interrompu. L'abdomen est d'un blanc jaunâtre de part et d'autre, avec l'extrémité anale d'un jaune d'ocre.

La femelle ne diffère du mâle que par sa taille plus grande et par la bordure des ailes inférieures plus large avec les points plus gros.

M. Herrich-Schæffer a figuré le mâle sur un exemplaire de Surinam appartenant au Museum de Stuttgard. Nous devons à l'obligeance de M. Depuiset une très-belle femelle prise dans la Guyane française.

Nous regardons cette Castnie comme fort rare.

#### GENRE CERETES.

Castnia, Dalman, Godart, Gray, Walker, Papilio, Pabricius.

Chemilles: Inconnues.

Insecte parfait : Tête petite, pourvue de deux stemmates.

Antennes de longueur moyenne, ayant une longue massee fusiforme, se terminant en pointe. Palpes très-velus, appliqués fortement sur le front, non divergents, à articles indistincts. Corselet assez robuste. Abdomen assez fort, cylindrico-conique, ne dépassant pas les ailes inférieures. Ailes larges; les supérieures un peu sinuées sur leur bord extérieur, avec le sommet un peu pointu; les inférieures ayant les deux nervures médianes très-rapprochées et coudées en sens inverse, mais ne se joignant pas pour former une cellule fermée.

Les espèces de ce petit groupe ont en dessous, sur une bande discoïdale, quelques points blancs. Elles sont toutes du Brésil.

#### 1. C. CHREMES.

Walker, Heterocera, p. 31, 37. — Papilio Chromes, Fab. Ent. S. III, 1, 47, 144. — Castnia Nicon, Gray, Synops. p. 148, 38. — Nicon, Hubs. Exot. Schm. — Castnia Thalaira, God. Enc. meth. IX, p. 800, 14.

Quoique cette Castnie soit assez bien décrite par Fabricius, personne, jusqu'à présent, ne l'avait reconnue, d'autant plus que cet auteur lui denne l'Afrique pour patrie. M. Walker, qui a en la bonne fortune de pouvoir consulter les *Icones de Jones*, est le premier qui lui ait restitué son véritable nom. Godart la prenant pour la *Thais* de Drury, lui a donné le nom de *Thalaira*, parce que Fabricius, dans sa Mantissa, avait déjà donné le nom de *Thais* à un Lépidoptère diurne!

Le mâle a 8 et la femelle 9 centimètres. Le premier est d'un noir-bleuâtre chatoyant en vert, avec des bandes transverses obscures, alternant avec des bandes d'un grisâtre un peu incarnat.

Les ailes inférieures sont d'un noir bleu très-chatoyant, avec une bordure rouge commençant à l'angle externe, et se terminant brusquement, bien avant d'arriver à l'angle anal.

Le dessous des premières ailes est brun à reflet violet, avec une bande orangée, très-largement bifide.

Le dessous des secondes ailes est d'un roux brunâtre très-chatoyant, avec deux bandes ferrugineuses un peu obsolètes, situées au-delà du milieu, dont la première est précédée d'un ou de deux points blancs. Le corselet et l'abdomen participent de la couleur des ailes.

La femelle (Thalairs Godart) a les ailes supérieures d'un brunolivâtre chatoyant en vert, avec la base et deux bandes obliques d'un gris incarnat.

Les ailes inférieures sont rouges, avec deux bandes et le bord marginal noirs; la première de ces deux bandes est sinuée; il y a en outre, entre toutes les deux et le bord marginal, des nervures poires.

Le dessous des premières ailes est rouge à la base, ensuite d'un rouge orangé, avec deux bandes noires et l'extrémité brune.

Le dessous des secondes ailes est d'un rouge briqueté, avec deux bandes brunâtres, obsolètes, dont l'antérieure est marquée de quatre à cinq points blancs.

Nous avons reçu du Brésil plusieurs exemplaires des deux sexes parfaitement frais.

Fabricius et Godart n'ont connu que la femelle.

#### 2. C. THAIS.

Papilio Thais, Drury, III, pl. 16, f. 4.

Elle a de 5 à 5 1/2 centimètres. Au premier aspect, elle offre un grand rapport avec la femelle de Fabricii. Les ailes supérieures sont à peu près du même ton, mais les bandes transverses ont une toute autre forme. Celle du milieu, au lieu d'être droite, est courbe, sinuée, anguleuse, interrompue, et couvre quelquefois une partie de la base, la suivante est un peu courbe, très-régulière, allant du tiers postérieur de la côte à l'angle anal; le bord terminal a la bordure d'un brun ferrugineux comme les bandes transverses.

Les ailes inférieures sont d'un rouge-briqueté vif, avec deux bandes noires, étroites, dont l'antérieure un peu coudée, et la seconde non interroinpue; le bord terminal est un peu noir près de la frange, ainsi que les nervures.

Le dessous des premières ailes est d'un ronge-briqueté pâle, avec la première bande du dessus, un peu sinuée et obsolète, tandis que la seconde est noire, bien marquée, très-régulière, non bifide et interrompue comme dans la Fabricii.

Le dessous des secondes ailes est d'un fauve orangé, avec la trace de deux bandes transverses un peu plus obscures, dont l'antérieure est marquée de deux petits points blancs. Le corps est brun en dessus et rougeatre en dessous.

Nous possédons seulement une femelle; nous ignorons comment est le mâle, qui offre peut-être une toute autre couleur. La figure donnée par Drury est très-exacte.

Du Brésil.

#### 3. C. FABRICII.

God. Enc. meth. IX, p. 800, 15.—Le mâle Castnia Marceleures, God. Enc. meth. IX, p. 800, 16. — Hubn. ? Züt. fig. 711-712. — La femelle Thais, Gray, Synops. 148, 20.

Godart a décrit la femelle de cette espèce sous le nom de Febricti, et dans le n° suivant le mâle sous celui de Marcelserre.

Elle a 6 à 7 1/2 centimètres. Le mâle est d'un gris-violàtre obscur, chatoyant, avec des bandes transverses brunes au nombre de trois, l'une vers la base peu marquée, la seconde à peu près droite, allant du milieu de la côte au bord interne, la suivante courbe, anguleuse, souvent un peu interrompue et formant une espèce de tache isolée qui tend à se réunir à la bande précèdente.

Les ailes inférieures sont peut-être un peu plus obscures que les supérieures, traversées, au-delà du milieu, par deux bandes brunes, dont l'antérieure souvent peu indiquée, et la seconde maculaire, placée sur une rangée de taches cunéiformes renversées, d'un blanc sale; la bordure est noirâtre, avec la frange blanchâtre.

Le dessous des premières ailes est d'un gris chatoyant en violet, avec l'extrémité d'un brun noir, divisée par une bande bifide, maculaire, blanchâtre.

Le dessous des secondes ailes est d'un gris légèrement rougeâtre, avec trois lignes transversales, ondulées, noirâtres, un peu obsolètes, dont l'antérieure est marquée d'un point blanc; outre cela il y a toujours un point noir vers le milieu de la côte.

Le corps est brunâtre en dessus et d'un gris blanchâtre en dessous.

La femelle, C. Fabricii Godart, est tantôt de la taille du mâle et tantôt un peu plus petite. Le dessus de ses ailes supérieures est d'un gris-roussâtre un peu incarnat, avec les mêmes bandes brunes que chez le mâle.

Le dessus des ailes inférieures est d'un rouge-brique un peu orangé, traversé un peu au-delà du milieu, par deux bandes noires, plus ou moins maculaires; elles ont en outre une bordure crénelée noire.

Le dessous des quatre ailes est d'un rouge brique pâle, avec l'empreinte plus ou moins nette des bandes du dessus.

Celui des inférieures offre sur le milieu de la côte, comme dans le mâle, un point brun, et sur la raie transversale antérieure, un point blanc; la frange et le dessous du corps sont d'un rouge-orangé sale.

Nous avons reçu mâle et femelle de la province de Minas Geraes au Brésil.

La figure du mâle donnée par Huhner d'après un exemplaire de la collection de Franck est très-mauvaise.

Godart a pris la femelle de cette Castnie pour l'espèce figurée par Swainson sous le nom de Fabricii, laquelle doit être rapportée à la Nicon de Hubner.

M. Gray réunit à tort comme femelle la *Thais* de Drury à la *Marcelserres* de Godart. Ménétriés fait à son tour une autre erreur, en supposant, que probablement, la *Thais* de Drury appartient à la *Thaisira* de Godart. Il ignorait sans doute que cette *Thaiaira* n'est rien autre que la femelle de *Chremes*, et que la *Thais* de Drury est une toute autre espèce.

Pour la Castnie en question nous avions à choisir entre deux noms de naturalistes; nous avons opté pour celui du plus célèbre.

#### GENRE ORTHIA.

Castnin, Dalman, Godart, Gray, Walker, Boisd. olim.

Chenilles: Ayant les mêmes mœurs que celles des Castnia, vivant de même dans l'intérieur des végétaux.

Insecte parfait: Tête petite, pourvue de deux stemmates. Antennes proportionnellement assez longues, en massue fusiforme, terminée par une petite pointe. Palpes trèsvelus, très-courts, à articles indistincts. Corselet peu développé. Abdomen cylindroïde, peu robuste, ne dépassant pas les ailes inférieures. Ailes allongées, assez étroites; les inférieures ayant près de la base une petite cellule elliptique fermée.

÷

#### 1. O. THERAPION.

Kollar, Lepid. Bras. Ann. Wien. 13, f. 3. — C. Paradoxe. Boisd. in Herrich-Schæffer, Samml. Aussereurop. Schm. f. 16, 17.

Elle a 7 1/2 centimètres. Ses ailes supérieures sont d'un roux ferrugineux, traversées obliquement, du tiers antérieur du bord interne jusque vers le sommet, par une ligne brune bieu écrite; cette ligne se courbe un peu en arrivant à la côte et est précédée en dedans, sous le milieu de la côte, de deux taches transverses, de sa couleur; outre cela, le milieu du bord interne est un peu rembruni, et on voit près du sommet un très-petit point blanc ocellé.

Les ailes inférieures sont d'un rouge un peu fauve, avec une bordure noire de largeur moyenne.

Le dessous des quatre ailes est d'un rouge fauve : celui des supérieures offre la trace du dessin du dessus ; celui des inférieures a la bande noire terminale, divisée par une rangée de taches d'un jaune d'ocre, coupées transversalement par une trèspetite ligne noire.

La femelle, que nous avons prêtée à M. Herrich-Schæffer qui en a donné une très-bonne figure, diffère seulement du mâle en ce que la bande marginale des secondes ailes est divisée en dessus, par une série de petites taches d'un jaune d'ocre.

Elle se trouve au Brésil où elle paraît être assez rare, car depuis plus de treute années nous n'en avons obtenu que trois individus.

## 2. O. ACRÆOIDES.

Boisd. Spec. gen. pl. 14, f. 1. — G.-R. Gray, Synops. 148, 27. — Walker, Heterocera, p. 32, 40.

Elle a de 6 à 7 centimètres. Cette espèce ressemble par le port et par le facies à l'Acræa Thalia. Ses ailes supérieures sont d'un fauve-roussatre terne, depuis la base jusqu'au-delà du milieu, et ensuite brunâtre jusqu'au bout, avec toutes les nervures noirâtres et bien marquées; outre cela, elles ont sur la partie brunâtre, comme dans l'Acræa Thalia, une bande transverse, d'un jauxe d'ocre, assez courte, coupée par les nervures.

Les ailes inférieures sont fauves, avec les nervures noires, un

peu dilatées; la bordure est également noire, divisée par une rangée de points jaunâtres plus ou moins indiqués.

Le dessous des ailes supérieures diffère du dessus en ce qu'il y a à la base, près de la côte, un espace plus fauve que la couleur du fond.

Le dessous des ailes inférieures est comme la face opposée, sauf que les points qui divisent la bande marginale sont beaucoup mieux marqués, plus gros et presque en forme de petites lunules.

Le corselet et l'abdomen sont bruns en dessus; le ventre a les anneaux jaunâtres avec les articulations noires.

Nous avons vu plus d'une fois, dans certaines collections, cette Castnie confondue avec l'Acræa Thalia. Elle n'est pas très-rare au Brésil, où sa chenille vit, dit-on, dans certaines espèces de Broméliacées.

#

#### 3. O. PELASGUS.

Dalman, Monograp. p. 21, 14. — God. Enc. meth. IX, p. 801, 18. — G.-B. Gray, Synop. 146, 20. — Walker, Heterocera, p. 22, 16. — Papillo Pelasgus, Fab. Ent. Syst. III, 1, p. 46, 139.

Elle a 6 centimètres. Ses ailes sont noires avec un beau reflet bleu, ou d'un bleu tirant sur le vert.

Les supérieures sont traversées, du milieu de la côte à l'angle interne, par une bande d'un jaune d'ocre, un peu dilatée dans son milieu et un peu recourbée à son extrémité inférieure.

Les ailes inférieures sont sans taches.

Le dessous des quatre ailes a le même reflet bleu qu'en dessus; la bande jaune est comme en dessus, mais un peu plus large.

Le corselet et l'abdomen sont d'un noir bleuâtre. Les pattes sont rougeâtres.

Nous en avons reçu une paire très-fraiche de la Guyane.

Jusqu'à présent, la plupart des auteurs qui avaient parlé de cette espèce, y compris Fabricius, ne l'avaient jamais vue en nature. Leurs diagnoses et leurs descriptions sont faites d'après la figure qu'en a donnée Cramer.

## 4. O. UNIFASCIATA.

Felder, Novara, Exped. Zoolog. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 79, £ 5.

Elle est un peu plus petite que *Pelasgus*, dont elle a tout à fait le port.

Ses ailes supérieures sont noires, à reflet d'un noir bronzé; elles sont traversées, du milieu de la côte à l'angle interne, par une bande un peu arquée, d'un blanc pur, à peu près semblable pour la forme à la bande jaune de *Pelasgus*; la frange est blanchâtre.

Les ailes inférieures sont sans taches, d'un noir à reflet bleu. Le dessous des quatre ailes est semblable à la face opposée.

Le corselet et l'abdomen sont d'une teinte bronzée. Les pattes sont noirâtres.

Elle se trouve dans l'Amazone, où elle est très-rare.

#### 5. O. Augias.

Boisd. in Herrich-Schæff. Samml. Aussereurop. Schm. f. 18.

Elle a à peine 5 centimètres. Ses quatre ailes sont noires sans aucun reflet.

Ses ailes supérieures, dont les nervures forment des stries grisâtres longitudinales, sont traversées, du milieu de la côte à l'angle interne, par une bande d'un jaune d'ocre, très-droite.

Les ailes inférieures sont sans taches avec les nervures un peuplus claires.

Le dessous des quatre ailes est comme le dessus, sans le moindre reflet, avec les nervures plus claires que le fond, et la bande jaune comme en dessus, mais un peu plus large.

Le corselet et l'abdomen sont noirs. Les cuisses de la première paire de pattes sont garnies de poils jaunes.

Nous en avons reçu une paire de la province de Rio-Janeiro.

M. Herrich-Schæffer n'a jamais vu en nature la véritable Pelasgus de Cramer, car s'il l'avait connue, il n'y aurait pas, dans son Index, rapporté, par correction, l'Augias, dont les ailes sont beaucoup plus étroites, sans le moindre reflet, avec des nervures d'un brun grisâtre, comme dans plusieurs espèces de Limnas.

#### 6. O. NEXA. Boisd.

Elle a le port et la taille de l'espèce précédente.

Ses quatre ailes sont d'un noir terne, sans aucun reflet, avec l'extrémité des nervures grisatre, comme ches Augias.

Les ailes supérieures sont traversées, du milieu de la côte à l'angle interne, par une bande d'un jaune-d'ocre très-pâle, un peu recourbée à son extrémité, comme dans *Pelasgus*.

Les ailes inférieures sont sans taches.

Le dessous des quatre ailes est semblable au dessus, seulement les supérieures sont piquées de grisatre le long de la côte.

Le corselet et l'abdomen sont noirs; les cuisses de la première paire de pattes sont garnies de quelques poils jaunes, comme dans l'espèce précédente.

Nous ne possédons qu'un seul individu femelle, dont nous ignorons la proyenance.

Cette espèce pourrait bien être une variété semelle d'Augias. Elle n'en diffère que par la bande des ailes supérieures, notablement plus pâle, formant un tant soit peu le crochet à son extrémité inférieure, et par le dessous des ailes supérieures, dont la côte est piquée de gris.

#### GENRE GAZERA.

Castnia, Godart, - Dalman, Gray, Walker.

Les chenilles ont les mêmes habitudes que celles des Castnies. Selon M. Burmeister, celle de l'*Heliconides* vit dans les Bromeliacées.

Insecte parfait: Antennes en massue allongée, terminées par une petite houppe soyeuse, à peine visible. Palpes courts, arrivant à peine au milieu du front, de trois articles, dont les deux premiers confondus et le troisième trèsdistinct, nu et pointu. Tête assez petite, pourvue de deux stemmates. Ailes allongées, Héliconiformes, à écailles moins grossières que dans les Castnia proprement dites; les inférieures munies d'un frein et ayant la cellule discoldale, étroite, fermée en angle aigu. Abdomen cylindrolde, un peu plus long que les ailes inférieures.

Dalman, qui n'avait jamais vu le *Papilio Linus* de Cramer, dit dans sa Monographie, que cet insecte lui paraît singulier et assez différent des espèces congénères. S'il l'avait connu en nature, il en aurait probablement fait un genre propre.

#### 1. G. LINUS.

Dalman, Monogr. p. 24, 17.— Gray? Synops. p. 47, 26.— Walker? Heterocera, p. 32, 39.— Papilio Linus, Cr. 257, A.

Cette espèce a le port d'un Héliconide, notamment du Xesthocleis psidii, dont elle a à peu près la livrée.

Elle a 10 centimètres. Ses alles supérieures sont d'un noir profond, avec trois bandos d'un jaune pâle, demi-transparent, disposées ainsi : une longitudinale à la base, divisée en quatre par des nervures noires, une autre oblique, partant du milieu de la côte, pour se diriger vers l'angle interne, coupée en deux taches inégales, dont la supérieure, presque ronde, est plus petite, l'autre, plus grande, est divisée par des nervures noires en quatre rayons inégaux; enfin, la troisième bande est oblique, située un peu avant le sommet; outre cela, elles ont une série marginale de sept points, d'un blanc pur.

Les ailes inférieures sont noires; le disque est d'un jaune pâle, demi-transparent, avec les nervures de la même couleur; vers l'angle externe le limbe est divisé par deux ou trois taches d'un jaune pâle.

Le dessous des premières ailes ressemble au dessus, sauf que la rangée de points blancs monte jusqu'au sommet.

Le dessous des secondes ailes a le disque comme la face opposée, avec tous les contours largement noirs; le limbe est divisé, en tirant vers l'angle externe, par une rangée de quatre taches d'un jaune pâle, s'alignant du côté de l'angle anal, avec trois points blancs très-petits.

La tête, le corselet et la poitrine sont ponctués de blanc comme chez la X. Psidii. L'abdomen est brun en dessus avec les quatre premiers anneaux jaunes sur les côtés. Le ventre est noir avec deux rangées de taches jaunes. Les antennes sont noires avec la massue jaune.

La femelle ressemble au mâle.

Cette espèce est très-rare. Nous n'en possédons que deux

exemplaires pris, tous les deux, aux environs de Cayenne, l'un par Lacordaire et l'autre par Leprieur.

La figure de la *Linus* est très-exacte dans l'ouvrage de Cramer. Godart et Dalman n'ont jamais vu cette espèce.

#### 2. G. HELICONIDES.

Boisd. in Herrich-Schæff. Exot. Schm. fig. 15.

Quelques auteurs qui n'ont probablement jamais vu la véritable Linus de la Guyane, y rapportent l'espèce du Brésil qui s'en rapproche assez, au premier coup-d'œil, quoique très-différente par les caractères suivants:

1º Elle est un peu plus grande, avec les ailes plus larges; 2º les bandes ont un reflet un peu roussatre et non d'un jaune trèspale comme dans le X. Psidii; 3º la bande longitudinale de la base a une toute autre forme; 4º les rayons de la grande tache située près de l'angle interne sont plus longs, et les deux inférieurs s'unissent aux deux premiers points blancs marginaux; 5º les ailes inférieures sont d'un jaune demi-transparent à reflet roussatre, traversées, au-delà du milieu, par une bande étroite, noire, un peu étranglée dans sa partie supérieure ; 6º le disque est coupé par des nervures noires et non par des nervures de la couleur du fond; 7º la bordure est noire, précédée d'une rangée de six taches cunéiformes renversées, s'alignant avec une septième plus petite et deux points blancs à l'angle anal; 8º le dessous des ailes inférieures est d'un jaune à restet presque doré, avec une bande noire, un peu maculaire dans son milieu, presque demi-circulaire, commençant au-dessous de la côte pour arriver à l'angle anal; 9" la côte est largement jaune et non noire comme dans la Linus; enfin, en arrière de la hande transversale noire, la couleur jaune du fond forme une bande dentée en scie, à grosses dents obtuses, blanches à leur sommet.

Elle se trouve au Brésil d'où on la reçoit assez souvent. C'est cette espèce que nous avons vue dans toutes les collections sous le nom de Linus.

La figure du mâle est très-bonne dans l'ouvrage de M. Herrich-Schæffer.

## 3. G. PERSONATA.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 43.

Elle a le port et la taille de *Linus*. Elle est brune à reflet vert ou doré selon les aspects. Le dessous du corps est jaune. Les antennes sont jaunes à l'extrémité. L'abdomen a un reflet doré, et est marqué, de chaque côté, d'une bande longitudinale d'un jaune ochracé.

Les ailes supérieures, assez étroites, ont des litures noires et une bande marginale, marquée de jaune pâle; outre cela, ces mêmes ailes ont une bande transverse discoldale, donnant naissance à quatre rayons de la même couleur.

Les ailes inférieures sont traversées par deux bandes paral· lèles, qui n'atteignent pas l'angle externe.

Guayaquil. - British Museum. - Walker.

## 4. G. COLUMBINA. Boisd.

Elle est très-grande, elle a 12 centimètres. Ses ailes supérieures sont d'un noir foncé; elles ont à la base, deux bandes longitudinales d'un roux un peu enfumé, dont l'inférieure se termine par deux rayons blanchâtres; outre cela, il y a sur le milieu de la côte un petit trait blanc, et au-dessous de celui-ci, près de la principale nervure, une tache blanche arrondie, plus bas et plus en dehors deux taches blanches cunéiformes; l'extrémité postérieure offre deux rangées parallèles de taches blanches inégales, les unes rondes, les autres allongées.

Les ailes inférieures sont d'un fauve vif, avec une bordure noire crénelée, et une rangée de points blancs; outre cela, elles offrent au-delà du milieu, deux ou trois points noiratres disposés transversalement.

Le dessous des premières ailes présente les mêmes caractères que le dessus, sauf que les deux bandes de la base sont fauves.

Le dessous des secondes ailes diffère de la face opposée en ce qu'il y a au-dessous de la côte une bande transversale noire, et en ce qu'il existe sur le bord terminal une rangée de taches cunéiformes blanches dont la pointe se perd dans la couleur fauve.

Le corselet est noir avec le collier blanc et des points de la

même couleur. L'abdomen est brun sur le des dans la moitié antérieure, et ensuite entièrement blanc de part et d'autre.

Les antennes sont d'une couleur testacée.

Nous devons cette espèce à l'obligeance de M. de l'Orza, qui en avait reçu une paire de la Nouvelle-Grenade.

## 5. G. ZAGRÆA.

Feld. Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 79, f. 2.

Elle est un peu moins grande que la Columbina dont elle a tout à fait le port. Ses ailes supérieures sont noires, avec une bande longitudinale fauve, sinuée, un peu irrégulière, coupée par les nervures, partant du milieu de la base et se prolongeant vers le bord postérieur; outre cela, il y a sur le milieu de la côte un petit trait, et au-dessous de celul-ci une tache un peu triangulaire de la même couleur, divisée par les nervures; l'extrémité postérieure offre deux rangées parallèles de taches blanches, lavées de jaune; mais la première rangée ne descend pas au-delà du milieu de l'aile.

Les ailes inférieures sont fauves avec une rangée transversale de six ou sept taches noires; la bordure est noire, divisée intérieurement par une série de longues dents appartenant à la couleur du fond.

Le corselet est brun avec le collier et des points fauves. L'abdomen est d'un jaune fauve, avec une bande dorsale brune un peu dilatée à son extrémité.

Décrite d'après la figure donnée par M. Felder.

Elle a été prise à Panama. — Coll. Felder.

M. Felder compare avec raison cette espèce au P. Zagræus, car elle en a véritablement le port et un peu le faciss.

#### 6. S. SIMULANS. Boisd.

Cette curieuse espèce a le port et la taille du Lycoræa Ceres. Les ailes sont bien entières, sans dentelures; les supérieures sont d'une teinte roussâtre enfumée, depuis la base jusqu'au-delà du milieu, avec une tache oblique d'un brun noirâtre à l'extrémité de la cellule discoldale; la partie postérieure de ces mêmes ailes est d'un brun noir, coupée par une bande oblique, droite, partant de la côte et n'arrivant pas jusqu'au bord externe; outre cela, il

## 3. G. PERSONATA.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 43.

Elle a le port et la taille de *Linus*. Elle est brune à reflet vert ou doré selon les aspects. Le dessous du corps est jaune. Les antennes sont jaunes à l'extrémité. L'abdomen a un reflet doré, et est marqué, de chaque côté, d'une bande longitudinale d'un jaune ochracé.

Les ailes supérieures, assez étroites, ont des litures noires et une bande marginale, marquée de jaune pâle; outre cela, ces mêmes ailes ont une bande transverse discoïdale, donnant naissance à quatre rayons de la même couleur.

Les ailes inférieures sont traversées par deux bandes paral· lèles, qui n'atteignent pas l'angle externe.

Guayaquil. - British Museum. - Walker.

## 4. G. COLUMBINA. Boisd.

Elle est très-grande, elle a 12 centimètres. Ses ailes supérieures sont d'un noir foncé; elles ont à la base, deux bandes longitudinales d'un roux un peu enfumé, dont l'inférieure se termine par deux rayons blanchâtres; outre cela, il y a sur le milieu de la côte un petit trait blanc, et au-dessous de celui-ci, près de la principale nervure, une tache blanche arrondie, plus bas et plus en dehors deux taches blanches cunéiformes; l'extrémité postérieure offre deux rangées parallèles de taches blanches inégales, les unes roudes, les autres allongées.

Les ailes inférieures sont d'un fauve vif, avec une bordure noire crénelée, et une rangée de points blancs; outre cela, elles offrent au-delà du milieu, deux ou trois points noirâtres disposés transversalement.

Le dessous des premières ailes présente les mêmes caractères que le dessus, sauf que les deux bandes de la base sont fauves.

Le dessous des secondes ailes diffère de la face opposée en ce qu'il y a au-dessous de la côte une bande transversale noire, et en ce qu'il existe sur le bord terminal une rangée de taches cunéiformes blanches dont la pointe se perd dans la couleur fauve.

Le corselet est noir avec le collier blanc et des points de la

même couleur. L'abdomen est brun sur le dos dans la moitié antérieure, et ensuite entièrement blanc de part et d'autre.

Les antennes sont d'une couleur testacée.

Nous devons cette espèce à l'obligeance de M. de l'Orza, qui en avait reçu une paire de la Nouvelle-Grenade.

#### 5. G. ZAGRÆA.

Feld. Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 79, f. 2.

Elle est un peu moins grande que la Columbina dont elle a tout à fait le port. Ses ailes supérieures sont noires, avec une bande longitudinale fauve, sinuée, un peu irrégulière, coupée par les nervures, partant du milieu de la base et se prolongeant vers le bord postérieur; outre cela, il y a sur le milieu de la côte un petit trait, et au-dessous de celul-ci une tache un peu triangulaire de la même couleur, divisée par les nervures; l'extrémité postérieure offre deux rangées parallèles de taches blanches, lavées de jaune; mais la première rangée ne descend pas au-delà du milieu de l'aile.

Les ailes inférieures sont fauves avec une rangée transversale de six ou sept taches noires; la bordure est noire, divisée intérieurement par une série de longues dents appartenant à la couleur du fond.

Le corselet est brun avec le collier et des points fauves. L'abdomen est d'un jaune fauve, avec une bande dorsale brune un peu dilatée à son extrémité.

Décrite d'après la figure donnée par M. Felder.

Elle a été prise à Panama. - Coll. Felder.

M. Felder compare avec raison cette espèce au P. Zagræus, car elle en a véritablement le port et un peu le faciss.

## 6. S. SIMULANS. Boisd.

Cette curieuse espèce a le port et la taille du Lycoræa Ceres. Les ailes sont bien entières, sans dentelures; les supérieures sont d'une teinte roussâtre enfumée, depuis la base jusqu'au-delà du milieu, avec une tache oblique d'un brun noirâtre à l'extrémité de la cellule discoldale; la partie postérieure de ces mêmes ailes est d'un brun noir, coupée par une bande oblique, droite, partant de la côte et n'arrivant pas jusqu'au bord externe; outre cela, il

## 3. G. PERSONATA.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 43.

Elle a le port et la taille de *Linus*. Elle est brune à reflet vert ou doré selon les aspects. Le dessous du corps est jaune. Les antennes sont jaunes à l'extrémité. L'abdomen a un reflet doré, et est marqué, de chaque côté, d'une bande longitudinale d'un jaune ochracé.

Les ailes supérieures, assez étroités, ont des litures noires et une bande marginale, marquée de jaune pâle; outre cela, ces mêmes ailes ont une bande transverse discoïdale, donnant naissance à quatre rayons de la même couleur.

Les ailes inférieures sont traversées par deux bandes parallèles, qui n'atteignent pas l'angle externe.

Guayaquil. — British Museum. — Walker.

#### 4. G. COLUMBINA. Boisd.

Elle est très-grande, elle a 12 centimètres. Ses ailes supérieures sont d'un noir foncé; elles ont à la base, deux bandes longitudinales d'un roux un peu enfumé, dont l'inférieure se termine par deux rayons blanchâtres; outre cela, il y a sur le milieu de la côte un petit trait blanc, et au-dessous de celui-ci, près de la principale nervure, une tache blanche arrondie, plus bas et plus en dehors deux taches blanches cunéiformes; l'extrémité postérieure offre deux rangées parallèles de taches blanches inégales, les unes rondes, les autres allongées.

Les ailes inférieures sont d'un fauve vif, avec une bordure noire crénelée, et une rangée de points blancs; outre cela, elles offrent au-delà du milieu, deux ou trois points noirâtres disposés transversalement.

Le dessous des premières ailes présente les mêmes caractères que le dessus, sauf que les deux bandes de la base sont fauves.

Le dessous des secondes ailes diffère de la face opposée en ce qu'il y a au-dessous de la côte une bande transversale noire, et en ce qu'il existe sur le bord terminal une rangée de taches cunéiformes blanches dont la pointe se perd dans la couleur fauve.

Le corselet est noir avec le collier blanc et des points de la

même couleur. L'abdomen est brun sur le des dans la moitié antérieure, et ensuite entièrement blanc de part et d'autre.

Les antennes sont d'une couleur testacée.

Nous devons cette espèce à l'obligeance de M. de l'Orza, qui en avait reçu une paire de la Nouvelle-Grenade.

#### 5. G. ZAGRÆA.

Feld. Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 79, f. 2.

Elle est un peu moins grande que la Columbina dont elle a tout à fait le port. Ses ailes supérieures sont noires, avec une bande longitudinale fauve, sinuée, un peu irrégulière, coupée par les nervures, partant du milieu de la base et se prolongeant vers le bord postérieur; outre cela, il y a sur le milieu de la côte un petit trait, et au-dessous de celul-ei une tache un peu triangulaire de la même couleur, divisée par les nervures; l'extrémité postérieure offre deux rangées parallèles de taches blanches, lavées de jaune; mais la première rangée ne descend pas au-delà du milieu de l'aile.

Les ailes inférieures sont fauves avec une rangée transversale de six ou sept taches noires; la bordure est noire, divisée intérieurement par une série de longues dents appartenant à la couleur du fond.

Le corselet est brun avec le collier et des points fauves. L'abdomen est d'un jaune fauve, avec une bande dorsale brune un peu dilatée à son extrémité.

Décrite d'après la figure donnée par M. Felder.

Elle a été prise à Panama. — Coll. Felder.

M. Felder compare avec raison cette espèce au P. Zagræus, car elle en a véritablement le port et un peu le facies.

#### 6. S. SIMULANS. Boisd.

Cette curieuse espèce a le port et la taille du Lycoræa Ceres. Les ailes sont bien entières, sans dentelures; les supérieures sont d'une teinte roussatre ensumée, depuis la base jusqu'au-delà du milieu, avec une tache oblique d'un brun noiratre à l'extrémité de la cellule discoldale; la partie postérieure de ces mêmes ailes est d'un brun noir, coupée par une bande oblique, droite, partant de la côte et n'arrivant pas jusqu'au bord externe; outre cela, il

#### 3. G. PERSONATA.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 43.

Elle a le port et la taille de Linus. Elle est brune à reflet vert ou doré selon les aspects. Le dessous du corps est jaune. Les antennes sont jaunes à l'extrémité. L'abdomen a un reflet doré, et est marqué, de chaque côté, d'une bande longitudinale d'un jaune ochracé.

Les ailes supérieures, assez étroités, ont des litures noires et une bande marginale, marquée de jaune pâle; outre cela, ces mêmes ailes ont une bande transverse discoïdale, donnant naissance à quatre rayons de la même couleur.

Les ailes inférieures sont traversées par deux bandes paral· lèles, qui n'atteignent pas l'angle externe.

Guayaquil. — British Museum. — Walker.

#### 4. G. COLUMBINA. Boisd.

Elle est très-grande, elle a 12 centimètres. Ses ailes supérieures sont d'un noir foncé; elles ont à la base, deux bandes longitudinales d'un roux un peu enfumé, dont l'inférieure se termine par deux rayons blanchâtres; outre cela, il y a sur le milieu de la côte un petit trait blanc, et au-dessous de celui-ci, près de la principale nervure, une tache blanche arrondie, plus bas et plus en dehors deux taches blanches cunéiformes; l'extrémité postérieure offre deux rangées parallèles de taches blanches inégales, les unes rondes, les autres allongées.

Les ailes inférieures sont d'un fauve vif, avec une bordure noire crénelée, et une rangée de points blancs; outre cela, elles offrent au-delà du milieu, deux ou trois points noirâtres disposés transversalement.

Le dessous des premières ailes présente les mêmes caractères que le dessus, sauf que les deux bandes de la base sont fauves.

Le dessous des secondes ailes diffère de la face opposée en ce qu'il y a au-dessous de la côte une bande transversale noire, et en ce qu'il existe sur le bord terminal une rangée de taches cunéiformes blanches dont la pointe se perd dans la couleur fauve.

Le corselet est noir avec le collier blanc et des points de la

même couleur. L'abdomen est brun sur le dos dans la moitié antérieure, et ensuite entièrement blanc de part et d'autre.

Les autennes sont d'une couleur testacée.

Nous devons cette espèce à l'obligeance de M. de l'Orza, qui en avait reçu une paire de la Nouvelle-Grenade.

#### 5. G. ZAGRÆA.

Feld. Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 79, f. 2.

Elle est un peu moins grande que la Columbina dont elle a tout à fait le port. Ses ailes supérieures sont noires, avec une bande longitudinale fauve, sinuée, un peu irrégulière, coupée par les nervures, partant du milieu de la base et se prolongeant vers le bord postérieur; outre cela, il y a sur le milieu de la côte un petit trait, et au-dessous de celui-ci une tache un peu triangulaire de la même couleur, divisée par les nervures; l'extrémité postérieure offre deux rangées parallèles de taches blanches, lavées de jaune; mais la première rangée ne descend pas au-delà du milieu de l'aile.

Les ailes inférieures sont fauves avec une rangée transversale de six ou sept taches noires; la bordure est noire, divisée intérieurement par une série de longues dents appartenant à la couleur du fond.

Le corselet est brun avec le collier et des points fauves. L'abdomen est d'un jaune fauve, avec une bande dorsale brune un peu dilatée à son extrémité.

Décrite d'après la figure donnée par M. Felder.

Elle a été prise à Panama. — Coll. Felder.

M. Felder compare avec raison cette espèce au P. Zagræus, car elle en a véritablement le port et un peu le faciss.

#### 6. S. SIMULANS. Boisd.

Cette curieuse espèce a le port et la taille du Lycoræa Ceres. Les ailes sont bien entières, sans dentelures; les supérieures sont d'une teinte roussâtre enfumée, depuis la base jusqu'au-delà du milieu, avec une tache oblique d'un brun noirâtre à l'extrémité de la cellule discoldale; la partie postérieure de ces mêmes ailes est d'un brun noir, coupée par une bande oblique, droite, partant de la côte et n'arrivant pas jusqu'au bord externe; outre cela, il

y a, à partir de l'angle interne, une rangée de trois ou quatre points jaunâtres qui ne remonte pas jusqu'au milieu du bord extérieur; le bord interne, la nervure médiane et la côte sont plus ou moins brunâtres.

Les ailes inférieures sont d'un fauve roussâtre, traversées audelà du milieu par une bande noire maculaire; elles ont en outre à l'extrémité une espèce de bordure noirâtre formée de taches cunéiformes; cette même bordure offre vers l'angle anal deux points jaunâtres et un point semblable vers l'angle externe.

Le dessous des ailes supérieures est fauve depuis la base jusqu'à l'angle interne; il est, en outre, marqué de deux bandes obliques d'un jaune d'ocre, dont l'antérieure très-courte, et la seconde correspondant à celle de la surface opposée.

Le dessous des ailes inférieures diffère du dessus en ce qu'il y a entre les dents de la bordure une rangée de taches jaunâtres et une raie longitudinale, noirâtre, située entre la base et le milieu.

Le corselet est brunâtre. Le dessus de l'abdomen est d'un brun pâle, avec une ligne dorsale d'un blanc-sale, obsolète. Le dessus du corps est fauve avec une bande latérale noire, longitudinale. La poitrine est tachetée de jaune. Les antennes sont brunâtres avec la massue jaune.

On prendrait volontiers cette castniaire pour une héliconide du genre Lycoræa, dont elle paraît presque une contrefaçon.

Décrite sur un exemplaire unique que nous a offert M. Deyrolle.

Cette espèce, dont nous ne connaissons que la femelle, habite la Colombie.

# TRIBU DES SYNÉMONIDES.

Les Lépidoptères dont il va être question constituent un centre de création à part, dont le cercle touche par sa circonférence, un peu aux Hespérides et aux Agaristides, mais principalement aux Castniaires, dont ils sont les véritables représentants à la Nouvelle-Hollande.

Nous ne savons encore rien de leurs premiers états, cependant l'abdomen des femelles terminé par un ovi-

ducte assez prononcé, semble indiquer que les chenilles doivent vivre dans l'intérieur des végétaux à la manière des Sésies et des Castnies.

Insecte parfait: Tête arrondie. Yeux grands. Front large. Trompe assez longue. Palpes courts, couverts de poils écailleux, assez épais; leur premier article court; le second beaucoup plus long, atténué au sommet; le troisième de la longueur du second, aigu à son extrémité. Antennes terminées par une massue assez courte, bien prononcée, plus ou moins mucronée à l'extrémité, laquelle est, en outre, garnie d'une très-petite houppe soyeuse, plus ou moins indiquée. Corselet assez robuste. Abdomen de grosseur moyenne, cylindrico-conique, garni dans les mâles d'un petit pinceau anal et terminé chez les femelles par un oviducte saillant. Pattes antérieures courtes, avec les jambes munies d'une épine aiguë. Tarses épineux, avec le premier article très-long. Ailes entières, garnies d'écailles assez grossières : les inférieures pourvues d'un frein comme dans les Castnies.

Cette tribu ne renferme que le genre suivant.

## GENRE SYNEMON.

Doubleday, Append. to Lort's discov. in Australia. — Walker, — Klug, — Felder. — Hesperia? White.

Mêmes caractères que ceux de la tribu.

La première espèce connue est le Synemon Sophia, rapporté par Grey de son expédition scientifique en Australie et décrit par White avec un point de doute, comme un Hesperia. Quelque temps après, seu notre ami Ed. Doubleday, ayant été à même d'examiner d'autres espèces rapportées de la Nouvelle-Hollande, reconnut avec la sagacité dont il était doué, que ces sortes de Lépidoptères avaient tous les caractères des Hétérocères et créa pour eux le genre Symemon adopté par Klug. Walker et Felder.

Les Synémons sont encore peu nombreux. Il y en a environ une dizaine de décrits ou de figurés, mais on est loin sans doute, de connaître toutes les espèces répandues sur l'immense espace qui constitue la Nouvelle-Hollande. Toutes celles connues jusqu'à présent ont les ailes inférieures jaunes, fasciées de noir.

## 1. S. SOPHIA.

Doubleday, Lort's discov. austr. Append. pl. 3, f. 5. — Walker, Heterocera, p. 34, 1. — Klug, Abhandl. d. Königl. Akad. d. Wissensch. zu Berlin, f. 1, 2. — Hesperia? Sophia, White, Grey's Exp. austral. Append. f. 7.

Il a environ 5 centimètres. Ses ailes supérieures sont brunes, nuagées de noirâtre et de gris avec les nervures un peu grisâtres; leur base est ombrée de noirâtre ainsi que le disque, qui offre une tache blanche à l'extrémité de la cellule discoidale.

Les ailes inférieures sont noires, marquées, vers leur base, d'une tache ovale d'un jaune orangé et, un peu au-delà du milieu, d'une bande maculaire de la même couleur, suivie, tout à fait en arrière, d'une rangée de taches inégales, également jaunes.

Le dessous des ailes est d'un jaune un peu fauve, avec des bandes transverses noires.

Le corselet est grisâtre. L'abdomen est noirâtre à la base, et ensuite un peu blanchâtre.

La femelle a les ailes supérieures presque noires, ombrées de gris légèrement bleuâtre, avec une série marginale de petites taches noires, et une bande maculaire blanche.

Ses ailes inférieures ont la tache jaune de la base plus grande que dans le mâle.

Nouvelle-Hollande, aux environs du port du Roi-Georges. Nous devons cette espèce à l'obligeance de M. Doubleday.

#### 2. S. PARTHENOIDES.

Felder, Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, tab. 79, f. 7-8.

Il a le port et la taille du précédent, dont il est très-voisin. Ses ailes supérieures sont brunes avec des ombres plus obscures; elles sont traversées par deux bandes blanches un peu maculaires, coupées par les nervures dont la première, située un peu au-delà du milieu, se dirige de la côte vers l'angle anal, et dont la seconde plus courte, bifide, est située entre celle-ci et le sommet.

Les ailes inférieures sont noires, avec une tache arrondie d'un jaune orangé vers la base, et deux rangées parallèles de taches de la même couleur, placées entre le milieu et la frange.

Le dessous des ailes est fauve avec des bandes noires. Celui des supérieures offre, en outre, avant le sommet, une bande blanche correspondant à celle du dessus, et une rangée marginale de taches fauves.

Le corselet est brunâtre. L'abdomen est noirâtre à la base et ensuite d'un jaune pâle à refiet doré.

Nouvelle-Hollande. Décrit sur un individu femelle que nous

#### 3. S. CATOCALOIDES.

Walker, Heterocera, XXXI, Suppl. p. 44.

Il a environ 5 centimètres et sa couleur est d'un cendré noirâtre en dessus et blanche en dessous. Les antennes sont annelées de blanc. L'abdomen est marqué, près de l'extrémité, de deux petites taches fauves, avec les segments bordés de blanc en dossous. Le petit pinceau anal est blanchâtre chez le mâle, seul sexe connu.

Les ailes supérieures ont quelques écailles d'un gris pâle et une tache discoldale d'un noir ferrugineux. Leur dessous est noir avec deux larges bandes obliques, irrégulières, d'un roux ferrugineux; il y a, en outre, près de l'extrémité, une bande composée de six taches, dont la première et la seconde sont blanches, et les autres ferrugineuses.

Les ailes inférieures, garnies de quelques poils fauves à la base, sont traversées par deux bandes un peu connexes, de la même couleur, suivies d'une série marginale de trois taches ferrugineuses. Leur dessous a la première bande limitée par une tache rousse, la seconde est interrompue, avec des taches marginales blanches, au nombre de six, dont la troisième est de beaucoup plus petite que les autres.

Il a été trouvé à Swan-River. - British Museum.

#### 4. S. THERESA.

Doubleday, Lort's Discov. austr. Append. pl. 3, f. 6. — Walker, Heterocera, p. 35, 2. — Klug, Abhandl. d. Königl. Akad. d. Wissensch. zu Berlin, pl. 3, f. 5, 6.

Il a 4 centimètres. Ses ailes supérieures sont d'un gris un peu brunâtre, striées longitudinalement de blanchâtre, et marquées à l'extrémité de la cellule discoïdale d'une petite tache blanche; outre cela, avant le bord terminal, on voit une rangée de taches oblongues noires, terminées en dehors par une série de points blanchâtres.

Les ailes inférieures sont d'un jaune fauve, avec la base noirâtre, marquée d'une petite tache fauve, et une bande noire, transverse, maculaire, entre le milieu et l'extrémité.

Le dessous des premières ailes est d'un jaune-orangé pâle, avec trois ou quatre taches noires, alignées transversalement vers le sommet.

Le dessous des secondes rappelle à peu près les caractères de la face opposée.

Nouvelle-Hollande. Décrit sur un individu femelle de notre collection.

## 5. S. Mopsa.

Doubleday, Lort's Discov. austr. Append. pl. 3, f. 7. — Walker, Heterocera, p. 35, 3.

Il a de 3 à 3 1/2 centimètres. Ses ailes sont brunâtres avec la base et une raie transversale courbe, au-delà du milieu, de couleur blanchâtre; le disque est assez obscur et marqué, à l'extrémité de la cellule discoïdale, d'un point blanc bien indiqué; outre cela, on voit avant le bord terminal, une rangée de petites taches oblongues, de couleur noirâtre.

Les ailes inférieures sont d'un fauve terne avec la base noirâtre, marquée d'une petite tache fauve; outre cela il y a, avant l'extrémité, une rangée de trois ou quatre petites taches noires.

Le dessous des premières ailes est fauve avec la base et deux bandes noirâtres.

Le dessous des secondes ailes est d'un brun-pâle luisant, avec une rangée de taches marginales obsolètes, un peu blanchâtres.

Nouvelle-Hollande. - Coll. Bd.

## 6. S. SELENE.

Klug, Abhandi. d. Königi. Akad. d. Wissensch. zu Berlin, pl. 2, f. 3, 4.

Elle a le port des précédentes. Ses ailes supérieures sont d'un gris brunâtre, avec le milieu beaucoup plus obscur, et le bord terminal marqué de petites taches brunes; outre cela elles ont, un peu avant le milieu, une bande maculaire blanche et une lunule de la même couleur.

Les ailes inférieures sont noires, traversées par trois bandes jaunes inégales.

Dessous des ailes d'un jaune testacé pâle, sascié de noir.

Corselet brun en dessus avec la poitrine blanchâtre. Abdomen grisâtre.

Nouvelle-Hollande. Décrit d'après Klug.

#### 7. S. NAIS.

Klug, Abhandi. d. Königi. Akad. d. Wissensch. zu Berlin, pl. 4, f. 7.

Il est de la taille des plus petits individus de Mopsa. Ses ailes supérieures sont d'un gris brunâtre, traversées un peu avant le milieu, par une bande sinuée d'un gris pâle, et marquées à l'extrémité de la cellule discoldale, d'une lunule d'un blanc grisâtre.

Les ailes inférieures sont d'un jaune orangé, traversées par une bande noire profondément sinuée dans son milieu et marquée vers le bord marginal de taches également noires.

Le dessous des ailes est d'un jaune orangé, fascié de noir.

Le corselet et l'abdomen sont grisatres.

Nouvelle-Hollande, Décrit d'après Klug.

#### 8. S. LÆTA.

Walker, Heterocera, p. 36, 4.

Elle a le port et la taille de Sophia, mais ses ailes sont plus étroites; les supérieures sont brunes, saupoudrées d'atomes blanchâtres, avec deux grandes taches noirâtres irrégulières, sur le disque, et une bande macuiaire d'un brun foncé, le long du bord terminal.

Les ailes inférieures sont d'un jaune orangé, avec une tache noire vers la base, et deux bandes transverses de la même couleur, dont la première, située sur le disque, est courbe et irrégulière, et dont la seconde est marginale, divisée par un cordon de taches orangées.

Le dessous des premières ailes est d'un jaune orangé, avec des taches noires correspondant à celles du dessus.

Le dessous des secondes ailes est marqué de taches blanches et de bandes noires correspondant à celles de la face opposée.

Le corps est brun en dessus et blanchâtre en dessous. Les antenues sont annelées de blanc.

Nouvelle-Hollande. Décrit d'après M. Walker.

## 9. S. PLANA.

Walker, Heterocera, p. 37, 5.

Il a le port et la taille de Mopsa. Ses ailes supérieures sont d'un gris obscur, avec deux grandes taches brunes sur le disque, et une rangée de petites taches d'un brun noir, le long du bord terminal.

Les ailes inférieures sont jaunes avec quatre petites taches noires disposées en une sorte de bande très-interrompue, sur le milieu du disque; la bordure est étroite et de couleur brune.

Le dessous des premières ailes est blanc avec deux taches noires sur le disque, et une petite bande terminale testacée.

Le dessous des secondes ailes est blanc, avec des taches brunâtres plus ou moins distinctes.

Le corps est brun en dessus et blanchêtre en dessous.

Nouvelle-Hollande. — Décrit d'après M. Walker.

#### 10. S. ICARIA.

Felder, Novara, Exp. Zool. Theil. Bnd. II, Abth. 2, pl. 79, f. 6.

Cette espèce a le port de Sophia, mais elle n'est guère plus grande que Mopsa. Ses ailes supérieures sont nuancées de gris blanchâtre, avec des bandes transverses brunes, dont une asser large sur le milieu, deux plus courtes et un peu obliques vers le sommet.

Les ailes inférieures sont d'un jaune orangé, traversées au

milieu par une bande sinueuse, noire, interrompue; la bordure est également noire, assez étroite, divisée par une série de petites taches d'un jaune orangé.

Le dessous des ailes supérieures est fascié de noir et de blanchâtre.

Le dessous des ailes inférieures offre à peu près les mêmes caractères qu'en dessus.

Nouvelle-Hollande, environs de Swan-River.

Coll. Bd.

Nota. M. Felder a figuré (Novara Exp. 2001.) pl. 82, fig. 12, sous le nom de Synemon hesperioides, un Lépidoptère entièrement d'un brun noir, comme notre Thanaos tages et Marloyi, n'ayant d'autre dessin que deux petits anneaux blanchâtres très-obsolètes, sur les ailes supérieures, et une petite ligne terminale de la même couleur. D'après son facies, nous ne pensons pas qu'il appartienne à la grande division des Hétérocères, mais plus probablement à la famille des Hespérides.

# ERRATUM.

Page 2, 4° ligne: on a oublié à l'impression le mot genre entre grand et Sphinx. Il faut lire: grand genre Sphinx.

# SUPPLÉMENT.

Pendant l'impression de notre Species, nous avons reçu de M. Erschoff son Mémoire sur les Lépidoptères de la Perse, dans lequel nous trouvons une très-bonne figure du Smerinthus Kindermannii que nous ne connaissions que de nom.

29 bis. S. KINDERMANNII.

Lederer, Zool. bot. Verk. B. II. 1852, p. 28. — Erschoff, Lépid. de la Perse. Tab. II. fig. 19.

Il a le port et la taille du Geminatus de Say. Ses ailes supérieures, sinuées comme dans l'Ocellatus, sont d'un gris-violâtre rosé, traversées par deux raies brunes, dont la première forme, au-dessous de la nervure médiane, un angle profond en forme de V, et dont la seconde courbe, sinuouse, bien indiquée, traverse l'aile dans son tiers postérieur; il y a, en outre, entre ces deux raies quelques ondes brunâtres, assez obsolètes, et sur la pointe apicale, une tache brune cunéiforme placée sur un espace blauchâtre.

Les ailes inférieures sont d'un rouge rose, un tant soit peu plus obscur à l'extrémité; elles sont marquées à l'angle anal d'une tache noire transversals, allongée, étroite, divisée dans le sens de sa longueur par une ligne bleue.

Le des cus des ailes supérieures est d'un rouge pâle jusqu'audelà du milieu, et ensuite bronâtre, avec le sommet marqué de la même petite tache cunéiforme qu'en dessus.

Le dessous des ailes inférieures est d'un gris blanchâtre avec l'extrémité brune et des bandes transverses de la même couleur.

Le corselet est de la couleur des premières ailes, marqué dans son milieu d'une grande tache brune en forme de V renversé. L'alsdomen est grisâtre.

Ce Smérinthe est très-distinct par sa tache anale et presque linéaire, des espèces du même groupe, — Il se trouve en Perse.

Sphingides que nous ne connaissons que de nom et dont peutêtre quelques uns font double emploi avec des espèces décrites dans notre ouvrage.

FABRICIUS.

Sp. Modesta. Indes orientales. — N'est probablement qu'une variété du Sm. dentatus, quoique l'auteur décrive plus loin, n° 19, le véritable dentatus d'après Cramer. Sph. asiliformis. Indes orientales. — Nous paraît être une petite espèce près de notre Lophura Hyas, nisi eailem.

Spr. Apulus. — Est une espèce de Bombycite qui n'a aucun rapport avec les Sphingides. Nous en possédons plusieurs exemplaires des deux sexes.

Sph. pagana. Indes orientales. — Quid?

SPH. HESPERA. Indes orientales. — Très-probablement une variété du Zonilia Morpheus.

SPH. BATUS. Indes orientales. — Nous paraît appartenir au groupe américain d'Anubus, de tersa, etc. Il doit y avoir une erreur d'habitat.

Sph. velox. Indes orientales. — Pourrait bien être le même que Lucasi.

CLEMENS TRYON, Synopsis.

DEILEPH. OXYBAPHI. Am. sept. — L'insecte à l'état parfait est encore inconnu. M. Clemens a trouvé sur l'Allionia nyctagines appelé aussi par Swett oxybaphus nyctagineus, une chenille qu'il suppose devoir produire un Deilephila.

CHOEROC, THALASSINA. Patrie inconnue.

CHOEROC. PROCNE. Californie?

CHOEROC. NITIDULA. Mexique. — Pourrait bien être le même que le crotonis.

SPH. LEUCOPHEATA. Texas.

SPH. LUCITIOSA. Wisconsin.

SPH. INSTITA. Honduras.

### M. GROTE, Ann. N.-Y. Lyc.

HYLOICUS PORYI. Quid?

SPH. CONGRATULANS. Etats-Unis?

SPH. CINEROSA. Am. sept.

Cramer a figuré pl. 287, fig. B, sous le nom de Sphinx pyracmon, un Cossus de Surinam, dont on a remplacé la tête par une tête de Sphinx!

Nous avons cité l'ouvrage de M. Walker à propos du Sphinz coniferarum. Selon M. Grote, ce serait le Sphinz Harrisii, qui existerait au British Museum sous le nom de coniferarum.

# TABLE DES MATIÈRES

DES

# FAMILLES, TRIBUS, GENRES, GROUPES

ET ESPÈCES.

#### FAMILLE DES SPHINGIDES.

Paj	res.	1	Pages.
Tribu des Achérontides	4	Esp. 12. S. Dentatus	. 25
		— 13. S. Grayi	
Genre Acherontia	4	— 15. S. Adansoniæ	
Esp. 1. A. Atropos	5	— 16. S. Ailanti.	
— 2. A. Styx	6	— 17. S. Oculata	. 29
— 3. A. Satanas. !	7	- 48. S. Pseudambulyx.	. 29
Tribu des Smerinthides	8	— 19. S. Complacens	. 30
Genre Brachyglossa	9	— 20. S. Ocellatus	. 31
		— 21. S. Argus	33 33
Esp. 1. B. Triangularis	.9	- 22. S. Planus	. 83 33
— 2. B. Australasiæ	10	— 23. S. Ophthalmicus — 24. S. Saliceti	
— 3. B. Banksiæ	11	— 25. S. Sanceu	
Genre METAGASTES	11	— 26. S. Jamaicensis	
Esp. 1. M. Phalaris	12	— 27. S. Pavoninus	
- 2. M. Nicobarensis	12	- 28. S. Excarcatus	
		— ≱). S. Geminatus	. 39
Genre Calymnia	13	— 30. S. Cœcus	. 40
Esp. C. Panopus.	13	— 31. S. Astylus	. 40
Genre Euglea	14	— 32. S. Myops	. 41
		- 33. S. Tatarinovii	. 43
Esp. E. Dumolinii	15	— 34. S. Tiliæ	44
Genre Nickryx	16	- 36. S. Indicus	
Esp. N. Hyposticta	16	— 37. S. Pudorinus	
		— 38. S. Pusillus	
Genre Smerinthus	17		
Esp. 1. S. Basalis	18	Genre Eurypteryx	46
— 2. S. Quercus	18	Esp. E. Molucca	47
	19	Genre Basiana	47
- 4. S. Sperchius	19		
— 5. S. Dryas	90	Esp. 1. B. Deucalion	
	캜	— 2. B. Cervina	
- 8. S. Meander	벎		49
	끏	<ul> <li>4. B. Canescens.</li> <li>5. B. Semifervens.</li> </ul>	
	<b>23</b>	- 6. B. Postica	
— 11. S. Tremulæ	ũ	— 7. B. Bilinesta	50

1 A Date		MAILENEO.
Genre Dapenusa	K4 (	Rsp.16. S. Ochus 82
		- 17. S. Rustica 82
Esp. 1. D. Ocellaris	51	- 18. S. Albiplaga 84
- 2. D. Colligata	52	— 19. S. Solani 85
Genre CYPA	52	- 20. S. Astaroth 86
Esp. C. Ferruginea	53	
		2º Groupe 86
Genre Ceratoria	<b>5</b> 3	Esp. 21. S. Menephron 87
Esp. C. Amyntor	53	— 22. S. Lugens 87
Tribu des Investores		— 23. S. Justiciæ 88
Tribu des Leucophlé-		— 24. S. Andromedæ 89
BIDES	54	— 25. S. Kremitus 90 — 26. S. Gordius 91
Genre Leucophlebia	55	
	55	90 6 64:4- 63
Esp. 1. L. Luxeri	56 56	— 28. S. Sordida 92 — 29. S. Canadensis 93
— 2. L. Emittens — 3. L. Beuglini	57	— 30. S. Chersis 93
	3,	- 31. S. Convolvuli 94
Tribu des Euryglotti-		- 32. S. Cingulata 95
DES	58	33. S. Ligustri 96
•		- 34. S. Drupiferarum 97
Genre Meganoton	58	- 35. S. Dryneus 98
Esp. 1. M. Nyctiphanes	59	— 36. S. Hylæus 98
— 2. M. Discistriga	59	— 37. S. Piebeja 99
Genre Macrosila	60	- 38. S. Strobi 100
	61	— 39. S. Sequoiæ 101
Esp. M. Tetrio		— 40. S. Juniperi 101
Genre Amphonyx	62	— 41. S. Cupressi 102 — 42. S. Catalpæ 103
Esp. 1. A. Cluentius	62	— 42. S. Catalpæ 103 — 43. S. Pinastri 104
- 2. A. Beelzebuth	63	- 44. S. Coniferarum 105
- 3. A. Jatrophæ	64	- 45. S. Harrisii 106
- 4. A. Godartii	65	- 46. S. Pinea 107
- 5. A. Duponchelii	65	— 47. S. Abietina 106
- 6. A. Morganii	66	- 48. S. Lanceolata 109
— 7. A. Walkeri	67	. — 49. S. Casuarinae 109
Genre Euryglottis	68	— 50. S. Collaris 110
Esp. E. Aper	68	— 51. S. Analis 111
		- 52. S. Lichenea !!!
Genre Sphinx	<b>6</b> 9	- 53. S. Forestan 112 - 54. S. Nestor 113
1º Groupe	69	
70 4 C Camalina	70	- 55. S. Jasmini 114 - 56. S. Jasminearum 114
- 2. S. Lycopersici	71	- 57. S. Pamphilus
- 3. S. Paphus.	72	- 58. S. Brontes 116
- 4. S. Cestri	72	— 59 S. Inexacta 117
- 5. S. Petuniæ	73	- 60. S. Fusimacula 118
— 6. S. Lucetius	74	- 61. S. Sesquiplex 118
- 7. S. Nicotianæ	75	
- 8. S. Quinquemaculata.	76	
- 9. S. Afflicta	77	Esp. 1. A. Ello 130
- 10. S. Tabaci	78	- 2. A. Alope 121
- 11. S. Hannibal	78	— 3. A. Scyron
- 12. S. Hamilcar	79 80	— 4. A. Cahuchu 122 — 5. A. Caricze
— 13. S. Pellenia	80	- 5. A. Caricæ 133 - 6. A. Pedilanthi 134
— 14. S. Capsici	81	- 7. A. Menechus 124
- 15. S. Lefebyrei	01	A. MOHOUMUS 134

TABLE D	ES	matières.	561
	25	Genre DEILEPHILA	158
	25 26	Esp. 1. D. Hippophaes	150
	30) 36)	- 2. D. Biguttata	160
	27	— 3. D. Annei	161
— 13. A. Meriana 1	28	— 4. D. Euphorbiæ	163
	<del>2</del> ()	— S. D. Esula	163
	29	— 6. D. Nicara	164 165
	<u>30  </u>	- 7. D. Lathyrus	165
	31 31	- 9. D. Tithymali	167
	32	10. D. Calverleyi	168
— ±0. A. Obscura 1	32	— 11. D. Zygophylli	16R
— 21. A. Guttulalis 1	33	12. D. Galii	169
— 22. A. Pallida 1	34	- 13. D. Celeno	170 171
C- D	۱	— 14. D. Opheltes	172
Genre Pachylia 13	36	— 16. D. Daucus	173
	35	- 17. D. Vespertilio	176
	36	— 18. D. Vespertilioides	173
— 3. P. Ficus 1	36	— 19. D. Epilobii	177
- 4. P. Tristis 1	38 38	Comp. Page	470
- 5. P. Inconspicua 1	ຶ	Genre Elisia	178
Genre Zonilia 13	39	Esp. 1. E. Rubiginosa	178
Ton 4 7 Marchana 4	38)	- 2. E. Dolichus	179
	70	- 3. E. Dolichoides	180
	ii l	— 4. E. Linigera	180
— 4. Z. Comma 1	12	Genre Ambilian	181
	13		
- 6. Z. Subvaria 1	(3)	Esp. 1. A. Palmeri	181
	샕	- 2. A. Crethon	182
— 9. Z. Furnosa	ii l	— 3. A. Gannascus	181
— 10. Z. Acuta 1	45	- 5. A. Daphne	184
— 11. Z. Chiron 1	45	— 6. A. Earysthenes,	183
	46	. — 7. A. Strigilis	186
	妈!	- 8. A. Tigrina	187
	47	- v. A. Eurycie	187 188
	Ĭń l	— 10. A. Astygonus — 11. A. Substrigitis	188
— 17. Z. Ardenia 1	48	— 12. A. Subocellata	189
— 18. Z. Œnopion 1	49	— 13. A. Rubricosa	190
		— 14. A. Coquerelii	191
Genre Madoryx 13	:0	— 15. A. Lycidas	191
	51	Genre Philampeles	192
	5 <u>1</u> [		-
	23 25	Esp. 1. P. Labrusca	193
	56	= 2 P. Phorbas	193
6 M Deberter 1	Ni	- 3. P. Capronnieri 4. P. Anchemolus	194 195
- 7. M. Pan	548	- 5 P. Satellitin	196
	36	- 6 P. Pandorus.	197
Tailor dos Decembers	ł	- 6 P. Pandorus	198
Tribu des Déilérmus-	أور	- 8. P. Pistacina	110
DES 18	101	9. P. Crantor	199
		<b>F</b> ***	

Esp.10. P. Vitis	200	Esp.13. C. Cecrops	235
— 11. P. Hornebeckiana	201	- 14. C. Scrofa	235 235
— 11. F. HULHODOCKIGHA		- 14. C. Goldia	200
— 12. P. Jussieææ	203	On C	an.
- 13. P. Strenua	203	3º Groupe	<b>23</b> 6
- 14. P. Typhon	204	Rsp. 15. C. Charis	236
		— 16. C. Osyris	237
Genre Aleuron	204		
	205	— 17. C. Celerina	238
Ksp. 1. A. Orophilos		18. C. Celerio	238
— 2. A. Carinatum	206	— 19. C. Silbetensis	240
- 3. A. Chloroptera	206	— 20. C. Japonica	241
- 4. A. Smerinthoides	207	- 94 C Gervon	241
- 5. A. Pudens	207	— 21. C. Geryon	243
	208	- 22. C. Oldeniandiæ	
- 6. A. Philampeloides	200	— 23. C. Epicles	244
C	ano	— 24. C. Cajus	245
Genre Everyx	208	— 25. C. Phœnyx	246
Esp. 1. E. Myron	209	- 96 C. Vigil	246
- 2. E. Chœrilus	210	— 27. C. Orpheus	247
2. E. Chucinus		— 21. C. Orpheus	241
- 3. E. Astyanor - 4. E. Pholus	211	to Commo	248
— 4. E. Pholus	212	4º Groupe	240
5. E. Orneus	212	Ksp. 28. C. Yorkii	248
- 6. E. Marginata	213	— 29. C. Brennus	248
o. 2		— 20. G. Diennus	240
Genre Euchloron	<b>2</b> 13	5° Groupe	249
		a composition of the composition	
Ksp. E. Megæra	214	Esp. 30. C. Caicus	249
		0.0	-
Genre Acosmerix	214	6° Groupe	<b>25</b> 0
Esp. 1. A. Anceus	215	Esp. 31. C. Erotus	250
2 A Appendice	216	- 32. C. Pallicosta	251
- 2. A. Anceoides		- 32. C. Paincosta	الظ
— 3. A. Naga	217	0	A
- 4. A. Shervillii	217	7° Groupe	251
— 5. A. Daulis	218	Esp. 33. C. Saclavorum	₹äι
- 6. A. Socrates	219	21 C Palassins	252
- O. A. Doctatos.	2.0	— 34. C. Balsaminæ	
Cone. Fuerman	219	— 33. C. Clotho	253
Genre Eucheryx	219	— 36. C. Rhesus	254
Esp. 1. E. Licastus	220	- 37. C. Lucasi	251
- 2. E. Nomius	221	— 38. C. Butus	233
— 3. E. Crœsus	221	- 39. C. Jugurtha	236
- J. E. Crœsus.		10 C Discide	
— 4. E. Depuiseti ·	222	— 40. C. Placida	256
Genre Chorocampa	223	No Common Dominion	. 20
Genre Chorocampa	220	8º Groupe. Pergesa	217
1er Groups. Daphnis et Da-		Esp. 41. C. Castor	257
	224	— 42. C. Acteus	257
rapsa	221	— 42. U. Acteus	20.
Esp. 1. C. Nerii	224	On Consuma	25%
- 2. C. Protrudens	226	9° Groupe	
— 3. C. Hypothous	226	Esp. 43. C. Helops	<b>₹</b> }×
- J. C. Assessed		- AL C Orientalia	<del>25</del> 0
- 4. C. Angustans	338	— 44. C. Orientalis — 45. C. Equestris	<b>≨</b> (1)
— 5. C. Hesperus	228	- 45. C. Equesuris.	_
	229	— 46. C. Lineosa	261
2º Groupe		- 47. C. Pollux	<b>≟</b> 61
Esp. 6. C. Alecto	229	— 48. C. Lycetus	262
- 7. C. Suffusa	230	— 49. C. Drancus	33
- 7. C. Suffusa	231	— 50. C. Ochracea	33
O C Form		— ou. u. umauta	~~
— 9. C. Eson	232	10° Groupe	264
- 10. C. Echeclus	233	20 070mpo	2004
— 11. C. Kotschvi	234	Esp. 51. C. Tyndarus	364
— 12. C. Capensis	234	— 52. C. Ceratomioides	264

TABLE DES	MATIÈR <b>ES.</b>	563
Esp.53. C. Laevis 268	Genre LAPARA	294
_ 54. C. Alcides 908	Esp. L. Bombycoides	292
— 53. C. Anubus 208		202
- 56. C. Epaphus 267 - 57. C. Druryi 267	Genre Arctonotus	
— 57. C. Druryi 267 — 58. C. Tersa 268	Esp. A. Lucidus.	293
— 50. C. Robinsonii		293
— 60. C. Aristor 270	Genre Tylognathus	
— 61. C. Crotonis 270	Esp. 1. T. Japyx	203 294
- 62. C. Nechus 271	— 3. T. Iphis	295
- 63. C. Hystrix 271 - 64. C. Eumedon 272	- 4. T. Ypanemæ	
— 63. C. Isaon	· ·	
— 06. C. Amadis	Genre Epistor	
— 67. C. Maculator 274	Esp. 1. E. Lugubris	<del>3</del> 97
- 68. C. Fugax 274	- 2. E. Luctuosus	±98
- 69. C. Falco 275 - 70. C. Aglaor 273	- 3. E. Camertus	298 290
— 70. C. Aglaor 273 — 71. C. Neoptolemus 276	— 4. E. Fegeus	
- 72. C. Rhodocera 276		
	1 - 7. E. Gorgon	300
11° Groupe 277	- 8. E. Prominens	301
Esp.73. C. Gundlachii 277	-	204
- 74. C. Irrorata 278	Genre TRICHOLON	301
— 75. C. Porcus 278	Esp. T. Inscriptum	302
12° Groupe 279	Genre Oction	303
Esp.76. C. Elpenor 279	Esp. 1. 0. Tyrrhus	303
- 77. C. Rivularis 240	2. 0. Murina.	304
- 78. C. Porcellus 280	— 3. O. Confusum	301
13° Groupe 281	Genre Asplebon	
Esp.79. C. Succineta 281	Esp. 1. A Dorus	305
- 90 C Ideiana - 300		
- 81. C. Scapularis 283	— 4. A. Dicanus	307
— 81, C. Scapularis	- 5. A. Marginatum.	
- 83. C. Variolosa 284	6. A. Pylas	308
84. C. Versicolor 284	7. A. Sardanus	308
Genre Panacra 285	Genre Lormuna	
Esp. 1. P. Busiris	Esp. t. L. Hyas	310
- 2 P. Automedon 248	· · 2. L. Pumilio	311
— 3. P. Tiridates 286 — 4. P. Assamensis 287	Course Design on	311
- 5. P. Truncata 288	Genre Princeon	
- 6. P. Lignaria 288	Esp. 1. P. (Enotherm	31 312
	= 3. P. Gorgoniades	313
Tribu des Macroglossi-	- 4. P. Nanum.	314
DES	Genre Pogogodon	_
Cana Terron. 300	1	
Genre Temnora 289	- 2. P. Clarkia.	
Esp. 1. T. Rhadamistus 290	- 3. P. Nessus.	
Esp. 1. T. Rhadamistus	_	
- 3. T. Andosa 291	Genre Angonyx	317

Esp. A. Emilia	318	Esp.25. M. Motacilla 347 - 26. M. Faro 348
Genre Œnosanda	318	- 26. M. Faro 348 - 27. M. Passalus 349
Esp. 1. C. Noctuiformis	319	— 28. M. Sturnus 349
— 2. Œ. Spuria	319	— 29. M. Sylvia 350
		— 30. M. Cyniris 350 — 31. M. Mitchellii 351
Genre Perigonia	<b>320</b>	— 31. M. Mitchellii 351 — 32. M. Brrans 353
Esp. 1. P. Magna	330	- 33. M. Fringilla 353
- 2. P. Stulta	321	l — 34. M. Rectifascia 353
— 3. P. Coffeae	322	— 35. M. Scottiarum 354
- 4. P. Nictitans	322	— 36. M. Heliophila 333 — 37. M. Divergens 333
<ul><li>5. P. Nephus.</li><li>6. P. Continua.</li></ul>	323 324	
- 7 P Caliginosa	324	— 38. m. Westermannu 355 — 39. M. Micacea 336
- 7. P. Caliginosa 8. P. Tenebrosa	325	— 40. M. Ædon 357
- 9. P. Lusca	325	— 41. M. Commasia
- 10. P. Ilus	326	- 42. M. Tantalus 358
- 11. P. Holdes	327	— 43. M. Titan 358 — 44. M. Fadus 359
— 12. P. Passerina — 13. P. Undata	327 328	- 45. M. Ceculus 359
— 14. P. Glaucescens	328	— 46. M. Sagra 3m0
- 15. P. Testacea	329	— 47. M. Coryns 361
		- 48. M. Triopus
Genre Microlophia	3 <b>2</b> 9	— 49. M. Phaeton 363 — 50. M. Croatica 363
Esp. M. Sculpta	330	- 51. M. Flavofasciata 364
		- 52. M. Sieboldi 364
Genro Thyreus	330	— 53. M. Fuciformis 365
Esp. T. Abbotii	331	— 54. M. Diffinis 366
		- 55. M. Bombyliformis 367
Genre Macroglossa	332	— 56. M. Affinis
Esp. 1. M. Caudata	333	— 58. M. Thysbe 369
- 2. M. Bombylans	334	— 59. M. Etolus 370
— 3. M. Avicula	334	— 60. M. Gracilis 371
- 4. M. Trochilus 5. M. Regulus	335 335	- 61. M. Ruficaudis 371
— 6. M. Gyrans	336	- 62. M. Pyramus
— 7. M. Milvus	336	— 64. M. Venata
- 8. M. Stellatarum	337	65. M. Radians
— 9. M. Zena	337	— 66. M. Saundersii 374
— 19. M. Pyrrhula — 11. M. Corythus	338 339	— 67. M. Curtisii 374
— 13. M. Sinica.	340	- 68. M. Apus
— 13. M. Aquila	340	— 70. M. Confinis 376
- 14. M Bengalensis	341	— 71. M. Yunx
— 15. M. Gilia	341	72. M. Hylas
- 16. M. Nycteris	342	
— 17. M. Belis	343 343	Genre Sataspes 377
— 19. M. Troglodytus	344	Esp. 4. S. Infernalis 378
- 20. M. Tinnunculus	344	- 2. S. Tagalica 378
- 21. M. Opis	345	
- 22. M. Philegeton	346	Genre Dasysphinx 379
— 23. M. Hirundo — 24. M. Alcedo	346	Esp. D. Mucescens 379
- 24. M. AKCRO	041	- 124h. p. Marcacons 313

## FAMILLE DES SÉSIDES.

Tribu des Sésiaires	382		16
Genre Bembecia	382	— 36. S. Stomoxyformis 40 — 37. S. Formicæformis 40	77
			_
Esp. 1. B. Hylseiformis	383	7° Groups 40	9
•	384	Esp. 38. S. Xiphiæformis 40	19
Genre Sesia	384		_
1er Groupe. Trochilium	386	1	_
		Esp. 39. S. Lomatizeformis. 40 — 40. S. Ichneumoniformis 44	-
Esp. 1. S. Apiformis	387 387	- 40. S. Ichneumoniformis 41 - 41. S. Uroceriformis, 41	
— 3. S. Pimplæformis.	388	- 42. S. Parthica 41	
— 4. S. Repanda.	388	- 43. S. Hymenopterifor-	_
— 5. S. Contracta	349	mis 41	3
— 6. S. Dasypodiformis	389	- 44. S. Masariformis 41	
— 7. S. Marginata	390	— 45. S. Annellata 41	
2º Groupe	390	- 46. S. Tenthrediniformis 44 - 47. S. Astatiformis 44	
Esp. 8. S. Laphriæformis	390	- 48. S. Braconiformis. 41	-
- 9. S. Asilipennis	391	— 49 Euceræformis. 41	
		- 50. S. Mannii 41	-
3. Groupe	391	— 51. S. Colpiformis 44	
Esp.10. S. Asiliformis	393	— 52. S. Bibioniformis 42 — 53. S. Bibionipennis 43	
- 11. S. Anthracipennis.	392	— 53. S. Bibionipennis 42 — 54. S. Philantiformis 42	
<ul> <li>12. S. Panorpæformis.</li> <li>13. S. Vespipennis.</li> </ul>	383	= 55. S. Affinis 42	-
— 14. S. Rhingiæformis.	394	- 56. S. Albiventris 42	
	.704	— 57. S. Aerifrons 42	
4. Groupe	395	— 58. S. Leucospidiformis 42	
Esp 15. S. Stiziformis.	300	— 59. S. Alysoniformis 42 — 60. S. Fenusiformis 42	
— 16. S. Gruneri.	:MC	- 61. S. Stelidiformis 43	
- 17. S. Fervida	396	— 62. S. Osmiiformis 42	
- 18. S. Sanguinolenta	396	- 63. S. Chalcocnemis 42	8
5. Groups	396	00 ('	_
Esp.19. S. Scolimformis	396	9° Groups 42	1
— 如. S. Spheciformis	397	Esp. 64. S. Azonos 42	
— 21. S. Mesiæformis	:NA	— 63. S. Agriliformis 42	7
- 22. S. Anthraciformis.	308	10r Groupe 42	R
- 3. S. Conopiformis 3. S. Nomadæpennis	399 399		
- 25. S. Cephiformis	400	Esp. 66. S. Doryliformis 42 — 67. S. Chrysidiformis 42	
- 26. S. Tipuliformis	400	- 68. S. Chalcidiformis. 43	
— \$7. S. Cypipiformis.	401	- 69. S. Elamoiformia	_
- 28. S. Mellinipennis.	402	— 70. S. Fæniformis 43	
ー コリ、S. 異elliniformis	403		
- 30. S. Chrysidipenais.	403	Genro Paranthrena 43	1
6° Groupe	404	Esp. 1. P. Tineiformis 43	3
Esp. 31. S. Myonmformis	404	— 2 P. Brosiformis 43	Ż
ー パン 5. Typhiaformis.	404	Conne Mynes.	•
— 33. S. Pipiziformia	405	Genre Myrsila 43	
- 31 > Culiciformis.	405	Esp. M. Auripennis 43	3

## SÉSIES SUPPLÉMENTAIRES.

_						
Esp.			Bassiformis	434	Esp.54. S. Leiæformis	436
_	2.	s.	Denudata	435	- 53. S. Alterna	436
_	3.	S.	Pyramidalis	435	- 56. S. Cupreipennis	457
_	4.	s.	Pleciæformis	436	- 57. S. Gravis	457
	5.	S.	Tricincta	436	- 58. S. Bicincta	459
-	6.	S.	Syringæ	436	- 59. S. Phasiæformis	458
	7	S	Kvitingo	437	- 60. S. Auriplena	439
<u>-</u>	8.	Š.	Caudata.	437	- 61. S. Claviformis	439
_	9.	Š.	Odyneripennis	437	- 62. S. Læta	439
			Emphytiformis.	438	- 63. S. Cryptiformis	480
_	44	š.	Hylotomiformis	438	- 64. S. Longipes	460
	13	š	Pyralidiformis.	439	- 65. S. Ruficincta	461
_	13	Š.	Fulvipes	439	- 66. S. Insularis	461
_	14	Š.	Scitula	439	- 67. S. Candescens	463
_	iR.	Š.	Pyri	440	- 68. S. Semirufa	463
_	18	Š.	Sapygæformis.	440	— 00. 5. Somit dia	
_	47	e.	Geliformis	441	Genre Tarsa	463
	10	٠٤٠	Myrmosæpennis.	441		463
			Buprestiformis.	442	Esp. T. Bombyciformis	403
	18.	ə.	Apprestioring.	442	Carra Carra . T.	464
_	ZU.		Anomaliformis Dinetiformis	442	Genre Sincara	
_	ZI.	5.	Trunk aniformis		Esp. S. Eumeniformis	464
_	ZZ.	5.	Tryphoniformis.	443	•	
			Plecticiformis	443	Genre Alonina	461
_	Z4.	5.	Sciophilæformis.	444	Esp. A. Rygchiformis	465
_	25.	Ş.	Cerceriformis	444	Esp. A. Rygennormis	400
_	26.	S.	Rhyssæformis	444	Genre Saunina	443
-	27.	S.	Cladiiformis	445		
_	28.	Ş.	Glyptæformis.	445	Esp. 1. S. Uroceripennis	463
_	29.	S.	Opiiformis	446	- 2. S. Cambodgialis	166
	30.	S.	Pellastiformis	446	_	
	31.	S.	Ceropaliformis	447	Genre Toosa	467
_	32.	S.	Crœsiformis	447	Esp. T. Glaucopiformis	467
_	33.	S.	Ischniformis	447	map. It common process many	
_	34.	S.	Porizoniformis	448	Genre Sura	417
-	35.	S.	Panurgiformis	418	Esp. S. Xylocopiformis	467
	36.	S.	Panisciformis	448	Esp. S. Aylocophormis	401
_	37.	S.	Blaciformis	449	Conno Merimora	468
_	38.	S.	Producta	449	Genre Melittia	
-	39.	S.	Basalis	450	Esp. 1. M. Ashtaroth	468
	40.	S.	Fasciculipes	450	🗕 2. M. Tibialis	469
-	41.	S.	Pulchripennis	450	— 3. M. Cucurbitæ	469
	42.	S.	Ruficaudis	451	- 4. M. Pulchripes	470
	<b>4</b> 3.	S.	Crassicornis	451	- 5. M. Andrænæpennis.	470
_	44.	S.	Plumipes	452	- 6. M. Satyriniformis	471
	45.	S.	Apicalis	452	— 7. M. Rutilipes	47.1
_	46.	S.	Ægualis	453	- 8. M. Mysolica	473
_	47.	S.	Unicolor	453	— 9. M. Astarte	47.5
	48.	S	Doleriformis	454	- 10. M. Bombylipennis	47.
_	49	S	Mesochoriformis.	434	- 11. M. Phorcus	47
_	30	S	Hilariformis	454	- 12. M. Eurytion	4.1
_	51.	s	Platyuriformis	455	- 13. M. Bombiformis	4.4
_	52	Š	Exochiformis	455	- 14. M. Lagopus	
_	83	Š	Ochracea	455	_ 15. M. Ursipes	473
	···	٥.	· · · · ·	₩.	1	711

TABLE DES	matières.	567
Esp.16. M. Cyaneifera	Esp. 5. A. Confinis	485 486 486 487
Tribu des Stygides 479	Genre Toyais	488
Genre Stygia 479 Esp. S. Australis 480 Genre Atychia 481	Esp. 1. T. Fenestrina	488 489
Esp. 1. A. Appendiculata . 482 — 2. A. Pumila 483	Genre Pachythyris	
- 3 A. Radiata 483 - 4. A. Orbonata 484	Esp. 1. P. Rajah	492 492
	GASTNIDES.	SIS
Tribu des Castniaires 494	— 31. C. Decussata	519 519
Genre Castnie. Castnia 495	= 33. C. Actinophorus	
Esp. 1. C. Geron	— 34. C. Mygdon. — 35. C. Phalaris. — 36. C. Argus. — 37. C. Dionea — 38. C. Subvaria. — 39. C. Inca.	521 522 523 524 524
- 7. C. Schrebersii 500 - 8. C. Pylades 501	- 40. C. Harmodius 41. C. Licus	536
9. C. Cácica	— 42. C. Licoides	
- 13, C. Meditrina 505 - 14, C. Morphoides 508	— 46. C. Invaria	530
- 15. C. Zerynthia	48. C. Tricolor	531
— 19. C. Borsduvalit 510 — 20. C. Menetriest 511 21. C. Galinthias 512	— 52. C. Cronis — 53 C. Cronida	534 535
- 22 (. Dalmann 512 - 23, (. Palatinus 513	Genre CERFTES	53 <b>5</b> 536
- 24. C. Hegemon 514 25. C. Evatthe 514 26 C. Viryi 515	- 2. (. Thais	537 538
27. C. Hubnert, 516 28. C. Eudesma 517 20. C. Cochrus 517	Genre ORTHIA Esp. 1. O. Therapion	539 540

368	14000	des matières.	
Esp. 2. 0. Acre — 3. 0. Pela		540 Tribu des Synémonides.	5
- 4. 0. Unif	asciata		5
- 5. 0. Aug - 6. 0. Next	ias	542   Esp. 1. S. Sophia	3
- 0. U. Nexi		2. S. Parthenoides	5
Genre Gazera.		543 - 3. S. Catocaloides	24.0
Esp. 1. G. Linu	ıs. <sub>: -</sub>	544 - 5. S. Nopsa	5
2. G. Heli 3. G. Pers		545 — 6. S. Selene 546 — 7. S. Nais	3
4. G. Colu	mbina	546 - 8. S. Læta	3
- 5. G. Zagu		547 — 9. S. Plana	5
— 0. 0. Simi		547   — 10. 3. Idalia	
ERRATUM	. <b></b>		:
Supplement	•		:

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.



FALCONER HIOLOGY LIB. JUL 1 7 2000

DATE DUE						
Collections.		- American Mil				





FALCONER BIOLOGY LIB. JUL 1 7 2000

DATE DUE						
CARL CONTRACTOR						
	1	100	HALD IN CO.			